



DIOSCORIDIS

PRO COE BELICE
ECA PHARMACOPE
ORV VRBIS ELYE
LIAR





IN HOC VOLVMIÑE CONTINENTVR

VALERII CORDI SI- mesusij Annotationes in Pedacij

*Dioscoridis Anazarbei de Medica materia libros V. longè altè quàm an-
tè hac sunt euulgatæ.*

EIVSDEM VAL. CORDI HISTORIAE STIRPIVM LIB. III. POST-
humi, nunc primum in lucem editi, adiectis etiam Stirpium iconibus: & breuissimis Annotatiunculis.

SYLVA, qua rerum fossilium in Germania plurimarum, Metallorum, Lapidum & Stirpium aliquot rario-
rum notitiam breuissimè persequitur, nunquam hactenus usq.

DE ARTIFICIOSIS extractionibus Liber.

COMPOSITIONES medicinales aliquot, non vulgares.

HIS ACCEDVNT

STOCC-HORNII ET NESSI IN BERNATIVM HELVETIORVM DI-
tione montium, & nascentium in eis Stirpium, descriptio Benedicthi Aretij, Græcæ & Hebraicæ linguarum
in schola Bernensi professoris clarissimi.

ITEM


CONRADI GESNERI DE HORTIS GERMANIAE LIBER RECENS;
unà cum descriptione Tulipæ Turcarum, Chamæcerasi montani, Chamæmespili, Chamænerij, & Conizoidis;

Omnia summo studio atque industria doctiss. atque excellentiss. viri CONR. GES-
NERI medici Tigurini collecta, & præfationibus illustrata.



Cum Gratia & Priuilegio Cesareo ad annos octo.
M. D. LXL.

Argentorati, 1561.



Inclyto & spectabili Collegio medi-

CORVM IN ILLVSTRI ACADEMIA VVITEBER-

gensi, CONRADVS GESNERVS Medicus & Philosophiæ interpres in schola Tigurina salutem
& pacem Christianam P.



ALERII CORDI SCRIPTA QVAECVNQVE COL-
ligere potui (clarissimi uiri & medici praestantissimi)
ut in publicum tandem ederentur cum adornassem nu-
per, & singulos libros singulis patronis, illis ferè à qui-
bus aliquos eorum acceperam, dedicasse: Primum
qui eius in Dioscoridei Annotationes continet, in
Iohannis Rallæ pharmacopolæ Lipsensis auunculi es-
us & studiorum promotoris benignissimi, nomē in-

scripsi. Paulò post uerò cum intellexi, optimum illum uirum, ex hac mor-
tali uita nobis sublatum esse, ne suo patrono priuatus hic liber, nullo aduer-
sus calumnias protectore muniatur, non illum solum, sed pariter omnes e-
ius lucubrationes (quanquam singulas, ut dixi, singulis etiam patronis di-
caui) inclyto patrocinio uestro commendare iuxta & nuncupare uolui: Idq;
non leues ob causas. Cum enim tota Academia uestra, omnium quas Ger-
mania nostra habet, omni doctrinae sacrae humanæq; genere excellentissi-
mis doctoribus, longo iam tempore, facile principatum obtinet: tum me-
dicæ facultatis Collegium nobilibus eruditione & uirtute professoribus
floreat. Huius autem cum aliquando alumnus atq; discipulus multis, ut ac-
cepi, annis Val. Cordus fuerit, (quamuis & Lipsiæ interdum, non paucis
mensibus hæserit) omnes eius ingenij fœtus, ad eandem Facultatem ueluti
parentem, quæ procul dubio ipsi iam quasi pupillis, materno amplexu reci-
piendis, ac fouendis benigna sit futura, remittendos iudicaui. Nam & CL.
V. Vitus Vinshemius, Cordum nostrum olim audiuisse amasseq; fertur,
& Casparus Peucerus, magnificus nuper Academiae uestrae Rector, medi-
cus ac philosophus summus, Phœnicis illius Melanchtonis gener, notum
clarumq; eundem quin habuerit, non dubito: & alij fortè, quorū nomina
ignoro. Mihi quidè, si fortassis miramini, nulla unquā cum Cordo uiuen-
te notitia intercessit, sed singularè in materia medica doctrinam, ab eius obi-
tu, predicari cum audiuissem, & iam aliquos ab Euricio patre editos libros
audivisimè perlegissem, nescio quē intra me cōsentientis naturę uis, ad illum
amandū me pertraxit. Pulchrè Homērus: *ὡς αὖ τὸν ὁμοῖον ἔχει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.*
Minus uerò mirū est similitudine quadam tacitoq; cōsensu animos uiuen-
tium trahi iungiç. Sed à defunctis quoque ad eos qui supersunt admiran-
dæ huiusmodi conuenientia & coniunctionis ingeniorum fomites manare
re, magnam sanè admirationem meretur: & ineffabilis quadam ἀπόρροια
(ut Democritus forsitan loqueretur) aut σύρροια hæc esse uidetur. Σύμνωρος δὲ
ἀποκ' αὐτοῦ ἔστι τὸ μόνον ὁ μικρότερος κόσμος κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαίαν ἰπποκράτη; ἀλλὰ
πολύ μᾶλλον καὶ πρότερον ὁ μέγας, ὁ τοῦ ὀλίγου ἀρχέτυπον: καὶ τὸ τό γε ὃ καὶ ἡμεῖς κατὰ τὰς

P R A E F A T I O .

ἀνὰ τὰς καὶ νοεῖς, ἢ τὰς γνῶντας καὶ αἰσθύνοντας φύσεις. Sed hæc forsân nimis philosophice: & Deo potius quàm naturæ *συμπάθειαι* tales acceptæ sunt ferendæ. Ego certè, qui Val. Cordum de facie nunquam uidi, nec ulla naturali aut ciuili occasione illum habui coniunctum, occulto quodam animorum (*αὐτόματοι δ' ἀγαθοὶ ἀγαθῶν πρὸς ἑωτὰς ἵενται*) & mira studiorum consensione, excitato in eius manes amore, modis omnibus, quæcunque literis mandauit conquirenda, exornandaque, cum aliàs, tum iconibus Stirpium additis, denique edenda ac defendenda per me, & alios optimos doctissimosq; patronos, quorum uos principem locum tenetis, mihi proposui: idq; magna ex parte consecutum me spero: eoque nomine Deo immortalis gratias habeo: & præstantias uestras, ut mihi, si audacius feci, ignoscant, oro. huius enim audaciæ præclarus nostro sæculo Norimbergæ medicus Hieronymus Heroldus Lipensis, mihi suator fuit: Cuius consilio ut procliuius ille meus in Cordum amor, sic erga uos obseruantia, facile subscripsit. Cordi autem eiusque librorum patrocinium, alacri paratoque animo uos susceptruros, adeò non diffido: ut multis ad id uos cohortari superuacancum putem. Non equidem omnes eius opiniones defendendas dixerim, ut homines sumus: sed eas quæ ueritati consonæ uidentur, ut sunt pleræque: & ipsum in genere optimi iuuenis eruditionem, industriam & conatus, eius denique famam & gloriam, quam meritus est amplissimam. Recentiorum certè nonnulli ex inuentis scriptisq; Cordi partim editis, partim non editis, & profecerunt, & sua exornarunt scripta, nullo id candore confessi: id quod mihi, qui suam cuique laudem tribuendam censeo, non parum doluit, nec minima, ut de operum eius editione cogitare, causa hæc extitit. Nuper doctissimus amicus meus de hisce Cordi libris, his uerbis ad me scripsit: Velim te in præfatione operum Val. Cordi ipsum excusare, quòd „ ultima manus eis non sit adhibita. Profectus enim in Italiam, Romæ febrī „ ardente extinctus est: cum plurimas per Italiam stirpes obseruasset, & multa in Annotationibus in Dioscoridis libros emendasset: quæ omnia per „ studiosos quosdam medicinæ fuerunt surrepta. In multis quidem ipsum „ sententiam mutasse affirmauit mihi piæ memoriæ uir Cornelius Sittardus „ medicus, socius & comes peregrinationis eius, atque etiā morbi, nam euaserat ex morbo per quartanam. Sic ille: qui hoc etiā significauit, anno „ superiore, Valerij fratrem medicum Hildeshemi, chemisticæ artis & re- „ mediorum quæ arte illa ad medicinam parantur peritissimum, diem suum „ obiisse. Digna mihi certè quamuis imperfecta, Cordi scripta, quæ lucem „ publicam uiderent, & ad posteritatem transirent, sicut Augusto olim Vergilij Æneis, uisa sunt. Nam uel inchoata peritorum artificum opera, imperitorum operibus, quibus ultimam illi manum imposuerunt, meritò præferuntur. Et si uerò innumera à Cordi obitu ad hunc usque diem, circa materiam medicam, quæ ipsum latuerant, inuenta sunt, plurimis passim uiris eruditissimis in amoenissimum hoc studium magna cum æmulatione incubentibus: Summa tamen hæc illius laus est, quòd inter primos ferme sæculi nostri harum rerum inuestigatores, permulta inuenerit, paternæ omnino eruditio.

eruditionis & gloriæ hæres. Nam, si quid ego iudico, pater eius Euricius, uir omni genere doctrinarum cultissimus, medicus peritissimus, & poëta optimus, dum uiueret, neminem in erudita Stirpium cognitione parem habuit. Patris uerò in materia medica studium & industriam æmulatus filius, etiam superauit: patris ad summam hanc laudem exemplo, iuuenili feruore, ingenij dexteritate, honestæ gloriæ studio, peregrinationibus multis & longinquis, labore & industria maximis, denique singulari gratia Dei præeunte & continente reliquas causas omnes, excitatus, adiutus atque promotus: ita ut inter primos, principes & præcipuos quosque reuocata ab omni antiquitate, ornataeq; & auctæ Stirpium ac totius medicæ materiæ cognitionis, authores & assertores censeret ac celebrari apud omnem posteritatem sit commeritus, neque uir bonus aut eruditus quisquam hanc ei gloriam inuidere debeat, aut possit. Quod si Deo placuisset, diutius in hac uita eum relinquere, nemo omnium hodie, qui rei plantariæ cognitione excellunt, (pace ipsorum dixerim) hanc palmam ei præriperet, non magis quàm Herculi extorqueret clauam. Huius igitur Academiæ uestræ tanti discipuli, libros per me adornatos & editos (ne uel interirent, uel ab hominibus ambitiosis & alienæ gloriæ insidiantibus premerentur,) ornatissimi & doctissimi uiri, serena fronte, placidoque uultu suscipite, & quoad eius fieri potest, & par est, in clientelam receptos defendite:

mèque amantissimum obseruantissimūque uestri re-

damate. Valete: Tiguri. tertio Cal. Iunij

anni M. D. LXI.

CON. GESNERVS MAGNÆ SPEI IUVENI

N. IOANNIS RALLÆ PHARMACOPOLÆ LIPSENSIS, FOE-
licis memoria, filio S.



VCTAS ET EMENDATAS AB AVTORE, VAL. CORDI IN
Dioscoridem Annotationes, meo studio edendas, optimo &
præclaro in arte sua uiro Ioan. Rallæ parenti tuo, Cordi autem
auunculo, nuper dedicaram: ne uidelicet posthumus liber, qui
nunc uigesimo ferè anno à conditoris sui obitu in publicum prodit, inter
tot Momos & alienæ gloriæ fucos, sine tutore aliquo appareret. Æquum
autem uidebatur, ut liber ab eo mihi communicatus primùm, (hunc enim
ad me mittendum à parente tuo, ni fallor, Ioan. Placotomus insignis me-
dicus accepit,) ad ipsum reuerteretur: præsertim cum maximam studio-
rum suorum partem libri author, eius ex sorore nepos, ipsius benignitati
promotioniq; ut fama prædicat, acceptam referre solitus fuerit. His causis
etiam tertia accedebat, quòd in simplicibus medicamentis dignoscendis,
summa parentis tui industria ac eruditio esset: id quod & alijs argumentis,
& misso ad me olim cultissimi horti uestri locupletissimo Stirpium cata-
logo, facile cognoui. Neque me latet multa egregia medicamenta, pharma-
copolis & medicis plerisque ante ipsum incognita, ab ipso primùm uestra
in regione demonstrata fuisse. Itaque inscriptam in eius nomen dedicatio-
nem primæ huius Cordi operum partis, ante paucos menses ad typogra-
phum miseram, nullo mihi domi exemplari seruato. Paulò post uerò si-
mul & optimum parentem tuum, fatis concessisse: & dedicationem meam
in uia, nescio quorum hominum perfidia, intercidisse intellexi. Illam qui-
dem sibi non ingratam fore per benignis ad me literis, paulò ante mortem,
iam significauerat pater. Quòd si exemplar mihi superfuisset, omnino
idem denuo ad typographum misissem excudendum. Vera enim solidas
que gratitudo, non erga uiuentes solùm, sed etiam defunctos, suum tuetur
ac seruat officium. Et sanè doleo ita contigisse. memini enim de Cordo in
epistola illa quædam me protulisse, ab amicis accepta, quorum non amplius
recordor. Ne uerò sine patrono in manus hominùm, quorum plerique
alienis laboribus utcunque elaboratis, obtrestant & insidiantur, liber hic
imperfectus perueniret, unius defuncti loco plures excellentissimosque pa-
tronos delegi, totum nempe in illustri Academia Vuitebergenſi medi-
corum Collegium: qui omnes hosce posthumos Cordi libros, tueri ac ser-
uare, ut equidem spero, dignabuntur. Tibi autem priuatim, egregij patris
optime fili, has in Dioscoridem Annotationes nuncupare uolui, ut sicuti
unicus ab eo filius es relictus, annum ætatis, ut audio, uix decimum sextum
agens, ita ut ad paternæ etiam gloriæ, industriæ, doctrinæq; fastigium aspi-
res, te cohortarer, & currenti (quod aiunt) calcar adderem. Id si, ut cœpi-
sti, facere pergas, spes iusta est, te quoque ad longam, patris instar, senectam,
animo corporèq; ualentem, domi tandem inter tuos, similiter piè placidè
deque, tuo fato functurum, & ad uitam migraturum meliorem. Quod
quidem

quidē ut nobis, & omnibus Christum profitentibus, scēliciter eueniat; is ipse Dominus & Præceptor noster, unigenitus Dei æterni filius largiatur. Nos interea inter tot tantæque miserrimæ huius & ancipitis uitæ discrimina, ad tantum certamen nos præparabimus, ac meditabimur mortem: cuius exempla in omni ætate, fortuna, ualitudine, quotidie præter omnem expectationem uidemus. Nam uel ex amicis, quibus aliquos huius uoluminis dicaueram libros, perbreui sanè tempore, non solum parens tuus, iam senex: sed etiam Philippus Bechius medicus eruditione præcellens, in uigore ætatis, cum hætenus semper optimè ualuisset, Basileæ: & iuuenis omnino Caspar Collinus pharmacopola non uulgaris, apud Vallesios, obierunt. Meditemur igitur communem omnium finem, ne nos miseros inopinatò opprimat. Vale, & me ama: meque uicissim tui amantissimum fore, propter CORDUM præcipuè cognatum tuum, quem uides quanti faciam, tibi persuadeas. Tiguri Helueticorum, anno Salutis M. D. LXI. Calendis Augusti.

CON. GESNERVS CANDIDO

LECTORI S.



DOCTISSIMAE VTILISSIMAEQUE ISTAE VAL. CORDI Annotationes in Dioscoridis libros V. plurimū ab ipso auctore, paulo ante mortem eius, emendatæ (asterisco * ubi aliqua super genuina lectione dubitatio, aut aliquid imperfectum erat adiecto) auctæq; ab initio operis usque ad Libr. II. Caput CVIII. (quod est de Hordeo,) nunc primū prodeunt. Inter quæ etiam pulcherrimæ sunt de Succini, deq; Sacchari natura disputationes. Quæ uerò deinceps sequuntur, quoniam ab auctore morte præuento, absolui non potuerunt, ex prima editione, (quæ scripta ab eo antequam in Italiam uenisset, Francfordiæ olim publicata est, cum Gualtheri Riffii Dioscoridæ,) continuauimus. emendatiora tamē ea quoq; & explicatiora dedimus, cum aliàs, tum ex breuissimis quibusdam ipsius Cordi (aut ex eius ore exceptis) in V. Dioscoridis libros Annotationibus manuscriptis. Hoc nō dissimularim, nonnulla quæ superflua mihi uidebantur, & nihil quam oneratura lectores, (ut capitula quædam in Libro secundo, super aquatilibus quibusdā animantibus, Cordo, aliisq; eo tempore per Germaniam eruditis, adhuc incognitis,) penitus à me recisa esse: quòd non solum utile nihil ex professo, sed ne obiter quidē continerent quicquam. In Capitum distinctione magna est uarietas: nos fere iis numeris notauimus Capita, ut in lac. Goupyli Dioscoridis editione Græcolatina Lutetiæ anno 1549. edita habentur. Notha quædam in Dioscoridis libris addita uel omiſsa, Capitū uarietatem fecerunt, &c. iis nos aliquando nullum numerū apposuius, ut cum Goupyli editione nobis conueniret. Porro omnia ubiq; rectè dixisse & iudicasse Cordū, ego mihi defendendum non sumo: nec libuit meas censuras ubique addere, etiam ubi potuissem; nam in multis ne potuissem quidem.

QVI NAM SCRIPTORES DIOSCORIDIS DE MEDICA MATERIA libros, & quomodo explicauerint. De nonnullis, quàm qui hodie uiuunt, liberius iudicabunt posteri.

AMATVS Lusitanus medicus, primū Ioan. Roderici Castelli Albi Lusitani nomine, in duos priores Dioscoridis libros, commentarios quosdam edidit: deinde, rursus Amati Lusitani nomine Enarrationes in quinque Dioscoridis libros: quæ

Venetis primum excusæ sunt, mox Argentinæ apud Vuendelinum Rihelium, anno 1554. in 4. Nomenclaturas rerum in uulgaribus linguis, Italica, Hispanica, Gallica & Germanica adiecit. Totus ad rerum cognitionem inclinat: in quibus multa quidem bona & rara docet: sed non raro etiam aberrat. Multa aduersus errores eius Matthiolus nuper scripsit, Audio eum emendasse plurima, & nouam editionem moliri. Vide etiam infra in R. Constantino.

ANDREAS Lacuna Segobienfis, medicus Iulii III. pont. max. Annotationes in Dioscoridem iuxta uetustissimorum codicum fidem elaborauit: quas Gul. Ro= uillius impressit Lugduni 1554. in 16. In præfatione scribit se Dioscoridis libros in Hispanam linguam uertisse, & scholiis minime pœnitendis illustrasse. (Eum codicem Antuerpiæ excusum audio cum iconicis figuris.) Quo labore, inquit, dum fungerer, annotaui septingentos uel plures locos, in quibus author ille, partim peruersus ab interpretibus Latinis, (in Ruellii quidem translationem potissimum animaduertit;) partim mutilus ac truncus, partim genuina sua præscq; destitutus dictione, conspiciebatur: quos omnes quam accuratissime fieri potuit, castigauit, ac restitui, adiutus antiquissimo ac integerrimo codice manuscripto, &c. Nuper etiam libellus quidam huius authoris, duabus (si bene memini) chartis conscriptus, aduersus Cornarii Dioscoridis librorum interpretationem editus est.

BARTHOLOMAEVS Marantha Venusinus medicus, condidit Methodi cognoscendorum simplicium medic. libros tres, eleganter profectò & eruditè: quos suis typis publicauit Vincentius Valgrisius Venetiis, anno 1559. in 4. Hi ad Dioscoridis innumera loca rectè intelligenda utilissimi sunt: ut cõmentarii quidam in eius libros, non grammatico tamen, sed philosophico more instituti, uideri queant. Promittit autem ex professo etiam in Dioscoridem commentarios: quos ualde desyderamus.

BENEDICTVS Textor Segusianus, medicus per eruditus, libellum Destirpium differentiis ex descriptionibus Dioscoridis, utili sanè & pulcherrima methodo digessit. Is in Gallia primum prodiiit: deinde Argentinae apud Vuendelinum Rihelium Hier. Tragi Stirpium historiae coniunctus.

CONRADVS Forerus Vitoduranus, iuuenis doctissimus, amicus noster, easdè, ut Benedictus Textor Stirpium differentias digessit, non quidem è Dioscoridis solum, sed etiam Plinii & Theophrasti editionibus. Nondum excusas puto.

CONRADVS Gesnerus. Lege in Orisatio.

FAVSTVS Longianus Dioscoridem in linguam Italicam ante P. Andream Matthiolum conuertit.

GUALTHERVS Riffius Argentinensis, ante decennium (circa annum Domini 1549.) si probè memini, defunctus, Dioscoridis libris à Ioan. Ruellio translatis, imagines crassiusculè factas; & breues explicationes adiecit: quas Christianus Egenolphus impressit Francoforti, anno 1549. in fol. unà cum Valerii Cordi nostri in Dioscoridem annotationum editione prima, sicuti diximus. In iis quidem nihil ferè suum adfert: sed aliorum ferè scripta repetit, satis breuiter.

H. B. P. medicus nescio quis, neque enim aliter quam tribus his literis innotescere uoluit: Annotationes breues singulis Dioscoridis capitibus ex interpretatione Ruellii subiecit, Adiectæ sunt etiam icones, perparuæ & crassiusculæ; Balthasar Arnolletus excudit Lugduni 1550. in 8. In exprimendis (inquit) simplicium facultatibus & forma, Galenum secutus sum: in priuata uerò simplicium censurâ, eximium illum & eruditione & perspecta diligentia Matthiolum reddidi, &c.

HERMOLAVS Barbarus patritius Venetus, uir eruditionis nomine nunquã satis laudatus, Dioscoridem nobis primus Latinum reddidit, elegantissima quidem & Pliniana dictione: ubi tamen accusatur, quòd nimio Plinium imitandi studio nunquam à Dioscoridis sententiâ recesserit. Adiecit etiam Corollarium longè doctissimum, & uariis argumenti, quo non Dioscoridem solum & rem medicam illustrat: sed simul utranque linguam & omnem philologiam pulcherrimè exornat.

Diosco-

Dioscoridis librorum interpretatio unà cum Corollario, impressa est olim in Italia; Corollarium uerò duntaxat in Germania Argentinae apud Ioan. Schottum 1529. in fol. cū Io. Ruellii interpretatione, & Marcelli Vergilii Cōmentariis ab Othone Brunfelsio decurtatis: ita ut singulis capitibus suū Corollarium subiiciatur. Et eodem anno Coloniae apud Io. Sotérē in fol. post Dioscoridis contextum Græcum, & Marcelli Vergilii ē regione interpretationē, subnexis ad singula cāpita eiusdem commentariis integris, seorsim in operis fine.

IACOBVS Goupylus rei medicæ hoc tempore disertissimus professor Luteciæ, dedit Castigationes in Dioscoridis libros, breuissimas, sed utilissimas; quibus contextus Græcus collatis exemplaribus diuersis, (excusis & manuscriptis, & locis ueterum medicorum Dioscoridem citantium: & interpretationibus quibus Latine recentiores quidam huius scriptoris libros uerterunt, ac olim Plinius, &c.) emendatur. Arnoldi Bircmanni uidea publicauit Parisiis 1549. in 8. unà cum Græco Dioscoridis contextu, & interpretatione Ruellii ē regione.

IANVS Cornarius Germanus Zuiccauiensis medicus, Dioscoridis De materia medica libros V. & unum De bestiiis uenenum ei aculantibus, alterum De letalibus medicamentis, Latinos fecit, prioribus quinq; Emblemata addidit; posterioribus Expositiones. Opus euulgatum est Basileæ in officina Frobeniana, anno 1557. in fol. In his emblematis & expositionibus, etsi rerum cognitio non admodum ultra quam ab aliis prius locupletatur: uocabulorum tamen in utraq; lingua uis ac proprietas plurimorum pulchrè explicatur: & genuina lectio passim tum Dioscoridis, tum Plinii, locis innumeris inuicem collatis restituitur.

IOAN. Agricola Ammonius, præclarus Ingolstadii nostro seculo medicinæ interpres, reliquit Indiscem copiosum simplicium medicam, à Dioscoride proditorum: & alium communem libris de simplicibus, Dioscoridis, Galeni, & Serapionis.

IOAN. Baptistæ Egnatii in Dioscoridem Annotationes extare feruntur, quas nondum uidi.

IOAN. Dantzius Germanus, (quo cum aliquando Italiam ingressus sum, fertur autem obiisse Francoforti ante annos aliquot,) Dioscoridis uolumen in Germanicam linguam transtulit: quod Francoforti, ni fallor, cum iconibus excusum est.

IOAN. Lonicerus Germanus, qui longo iam tempore, in Academia Märpurgensi floruit, Scholía quædam in Dioscoridis libros composuit, cum nomenclaturis Græcis, Latinis, Hebraicis & Germanicis. Liber impressus est Francoforti 1543. in fol.

IOAN. Manardus Ferrariensis medicus, in doctissimis epistolis suis cū aliā multa passim ad cognitionē medicaminū simplicium eruditè docet: tū in prima libri 8. epistola Marcelli Vergilii interpretationē in primum Dioscoridis librū examinat.

IOAN. Ruellius Suefionensis, medicus, Gallus, Dioscoridis libros Latine expressit inter primos nostra memoria, post Hermolaum quidē, sed ante Marcellum, à quo aliquoties notatur. deinde eandem interpretationem recognouit, ita ut cæteris ferè omnibus hodie à doctissimo quoque præferatur. Emendari tamen in ea quædam poterunt, à Iacobo Goupylo, Andrea Lacuna, Cornario, & Matthiolo obseruata. Eiusdem Ruellii De natura stirpium libri iii. eleganter & copiose conscripti, ueluti commentarii quidam cum in Dioscoridis tum aliorum De plantis libros existimari possunt. li Luteriæ primum, deinde Basileæ excusi sunt: & nuper à quodam (ut audio) in Compendium contracti.

MARCELLVS Vergilius Florentinus Dioscoridē, mox post Hermolaū & Ruellium Latinitate donauit. & commentarios doctissimos adiecit: in quibus partim Dioscoridis uerba explicat, partim translationis suæ rationem reddit, partim uerò Hermolai translationem reprehendit. Ad ipsam quidem plantarum rariorum aut incognitarum nōtionem non multum emolumenti adfert.

MELCHIOR Guilandinus Borussus scripsit quædam de erroribus Matthioli in Dioscoridem commentariorum, &c.

ORIBASIVS Sardonius Collectorū libris undecimo & duodecimo, simplicium medicamentorū descriptiones Sex Dioscoride præcipue (ordine literarum proponit. Euporiston uerò libro 2. eodem ordine, facultates ac uires eorum, ex Galeno opinor mutuatus. Li Baptista Rosario Nouariensi medico interprete Latini extant, extusi ab Ilingrinio Basileæ 1557. cum reliquis Oribasii. Quod si Græcè etiam eorū copia daretur: possent forte Dioscoridis quædam inde emendari. Nos quoq; Historiam plantarū dedimus eodem ordine, ex Dioscoridis descriptionibus: quibus ex Theophrasto, Plinio, & recentioribus Græcis multa addidimus: uires autē breuissimè ex Paulo Aegineta, &c ea excusa Basileæ in 2. anno 1547. & est mox etiam Venetiis in 16.

OTHO Brunfelsius Moguntinus Marcelli Vergilii in Dioscoridem commentarios decurtauit, ut supra in Hermolao diximus.

PETRVS Andreas Matthiæ Senensis Dioscoridem primū Italicè interpretatus est, & commentariis in eadem lingua copiosis illustrauit. Deinde etiam Latine reddidit, adiectis figuris quam plurimis elegantissimisq; stirpium. Vincentius Valgrisius excudit aliquoties Venetiis, nō sine nouo semper auctario. Nunc etiam Pragæ in Bohemia ubi author degit, Bohemica Germanicaq; lingua idem opus, cū maiusculis & perpulchris iconibus, longe auctius excudi, aut excudendum esse breui audio, primum Bohemicè & Germanicè, deinde etiam Latine.

PETRI Paduani Additiones quasdam in ueterem translationem Dioscoridis (quæ ferè integra habetur in Syluatici Onomastico & Io. filii Serapionis libro de simplicibus) extare aiunt.

R. CONSTANTINVS edidit Correctiones Lemmatū & Adnotationes in Amati Lusitani enarrationes, cū illis pariter excusas Lugduni à Guil. Rouillio 1578. in 8. unā cum iconibus ex Fuchsi ferè libro desumptis, exiguis.

VALERII Cordi Sinesii Annotationes doctissimas in Dioscoridis libros V. secundo ab autore auctas & recognitas &c. Josias Rihelii cudit Argentinæ anno 1561. in folio, unā cum libris quatuor eiusdem, quibus Descriptiones Stirpium uariarum continentur, & alia quædam egregia: & Con. Gesneri De hortis Germaniæ libro.

Audio & Rufi ac Plutarchi quædam fragmenta in Dioscoridis libros extare Græcè in Italia, nondum excusa: quorum copia facta sit Aloisio Anguillare Romano, horti medicorum Patauii procuratori, uiro in uariarum stirpium cognitione summo & facile principi: ut fama loquitur, & ipse (spero) propediem suis lucubrationibus declarabit.

ABEN Bitar (uel, ut alii scribunt, Ebenbitar) scripsit De simplicibus medicamentis opus insigne & magnum, ordine alphabeticò, citatis authoribus, quod à Bellunenſi aliquoties citatur, qui & Arabicum expositorem eum alicubi nominat. Hoc non ita pridem ex peregrinatione sua in Orientem doctissimus uir Guil. Postellus secum aduexit. In eo (inquit in epistola, quam de suis ac peregrinis & secum aduectis libris olim ad me dedit) simplicia quam plurima & remedia innumera, quorum nec nomen, nec uis, nec usus nobis adhuc innotuit, sunt expressa: atque omnia ita absolūtè, ut quicquid super iisdem medicamentis apud Dioscoridem, Galenum & Oribasium imperfectum & mutilatū est, ex hoc uolumine restitui & sarciri possit.

DIOSCORIDI falso attribuantur libri duo Græci, quos manu scriptos habeo, De curandis morbis, per simplicia ferè medicamenta, secundum morborum genera digesta, &c. Eos breui latine edendos spero, Io. Moibano doctissimo Reipub. Augustinæ medico interprete.

IOHAN.

IOANNES CRATO FERDINANDI CAE.

SARIS AVGVSTI MEDICVS, CON. GESNERO MEDI-
co Tigurino S.



QUAM SYNCERVS ET CANDIDVS SIS AESTIMATOR VO-
luntatis amicorum, optime & doctissime Gesnere, abunde satis testan-
tur, literæ tuæ 23 Augusti scriptæ. Eas cum hîeri acceperim, uides quan-
tò post ad me perlatae sint, quàm fuerant datae. Fuisse autem mihi uehe-
menter gratas atque optatas, dubitare non debès, etiam si in animi mei
declaratione non utar pluribus uerbis. Nihil enim humanitatis studio & cum si-
de amicitias colenti, quo in genere hominum me semper esse & numerare uolui, pa-
ri erga se uoluntatis testificatione optatus. Quod igitur ad mutuam beneuolen-
tiam & amicitia nostræ firmitatem attinet, ea iacta fundamenta confido, quæ eam
sustinere, & certam præstare possint. Officiorum autem uices ita reddam, ut omnia
potius mihi deduisse quàm summam uoluntatis propensionem intelligas. Ac nunc
nihil æquè cupio, quàm iurare me posse editionem tuam scriptorum Valerii Cor-
di, mihi dum in uiuis esset, coniunctissimi & amicissimi. Sed quid possum in tanta
temporis angustia? Ineuntes ætatis & primæ adolescentiæ eius studia non mihi sunt
explorata: neque, ut arbitròr, hæc scire multum refert. In familiaritatem eius deueni
ante annos uiginti, cum uterque nostrum audiret Philippum Melancthonem ex-
plicantem Nicandri Alexipharmaca. Omnia in illo dona conspiciebantur naturæ,
quæ cum homine nascuntur: & mentem doctrina à pueris institutione patris exco-
luerat. Erat moderatis temperatisq; moribus, & ad omnem uitæ consuetudinem
aptus. Ingenii tanta ui præditus, ut ubicunque id intendere, non natus ad hoc quod
agebat, sed à Deo uictus uideretur. Præcipue autem possessionem artium sibi quasi
hæreditario iure à patre Euricio Cordo, (quem Poetam & Medicum eximium fuis-
se scripta ostendunt,) relictam, augendam atque amplificandam putabat. In Poëti-
cis variusculè sese exercebat: Verùm laudabile carmen scribebat. In rei Medicæ in-
uestigatione erat totus: & non solum studium, sed ardorem quandam amoris, (sine
quo, ut Cicero inquit, nihil quicquam egregii unquam assequimur,) præ se ferebat.
Et cum studium (ut idem ait) perueniendi aliquo nihil profit, nisi illud quod eo,
quò intendas, ferat deducatq; cognoris: laboriosas sepe peregrinationes unius sim-
plicis Medicamenti inuestigandi causa, suscipiebat: perscrutabatur omnia loca Me-
tallica, præcipue Misniæ & Saxoniae: herbas mirifico studio inquirebat, nihil non
molestarum perferens, ut in exactam cognitionem earum perueniret. Itaq; & inter
uarias oberrationes & profectiones, ut quæ bona essent, meliora redderet, perpe-
tuò ueterum descriptiones attentè considerabat, easq; tanquam ungues notas sibi
facere conabatur. Hæc autem uitæ & studiorum ratio faciebat, ut ea quæ scripsit
αὐτοῦ ἐκ τῆς αἰσῆς potius, quàm elaborata & perpolita uideantur. Dioscoridē in scho-
la Vuitbergenli ter legit, ac primò quidem ea dictauit, quæ nescio quomodo ex-
rant. Peruagatus deinde Thuringiam atque uicina loca, multa mutauit, & alios
quasi Commentarios in Dioscoridem confecit. Atque hos postremos arbitròr ad
tuas manus peruenisse. Priusquam uero iter in Italiam profecturus ingrederetur,
tertiò Dioscoridem in gratiam quorundam amicorum enarrauit. Sed in prælectio-
ne neq; ipse quicquam scripsit, neque aliis dictauit. Quæ autem docuerat, singulari
studio obseruata & scripta D. Iohannes Aurifaber, uir pietate & doctrina excel-
lens, ornamentum patriæ nostræ, & scholæ Regiomontanæ, Sambienſium Episco-
pus, popularis meus, mihi pro perpetua nostra necessitudine & in amicitia fide com-
municabat. Ea nisi ad textum Dioscoridis mei essent scripta, & talia, ut pleraque o-
mnia in iis libris, quos te diuulgare uelle scribis, repetiri existimem: iam nunc tibi
optime mi Gesnere mitterem. Interea, ne prorsus officium meum tuæ uoluntati de-
fuisse uideatur, accipies cum his literis festinanter, ut res ipsa ostendit, scriptis, do-
ctrinam quandam Cordi de Oleis destillatis, & extractionibus, ut uocant, quibus

addidit rationem conficiendi olei Vitrioli: cuius author Valerius Cordus perhibetur, uerè an secus, ad meum iudicium nō reuoco, cum ipse in eo quādam desiderem? Habebam prius exemplum admodum corrupte scriptum: uerum nuper Ioachimus Camerarius F. quem & propter parentem uirum summum, ac Germaniæ singulare decus, & propter suauissimos mores, diligentiam, industriam, & rei Medicæ studium, diligo, ad me multo emendatius misit. Hoc igitur accipies, atque cum iis, quæ ad te peruenisse scribis, conferes. Arbitror Ioachimo à Iohanne Ralla Pharmacopola Lipsito, scripti copiam factam: certum non scio. Eum Valerius Cordus ut parentem, propter coniunctionem, quæ ei cum patre Euricio fuerat, colebat, nec illius auctoritatem etiam contra suam uoluntatē, negligebat: cum & Ralla uicissim Cordum quibus posset officii piosequeretur. Ac eius quidem rogatu primum Dispensatorium, ut uocant, collegit. Postea Casparus Pitruend, qui illis temporibus Pharmacopolio Vuitebergenli præerat, & nunc iucundos aspectu atq; rarioribus herbis excultos Torgæ hortos habet, obsequio quodā u. c. tus, eas annotatiunculas, quas editas cōspicimus, addidit, atq; in istum ordinē, quo Senatui Norimbergenli hæc sunt exhibita, redegit. Cæterum quam hoc fecerit inuitus, & quā uix rectum putauerit, ut ex suo quasi præscripto hæc uel illa fierent, meminim: & haud dubiè si diutius in uita fuisset, plurima in eo libello emendasset, nec sic ut nunc est, exiisset. Sciebat enim illud, in quo quis offenditur, etiam ea quæ laudanda sunt sepe obtrudere: ac meminim cum Janus Cornarius me præsentē libellum recens editum inspiceret, & appellationem confectiois Diathamaron à Thamar, quod Arabibus Dactylū significare Cordus arbitrabatur, deductam uideret, suauiter eum ridere, atq; *διακατα- τὰ νόσος*, quasi contra mortem ualeat, dictam existimare, siue hoc recte, siue non recte, aliorum sit iudicium. Habeo & Censuram Aloisii Anguillare Romani mihi amicissimi, & rei herbariæ peritissimi uiri, de Dispensatorio non inutilem, quam breuissimè hoc permittente Aloisio facere potero, uidebis. Nunc cum non satis sciam an Aloisio *δευτερας* sint de his *πεγοριδεις*, non uolo ea publica facere, quorum illum pudere aut pigere ullo modo possit: iniustissimū enim esse arbitri or diuulgare contra uoluntatem hominis amici ea, quæ ipse omni studio continere cupiat. Ut autem ad Cordum redeam, priusquam Germaniam relinqueret, Theriacam magno studio composuit, quam præclari Medici singulari atque admirabili dexteritate esse factam, in difficillimis curationibus sunt experti. Reliquit & amicis alias suas Compositiones uarias, inter quas in primis cōmendantur Pastilli è Succino, quos in gratiam Andreæ Aurisabri artis Medicæ Doctoris eximii & principis Borussiae &c. Archiatri, amici nostri fecerat, quem miro successu iis uti in sui curatione ipse uidi, cum sanguinis mictu laboraret. Sed Compositiones Cordi longum esset recensere. Adiuncto autem sibi opt. & doctissimo iuvene Hieronymo Schreiberio Norico, cuius diligentia magnam partem Curationum, & consultationum Montani, quæ extant, rei Med. studiosi debent, qui postea Parisiis est extinctus, atque in eius cysti fellis insignis calculus, ut commemorante Iohanne Pontano audiui, repperitus. Hoc, inquam comite, cum aliis quibusdam Anno 1577. est in Italiam profectus, in qua diligentia, industria & singularis studii omnia, quæ terra atque mare habebat, inuestigandi plurimos testes & admiratores etiamnum habet, qui sciunt ex rebus penitus perspectis planeq; cognitis atque ab omni arbitrio seunctis, Cordum ea pronunciasse, quibus apud Italos, uiros doctos, magnam scientiam tandem sit consecutus. Non totum biennium Patauii & in uicinis locis uixerat, cū Hieronymo Schreiberio comite, Romam abiit, in itinere multum defatigatus, inquisitione & inspectione herbarum & aliarum rerū in Appennino, quibus illas doctrinæ suæ copias augeri posse arbitrabatur, ex defatigatione largiori esu fructum & potentioris uini potu, cum biduo aut summum triduo itinere Roma abesset (obsequiebatur enim amicis, præsertim ei, quem præter Schreiberum secum habebat comitem, interdum immodice) in febrim incidit: qua non multo post, cum grauius Symptomata accessissent, summo rei Medicæ detrimento, Anno 1577. Sept. Cal. Octob. cum

natus esset Anno 1515, extinctus est Romæ grauissimumq; desiderium suis amicis
 in Germania reliquit. Totum igitur uitæ breuis curriculum, in quo tot arcana na-
 turæ eruit, cognitionem herbarum, metallorum, piscium (eos enim quos Adriati-
 cum habet mare, singulari studio depingendos curauit) monstratis ueterum descri-
 ptionibus illustrauit, atq; auxit: & de plurimis homo adolescens & Germanus Ita-
 los senes, (ea tamen uirtute præditos, ut multi de se, *ἑὸς καὶ πότμος* potius quā *ὑπὸς καὶ πολλὰ*
Ἀδριατικοῦ, dicere possint, erudiuit) fuit annorū uiginti nouem, cū longiori quidē
 spacio esset dignissimus, Ideoq; in dolore quē recordatio Cordi nobis facit, uerissi-
 mē possumus usurpari, quod Poeta dixit: Optima prima ferē manibus rapiuntur a-
 uaris: & illud loachimi Camerarii summi mei amici, quod alludens ad cantilenā La-
 conicā scripsit nobis ipsis occinere, *Νῦν οὗτος, πρόσθεν δ' ἔτερος, μετέπειτα δὲ ἄλλος*. De
 Valerii Cordi sepultura diligenter quæsiui, cū anno 1547. Romę essem, ac audieba-
 mus in sacra æde Germanū esse humatum. Verū primō quidem nō potuit nobis
 commonstrari locus: postea cum reuersi essemus Neapoli Romam, incidimus in
 Chirurgum quendam Germanum hominem, qui morienti adfuerat, is ad Mariæ
 de anima, D. Iohanni Baptiste & D. Paulo Heinzeliis, Senatoribus Augustanis;
 & D. Adolpho Occo Medico Augustano atque mihi sepulchrum eius common-
 strabat, & hæc quæ scripsi de uitæ exitu commemorabat. Pro eorū autem, quo D. D.
 Heinzeliū quorum beneficio mihi contigit Italiam perlustrare) in rem literariam
 sunt animo, cuidam mandata dabant de Epitaphio conficiendo: uerum Iohannes
 Brunsterus, qui deinceps Romam est profectus (ut accepi) hoc cessante illud fieri
 curauit, qui & ipse cum in Germaniam esset reuersus, Norimbergæ, quæ illi patriā
 erat, diem suum obiit. Hęc, ut grato animo, & honoris amicorum etiam demortuorū
 studiolus, iecito, ita tibi gratias ago, cum pro naturæ tuæ bonitate & candore,
 non solum memoriæ Valerii Cordi faues, uerum etiam aliorum studiosissimum te
 esse declaras, & ipse samam tuam undique puram eo modo exhibes, ut neque ex ul-
 lius ignominia, id quod quidam faciunt, laudem quæras, & laboris præmium, quod
 ex prædicatione est, sis etiam, qui tenuiter tuos summos adiuant, & quibus a natu-
 ra minora sunt dat attribuas. Denique excitas plurimos, & operas ingenii tui melio-
 ribus scriptis illustrari uel etiam obscurari gaudes. Sed de Valerio Cordo satis. Ad
 reliquas Epistolæ tuæ partes respondebo quam primum aliam occasionem mit-
 tendi ad te literas nactus fuero. Nunc hanc negligere nolui, lapidem nostratem
 mitto & Margam quam Dalmata quo scripsi pro terra Lemnia uenditat. De Her-
 ba Spli non conquiescet cogitatio mea dum aliquid extricem. Cetera referuo præ-
 xima Epistolæ, tibiq; hoc de me, quod ueteres in conditionibus scripserunt, affir-
 mo, me quibus sciam poteroq; modis, tibi summa fide & uolūtate omnia gra-
 ta facturum. Bene uale. Salutat te & Lælium Soccinum, cui
 & ego salutem opto, Zacharias Vrsinus, Viatusla-
 uia ex meis ædibus die Luca Medii
 ci & Euangelistæ Anno
 1559.

EX EPISTOLA GE. AGRICOLAE (CVIVS

COPIOSISSIMI DOCTISSIMIQUE DE IIS QUAE EX TERRA
effluunt & effodiuntur, libri extant) ad Vuolsgangum Meurerum epistola.

VALERIUS Cordus, quoad uixit, non cessauit ad me mittere omnia, quibuscunque iuari atque ornari mea studia possent, iuuenis longa uita dignus, sed perpetua dignior.

EX GUALTHERI RIFFII ARGENTINENSIS,

IN PRIMAM VALERII CORDI ANNOTATIONVM
in Dioscoridis libros editionem, praefatione.

FUIT in Val. Cordo cum in uniuersa medicina perdiscenda, tum uero praecipue cognoscendi Simplicia med. incredibile studium: ad quod illum parens Euricius medicus, idemque poeta clarissimus & autoritate & exemplo inflammauit, qui filium ab incunabulis inter ipsas herbas ac flores educari uoluit. Accessit ad optimam institutionem, ingenium acre, & rara naturae felicitas, cui nihil arduum aut inaccessum esse posset: ad haec, mirabilis industria atque assiduitas in inquirendis rebus, insuper & perceptorum fidissima custos memoria, qua ita excellebat, ut integras descriptiones singularum rerum ac diuersorum authorum secum ubique animo circumferret, ac expromeret ubi opus esset. His dotibus breui tempore eo progressus est, ut excellentes medici ac senes discendi gratia adolescentem frequentes accederent. Subinde etiam uarias peregrinationes suscepit, quod certius & exactius omnia suis ipsius oculis subiecta cognosceret: ne uel aliorum narrationibus (quod pluribus accidisse uidebat) deciperetur. Ac primo quidem perlustrauit omnem fere Germaniam, ac uicinas Septentrionales regiones. Intrauit horrentes saltus, superauit editissima montium iuga, demisit se in profundissimos specus: & pleraque summa diligentia peruestigauit, quae in istis partibus gignuntur, paucis hucusque nota. At quoniam bona pars medicamentorum exoticis constat, ne illa parum cognita haberet, conuertit se ab Aquilone ad alteram mundi plagam, adscitoque uno atque altero comite peruenit in Italiam: ubi breui nouus ille hospes propter ingenii praestantiam, multis admirationi esse coepit. Sed, quae est humanarum rerum fragilitas, in ipsius studiorum cursu e medio sublatus est, magno cum dolore omnium doctorum, & inestimabili iactura totius medicinae.


EX BIBLIOTHECA CON. GESNERI

EURICIVS Cordus Simesusius, natione Germanus, Valerii pater, utraque lingua doctus, Marpurgi medicinam professus est: & rem herbariam non parum adiuuit. Botanologicum eius, siue Colloquium De uariis herbis, excusum est Coloniae apud Ioan. Gymnicum anno 1534. in 8. chartis 13. eodem anno ab autore scriptum. Idem Theriaca & Alexipharmaca Nicandri poetae Graeci Latinis uersibus heroicis reddidit eleganter. Liber impressus est apud Egenolphum Francforti anno 1532. in 8. chartis 5. Epigrammata quoque scripsit, praesertim a Graecis translata.

ANDREAE

ANDREAE ELLINGERI MEDICI EPI-
GRAMMA DE INVENTORIBVS SCORDII ET CHA-
medrys in Germania.

Scordion à Scorodo dictum, quod spiret odore
Allia, nunc uestit flore rubente comas:
Propter aquas & putre solum stagnantis Elestri,
Qui nostros tardis flexibus ambit agros.
Caule breui, folijs instar Trisaginis herba,
Mansa leuem gustu prodit amaritiem.
Virtute eximia: membris agit omne uenenum,
Præstat ab immunda corpora tuta lue.
Quæ sitam multis uni tibi Corde repertam
Scimus, & huic meritò nunc quoq; durat honos.
Vdo crescentem in saltu prope mœnia doctæ
Vrbis, ubi flauas deuehit Albis aquas.
Te quoq; qui certa medicamina conficis arte,
Nonnulla inuenti gloria Rhalla manet.
Præmum Elestrinis humilem deprendis in oris,
Quæ tibi carpenti uisa Chamædrys erat.
Verum odor indicium fecit manifestus, habentis
Quas illi ueterum dant monumenta, notas.
Quid? qua laude uebam studium, quo plurima nobis
Planta peregrini cognita facta soli est?
Quis ferulam nosset, quis odoriferam Panaceam?
Quis te pictorum mollis Acanthe labor?
Quis Cynaram, Asphodelon? quis purpureos Hyacinthos,
Stœchada, Dictamni Grosiatiq; comas?
Si nostri paulum cessaret cura Crateuæ:
Quo duce Plantarum surgit odora seges.
Quas tener illius feliciter educat hortus:
Sæua licet, Borea flante, repugnet hyems.
Grati agnoscamus Cordi Rhallæq; fidelem
Quam studijs operam nauat uterq; bonis.



VALERII CORDI SIMESUSII, in Pedacij Dioscoridis

ANAZARBEI PRIMVM DE ME-

dica materia librum, Annotationes.

DE IRIDE. CAP. .x.



IRIS, SIVE IREOS, SIVE IRIDIS, IN GENITIVO CASU PROferas, eadē est planta, quapropter inepte quidam tanquam diuerfas distinguunt, Iris & Ireos. † Est autem Iris Illyrica ea <sup>† vulgò Li-
lium coele-</sup> radix, quæ in pharmacopoliis Ireos & Germanicè Viol- ^{ste vocant.} wurtz appellatur. non quod uerè sit uiolæ radix, sed quod odore uiolæ imitatur, ea propemodum sola ab authoribus cunctis aliis eius speciebus præfertur. Nascitur etiam apud nos & proprie uocatur Blaw liltien / Blawschwertel, & Schwert hew. Sed suas habet quibus ab Illyrica distinguitur notas. Est enim horribiliore odore iniucundior, & multò maiore acrimonia gustantj molestior, faucesq; grani Gnidii modo exurit, quapropter caliditate quidem Illyricam plurimum superat: sed quanto hac illa est superior, tantò etiam aromatico odore & sapore inferior existit. Vehementius quoq; aluum quam Illyrica purgat. Est etiam in floribus differentia, siquidē nostra Iris purpureum fert florem, in arcus celestis colorem uariantem, unde totum Iridis genus nomen inuenit. Illyrica uero candidum producit.

DE ACORO. CAP. .ii.

Peruasum omnibus est Acorum eam esse herbā, quæ à nobis Gelbschwertel appellatur, quantum uero hæc à ueritate distet opinio, facile intelligunt qui rationem & communes sensus habent. Acorus enim in tertio calefaciendi ordine à Galeno ponitur, cum qua facultate etiam iucundum & aromaticum tam odorem quam saporem habet. Qui uero apud nos prouenit, falso appellatus est Acorus: nihil acrimoniæ, nihil item quod aroma redoleat aut sapiat sortitus, sed austeri & acerbis saporis plurimum. Hinc necessario sequitur eum cōtrarium uero acoro temperamentum habere. Atqui hoc non concesserim, eum sic in nostris terris degenerare, nam quamuis hic ipse falso uocatus Acorus etiam in calidis regionibus nascatur, eandem tamen seruauit acritatem: & contra uerus Acorus frigidioribus locis nascens, eandem habet acrimoniam, quam in Syriā multo calidiore terra enatus. Porro uerus Acorus multum iudicio nihil aliud est, quam illa radix quæ hodie in omnibus totius Europæ pharmacopoliis calamus aromaticus appellatur: cui sententiæ nos quoq; eo usq; subscribimus, donec nos erroris cōuincat aliquis, multis id enim argumentis demonstrari potest, ea omnia adducere longum foret: interim nobis sufficiat uirorum bonorum fides & autoritas, qui in Syriā nostrum falsò uocatum calamum nasci uiderunt, istādem omnibus insignem notis quibus Acorus describitur. Quod autem uero Calamo aromatico careamus, suo demonstrabitur loco. Antonius Musa magni nominis in Italia Medicus, Acorum putat esse uerā & omnibus cognitā Galangam, quam ^{Galangā} sententiam affirmare nō possum. Multò etiam minuse eos probamus, qui Galangam maiorem ante paucos annos afferri ceptam, uerum Acorum esse autumant, in quam opinionem ipse quoq; penè seductus fuissē. In ea autem adhuc sunt plures medicorum, inter quos est etiam Leonhardus Fuchsius clarus apud nos medicus. Sed cum utraq; Galanga Cypero sit cognata, Acorus uero Iridi, diuersum iudicauimus. Nobis etiam compertum est maiorem Galangam folijs, caulibus, & paleaceis, flore, & semine, Cypero similem esse, sed undiq; maiorem, nec habet grandem Iridi aut pseudoacoro æqualem & luteum florem qualis Acoro est. Acorus præterea in confortan-

do utriculo ualde commendatur. Galangā uerò maior eum subuertit & uomitum ei⁹ tantum abest ut confortet: nihil enim odore aut sapore habet quod aromaticam uim referat, sed simplicem tantum, eamq; uehementem & ingrati tam gustu quam olfactu acrimoniam.

¶ Vulgo dictum Calamum aduersus aquas corruptas multi peregrinantes secum ferunt.

DE MEO. CAP. 3.

Meon quod quidam etiam Meum appellant, solo tantum nomine cognoscitur: res autem ipsa hodie penitus incognita est, quamuis pharmacopolæ radículas quasdam acres hoc nomine ostendunt: non tamen omnes eandē demonstrant. Quidam enim Magistrantiam, appellatam radicem: quidam angelicam: quidā Toydylon, hoc est, *Beerrwurtz* dictam radiculam: quidam etiam alias quasdam radículas, quas agyrtæ *Olfenick* uocitant, Meum nomine uendunt. Verum autē Meum in calida & medicamentorum feracissima Italia sponte uix nascitur, nedum in frigidiori Germania. Propterea olim in Italia Medici hanc herbā studiose in hortis ferebant, testante Plinio libro xxi statim in principio capitis xxxiij, ubi sic inquit. Meum in Italia non nisi à medicis feritur, & iis admodū paucis: Quapropter licet eius uice aliam eiusdē facultatis & temperamenti herbā accipere, quam uerò pro ea capimus Meon nominare non perinde cōcessum est. Missa autē aliquando mihi est à Ioanne Neseo pharmacopola Francofordiano, herbarū indagandarū studiosissimo homine, planta quædam pro uero Meo quam secum ex Italia attulerat, caulibus, foliis, umbellis, & semine Anisi, tenuioribus tamen, & acris admodū & aromatico semine, quæ omnino uidebatur descriptio ni respondere. Quoniam uerò radices eius nō aderant, nihil certi iudicare potui: nam eæ solæ ex hac planta medicis in usu fuerūt, tanquam aliis herbæ suæ partibus, foliis, semine, floribusq; efficaciores.

DE CYPERO. CAP. 4.

Cyperum Græci etiā *Cypestrum* & *Cypirum* uocant. Plinius tamen inter *Cyperū* & *Cypirum* differentiam facit, sed magno errore, Reuera enim nihil differunt: quare siue *Cyperū* siue *Cypirum* pronuncies, aut alicubi scriptum reperias, eadem erit planta. Est autē *Cyperus* iuncus odoratus, angulosus, triangularis siue, à quibusdam etiam quadratus appellatus, sed male admodū, non enim quadrangularis illi est, sed triangularis caulis. Eius autem duæ sunt species, alter longas habet radices, is Græcis uocatur *Cyperis*, in pharmacopoliis uero *Cyperus Romanus* siue longus: alter rotundas habet & siue inuicem coherentes radículas, quem pharmacopolæ *Cyperum rotundū* appellant: Græci autem simpliciter: Germani utrunq; uocāt *Wilden galgan*/ hoc est syluestrem Galangam. Porro parcius effertur ad nos longus *Cyperus*.

DE CYPERO INDICO.

Omissum
in impres-
sis.

Cyperus Indicus, cui à Dioscoride tribuitur amaritudo, *Zingiberis* figura, et *Croceus* color, ea est absque dubio radix, quam ubiq; *Curcumam* in pharmacopoliis uocant, quidam etiam terram meritam, quamuis terra nō sit, sed radix ex India ueniens, Rarus eius est in medicina usus, sed frequens tingendis mensis aliisq; rebus.

DE CARDAMOMO. CAP. 5.

Cardamomi appellatione grana quædam in pharmacopoliis habentur, & gustus & olfactu admodum aromatica. Manardus & Antonius Musa contendunt nos uero *Cardamomo* carere, quoniam ab authoribus descriptæ notæ granis *Cardamomū* appellatis non conueniant. Quod quidem uerum esse ipse fateor, non tamen continuo proclamandum erat nos uero *Cardamomo* carere. *Dioscorides* enim & *Serapion* integros *Cardamomi* utriculos siue fructus granis confectos, ut olim afferebantur, atq; non raro nostra etiā ætate, descripserūt. Hodie uero ut plurimum cortices, quia lignosi & nullius qualitatē sunt abiiciuntur, & sola grana folliculis inclusa propter saporis & odoris fragrantiam ad usum reponuntur: hinc etiā est, quod Græci in compo-
positis medicamentis semper expertant *Cardamomū*. *Hyppocras* & *alio spiritibus* *Cardamomi*, hoc est, exenteratum & ex utriculis exempta uiscera siue grana, et ipsam medullam siue semina. *Cardamomi* autem hodie duo offeruntur genera, Maius alterum, & Minus alterum. Maius fructum habet lignosum, fractu contumacem, sicut propemodum magnitudine & figura: intus angulosus & aromaticis granis, mali *Pu-
nici*

nici modo, plenum. Minus uerò fructum fert auellana nuce ut plurimum minorem, triquetrum & minoribus granis repletum, eiusdem saporis & odoris, sed uehementius palatū & linguam penetrantibus: ex his frequentius in usu est minus, quod simpliciter hodie Cardamomum uocatur, maius parcius affertur, propterea quidam in eius locum Grana paradisi, alias Melligeta nominata, substituerunt, eaq; Cardamomum maius uocauerunt: improprie tamen & male. Nam sapore quo piperi similia sunt, & odore, plurimum à Cardamomo differunt. Fructus tamen siue utriculi figura magnam habent cum maiore Cardamomo similitudinem, qui oui plerumq; magnitudine conspiciuntur, & granis (quæ nouimus) onusta sunt, Cardamomo instar angulosis. Illi uero plurimum errant, qui Nigellæ Citrinæ semen Cardamomum esse credunt, quod etiā Antonius Musa non immerito reprehendit. Porro Arabes utrumq; Cardamomum generali nomine, & Cordumeni, & Sacolla appellant. Itaque uehementer errant qui Cardumeni apud Serapionem Carui agrestis interpretantur: idē enim est cum Cardamomo. Nec aliquem suspendat quod Serapion eandem rem alibi Cordumeni, alibi Sacollæ nomine describit: in capite enim de Cordumeni ea recenset, quæ apud Dioscoridem de Cardamomo leguntur: in Sacolla uerò rem eo de pingit modo, ut Arabes descriperant, & ut ipse uiderat, & quemadmodum adhuc affertur Cardamomum, (scilicet cum) Dioscoridis & aliorum Græcorum descriptioni, & Cordumeni & Sacollæ apud Serapionem, historiæ per omnia conueniat, nemo diuersum statuatur esse, Cardumenia Sacolla. Porro Arabes pulchrè etiam suis nomini bus Cardamomi species distinguunt. Siquidem maius appellant Heyl, minus uerò Helbane, qui autem contrarium dicunt, errant.

*Cardamomum minus, nomen seruat in Pharmacopolijs, Germanicè Cardamōmle, Arabicè Helbane. Maius uerò, Arabicè Heyl, diuersum à granis paradisi, quæ aliqui Cardamomum minus improprie uocant, minus fortè præciò & uiribus intelligentes: mole enim maiora sunt, aliqui maiori Cardamomo substituant.

DE NARDO. CAP. 6.

Cum simpliciter Nardi uocabulum apud auctores reperitur, semper Indicam uel Syriacam Nardum intelligere debemus. Sunt enim multe Nardi differentię, ut Indica & Syriaca: quæ tamen nullum nisi solis natalibus discrimen habent. Præter has sunt Celtica, quæ etiam Saliunca uocatur: Montana; Rustica, quæ etiam Asaron: Celtica siue Phu, & Malobathrum: de quibus singulis deinceps agemus. Syriacam autem siue Indicam Nardum, de qua nunc scire nobis est, eam esse censemus, quæ adhuc in pharmacopolijs, Spica Nardi, Spica Indæ, & simpliciter Spica appellatur, cuius omnes notæ adeo descriptioni conueniunt, ut nulla discrepet. Quapropter non raro eos mirari soleo, qui Nardo uera nos carere contendunt. Fatemur tamen ipsi nunc afferri Nardum ualde inueteratam, fatuo propemodum languidoq; sapore & odore, & antea humore aliquo dilutam & maceratam, ut tutius conuenientiusq; sit Celticam, hoc est, nostratam Nardum pro Indica accipere.

DE NARDO CELTICA. CAP. 7.

Celtica Nardus absque ulla controuersia est ea, quæ hodie à Pharmacopolijs Spica Romana uocatur: nulla enim prorsus est quæ descriptioni non conueniat nota. Testatur Dioscorides hanc Nardum Saliuncam ab incolis, ubi nascitur appellari, quod uocabulum interpres Virgilius Marcellus in Gallicam peruertit, admodum infirmis rationibus & argumentis inductus. Nam Germani pleriq; eandem herbam adhuc proprio ueteriq; nomine Celti, & Celti appellant. Celtica autem Nardus apud nos in Germania & finitima nobis Istria, Norico, Pannonia, & alpijs nostris provenit, ideo potius Germanica quam Gallica cognominari debet, cum in ipsa Germania & finitimis regionibus uersus hybernū ortū nascatur: quo fit ut adhuc ex Norico, Istria & Pannonia superiori in maxima quantitate, Venetias deferatur. Quare ipse Dioscorides huic Nardo Gallicæ cognomentum non tribuit, sed Celticæ & Saliuncæ. Celtarum enim appellationem tam Germani quam Galli ab historicis uocantur, quemadmodum etiam Galatarum. Itaq; etiam hæc Nardus Galatica à Grecis nominatur: Adde quod Saliunca uocabulū in lingua Germanica significet animum iuuenilem reddens. Habent etiā Germani alia nomina, quibus suam Nardum appellant, ut sunt

Lauendu-
lam nō esse
Nardum
Celticam.

Narientblumen & Spicanarden. Sed omnium propriissimum & vetustissimū est Seliunc/ quod Romani in Saliuncam deflexerunt. Illi autem uehementer errant & impingunt, qui Spicam siue Nardum Celticam eam putant esse plantam, quæ ab aliis Lauendula maior siue Massiliensis Lauendula & Spica appellatur, unde oleū Spicæ in pharmacopoliis uocatum dicitur: toto enim cælo hæ duæ plantæ distant. Siquidē Nardus Celtica brevis describitur herbula, quæ propter breuitatem suam radicitus euulsa in manuales fasciculos perinde hodie, ut olim ligatur. Lauendula uero maior lignosa, longusq; frutex est, neq; in fasces radicitus euulsus ligatur. Nardi Celticæ folia subflaua describuntur. Lauendulæ uerò maioris ex uiridi colore in cinericiū uergunt. Nardus Celtica luteo describitur flore Lauendula maior seu Spica purpureum ostendit ferè. In Celtica Nardo solæ radices & coliculi medicinam faciunt; folia enim & flores, quoniam neq; saporem neq; odorem habent, ex omni usu abdicantur. In Spica contra, soli flores & folia medica ui pollent: radices autem atq; caudices & uirgæ, quoniā lignosæ & odoris saporisq; expertes sunt, nemini sunt usui, præterquam in accendendo igne. Hunc enim usum in Narbonensi Gallia, maxime eius parte, quæ Prouincia uocatur, præstat, ubi frequens admodum est odoratissimæ huius fruticis spicati proventus. Certum igitur est Lauendulam maiorem siue Spicā plurimum à Nardo celtica differre, utraq; enim sui generis est planta. Quid autem sit hæc maior Lauendula, quæ etiam Spica uulgo uocatur, indicabitur tertio huius operis libro, cum ad Stœchademp peruenerimus.

DE NARDO MONTANA. CAP. 8.

Montana Nardus, quæ etiam Niris, Neris, Thylacitis & Pyritis appellatur, olim ex Cilicia coriaceis sacculis, quos Græci *θυλάκια* uocāt, ad exterarum nationes ferebatur: partim ad medicinæ usum, partim etiam ut in sacrificiis, ignibus, propter iucundum odorem iniiceretur, unde etiam illi Pyritidis nomen factum est. Hanc itaq; Spicam intelligit in Fastis suis Ouidius, cum ait, Et sonat accenso spica Cylissa foco. Non enim Crocus eo loco intelligendus est, qui igni injectus foetet: Nardus uerò montana in flammam iucundioris odoris resoluitur. Copiosè hæc in Cilicia provenit. Quapropter potius Pauli Marci Piscinensis, quam Antonii Phanensis commentarium in hunc Ouidii locum probauerim. Nam ille Nardi spicam, hic uerò Crocum per Cylissam spicam intelligendum asserit. Porro hodie nullus est apud nos montanæ Nardi usus: quoniam non amplius affertur, præterquam quod interdum casu cū aliis mercibus apportetur, sed id rarissimè accidit. Hi autem uehementer errant qui montanum Nardum eam putant esse herbam quæ à nobis *Käzengrün* appellatur, muscus potius funiculi modo per terrā serpens, quam herba, asperis locis enascens, nullo neq; sapore neq; odore commendabilis.

† Wein-
grün Tra-
go.

DE ASARO. CAP. 9.

Asarum quamuis odore Nardum imitetur, ut etiam propterea syluestris Nardus nominetur, nullam tamen formam cum Nardo communem habet. Non defuerunt qui Asarum etiam Baccharum appellaret, propter odoris similitudinem: ambe enim, tam Asarum quam Baccharis odoratæ describuntur, herbæ diuersæ tamen sunt, ut omnes testantur. Male igitur Baccharis descriptio in Asari historiam, & e contra in Dioscoride, à librariis translata est, natura diuersas, eandē herbam esse putantibus, in correctionibus uerò exemplaribus, seorsim de utraq; agitur. Nam Asarum primo libro inter Aromata recenset Dioscorides: Baccharum uerò in tertio inter odoratas & coronarias herbas describit. Est autem Asarum ea herba, quam nos *Wasselswurz* nominauimus, quod plerumq; ferè semper in coryletis nascatur. Antonius Musa Italus, diligens herbarum inquisitor, sed Germanicæ linguæ ignarus, ideoq; uenia dignus, à lepore illi factum nomē apud Germanos interpretatur, sed malè, & ab aliis fortasse persuasus: nam si à lepore eius nominis etymum duceretur, non *Wasselswurz* sed *Wiemwurz* scribendum & pronunciandum esset, ut nostræ linguæ uel mediocriter periti facillè intelligunt. Latet tamen plerosq; etiam Germanos suæ ipsius linguæ energia & proprietat.

Phu, siue Nardus Cretica quam etiam aliqui syluestrem aut agrestem Nardum cognominant, solo odore Nardum æmulatur: cætera enim omnino illi dissimilis existit, hæc autem ab omnibus esse creditur ea, quæ Valeriana appellatur: quoniam uerò præcipuæ notæ descriptioni non respondent, non possum assentiri iis qui in uertendis Græcis authoribus & alias scribunt & pronunciant Phu absque ulla controuersia esse Valerianā. Non tamen negauerim Valerianam aliquam Phu esse speciem ægrestiore, odore uirosiore, radice multum à genuino differentem, & ueteribus non descriptum. Verum† autē Phu ea est herba, quam Germani Tyriactesfrant/et Gattenjelmuck / quasi Theriacariam herbā, & satiuam seu hortensem saluicam aut Nardum appellant. Radices habet multas digiti crassitudine, quæ transuersæ in superficie terræ serpunt, sed graciles fibras à tenui tuberculo in terram agunt. Scio quidem Leonhardum Fuchium diuersum à nobis sentire, credit enim uulgarem nostram Valerianam melius descriptioni conuenire, qua in re liberum cuius relinquitur iudicium utranque Valerianam cognoscenti: habemus enim & nos certas rationes, quibus persuademur hortensem illam Valerianam uerum esse Phu: itaq; minime ipse male habebit quod non secum sentiamus.

† Matthiolus quoq; hæc (ipse Phu maius appellat) magis descriptioni respondere putat, quam Phu agrestis, quod minus nominat: apud nos quidem multo procerius prouenit.

DE MALOBATHRO. CAP. 11.

Malobathrum crediderunt multi Nardi Indicæ folium esse, uerum decepti & falso. Dioscorides enim ipsa experientia contrarium testantur. Malobathrum ueteres etiā Græci φύλλον, Romani idē significante uocabulo Folium nominabant. quoniam nihil aliud quam folium esset, sine radice, in India paludibus innatans, hinc uenientia, hoc Malobathro odorabantur, foliata Romanis dicta sunt, expetebaturq; folium hoc præciocissimis quibusq; unguentis. Iam uero amplius non affertur, præterquam quod casu nonnunquam cum Nardo Indica affertur, ut semel atque iterum deprehendimus. Itaque operæ pretium nos facturos existimamus, si figuram ipsius descriperimus, ut aliis etiam id inquirendi ansam & occasionem præbeamus. Est autem Malobathrum, folium propemodum rotundum, & disci figura orbiculatum, trium fere digitorū, quoquo uersus latitudine, colore in fusco & spadiceo cinericeū, uenosum, densum, laurino crassius, lentum, flexile, & fractu contumax, nisi omnino aridum fuerit, gustu subacre, subamarum, tenue, per palatum se diffundens, orisq; halitum odoris gratia diu commendans, odore acere, Nardi æmulum & admodum aromaticum. Eius in locum Casia Cinamomi & Caryophylli folia substituta sunt, quæ pro Malobathro quidem in usum recipere licet cui libet: sed eadem Malobathrum siue folium Indum appellare non perinde licere arbitramur.

✱ Quod pharmacopola pro Folio ostendunt, non Folium uerum, sed Casia folium est.

DE CASIA [specie Cinamomi.] CAP. 12.

Casia siue Cassia multiplices habet differentias. Est autem Casia de qua hic agitur Cinamomo cognata arbuscula, cuius ramuli & furculi si cū ipso cortice, ligno adhuc inherente uendantur, Xylacasia appellantur: cum uero exempto ligno cortices tantum adportantur, Cassia Syringitis, uel Syringis nomine ueniunt, quoniam excauati cortices fistulæ similitudinem habeant. Talis est antiquorum Casia fistula siue fistularis Cassia, Arabes uerò aliam Cassiam fistulam in usum medicinæ introduxerunt, recentioribus Græcis appellatam Cassiam nigram: quæ fructus proceræ est arboris in India, & nunc etiam Aegypto, ut aliqui tradunt, nascentis. Eum fructum Aristobulus fabam Indicam uocat, quoniam longis siliquis claudit semina fabis non dissimilia, diuersæ penitus cum priore facultatis. Porro ueterum Cassia fistularis siue liginea multis sæculis in Europa uisa non est, sed eius loco cortex uenosus radicis cuiusdam gustu acerbus & tenuis uenditur, iam uerò quorundam diligentia factum est, ut aliquot eius species rursus adferantur, sed tanta est quorundam pharmacopolorum ignauia & retinendorum erroris pertinacia, ut etiam admoniti, eam sibi non comparent. Habet autem Cassia hæc tantam cum Cinamomo similitudinem, ut alterutra

in aliam nō raro degeneret, ut Galenus scriptum reliquit. Itaq̃ difficile est etiā ipsius *Calliæ* species omnes dignoscere.

*Quod pro Folio hodie ostendunt, non uerum Folium, sed *Cassie* folium est. *Daphnitiidis* cognomen à folio laurino factum putat Cordus.

DE CINAMOMO. CAP. 13.

Cinamomi non pauciores quam *Cassie* species sunt; optimum autem est quod *Galenus* in libro de *Theriaca* ad *Pisonem* & de *Antidotis* describit: tali uero hodie omnino caremus. Hactenus enim ex omnibus eius speciebus tantum unum illud † ad nos in *Germaniam* allatum est, quod *Arabes* *Darseni*, & *Græci* *Characium*, hoc est, uallare uocant, propterea quod baculorum crassitudine uallos æquet. Quidam opinantur nos in uniuersum *Cinamomo* carere, & uocatum uulgo *Cinamomum* siue *Cannellam* *Cassie* potius speciem esse. Cum uero tam *Cinamomi* quam *Cassie* plures sunt differentie, inter se ualde cognate, temerarium esset pronunciare nos in totū quouis *Cinamomo* destitui. *Cinamomum* autem, ut hodie affertur, cortex est sui fruticis, cannali conuoluto similis, ideoq̃ *Canellam* aliqui uocant: nos uero *Cinnamomum* / *Cinnamomum* / *Canellam* / *Cinnamomum*, id est *Cinamomi* cortices siue *Canalles*, siue *libros*, & *Cinamomum* appellamus.

DE AMOMO. CAP. 14.

Amomum, ut parens meus *Euricius Cordus* prodidit, est paruus ille & odoratus frutex, ueluti ungibus quibusdā in racemosam faciem cōuolutus, quē monachi *Rosam de Hiericho*, & *Rosam Sanctæ Mariæ* uocant. Cui sententiæ ego quoq̃ subscribo, quoniam nihil offendo hoc in fruticulo quod *Amomi* descriptioni & notis repugnet. *Antonius Musa* tamen, harum rerum diligens scrutator, huic iudicio contradicit, eo fretus argumento quod *Amomo* folia tribuantur *Bryoniæ*, quod quidem negare non possum: sed æquo animo de rebus iudicare oportet: auctorūq̃ tradita, & id de quo agunt auctores diligenter & fideliter perpendere. *Dioscorides* enim comodo depingit *Amomum*, quo in Oriente nascitur. Parens uerō meus de *Amomo* iam dudum rescisso sententiam suam dicit. Ideo quamuis in *Hierichuntide* apud nos neq̃ flores, neq̃ *Bryoniæ* folia deprehendamus, minime tamen certū quis statuatur, *Amomū* non esse *Sanctæ Mariæ* siue *Hierichuntida* *rosam*. Qua enim cōtumacia tantillus frutex multos ante annos carptus, & in longinqua regione trans maria uectus, toties pro miraculo ostentatus, & innumeris tractatus gestatusq̃ manibus, folia sua reuincere: cum etiā intacta in solitudinibus propemodū omnes, tam arbores, quam frutes & herbe, singulis annis solidissimè dehonestentur defluuio, & nuper decerpere peregrinantiumq̃ capitibus imposita frons flaccescat, & quamprimum folia amittat, uellenti admodū aure flatu. Quare nō suspendat aliquē, quod *Hierichuntis*, siue *Sanctæ Mariæ* *rosa*, *Bryoniæ* folia nō habeat cum ad nos adfertur. inquirendum potius iis quibus tam facilis est in *Syriam* nauigatio, qualia sunt *Hierichuntidi* *rosæ*, adhuc in *Media* & *Assyria* nascenti folia. Si *Bryoniæ*, maneat ergo ea *Amomū*: si uerō dissimilima, tum primum hac de re merito dubitabimus: nemo enim temerè negauerit nostrā *Hierichuntida* *rosam* *Bryoniæ* similia habuisse folia, cum adhuc in Oriente nasceretur. Igitur eousq̃ patris subscribimus sententiæ, donec manifeste demonstretur *Hierichuntida* *rosam* dissimilia *Bryoniæ* folia habere. Est præter folia etiā aliud quod *Antonium Musam* remoratur, nempe hoc, quod *Hierichuntis* *rosa* nares non uulnerat, quantumuis recens, quod dictū quomodo ipse intelligat nō possum coniectere. A *Dioscoride* enim probatur *Amomū* πικρὸν ὁσμὴν φέρον, hoc est, odore feriens, quod uidelicet acri & aromatico odore olfactus organa afficiat: id autē facit uera *Hierichuntis* *rosa*, nō tamen usq̃ adeo ferit & uulnerat nares, ut cruentæ fiant. nihil enim ex censu aromatum hoc odore facere potest, sed attrahit, ut *Garyophylli* atq̃ optimū *Cinamomum*. Itaq̃ non uideo cur *Antonius Musa* alioquin doctissimus uir, hac in re scrupulosum intellectū excitare debuerit in uocabulo πικρὸν. Porro duę sunt *Hierichuntidis* *rosę* species. Altera tota lignosa, fractūq̃ cōtumax, gustu insipida, nec odorata: Altera lignosa quidē, sed fragilior, gustu aromatica, ualde odorata, intusq̃ racematim concreto, semine plena, quarum prior *Amomis*, altera uerō *Amomū* uocatur.

*Loco huius uulgo habent semen botryos, alij *Sisonis*. *Arabes* *Pedem columbinum* uocant. Est & alius *Pes columbinus* *Geranij* species.

Hierichuntis *rosæ* duplex.

Costi triplex genus apud ueteres, in Arabicum, Syriacum, & Indicum diuiditur. Recentiores uero, duas tantum ex sapore differentias statuunt: alterum dulcem, alterum amarum appellantes. Sed tanta est rerum confusio, ut is quem dulcem uocant amarum, & quem amarum nominant dulciore gustu sentiantur. Conuenientius igitur est, ueterum modo secundum regiones, quibus nascitur species eius distinguere. Admonuit autem nos Dioscorides, quosdam pro Costo Comageni Helenii, hoc est Inulæ, in Comagene orientis regione, prouenientis radices uendere. Sunt enim nostra Campana Inulæ densiores, quapropter facile imperitis pro uero Costo substituuntur. Cuius doli nos quoque pharmacopolas admonemus, nam idem adulterinus Costus hodie non minus quam olim adfertur. Et præter hunc nullum alium habent pharmacopola uero Coste similiorem. Ideo quomodo adulterinus dignoscatur, docebimus, occasionem pharmacopolis genuinum inquirendi daturi. Obseruauimus autem sapissimè quatuor ad nos Costi appellatione afferri radices, genere & specie omnino diuersas. Primus enim aduehitur ex oriente Comageni Helenii radix, quæ nostrati Inulæ per omnia est similis, nisi soliditate & densitate tantum differret: colorem habet in cinereo candicantem, saporem amariuskulum ut nostra, non tamen adeo acrem, idque ideo, quoniam inueterascit antequam ad nos perferatur. Affertur autem ea in partes per transuersum aut longum incisa. Cum transuersè fuerint incisæ, nostram Inulam eodè modo incisam orbiculato rugarum habitu, referunt. Præter Comagenum Helenium nuper uendi cœpit Costi uice radix per transuersum taleolas secta, crassitudine plerumque manum complens, foris fusco, intus candicante colore, cortice crasso, substantia rara, & leuis odore, cum teritur rancidam aliquam pinguedinem olens, gustu supra modum acris, nauseosa, rancida, saluam ciens, & strangulationem comminans. Vtraque adulterinus est Costus. Altera uero non sine uitæ periculo intra corpus sumitur: est enim Thapsiæ species in monte Gargano effossa, ut ipsi ex Agrytis adiuimus, qui semen eius nobis attulerunt, in umbelliformi aut anethi modo enatum, crassum, nigrum, magnitudine et figura tritici, sapore radices suæ quam Agrytæ corrupto nomine unâ cum Italis Costones, quasi Costum amarum uocant. Huius autem usum ad interanea non temere probamus, foris uero imposita efficacius etiam uero Costo & profundius attrahit ruborem, tumoremque excitat & exulcerat ut Thapsia, cuius speciem esse ante diximus. Veri autem Costi in antiquis & bene instructis per Germaniam pharmacopoliis, species deprehendimus duas, quarum altera Syriaci, altera Arabici Costi historiam repræsentat. Altera enim radix est duum ad plurimum digitorum latitudine, per transuersum in taleolas secta, colore candida, pondere leuis, gustu acris, aromatica, acrimonia sua diu palatum obsidens, odore acris, iucunda, orisque halitum ad longum temporis spacium bonitate odoris commendans. In summa, nihil deest quod ad Arabici historiam attinet. Altera crassitudine iam dictam æquat: sed buxæ colore, & pondere differt, odore tamē ac sapore Arabico omnino similis. Tales quidem sunt Arabicus & Syriacus Costus. Indicum uero nondum nobis uidere licuit. Interim pharmacopolas hortamur, ut uerum costum emere studeant, & repudient tandem adulterinum. Porro non me latet, Hieronymum Tragum credere costum etiam apud nos in Germania nasci, esseque eam herbam quæ Germanis Pestilenzwurcz uocatur, quam opinionem omnino improbamus, non tamen ideo existimet quispiam nos quidquam hac in re detrudere authoritati uiri aliqui optimi, & in iuuanda herbaria medicina diligentissimi, eius enim studium & industriam ita probamus ut nunquam alterius, qui ante eum in Germania lingua nostra aliqui de simplicibus medicamentis scripserit. Quid autem sit ea radix, quam ipse costum esse contendit, suo loco indicabimus, quarto Dioscoridis libro, cum ad Petasitis historiam perueniemus.

Helenium
Comageni
pro Costo.

Thapsiæ
maioris
radix
pro Costo.

Veri Costi
species
duæ.

* Est et herba Costus, quam aliqui Mentam Saracenicam uocant, Marienmünz.

DE SCHOENO, [Id est, luncum odorato rotundo: quem Squinantum uulgo uocant.] CAP. 16.

Σχοινος Græcis luncum significat, qui in duo diuiditur genera, alter enim odo-

A. iij

ratus cognominatur, alter palustris. Hoc autem loco inter aromata recenset Dioscorides, priorem & odoratum illum in Syria, Arabia & Lybia nascentem, quem Græci *μυρρίκη* et *ἀδύσσωμον* cognominant, Latini luncum odoratum teretem et rotundum, ut distinguatur ab anguloso odorato luncu, de quo supra in Cypro dictum est. Græci tamen plerumque sine cognomento *σχίνον* absolute scribentes, semper rotundum odoratum luncum intelligunt, quod meminisse Græcorum lectores oportet. Expetebantur autem olim huius odorati teretis lunci omnes partes ad medicinam, culmi uel delicti, flores, comæ, & radices: præferbatur tamen alijs flos, quem peculiariter *σχινὸν ἄνθος*, uel composito nomine *σχινὸν ἄνθος* appellabant. quo quidē nomine hodie in pharmacopoliis non flores, sed culmi eius habentur, uerum corrupto: nam Squinantum appellant. Itaque floris nomenclum & stipulis inditum est, non enim ad nos flores perferuntur, nec est aliquis nostrorum negociatorum (quos nos percontati sumus) qui in tota uita sua huc allatos uidisset. Quod quidem mirum non est, cum olim etiam in ipsam Græciam non amplius deferrentur. Miratur enim Galenus eos qui lunci flores semper expetere solebant, nam eius quoque ætate in Græciam se rebatur odoratus rotundus luncus, summitate Camelis præfusus. Libentissime enim eo uelutuntur, ut ipse testatur: ob quam causam nostri hunc odoratum teretem luncum, *Camelstro* & *Camelshau*, hoc est, Camelorum stramen & scenum appellant. quæ quidem in re Galeni dictum confirmant. Contuli autem aliquoties hæc de re cum mercatoribus, nonnullisque alijs grandæuis & magnis uiris, qui uisendæ terræ sanctæ gratia in Orientem hinc proficiscebantur. Ii retulerunt, negociatores ex Syria Alexandriam ducere Camelorum greges, quos Carauanas uocant, impositas merces ferentes, cum autem in solitudines perueniant inter Syriam & Aegyptum ad Arabiam sitas, neque pabuli neque aquæ copiam inueniri, nasci tamen secus uias ubique aridas ueluti stipulas easque numerosas, densas, & stipatas ex uno radicum cespite, admodum odoratas: quas obiter inter eundem aut alias quiescentes depascant Cameli, eamque ob causam se pabulum hoc *Camelstro* & *Camelshau* appellare. Referebant etiam illos solere tali pabulo Camelos onerare, ne in sterilibus locis deficerent iumenta: quod uero superfluit Alexandriæ & Alkairi uili admodum uendere,

DE CALAMO AROMATICO. CAP. 17.

Duo sunt Calami hoc est harundinis, quemadmodum etiam lunci, prima diuisione genera. Alter uulgaris ubique aquis & stagnantibus locis nascentis: & odoratus alter, in India, Arabia Syriaque proueniens, de quo hoc loco Dioscorides agit. Vulgo in omnibus pharmacopoliis radix quædam calami aromatici nomine uenditur, sed nihil habet cum uero calamo similitudinis. antea autem à nobis indicatum est eam genuinum esse Acorum. Sed operæ pretium nobis esse uidetur rationes, quibus inducti id statuamus, hoc loco referre, ne uideamur sine iusta aliqua causa & temere tot sæculis receptam opinionem impugnare, quamuis primi non simus: cum ante nos Manardus & parens noster Euritius Cordus idem fecerint. Ut autem res tota, legentibus hos nostros commentarios intellectu facilius fiat, eam paulo uerbosius prosequemur sumpto ab historia & descriptione calami aromatici exordio. Principio igitur hæc ordinata planta Calami nomen inuenit, quoniam Calamo, hoc est, harundini alicui uulgari figura & habitu similis existit: uidelicet distractis per obliquum transuersumque radicibus, culmorum radicumque geniculatis internodijs, & in his fistulæ simili cauitate, aranearum telas referente in his lanugine, & tereti habitu. Aromatici uero cognomentum ei propter odoris iucunditatem inditum est. Itaque quantum ex omnium auctorum concordia historia, ipsaque oculata fide & propria inspectione colligere possumus, Calamus aromaticus est uulgari harundini similis, culmos emittens minoris ut plurimum digiti crassitudine, interdum uero graciliores, ex intervallo geniculis interceptos, fistulæ modo concauos, atque in ipsa cauitate aranearum telæ similem lanuginem habentes, colore in candido rufescentes. Radicibus nititur culmis descriptis similibus, candidioribus tamen & crebrioribus geniculis præcinctis, cauis & ipsis. Odor & sapor tam radici quam culmo acris, suauis, aromaticus, Schoeno quem Squinantum uocant non admodum dissimilis, sed iucundior.

Acorum
pro Calamo
uendi.

amdiſior. Talis igitur eſt Calamus aromaticus uerus, quem aliquoties in phatmaco-
poliis inter Squinanti, ut uocāt, ſtipulas & Spicam Indicam inuenimus. His enim nō
nunquam calu immixtus ad nos fertur, aliās autem per ſe non aduehitur. Subſcribi-
mus igitur nos quoq; iis qui tradunt, nos Calamo aromatico carere: nam uocatus in
pharmacopoliis abſolutē Calamus, aut cognomento aromaticus, neque genicula-
tas harundinis modo ex interuallo radices aut culmos, neque concauos habet, neq;
iubat in ſummitate paniculam, ſed magnum florem Iridiæ qualem, colore luteum,
caulemq; & radices ſolidas. In ſumma, Iridi cognata eſt planta, nihilq; aliud quā
uerus Acorus. Porro nihil mouet nos Hermolai Barbari doctiſſimi alioqui
uirī authoritas, ſcribentis ſe legiſſe, in Mæotide etiam odoratum naſci Calamum,
radice ſubalbida & ſine fiſtulis, plena intus & amara, ſpecie Acori, hoc eſt, ut recte
intelligamus falſo uocari Acori: nam hic Calamus quem Barbarus deſcribit, idem
cum uocato uulgo Calamo aromatico exiſtit: ideoq; non merito eos reprehendit
qui hunc Acorum eſſe putant. Quod autem dicit utrumque genus Acorum o-
dore ſuperare, ita intelligendum eſt. Verus Indicus Calamus, & qui Calami ſty-
minead Mæotidem paludem naſcitur, odoris bonitate uincunt eam radicem ſty-
pticam falſo Acori nomen habentem. Hæc ideo longius executi ſumus, ut phar-
macopolas & negociatores inſtigaremus, ut tandem genuinum Calamum expe-
tant. Nam ſi Nardi ſpica, Cardamomum, & alia aromata, ex India, Syria, & Arabia
afferuntur: quid impedit quo minus etiam Calamus ad nos aduehi queat? Sed
pleraq; huiusmodi conſuſiones & errores ſordidus quæſtus & ſœda lucri cu-
pido, bonarum & honeſtarum rerum omnium calamitas, peperit.

DE BALSAMO. CAP. 13.

Balaſamum parua eſt arbuſcula, numeroſis ſarmentis fruticoſa, cuius hiſtoria & de
ſcriptio non eſt eadem cunctis authoribus: aliis piceæ, aliis Terebintho, aliis Pyxa-
canthæ ſimilem tradentibus. Propterea difficile nobis eſt, quicquam certi de ea pro-
dere. Partes eius tres medicis uſui ſunt, uidelicet lignū quod Xylobalaſamū, fructus
quem Carpobalaſamum & Caſſamum, atque liquor quem Opobalaſamum ac Ba-
ſamæon uocant. Efficacior omnibus liquor, proximē fructus, poſtremum boni-
tatis locum ſarmenta ſiue lignum obtinent. Cortex tamen ſarmentorum ipſum
lignum medica ui ſuperat. Fuit autem omnibus huc uſque ſæculis maximum præ-
ceteris aromantibus cunctis Balaſmo præcium, ideoq; mille modis adulterabatur,
præcipuē liquor, deinde etiam fructus, atque ipſa uirgulta. Hodie uerō ne adulte-
rati quidem Opobalaſmi copia nobis contingit. Nouimus in omnibus pharma-
copoliis pro Xylobalaſmo oſtendi tenuia quædam uirgulta, ex quibus maxima
pars fatua, omniſq; odoris & ſaporis expers exiſtit. Non dubium igitur, quin pro
Xylobalaſmo alterius cuiuſdam fruticis ſurculi uendantur: reperiuntur tamen in-
ter eos nonnunquam qui mirum in modum odoris & ſaporis gratia commendan-
tur. Idem quoque de Carpobalaſmo uocato uſu uenit. Semina inania ſunt & inſipi-
da, habentq; figuram Hyperici fructuum, quæ figura etiam Dioſcorides nothum
Carpobalaſamum depingit: non rarō tamen inter ea inueni quæ maiora eſſent adu-
terinis granis, pleno pinguique intus & oleoſo nucleo, odoris in attritu gratiſſimi,
& quæ guſtu ineffabili odoris, ſaporisq; gratia oris halitum diu commendarent.
Porro ipſum Carpobalaſmum uix credo ad nos afferri amplius, uſtatīs Syria, Ju-
dæa, & nunc etiam Aegypto, Turcarum & Barbarorum rabie & incurſionibus. Ita-
que nemo ſperet temere ſe ſynceram Balaſmi lachrymam confeſciturum. Vidimus
tamen uerum Carpobalaſmum, quod hominum memoria aliqui ex Aegypto attu-
lerunt, Hieroſolymis huc reuerſi, colore ſulurum, lentum, ſpiſſum & inueteratum, in-
terim tamen ſua uiſiſſima adhuc odoris, cuius tantillum totū palatum penetraret. Hæc
itaq; dixiſſe hoc loco de Balaſmo ſufficiat. Totam autem partium Balaſmi hiſtoriam
& deſcriptionem deſiderantes, remittimus ad Plinium, Pauſaniam, Strabonem, Her-
molaum Barbarum, Ruellium, & alios, qui de toto frutice longius ſcripſerunt. Nos
quoq; alibi paulo diligentius quam hoc loco Balaſmi partes deſcripſimus, ut uolen-
tes in libris noſtris de hiſtoria ſimplicium medicamentorum inquirere poſſunt.

DE ASPALATO. [Eruditi quidam fruticem, quem pro Acacia pingis
Matthiolum, Aspalati speciem faciunt.] CAP. 19.

Aspalati appellatione hodie nusquam in pharmacopoliis medicamentum habetur. Est autem odoratus, spinosusque frutex, ut auctores tradunt. Possunt autem eorum studiosi totam eius historiam ex Plinio, Hermolao & Ruellio discere, nobis nihil certi hactenus scrutari licuit quod ad eius cognitionem faceret. Non enim nomine tantum incognitus est, desideratur etiam ipsa res. Recentiores uero omnes, praesertim uero Serapionis interpretes, tradunt Darisahan, hoc est Aspalatum esse Puniceam sylvestrem, seu ut ipsorum uerbis utar, arborem mali Granati sylvestrem: quod

Quod non sit Malus Punica sylvestris. nemini sano iudicio praedito unquam persuadebunt. Aspalatus enim odoratus gustuque subacer est frutex. Punicea uero tam Sylvestris quam sativae materia & cortex nihil odorati, nihilque acrimoniae praeseferunt, praeterquam quod folia grauem aliquem foetorem ferunt ut Cynoglossa & uirens Sena atrectata emittant. Huius autem erroris causa est magna inter Punicam sylvestrem & Aspalatum, similitudo. Vtraque enim arbuscula fruticosa, multisque spinis armata est, utrique etiam roseus flos. Nonnulli uero uehementius impingunt, qui credunt Aspalatum siue (ut Arabes uocant) Darisahan idem esse cum Berberi, spinoso frutice, a quibusdam Oxyacantha uocato, qui & ipse sylvestri punicea non dissimilis existit, idque tanquam secretum magnum solos se scire opinantur, quam opinionem omnino reprobamus. Scimus etiam Ioannem Ruellium constanter affirmare, Aspalatum esse lignum Rhodium, uulgo (ut ipse ait) Rodoen appellatum, quod mango-

Quod non sit Berberi.

Quod non sit lignum Rhodium.

nes officinarum per saepe pro Algaloch, hoc est ligno Aloe substituant, idque tanto a pere affirmat, ut dicat nullos nisi ueritatis furdos hoc insciari posse. Nos autem saluo omnium bonorum sano iudicio, id insciari nos ingenuè fateamur, qui & ipsi tamen indagandae ueritatis magno flagramus studio & desiderio. Quare si quid contra eius sententiam pronunciare cogimur, id faciemus rei cognoscendi studio, non quod auctoritati doctissimi aliqui uiri quicquam detrachere conemur. Statuimus autem contra eius iudicium, lignum Rhodium non esse Aspalatum, haud absurdum rationibus inducti. Principio igitur illud nouisse legentes oportet: lignum Rhodium, quod Ruellius uulgo Rodoen appellari scribit, idem esse cum eo quod apud nos a quibusdam Rhodisium appellatur lignum. Venditur enim saepe pro Algaloch, quod etiam Xilaloen, hoc est lignum aloen uocant, & ponderosum est, ita ut aque immersum lapidis modo subsidat, nec unquam postea emergat. Fiunt ex eo quoque globuli quibus funiculo traectis praeces suas mulierculae numerant. Est praeterea odoratum, in sum-

Ruellij argumenta, quod Rhodium lignum sit Aspalatus.

† Fortè nos.

ma idem est cum Rhodio cuius Ruellius meminit, nostrum Rhodisium lignum. Commellimur autem deinceps singulas eius recitare notas, quas Ruellius Aspalati historiae & descriptioni applicat, & per omnia conuenire constanter affirmat. Primum existimat Rhodium lignum cum nasceretur fruticosum fuisse, idque nobis testari quibus adhuc exasperatum scateat. Spinis nonnunquam inhaeruisse arbusculam, putat declarare aculeorum uestigia. Modicam arborem uel fruticem fuisse, satis ligni reliquias docere. Pondere etiam respondere Aspalato Rhodium lignum asserit, quoniam lapidis modo confestim praecipis fidat. Addit praeterea hoc lignum subrubere, & in purpuram quandam, exuto cortice, tendere, atque duriciam & spissitudinem eius tactu sentiri. Odoris quoque suauitatem indicare ligni suffitum, gustuque lenem amarum lenitiam recipere, & quadantenus amarescere: denique gustu deprehendi in eo acrimoniam & adstringendi uim quam Galenus Aspalato tribuat. Haec sunt eius rationes, quibus suam sententiam confirmare conatur, eas sigillatim confutare ueritatis causa cogimur. Principio autem ex nodis nempe ratiocinari potest fruticem Rhodium lignum fuisse, cum ij non tam fruticibus quam arboribus proprii sint: neque ulla pars definitionis habeantur fruticem designantis. Theophrastus enim fruticem definiens libro primo de historia plantarum sic inquit: *ὁ ἀμυγρὸς* (seu ut quaedam exemplaria) non admodum bene habent, *φρύγανος δὲ ἀπὸ ρίζης καὶ πολυτέλειας, καὶ πάλυκλαδον, ὅσον βάρους, πελίσσουσιν*: hoc est, ut Theodorus Gaza uertit: Frutex uero, quod ab radice, caudice multiplici ramosumque se attollit: ut Rubus, Palurus, & nullam facit nodorum mentionem, sicuti paulo ante in arboris defini-

Eadem dicitur.

tionem fecerat: *ῥωδιόν*, hoc est arboris *ῥωδίου*, id est, nodosam uocans. Ad hunc modum neque alii qui ex partium omni ratione aut circumscriptione fruticem definiunt, nodos ei assignant. Igitur quod nodi in Rhodio ligno scateant, non probat fruticem fuisse: sed intortam & tuberosam arbusculam. Est enim incurua, tuberibus & conuolutis pectinibus intorta eius materia, quæ res manifeste indicat arboris potius caudicem quam fruticis uirgas fuisse. Ferè enim omnes frutices (paucis admodum exceptis) multis longis, rectisq; uirgis à radice assurgunt, ut spina Crispina, Rhamnus, et Oxyacantha: adde Corylum, Ficum, Sambucum, Agnum, Eleagnum, & id genus alios. Quo fit, quod non existimemus, solum Aspalatum tortis enasci caudicibus. Si uero id ipsum quis affirmet, ei confestim argumenti ex nomine sumptum obiciemus. Dicitur enim Aspalatus alio uocabulo etià Erylsceptum, quæ uox pluribus comis est herbis, ut Cypero, Chamæleoni albo, Spina albæ. Obseruauimus autè nos diligenter nō nisi recta attollentibus & capitatis herbis, Erylsceptri cognomen, propter aliquam sceptri similitudinem, imponi. Sic enim sceptri cacumen emulatur utriusq; Chamæleonis Capitulum, sic etiam Cyperus in erectiorū caulium summitate diffusa gerens comam sceptri imaginem repesentat. Quemadmodū quoq; spina alba quæ procero, tereti, & harundineo caule, caulicq; impolito capitulo non dissimilem scepro præ se fert figuram. Itaq; etiam Aspalatū recta in altū attolli censemus, cum & ipse Erylsceptri nomine gaudeat: quare hoc Ruellii argumentum nō probat fruticosum Rhodii ligni habitum. Quod autem subiungit spinis id inhorruisse, ut declarant aculeorum uestigia, multo est incertius. Apparent quidem in superficie eius tubercula quædam, & nodi, & præcisorum ramulorum uestigia, sed quæ nihil minus referant quam aculeorum reliquias. Aculei enim Aspalati, quantum ex Theocrito etiam colligere possumus, graciles & ad uulnus infesti sunt, quemadmodū Rhamni, minimeq; crassi aut lati, ut tanta uestigia tuberum occupare aut tegere unquam potuerint. Deferimus igitur hanc rem omnibus bonis & æqui iudicii hominibus diiudicandam, qui aperte cognoscent, nullis aculeorū uestigiis exasperari id lignum, sed ramorum potius resectorum & tuberosorū nodorum reliquiis in æquale reddi. Fassetur tamen ipse quoq; Ruellius, spiculis suis castratū id afferri. Quapropter nec ista ratione cuiquam persuadebit, spinosum fuisse Rhodium lignū. Modicam arborem fuisse ipsi quoq; ex materia non usq; adeo crassa colligimus. Sed non continuo Aspalatus est, quod modicæ arboris magnitudinem habet. Neq; enim adeo gracilia sunt hæc ligna, ut frutices fuisse uideri possint: afferuntur enim sæpissime quæ una manu nemo complectatur. Vidimus nos non rarò à caudice aut radicum principio resecta tubera, quæ crassitudine utramque manum implerent, & propter eam amplitudinem pocula ex ipsis facta memini. Contra Aspalatus frutex, quo medicis usi sunt, ea crassitudine non describitur. Quod uero ponderosum sit lignum Rhodium, perinde non comprobatur Aspalatum id esse: non enim quicquid ponderosissimum est & lapidis modo aquæ iniectum subsidit, Aspalatus, nominandum erit, cum nullus unquā scriptoranti ponderis tantæq; densitatis notam Aspalato tribuerit. Conferatur enim (quod ad pondus hoc loco attinet) sibi ipsi ab auctoribus Aspalatus. Itaque in eo probatissimus cæsetur, quin suo genere densissimus & ponderosissimus fuerit. Siquid enim non tradūt auctores omnium lignorū ponderosissimum esse Aspalatum. Nam quæ pondere alias superant arborum materiæ numerantur, (Ebene,) Buxi, Oleastri, & id genus arborum, quarum nulli ferè pondere inferius est Rhodium lignum. Nos uero non ita ponderosum esse Aspalatum uel inde colligimus, quod quidam feruaceum esse Plinio dicatur, hoc est rarus, fungosus, leuissq; qui improbat & probatur ponderosior. Ergo credendum est Aspalato materiæ densiorem, lignosiores, & grauiorem Ferula, non omnium ponderosissimam, sed natura accedere ad ligni alius lentorem & duritiam: id enim Dioscoridi aliisq; Græcis significat *ῥωδιόν*, & Latinis lignosus, non quod omnia ligna soliditate uincit, sed quod prope ad ligni naturam duritia accedit, illud enim non lignosum sed lignum & plusquam lignum appellandum est. Longe igitur maius est Rhodio ligno pondus, quam Aspalato tribuitur: quapropter neque densitas eius nimia, neq; modum excedens duritia, neque tactu sensibilis spissitudo causæ censendæ sunt, ob quas Aspalatus uideri possit. Negamus etiam subrubere & in purpuram quandam exuto cortice tendere hoc lignum.

gnum. Miror autem cum Rhodio ligno diuersi sint, sibiq; alternis uicibus immixti colores, cur silentio præterierit candicantem, & pallidum: rubescentem tantum & purpurascentem eligens forte, quia hi propius quam illi ad descriptionem accedebant. Sed pace Ruellii & uenia bonorum omnium dixerim, non rubescere, neque ad purpuram uergere Rhodium lignum. Floridi enim & iucundi aspectus *ὑπερβόρου* & *περφυρίζου* colores, significatq; prior uox illa medium inter candidum & sanguineum aut roseum colorem: altera ex modico candido & roseo in profundiorē, hoc est purpureū uergentem. Rhodium uero lignum talibus nunquam blanditur coloribus, sed habet uenas partim albicantes, partim pallidas, partim in spadiæo fuscas et nigras: qui omnes aspectu luridi sunt, nec quicquā gratiæ præter diuersitatem habēt, rarissimeq; inuenitur quod nō distinctos habeat hos omnes colores. Aspalatus uero neque pictus est neque maculis diuersi coloris distinctus, sed uno tantum conspicitur, ex duobus tamen perfecte mixtis. Miror etiā non dubitare aut perpendere Dioscoridis interpretes cuinam Aspalathi partī inesse debeat subrubens aut purpurascens color. Nam dubium nobis relinquit Dioscorides, utrum de cortice an ligno id intelligendum sit, cum probat aspalatum *μετὰ τὸ περιφλοιδίννα* *ὑπερβόρου*, *ἢ περφυρίζοντα*, hoc est, post ex corticationem subruffum aut purpurascētem, indefinite enim ponitur infinitius *περιφλοιδίννα*. Interpretes uerō omnes, quemadmodum etiā Plinius infinitiuo modo positum uerbum in participium Latinum conuertunt: quo fit ut omnes intelligant eum colorem ipsum lignum præ se ferre debere, postquam deglubatur. Nos uerō contrarium intelligimus, censemus enim id de cortice dicere Dioscoridem. Nam quamuis totus hic frutex Aspalatus nominetur, à medicis tamen id nō mē etiam ad certam eius partem, quæ maxime usui fuit translaturum esse uerisimile uidetur. Ita enim Cassiam, ita Cinamomum appellamus, cortices tantum suarum arborum, cum id nomen aliās totis arbutis & fruticibus proprium sit. Quemadmodum enim omnes odoratæ arbusculæ & frutices cortice maiorem quam ligno gratiam habent, ut Cinamomum, Cassia, Balsamum & alia eiusmodi, ita etiā in Aspalato ferem habere ratiocinamur, sed id nostra authoritate uix alicui persuadebimus: igitur uterum testimoniis adductis forte fides nobis habebitur. Plinius naturalis historiæ libro XXIII capite XIII inquit uulgaris cuiusdam & syluestris spinæ (quæ Aspalatus nominetur, & ex qua urnæ fullo nariæ implantur) radicem usum præbuisse, eaq; multos per Hispanias fuisse usos ad odores & unguenta. Deinde subiungit historiam Aspalati ut in oriente nasci ab authoribus describitur, & nos non dubitamus, quin ea spinæ eadem cum aspalato fuerit. Omnia enim de ea scribit quæ alii aspalato tribuerant, postquam in oriente geniti Aspalati uires recensuisset, dicens. Similia præstare quoque Syluestrem putant. Non enim refert quod uulgarem hanc dicat spinam, nam uulgaris etiā erat Aspalatus in Aegypto, Syria, Cycladibus, Sicilia, Creta, Rhodo, Nisyro, Phocidis agro, & pluribus locis enascens, ut Plinius scribit: sed non ubique odoratus. Itaque Aspalatus qui in Hispania uulgaris erat, nobis qui frigidiora loca incolimus, non perinde uulgaris & cognitus est. Fuisse autem radicis usum iam ex Plinio probauimus, non tamen indicat num totæ radices an cortices tantum medicinam fecerint. Igitur afferemus etiā aliorum testimonia. Serapion in capite Darisfahan, hoc est aspalathi adducit auctoritatem cuiusdam Sulachin, dicentis hunc in modum: Darisfahan est planta spinosa, ingrediens in speciebus medicinarum odoriferarum, & habet florem croceum, & cortex ligni eius tendit ad rubedinem. Idcirco si Arabs Sulachin, subruffum colorem cortici inesse scribit, cur non etiā apud Dioscoridem uocabulum *ὑπερβόρου* ad Corticem referimus potius quam lignum: nam si lignum subruberet, de eo adscripisset Sulachin, & non de cortice: quapropter iste color tribuitur ei Aspalathi partī, quæ plus cæteris in usu fuit. Fuisse autem Corticis usum in medicamentis testatur Galenus diuersis locis: libris de Theriaca ad Pisonem, & de Theriaca ad Pamphylianum in magmate Hedychroo secundum Magni descriptionem. Vtroq; enim libro recipiendum esse iubet ad confectionem Hedychroi magmathis, *ασπαλάδης ῥίζης φλοιόν*, hoc est Aspalathi radicis corticem. Idem testatur Aëtius in suffumigio quodam, corticem Aspalathi recipiendum præcipiens. Cum uerō corticis, & præsertim ex radice usus fuerit, & rubescens color manifeste cortici à Su-

lahin Arabe assignetur, nemo temere affirmabit, ipsum Aspalati lignum rubere aut purpurascere, & utilius Cortice in medicina esse. Contra in Rhodio ligno cortices, studio & industria, cui omnis aromaticæ facultatis & utilitatis expertes, cum proxima & exteriori materia profundius resecta abiiciuntur, soliusque ligni cor odore & sapore commendatur. Ideo neque hac ratione Rhodium lignum Aspalatus esse potest. Odoris autem suauitatem in eius suffitu deprehendi non inus inficias: sed multa sunt præter Aspalatum odora menta quæ iucunde olent per se aut prunis immixta posita. Taceo autem quod Aspalatus odore ad Castoreum accedere quibusdam scribitur, qualem odorem in Rhodio ligno tam crudo quam prunis imposito non percipimus. Miramur præterea cur Ruellius dicat Rhodium lignum leuem amaritudinem respere, quadantenus amarescere, cum non inclinet tantum ad amaritudinem * respicit, quam in Aspalato esse debet. Si uero accurate gustum consulamus, Oleastri saporem sed amariorē & actiorem in eo sentiemus. Galenus qui alias diligenter medicamentorum sapores considerat, & nihil, quod ad diuicandās eorum qualitates attinet, prætermittere solet, nullam amaritudinem Aspalato tribuit: quam si euidens in eo esset, nequaquam silentio præterisset. Rhodio uero ligno tanta inest amaritudo, ut nullus gustum fugere possit: cui adiuncta est, cum aliqua adstringendi uis, manifesta acrimonia, quæ paulatim incipiat donec prorsus excalefactas fauces, propemodum ut Cocognidium exasperet & seruire detineat, quare id in tertio gradu completo, calidum pronunciamus. Aspalato contra dilutius est temperamentum. Habet enim, ut Galenus testatur, diuersas qualitates, acrem quidem calefacientem, stypticam uero refrigerantem: itaque in caliditate & frigidityte medium quiddam obinet, ut ex uiribus ei attributis ratiocinamur. Si uero aliquantulum superat acrimonia adstringentem facultatem (quod tamen nullus asserit) primum ei completum caliditatis gradum assignemus. Quemadmodum etiam facit Serapion, illud inter medicamenta recensens, quibus primus est in siccitate & caliditate excellus, quod Aspalati temperamentum duobus gradibus excedit Rhodii ligni caliditas. Porro cum hæ Rhodii ligni notæ non possint ad Aspalati historiam referri, haud uideo qua aliquis ratione nobis persuadeat, idem esse Rhodio ligno Aspalatum. Sed obicietur nobis fortasse, quod potius indicemus quid non sit, quam quid sit Aspalatus. Verum æquos animos legentium id non spe ro offensurum. Longius enim ideo negotium tractauimus, ut reiecta falsa de Rhodio ligno opinione alios etiam instigaremus, ut uerum inquirant Aspalatum, quod nos etiam conabimur. Allatus est hætenus in totam Europam pro Cassia lignea cor tex radicis cuiusdam, crassiusculus, colore purpurascens, præsertim fractus, gustu stypticus, tenui odore gustantium palatum achalitem commendans, quem ex Aspalati specie aliqua detractum opinamur, nihil tamen affirmamus, antequam ad reiectam cognitionem perueniamus. Ut autem aliquam calumniæ partem effugiamus, ostendamus quid sit apud authores Rhodium lignum; cum Oleæ Aethiopice historiam attigerimus.

Conclusio

Aspalatum uidetur cor titem, qui pro Cassia lignea uulgo uenditur.

DE MUSCO. CAP. 30.

Duo sunt medicis præcipui odoris medicamenta, eodem ferè nomine insignita. Alterum Muscus, alterum Moschus appellatur. Quod Moschi nomine ab Aetio dicitur, Indicæ cuiusdam Capræ odoratum pus est, cuius usum nos Arabes docuerunt. Quod autem Latinis Muscus, ueteribus Græcis *βρύον* & *Σπλάχνον*, recentioribus uero etiam *μύσος* siue *μύσος* dicitur. Villosa & odorata arborum canities muscus est, Cedri, Quercus, Populi albæ & aliarum quarundam arborum ramis dependens: quare crebro in odoratis unguentis, suffitibus & cæteris medicamentis usa est antiquitas. Quamuis autem musci appellatio quarumcumque arborum uillosam caniciem significet, quotiescunque tamen Bryi, Musci, Splachni aut Hipni uocabulum apud Græcos legentibus occurrit, semper intelligendus est hic odoratus arborum muscus, quem Arabes *Vsneam* uocant. Non me fugit Hermolaum Barbarum differentiam inter Bryon & Brion constituere, nec conicere possum quæ fretus sit autoritate aut ratione. Nam candidos illos albæ Populæ racemosos

musci uillos, quos Barbarus Brion dici tradit, Dioscorides etiam Bryi nomine comprehendit. Quod autem alibi Brion alibi Bryon apud autores legatur, librarium incuria accidit, pro u litera i, scribentium. Aëtius pluribus locis testatur *ῥιον* siue *ῥιον* idem esse quod *ῥιον* & *ῥιον*, hoc est, muscum arborum odoratum. Idem tamen author libro xliii. capite cxviii in Masuaphi confectione interprete lano Cornario, scribit Hipnum canaliculam paruum esse ex arbore quæ Damascena dicatur, itemque ex ea quæ Rhodacinea appellatur. Qua quidem in re miror Aëtium, si modo non mendosum est eo loco Græcum exemplar: non enim tantum contra aliorum omnium auctoritatem, sed & contra suam ipsius sententiam id prodidisset, cum alibi muscum *ῥιον* esse dixerit, cui nihil simile canalicula quæ etiam habere potest. Itaque mendosum suspicor esse hac parte exemplar, quod interpres Cornarius queritur etiam situ, carie & blattis exelum fuisse. Per canaliculam autem intelligendus est cortex ex arbore Damascena detractus, canalís figuram habens, quemadmodum in Cassia & Cinamomo uidemus. Cum autem à nullo alio Hypnum cortex aut Canalicula esse dicatur, & ipse Aëtius sæpe testetur Hypnum idem cum Bryo, hoc est, [†] panico, & [†] splachno esse, non potest fieri quin defectus quidam sit in isto uerborum contextu. Coniicio uero statim Hypni uocabulum in integris exemplaribus sequi Aspalatum aut alium quendam odoratum corticem, de quo id dicat Aëtius. In eam enim confectionem alias non ingrederetur Aspalatus, qui tamen peculiariter omnibus ferè odoramentis misceri solet. Præterea canaliculato Aspalati cortice mediciebantur, nascitur etiam in Syria & Rhodo insula Aspalati arbuscula, ideo non sine ratione à Damasco Syriæ urbe & Rhodo natalibus suis, Damascena & Rhodacinea nominari potuit. Scio tamen Aëtio Rhodacini nomine etiam Persicam malum dici. Cum uero Persica malus prior & crassior sit, quam ut tam parua canalicula ex ea deglubi queant, non uideò qua ratione aliquis per Damascenam aut Rhodacineam arborem, Persicam malum intelligere debeat, præsertim cum nihil habeat quod iucundè oleat Persicæ mali cortex, siue à caudice, siue ramis, siue radicibus detrahatur. Quantum uero ex interpretis Cornarii translatione colligere licet, uidetur differentiam constituere inter Damascenam & Rhodacineam arborem. Dicit enim: canalicula ea parua est ex arbore quæ Damascena dicitur, itemque ea quæ Rhodacinea appellatur, ea ratione canalicula cuius meminit Aëtius non esset unius eiusdemque arboris cortex, sed duarum diuersarum, quod omnino absurdum est. Species enim indiuidua cum sit ea canalicula, è singulari etiam arbore eam detrahi necesse est. Quare nos ita potius legendum apud Aëtium existimamus. Canalicula ea parua est, ex arbore quæ Damascena dicitur, quæ etiam Rhodacinea appellatur. Non tamen quisquam existimet nos interpretem culpasse. Credimus enim uitio exemplaris id accidisse, quam primum autem Græci exemplaris copia nobis facta fuerit, diligenter hunc locum considerabimus. Hactenus enim non licuit nobis sua lingua scriptum legere. Porro hic odoratus arborum muscus, nusquam in Germaniæ pharmacopoliis cognoscitur, nec credo ipsum temere in reliquis Europæ nationibus aut uulgo haberi aut cognosci. Recentiores magno errore muscum & moschum diuersissimi generis medicamenta, nominis similitudine decepti, confundunt. Muscum enim uocant non odoratos arborum uillos, de quibus iam diximus, sed latè olens Indicæ cuiusdam capræ pus, quod proprie Moschus ab authoribus nominatur, & à quibusdam recentioribus Castoreum, quamuis plurimum à Moscho Castoreum differat: quoniam uero non raro Moschus folliculis & utriculis Castoreo similibus inclusis uendatur, atque ut ipsum ferè grauiter oleat, propter aliquam similitudinem id nomen adeptus est. Oportet igitur circumspectos esse lectores ut discernant an Moschus, an Castoreum apud aliquem huiusmodi scriptorum recipiendus sit.

lignum Aloë appellatur, quo nomine vulgo in pharmacopoliis ostenditur. Quis-
 dam è recentioribus id etiam simpliciter Aloë & Aloa nominant, quorum in nume-
 ro est Ludouicus Vartomannus, qui Orientales & Australes regiones descripsit.
 Videntur tamen etiam ueterum nonnulli similiter per Aloën Agallochum intel-
 lexisse. Nam Diapasma illud quo lectulum suum odoris gratia conspererat mu-
 liercula, de qua in prouerbiis Solomonis legitur, Myrrham; Aloën & Cinamo-
 mum recipit: quo loco minime intelligendus est dentatus ille amarissimus & gra-
 uiter olens succus Aloë uocatus, qui nullis odoratis pulueribus; aut Diapasma-
 tis miscetur unquam, nec reputatur inter aromata & odoramenta. Itaque hoc pro-
 uerbiorum loco per Aloën Xyloaloe, hoc est, Agallochum intelligimus, ceu ple-
 risque etiam aliis locis. Sunt autem plures Agallochi differentiae, ex quibus optimū
 quodq; ad fros usus referunt Indi & reliqui Australes populi, nobis quod nō ita bō-
 nitatē excellit mittentes. Miror autem nusquam apud Galenum in censu simplicium
 medicamentorum Agallochum inueniri, cū tamen ante ipsum Dioscorides de eo egē-
 rit, ac post eū etiam Paulus Aegineta, qui omnia sua ex Galeno excerpfit. Citant etiā
 in testem Galenū Arabes scriptores de Agallocho loquentem, quo fit ut omnino eī ē-
 dam, eius mentionē inter simplicia medicamenta fecisse Galenum, sed temporum in-
 iuria ac librariorū incuria id caput ē libris de simplicibus medicamentis excidisse. Nū-
 quam etiam Plinius huius ligni, sub Agallochi nomine meminit, quamuis diligenter
 Dioscoridis scripta perlegerit. De Taro tamen scribit pauca, quod idem eī ecum
 Xyloaloe, hoc est, Agallocho, Aëtius affirmat. Dioscorides Agallochum Thuino
 ligno simile esse dixit: uidendum igitur qualis sit Thuia arbor. Theophrastus li-
 bro v, de historia plantarum, Thuia materiam tribuit quae uetustate corrumpi uix
 queat, & radices habeat crispissimas preciosioribus operibus expetitas. Eadem
 arbor aliis authoribus, ut cum plerisque doctis suspicamur, etiam Citrus & Troge-
 tes appellatur, fiebantq; preciosissimae ē radicibus eius apud Romanos mensae, qui-
 bus aestimationem fecit crispis uenis conuoluta, & maculosa materia, quam etiam
 Croco tingebant, ut paulo post in Croco dicemus. Est igitur Thuia lignum ue-
 nis intortis crispis conuolutum, & maculosum quemadmodum Betulae, Fraxini
 & Aceris arborum tuber, tum Bruscum tum Molluscum Germanis Waser & Fla-
 der dictum, quo hodie etiam ubique apud nos mensae & delicatiora opera fiunt:
 Hinc itaque Thuino ligno simile describitur Agallochum, quoniam maculosum, cri-
 spumque sit, quale saepe uidimus ad nos adferri. Idem autem Agallocho accidit
 quod Thuiae. Quemadmodum enim non quauis eius materia aut pars crispatur;
 ita etiam non quoduis Agallochum crispum apparet. Quod uero radici proxi-
 mum aut radicis pars fuerit, fluctuantibus uenis in crispum habitum uibratur. Por-
 ro quod ad nos deferunt non usque adeo ponderosum est, ut aquae iniectione lapi-
 dis modo subsidat. Haec enim nota non est praecipua, neque omnibus Agallochi
 speciebus propria: alioquin Rhodium lignum, quod pro Xyloaloe uenditur, opti-
 mum esset Agallochum. Considerandę potius hae notae: uidelicet ut sit odoratis-
 simum, etiam per se, ut est integrum gustu: ualde aromaticum, modice amarescens,
 leniter adstringens, pingue & resinosum, cuius suffitus gratissimū late spargit odorē,
 & ut gustatum ac palatum commendet, ceu in libris nostris de historia medicamen-
 torum diffusius indicauimus. Animaduertendum postremo est, ne decipiamur in
 Agallocho comparando, plerique enim Rhodium lignum ignaris pro eo uendunt,
 quem dolum Ruellius quoque taxat. Adulteratur praeterea Agallochum, ut Pla-
 tearius tradit, ligno quodam in montibus Almasiae nato, quod pondere, nodoso
 habitu, & quadam aromatica ui Agallochi notas ut cunque refert, sed neque no-
 men ligni, neque ubi siti sint Almasiae montes indicat. Matthaeus Syluaticus.
 Pandectarum author idem paulo aliis uerbis refert, & lignum quod pro Agallo-
 cho uendi conqueritur, Chamelae radices esse scribit. Videndum igitur quid Chamelae
 nam per Chamelaeam eo loco intelligendum sit. Significat autem Chamelae pro-
 prie eam plantam, quam Latini Oleaginem & Oleastellum, Arabes uero Meze-
 reon uocant Thymelae, hoc est, granum Gnidium ferenti frutici figura & uiri-
 bus similem. Eius radices Matthaeus Syluaticus pro Agallocho uendi credidit,

† *Nervosa.* sed male. Nihil enim simile habet cum Agallocho dodrantalis plantæ radix, substantia rara, lenta, flexilis, & gracilis: cum Agallocho, neque rara neque *† ueriosa*, neque flexilis neque gracilis sit materia: sed densa, lignea, flectenti contumax, rigida & crassa. Præterea Chamelææ illius lignum (quo adulteratur Agallochum,) mentitur colore, pondere, nobis & sapore uerum Agallochum. Chamelææ uero, hoc est, Mezerei radix, nihil horum præ se fert. Itaque aliam quandam plantam per Chamelæam (qua quidem Agallochum adulteratur) legentis intelligendum meminerint, qua de re nostram sententiam studiosis communicabimus. Chamelææ uox apud Græcos, perinde ut apud Latinos Oleastelli, non tantum Mezereum designat, uerum etiam Thymelæam: & præter Thymelæam & Chamelæam, Oleastelli uox aliam paruam quandam oleam sui generis, quam Cilibracam Columella appellat, (quamuis quidam Calabricam legere malint). Cum igitur uagasset & pluribus plantis communis Chamelææ & Oleastelli appellatio, absque dubio etiam ad Oleastrum, quæ syluestris & pumila est olea, referri potest, quæ alio nomine Græcis *Κότιν* & *Αγριλάϊα* uocatur. Cum autem authores nos admonent Chamelææ radicibus Agallochum adulterare impostores solere, nec ullo pacto hoc possit intelligi uel de Oleastello, hoc est Mezereo, uel de Thymelæa, necessesse est ut per Chamelæam hoc loco intelligamus Oleastrum, qui parua & syluestris est Olea, maxime cum talis e sit materia, quæ facile pro Agallocho substitui queat. Est enim oleæ densum, solidum, ponderosum, gustu amarum & acre lignum, præsertim syluestri, inprimis autem in Arabia & Aethiopia nascenti, cui propter cæli calorem etiam odorata est materia. Censem igitur sæpe pro Agallocho uendi Aethiopici siue Arabici, aut alibi in calidioribus locis enati oleastri lignum. Nam ipsi Arabes scriptores testantur in Arabia nullum Agallochum gigni, sed aliud quoddam lignum ei non dissimile, quod est oleastri. Id ipsum autem idem est cum Rhodio ligno uulgo uocato. Non obstat quod Ruellius dicit lignum Rhodium in Rhodo insula nasci. Curenim in Rhodio non nasceretur Oleaster, cum etiam frigidioribus terris familiaris sit? At quæ causa sit quod credamus idem esse Aethiopici Oleastri materiæ Rhodium lignum, differemus elicere donec ad Aethiopice oleæ historiam & descriptionem perueniamus.

* Pro Agallocho plerique uendunt lignum Rhodium uel Rhodisium uulgo dictum: quod uilius Agallochi species est: cuius lignum est solidum, durum, uarij coloris, amarum: & uidetur Oleastri uel oleæ Aethiopice lignum esse.

DE NASCAPHTHO. CAP. 22.

* *Storax* Nascaphthum quod etiam Narcaphthum & Lacaphthum Græcis uocatur, cortex est arboris cuiusdam, ut authores tradunt, ex India allatus. Incertum autem est cuius nam arboris cortex sit, siquidem hac de re nihil certi nobis tradiderunt Græci scriptores. Paulus Aegineta tamen libro vii. in compositione Cypheos magni siue heliaci Lacaphthū interpretatus corticem piceæ, uel alterius cuiusdam arboris, magis dubios reddit lectores. Non est quidem cur aliquis credat Pini aut Piceæ corticem Nascaphthum esse. Si enim harum arborum corticem Nascaphthum appellarent authores, nihil uilius in Europa Nascaphtho esset. Quoniam uero ex alio orbe in Europam fertur Nascaphthum, nihil minus quam Pini aut Piceæ cortex fuerit. Hodie nullum habetur hoc nomine in Europæ pharmacopoliis medicamentum, nec temere apud Aromatopolas sub alio nomine latens cortex reperitur: Nisi enim hic Nascaphthum fuerit prorsus rem ignoramus. Cum uero nobis certo non constet unde afferatur, & cuius arboris cortex sit, sicca appellata storax, de re ignota non est operæ precium longius dicere. Ex India non afferri argumentum est utilitas, quamuis alijs quoque indicijs id constet. Serapion Abicis cuiusdam testimonio frustrata, dit siccam uocatam storacem corticem esse arboris storacem (Styracem resinam) fundentis, qui decocta & expressa liquida styraei super sit, quod tanquam uerisimile non impugnamus. Hoc tamen reticendum haud existimamus, nobis uideri aliam esse & diuersam arborem liquidam Styracem fundentem, ab ea quæ calamitam

laminam sudat Styracem, ut paulo post in Styrace indicabimus. Hoc enim loco non de Styrace, sed Nascaphtho nobis differendum est. Ioannes Rhodericus Lusitanus Nascaphthum putat esse preciosam illam arboris cuiusdam Indicæ materiam, quam ligni aquile nomine instructiores Lusitanorum officinæ seruant. Sed cum hoc lignum non sit cortex, sed arboris cuiusdam Indicæ materia, Agallocho similis (cuius etiam speciem esse arbitramur) non ausim eius opinionem confirmare. Siquidem Nascaphthum cortex est arbori suæ detractus. Aquile uero lignum, non cortex, sed lignum est, quamuis nonnunquam etiam cortice uestitum afferatur, sed rarò, & cui non sit eadem, quæ ipsi ligno in odore & sapore gratia. Nos itaque ingenue fateamur, nobis hæcenus nihil certi de Nascaphtho constare, Hortamur igitur alios, ut id inquirant.

DE CANCAMO. CAP. 39.

Quod *Κάναμον* ueteres Græci dixerunt, recentiores Græci pariter Arabibus Lacham appellant; & facile intelligent, qui Arabum authorum libros, cum Græcis contulerint, Lacham idem esse cum Cancamo: dubitat Hermolaus Barbarus, quoniam Lacha odore uacare uideatur, qui possit ad suffimenta dari. Sed nullum hac in re dubium mouendum est. Non enim omnia quæ suffita olent, per se ut sunt integra spirant, quod etiam in Lacha contingit. Est enim densa, solida & arida prorsus cum ad nos uenit. Itaque non potest spissæ substantiæ inclusus odoratus eius uapor, & halitus per se erumpere, prunis uero imposita talatenon insuauem odorem diffundit. Quare odor eius sufficit tantum percipitur. Est autem Cancamum concretus humor, seu lachryma, in India & Arabia nascens, arborum ramulis & surculis undique circumfusus, colore fuluus & pellucidus, qui Laccæ nomine in omnibus pharmacopoliis ostenditur. Authores figuram arboris in qua gignitur non tradunt. E recentioribus tamen Ludouicus Vartomannus, Nuci luglandes ferentis, similem esse scribit. Quinetiam de re ipsa dubitant scriptores. Plerique enim Gummi siue lachrymam esse affirmant: Rhafis uero de cælo eam cadere dicit super ramos Gubere arboris, quam Mespilum interpretantur, quam bene autem non scio. Apud nos certe ueris tempore arborum surculis circumfusa uidetur seu spumosa quædam & lenta salua, quam Cuculi uomitum aut saluam agrestes uocant pueri. Ea æstate conerescit in Laccæ soliditatem, sed multo est tenuior ac gracilior: colore cinericeo etiam à laccâ differt. Nos hæcenus eos sequimur, qui Lacham Gummi aut lachrymam esse affirmant. Nam habitu & aspectu nihil prorsus ab aliis lachrymis differt.

DE CYPHL. CAP. 40.

Cyphi non est simplex aliquod medicamentum, sed Thymiaa quoddam, & odorata diuisque sacrata confectio: qua Aegyptii sacerdotes ad suffitus, medici uero ad diuersas morborum iniurias antiquitus utebantur. Eius multæ fuerunt compositiones: quæ autem Medicis receptæ sunt, à Dioscoride, Aetio, Paulo Aegineta & aliis describuntur. Arabes hoc Thymiaa Cochion & Cyphi intelligendum est, quod in Mithridatium Antidotum ingreditur. Requirit autem ad Cyphi suum Dioscorides *ἀόλαρον*, hoc est, uegetam luniperi baccam. Cum autem duæ sint luniperi species, quarum altera maiorem, altera minorem fert fructum, dubium est utrius baccæ accipiendæ sint. Marcellus Virgilius interpres crassas luniperi baccas è maiore lunipero intelligit, ut ex commentario eius in hoc caput scripto aperte colligimus. Nos autem *ἀόλαρον* appellationem non ad maioris luniperi fructum referendam censemus. Significat enim plenam, adultam, & iusti incrementi baccam siue maioris, siue minoris luniperi: ideo magis probamus hoc loco Ruellium, qui non magnam aut crassam, sed adultam uertit.

DE CROCO. CAP. 41.

Crocus herba est bulbosa radice, foliis longis & admodum angustis: flore Lilio non dissimilis, autumnino è terra emicante. Stamina singulis floribus plerumque

terna, nonnunquam etiam plura sunt, oblonga, gracilia, colore puniceo, & egregio odore, cum exaruerit, quæ propter excellentiam cæteris herbæ partibus præferuntur, & Croci nomine ueniunt. Crocus alibi sponte prouenit, ut in Cilicia, alibi olerum modo in hortis feritur, depositis ordine radicum bulbis, ut Cyrenis, in Sicilia, Italia, Gallia, & Germania. Nam apud nos quoque sæliciter prouenit, uident eo latè pluribus regionibus, segetis modo, agri, præsertim Misniæ. Satiua præfertur in medicina sponte in Coryco natus, sed nemo speret temere ex Asia ad nos adferri. Itaque uticogimur, Italico Aquilæ urbis agro genito, & nostriati seu uernaculo. Tradit Dioscorides Thuinam † tingentes in Italia satiuo usos fuisse, quoniam succi copia & coloris bonitate, sponte natum uinceret. Quo loco non satis fecerunt legentibus interpretes Barbarus, Ruellius, Marcellus & uetus interpres, quemadmodum nec ipse Plinius, quod omnium eruditorum & honorum pace & uenia dixerim. Neque enim culpam transferendam in uiros doctissimos existimamus, sed potius in libentarios, *Thuiam* pro *Thuiæ* † scribentes, quorum uocabulorum prius *Thuiæ* habet *Thuiam* mortarium, alterum uero *Thuiam* arborem significat. Hinc factum est quod omnes mortarium interpretati sint, sed malè admodum & absque ullo sensu aut intellectu. Quæ enim est in tingendis Croco mortariis utilitas, aut quis usus Croci coloris ex mortario. Nos semper hoc de Thuiæ arboris materia intelleximus: Nam quemadmodum adhuc preciosa opera crispa Fraxini & Aceris materia aut turberibus earum elaborata diluto Croco tinguntur, ita etiam ueteres Thuiam, quæ & ipsa crispa est, infecisse uerisimile est, immò certum. Idem suspicatur etiam Ruellius, non quidem in Dioscoridis uersione, sed in suo de stirpibus opere, tam herbam ipsam cum radice, quam Punicea florum stamina Germani pariter Gallis Arabico uocabulo, *Saffian* nominant.

Thuiæ arboris materia.

† *Nostri dicunt habere Thuiam.*

DE CROCOMAGMATE. CAP. 26.

Crocomagma Crocini unguenti, cuius paulo post mentio fiet, sex & sedimentum est. Constat autem Croco & Myrrha, quæ expresso Crocino unguento remanent, ac in pastillos conformantur. Probat Dioscorides Crocomagma, quod dentes & linguam uehementer ad aliquot horas permanente colore inficiat. Quo loco Ruellius per 400 annos intellexit, sentiens optimum esse quod uetustatem terat, & multos annos duret. Sed Dioscoridis sententia est, optimum esse quod infectos dentes Croceo colore ad multas horas permanente oblideat. Ita enim hunc authorem intellexit Marcellus interpres, cuius uersionem hoc loco magis quam Ruellii probamus. Huius Crocomagmatis apud ueteres usus fuit. Postea Arabes Trochiscos Crocomagmatis & corrupto nomine Crocimagmatis recentiorum nonnulli appellant. Capiunt hi ut Mesues tradit Crocum, Colcotar, Alumèn, Calcadè, & Gummi Arabicum. Quid autem sit Colcotar & Calcadis (quia huius loci non est) in quinto libro, ubi metallica medicamenta attigerimus, ostendetur. Paulus Aegineta quoque libro vii pastillos quosdam ponit, quos etiam Crocomagma uocat, quorum compositionem ex ipsa *so* authore legentibus petendam relinquimus.

DE HELENIO. CAP. 27.

Helenium Romanis Inula, pharmacopolis Enula Campana, Germanis Alant nominatur. Herba est uerbasci foliis, procero caule, floribus Conyzae modo orbiculatis, colore aureis, radice crassa, perenni, gustu amara & odorata, cuius usus est. Nasctur sponte tam montanis quam campestribus locis, utrisque tamen (ut obseruauimus) pinguibus. Interim etiam in hortis bulbosis radicum oculis feritur. Caulem interdum eadem radix non emittit. Hinc est, quod Dioscorides tradat, caulem quibusdam locis non proferre Helenium. Nos longa obseruatione deprehendimus, id non fieri singulari aliqua natalium locorum natura, sed ratione temporis & radice ætate. Cum enim sponte enatum, se non radicum oculis sed disperso uentis pappaceo semine latè, propagat, aliquot primis annis noua germina semine enata non possunt caules producere, donec ad iustam ætatem & magnitudinem radix perueniat. In hortis autem auulsis radicum oculis satum citius incrementum capessit, caulemque

caulemque emittit, quem tamen omnibus annis eadem radix non semper molitur, sed alterius plerumque.

*Helenium hoc Theophrastus nomine Chironij Panacis describit. Helenium autem ipse vocat alterum duntaxat Dioscoridis ē Cratæa descriptum Helenium.

*Helenium ex Helenæ lachrymis enatum aiunt: quam fabulam pulchre describit Nicander in Theriacis suis.

DE HELENIO AEGYPTIO. CAP. 28.

Theophrastus huius Helenii sub hoc nomine nusquam meminit, quamvis Helenium quoddam describit foliis parvis, cuius sit coronis usus. Nouisse itaque legentes oportet Theophrasti Helenium idem esse cum eo, cuius historiam Dioscorides in fine huius capitis ē Cratæa desumpsit, quam Helenii speciem (cum ipsi Dioscoridi ignota fuerit) difficile quis iudicare poterit, tanquam nobis peregrinam & calidis maritimisque, Aegypti præsertim locis, familiarem.

DE OLEO ACERBO. CAP. 29.

Olei propria appellatio intelligunt auctores pinguem Oliuarum succum. Itaque cum simpliciter & indefinitè posita apud scriptores Olei uocē lectores inuenerint, meminisse eos oportet, natium & ex oleis expressum succum recipiendum esse. At cum omnia alia olea ex herbarum seminibus eliciantur, hoc priuatim Germani Baumöl, hoc est arboreum oleum nominant: quoniam non ex herbarum seminibus, sed ex arborum fructibus exprimitur. Diuiditur autē in plures oleum differentias, sed geminas præcipue. Aut enim satiuus premitur oliuis, aut syluestribus. Quod uero ex Oleastri baccis fit, rursum in tres differentias primarias conciditur, cum aliud uulgares Oleastri, aliud Aethiopicæ Oleastri, aliud Cilibracæ oleæ siue Oleastelli fundant, Urbanae, seu (quod idem est) satiuæ oleæ baccis expressum, nationibus & regionum quibus gignitur diuersitate, in plures species distinguuntur. Sed ubicunque genuū duas habet differentias: aut enim ex immaturis adhuc oliuis premitur (de quo nunc sermo nobis est) aut ex maturis. Quod immaturæ fundunt oleæ, priuatim Græcis ὠμοτριβός, & ὀμφάκιον appellatur, quoniam id crudæ, acerbæ, & sole nondum percoctæ tritæ baccæ remittant. Latinis Acerbum oleum appellare mos est, recentiores Græco nomine magis delectantur, Omphacinum appellant, &

DE OLEO COMMUNI. CAP. 30.

Apparet Dioscoridem hoc uno eodemque capite continua orationis serie de omnibus oleis speciebus egisse. Librarios uero membra capitis huius in plura capita redeigisse. Primæ itaque parti iractionis de oleo præfixus est titulus περὶ ἐλαίου ὠμοτριβός, Secunda autem parti περὶ ἐλαίου κοινός, hoc est, de oleo communi. Est autē oleum commune, uulgare illud ex maturis & diruptis oliuis (Græci ἐν πετρίᾳ appellant) expressum, quod nos Germani Aelßöl, id est, maturum oleum nominamus. Non enim refert quod Dioscorides παλαιότερον, hoc est, uetustius dicat. Siquidem mea sententia per hanc uocem nequaquam intelligendum est uetus Oleum, sed quod Omphacino sit uetustius, ideoque in comparatio gradu παλαιότερον, & ἢ παλαιόν dixit. Nec quis credat commune hoc ē diruptis baccis expressum oleum uetustius acerbo esse debere, expressionis tempus respiciens: hinc enim non est genuinus sensus. Vetus enim ideo dixit, quia Drupæ oleæ, ex quibus commune hoc premitur oleum, diutius in arbore sua pendet, quam Omphacæ, & ad iustam ætatem perueniunt. Oleum itaque quod Drupis inest uetustius existit eo, quod ante maturitatē decerpæ oliuæ continent. Esse autem hunc Dioscoridis sensum ipse paulo post indicat eodem capite, cum simpliciter παλαιόν, hoc est, uetus oleum ponit. Prima igitur capitis parte de acerbo oleo: secunda de uetustiore, hoc est, maturo: tertia uero simpliciter de ueteri agit oleo:

DE OLEO SYLVESTRIS OLEAE. CAP. 31.

Oleū ex agrestis oleæ, quæ Cotinus & Oleaster appellatur, baccis expressum hoc loco Dioscorides intelligit, quod quouis alio efficacius cum acore manifeste adstringit. In Pharmacopoliis nostris non habetur, nec temere etiam in Italiæ officinis: quare superuacuum est plura de eo dicere.

Reperitur natura etiam candicans oleum: sed Dioscorides de eo tractat quod arte & industria humana candorem contraxerit, ad quod eligendum est, quemadmodum ipse præcipit, quod per se albicet. Dealbatur autem leuaturque duplici modo, adiectis uidelicet odoratis quibusdam rebus, ueluti hic ostendit aut sine his, pura solummodo crebroque effusa & refusa aqua, idque duas ob causas. Primum ut acrimoniam, amuræ reliquias, & pinguedinis rancorem in aquam deponat. Deinde etiam, ut aspectu candoreque magis placeat, ne fusco aut profundiore colore candida unguenta inficiat. Lauatur præterea aliis modis habito diuersarum affectionum respectu, aquis aliquibus odoratis, ceu Maioranae & Lauendulae: seu frigidiori aliqua, qualis est Rosacea.

Sicyonium oleum uocatum, in Sicyōne Achaiae urbe præparabatur, unde nomen inuenit. Porro ne Græcorum lectores hæreant aut impingant, duplex esse Oleum hoc nomine una tantum litera mutata meminerint. Alterum *Σικυώνιον*, alterum *Σικυόνιον* appellatur. *Σικυώνιον* est cuius Dioscorides hic meminit & nomen à Sicyōne Achaiae urbe obtinuit: hoc autem intelligit Paulus Aegineta libro iij. capite ix de Leithargi cura: & libro eodem capite xx. in cura Tetani. Vtroque enim loco requirit *Σικυώνιον* media syllaba non per *o* breue, sed per *ω* magnum scripta. *Σικυόνιον* uero diuersum penitus est à priore, habetque longe aliam nominis causam. Quemadmodum enim à Sicyone urbe *Σικυώνιον*, ita hoc à *Σίκυος* radicibus aut succo, quæ recipit *Σικυόνιον* dicitur, media syllaba non per *ω*, sed per *o* scripta: nam *Σίκυος* Cucumerem Græci uocant. Fit autem hoc oleum non ex satiuo, sed agresti Cucumere, quem nunc Asininum, olim Anguinum appellabant Latini. Meminit Sicyonii huius Paulus Aegineta libro iij. capite lxxvij in cura coxendicis, ubi de sanguine exigentibus per aluum medicamentis agit his uerbis. Καὶ ὁ χυλὸς τοῦ ἑλατταρίου, καὶ τὸ δι' αὐτὸ ἢ τὸ διὰ τῶν ῥιζῶν αὐτῶ συντιθε-
μενον σικυόνιον ἔλαρον. Hoc est (si quis uerbum uerbo uertat) Et succus Elaterii, & ex ipso aut ex radicibus ipsius compositum Cucumerinum oleum.

Ῥύπον, siue *γλοιὸν βαλανέων* Græci uocant Strigmenta, quæ in balneis à lauantium cute defringuntur, & sub scarnis & pauimentorum tabulis in lubricum & glutinosum humorem concreta, repertiuntur. Cum autem apud omnes gentes non fuerit idem lauandi mos, aliis oleo se inungentibus, aliis simplici aqua lauantibus, ideo hæc strigmenta etiam uariant. Intelligit autem Dioscorides hoc loco per balneorum strigmenta ta sordes humanæ cutis, unâ cum sudore & inuncto oleo lauantibus defluentes. Mos enim Græcis multisque aliis gentibus fuit, inter lauandum oleo corpora emollire, qui deinde etiam ad Romanos translatus est. In Germania uero nunquam fuit hæc consuetudo: ideoque strigmentis, hisce quatenus oleo constant, destitutumur.

Græcorum iuuentus in palaestra se nudis corporibus luctando exercens oleo inungebatur, quod cutis sordibus, sudori & pauimentorum pulueri inter luctandum casu mixtum in pauimentum destillans, frequenti luctantium insultu conculcabatur, & in unum corpus coalescebat. Colligebantur, & medicis in suos usus uendebantur hæ sordes, priuatim *πάτῳ* appellata, quoniam pedibus conculcarentur.

Cum oleo inuncti iuuenes inter exercendum parietibus & æreis Gymnasiis statuis sordida affricarent corpora, aut casu admouerent, ipsæ statuae luctantium strigmentis perfundebantur, quæ sordes, & ipsæ ad medicinæ usum detergebantur. Discebant autem à palastrarum sordibus, quod puluerem admixtum non haberent, & quod aliquid æruginis ex æreis statuis contraxissent, itaque illis acriores erant. Porro cum Dioscorides dicat parietum gymnasiorum & statuarum sordes calefacere, non oportet

oportet intelligere ligneis tabulis, faxis, lateribus, aut marmore constructis parietibus adherentes sordes. Hæ enim parum aut nihil à balnearum strigmentis different; sed eas quæ parietes, quatenus ære obducti essent, obsiderent. Ornabat enim antiquitas gymnasionum parietes æreis signis, tabulis & statuis: quem sensum etiam è Paulo Aegineta & Galeno collegimus. Siquidem hinc non parietum, sed alter eorum *σκιῶν*, hoc est, ualorum, meminit, sine dubio æramenta parietum & ærea uasa quibus continebatur Oleum intelligens.

DE OLEOMELLE. CAP. 37.

Oleomel, quod Græci *ἐλαιόμηλι* uocant, quoniam in Syria, alio quam nostro orbe, prouenit, nec satis authoribus constat è quam emanet arbore, difficile nobis est rem peregrinam indicare. Nouisse tamen hoc legentes oportet, duplex esse Oleomeli, alterum quod sponte sua ex arboris caudice defluat, & alterum quod ex eiusdem arboris furculis humana arte & industria eliciatur. Lögus de eo Marcellus in suo commentario egit, quæ repetere non est nostri instituti, poterunt uolentes ea quæ commentatus est ipsi legere. Nos, quod ad aliquam cognitionem attinet, non silentio præteribimus, apud nos ueris tempore è betulæ & quercuum caudicibus sponte sua distillare humorem liquido melle crassiore, ad quem apes & id genus insecta conuolent. Est enim gustu dulcis, sed nauseam gustantibus affert. Alliciuntur eius dulcedine agrestes pueri nonnunquam, sed postquam tantillum degustauerint, nausea & capitis dolore corripuntur, qui superueniente uomitu paulo post soluitur. Porro hunc liquorem Oleomel esse nequaquam affirmamus, sed similem aliquem in nostro orbe genitum. Aliud ab hoc est qui lauciatis Betulæ & Ostryæ arborum caudicibus manat humor, aqua modo liquidus, pastoribus & agrestibus ad restinguendam sitim expeditus. Scimus etiam hunc liquorem à quibusdam in Septentrione gentibus, tanquam uinum aut ceruismam ad quotidianum potum repositum toto anno seruari. Hermolaus Barbarus propemodum in ea est opinione ut credat idem esse cum Oleomelle æromeli, hoc tanquam à ueritate alienum minimè probamus, confutare uerò non est necesse, cum id Marcellus & Ruellius præstiterint.

DE RICININO OLEO CAP. 38.

Postquam de nativo oleo, de quibus hæc quæ oleo sunt strigmentis, & quod olei pinguedinem habet Oleomelle disseruit Dioscorides, sermonem iam ad factitia flectit olea, qualia sunt omnia quæ ex herbarum Olerum & seminibus exprimuntur. Eliciebantur autem hæc antiquitus affusa cōtuse offæ feruenti aqua & expressa, à qua innatantem pinguedinem auferebant. Hodie diuersa sunt ratio. Cōtunduntur enim, tum leniter teruntur semina, postea è feruente adhuc offa & cuneis latis impacta, ut pinguedinem excusam exprimunt. At Ricininum oleum, quod *ρίκινον* Græci, Arabes uerò Oleum de Kerua appellant, è Ricini seminibus olim in Aegypto fiebat plurimum. Vtebantur enim eo ad lucernarum lumina, nunc uerò parcius apud nos in Europa conficitur, præsertim in Germania, quamuis ubique iam herba hæc fata proueniat: hæc qualis sit, & quot habeat species, ubi ad quartum librum perueniemus, indicabimus;

DE AMYGDALINO OLEO CAP. 39.

Tam dulcibus quam amaris amygdalis expresso oleo hodie frequenter utuntur medici. Veteres amaras nuces ad hoc oleum eligebant, quarum pinguedinem priuatim Metopium appellabant, quoniam Metopii unguenti, quod Galbano cōstat, confectiones ingrederetur. Dulcibus Amygdalis expresso hodie utimur in leniendâ aluo, corpore alendô, & medicaminum, præcipue purgantium, acrimonia obtundenda;

DE BALANINO OLEO. CAP. 40.

Ex glande unguentaria, quæ Græcis Balanus Myrepica uocatur, hoc oleum exprimitur, id Arabes scriptores, oleum de grano Ben appellant. Erat olim frequens eius in preciosis unguentis usus, nunc uerò paucissimi eo medici utuntur.

Quid

Quid autem sit Balanus Myrepfica in quarto huius operis libro indicabimus.

SESAMINVM. CAP. 41.

CARYINVM. CAP. 42.

DE HYOSCYAMINO OLEO. CAP. 43.

Hyoscyaminum oleum è semine cuiuscunq; Hyoscyami conficitur, tutius tamen est, ut ex ea Hyoscyami specie eliciatur, quæ albos profert flores. Exprimebatur autem olim tuso & aqua calida macerato semine, quem modum adhuc quædam Herbariæ mulieres obseruant, sed ita confectum facillime corrumpitur, & foedum odorem contrahit: quoniam remanet in eo plurimum infusæ aquæ, quæ putrescit atq; ipsum oleum corrumpit. Quapropter nos præferimus quod ex tuso & tosto semine ui exprimitur: syncerum enim & clarum est, nihilq; alieni aut aduentitii humoris continet, ideoq; putredini ac corruptioni minime est obnoxium ut illud.

DE CNIDIO OLEO CAP. 44.

E Thymelææ fructu, quem Græci κόκκον κνιδίου, Latini granū Cnidium appellāt, Cnidelæum exprimitur, cuius hodie rarus est, præsertim apud nos, in medicina usus. Exprimitur autem eo modo, quo Amygdalinum & Hyoscyaminum, tuis, leniter tostis, & dein expressis grani Cnidii nucleis. Porro qualis sit frutex Thymelææ, cuius fructus est granum Cnidium, in quarto huius operis libro, cum ad purgantia medica menta peruenierimus dicemus: Vbi Dioscorides eos reprehendit qui granum Cnidium Chamelææ fructum esse existimant: in quem errorem etiam interpretes Virgilius lapsus est, quamuis Dioscoridem huic errori reclamantem diligenter uerterit. Quapropter nemo fidem Marcello habeat in huius capitis cōmentario dicenti Chamelææ, quam Cneoron Theophrastus uocat, granum Cnidium semen esse, alia enim & diuersa à Thymelæa granū Cnidii ferente, planta Chamelæa est, ut suo loco ostendemus.

DE CNICINO OLEO. CAP. 45.

Cnicinum oleum è Cnici (quem recentiores medici & phar̃macopolæ omnes Carthamum appellant) seminis nucleo exprimitur, cuius hodie quoq; non minus quam Cnidii olei perquam rarus est usus. Fit autem eodem modo quo Amygdalinū, purgatis & cortici suo exemptis nucleis: quod melius est, quàm si una cum corticibus pinguedinem imbibentibus exprimantur.

DE RAPHANINO OLEO. CAP. 46.

Duæ sunt herbæ quæ uulgo hodie Raphanus appellantur, altera maioris, altera minoris cognomento: quarum altera grandi Lapatho æqualia & similia habet folia, caulem sesquicubitalem in uirgas diuisum: flores exiles, candidos, & numerosos, radicem longam, crassam, candidam, odore & sapore Nasturtii, sed acriorem. Germani *Wedererich*, hoc est, Marinum Raphanum appellant. Ex huius semine non exprimebatur Raphaninum oleum. Nam nullus est ueterum, qui ad Raphani genus hanc plantam retulerit. Itaq; male faciūt qui Raphani uocabulo eam appellant, cum potius Nasturtii speciebus adnumeranda sit, quod ueteres etiam fecisse, cum locus inquireret, indicabimus. Raphaninum ergo oleum è propriè uocati Raphani semine exprimitur. Latini radicem, Germani *Wibererich*, hoc est, Rapo similem Raphanum aut simpliciter *Wetterich* uocant, quoniam caulis florum seminum & radicum figura & qualitate Rapis non sit dissimilis. Fit autem ea ratione qua Amygdalinum.

Exprimuntur apud nos similiter olea è luglandibus, Fagi nucibus, Rapi, Napi, Sinapis, Lini & Papaueris semine, quibus pro oleo oliuæ frequenter ad obsonia nostri utebantur, interdicto à summo pontifice ieiuniorum tempore butyri & adipum usui. Nunc autem plerisque in locis fieri desierunt, excepto quod è Lini exprimitur semine. Hoc enim pictores colores suos diluunt, & ad Vernisij confectionem Dantiscant utuntur.

DE NIGELLINO OLEO. CAP. 47.

Nigellinum oleum è Nigellæ semine exprimitur, eius rarus admodum est in Germania

maniaufus. Si quis autem uoluerit, rufa & leniter tofta donec calefiant femina uī exprimat, quemadmodum in Amygdalino & Ricinino dictum eft. Animaduertēdum autem eft ne ad confectionem eius falfo appellatam Nigellam accipiamus, in fegetibus nascentem, foliis longis, hirsutis, caule geniculato, flore puniceo, simplici & parue rofæ non diffimili, femine in oblongo & acuminato uafculo, nigro, intus candido, & frumentalicuius modo farinam reddente, planeq; inodoro: hæc enim herba nihil minus eft quam Nigella. Recipiendum igitur eft ueræ Nigellæ semen, quod odoratum eft, & paffim in aruis fponde, atq; in hortis fatum prouenit, de qua fuo loco plura dicemus.

DE SINAPINO OLEO. CAP. 48.

Sinapinum oleum ē Sinapis femine, quemadmodum Raphaninum exprimitur. Pieri autē poteft ex omnibus Sinapis speciebus, hoc eft, Sinapi agresti & fatiuo: Eruca, Erucula maiorē, & Erucula minore: fed noſtrates raro eo utūtur, ideoq; in noſtris pharmacopoliis nō reponitur. Ad abſtergendas cutis maculas uultus eo illinunt.

DE MYRTINO OLEO. CAP. 49.

Hactenus Dioſcorides natiui, hoc eft, propriè uocati olei differentias recensuit, quo quidem in genere continentur ex cuiuſcunq; oleæ aut Oleaſtri baccis facta olea: quibus ſtatim ſubiunxit ea, quæ ex fructuum & ſeminum quorundam nucleis tuſis exprimuntur, aut coctura eliciuntur: Hæc autē ſecundū olei genus cōſtituunt, quod Plinius Factitium appellat, quamuis ad hoc genus etiam referat Oleaſtri & Chamelegæ, hoc eft, parui cuiuſdā Oleaſtri baccis expreſſum oleum. Factitium rursus in duo genera diuiditur: alterum enim ſimplex eſt ceu Amygdalinum, Ricinum, Scſaminum & omnia quæ ſolis fructuum & ſeminum nucleis exprimuntur, uel arte: quædā etiam ex aliis quibuſdam ceu Pice, Thure, aut Reſina aliqua, aut aromatibus eliciuntur: alterum uero compoſitum: hoc fit maceratis oleo natiuo, arborum, fruticum, & herbarum foliis, floribus, ſeminibus, aut aliis partibus medica uī pollentibus, qualia ſunt quæ iam ſequuntur, Myrtinum, Laurinum, Lentilcinum, Maſtichinum, & reliqua eiufmodi. Atq; hæc non ineptè compoſita olea & ſimplicia unguenta appellantur, ſiquidem Paulus Aegineta libro ſeptimo, ubi oleorum & unguentorum compoſitiones recenset, eodem ſerè modo appellat & diſtinguit. Eſt enim differentia inter unguenta & olea, ut Galenus quoq; pleriq; in locis teſtatur, clare autem de ſimpliciū medicamentorum facultatibus libro ſecundo circa finē, ubi Roſacci meminit, oleum Roſaceum appellans: quod ſimplici ratione fit, maceratis in oleo roſis abſque alia cuius aromatis, aut odoramenti alterius adiectione. Cum enim præter Roſas etiam alia recipit aromata, quibus ſpiſſatur & odoratur oleum, iam non amplius oleum, ſed unguentum Roſaceum appellandum eſt, quod meminiffe legentes, & medicinæ ſtudioſos plurimum reſert, & quidem in hoc capite apud Dioſcoridem. Tradit enim duplicem Myrtini confectionem, alteram ſimplicem, alteram compoſitam: quarum prior Myrtinum eſt oleum: altera uerò, Myrtinum unguentum, quoniam non tantum Myrto & oleo conſtat, ſed præter hæc etiam aliis aromatibus, quibus ſpiſſatur antequam Myrtum recipiat oleum. Hoc non tantum de Myrtino, uerum etiam de Laurino & aliis quibuſdam intelligendum. Porro, ad confectionem Myrtini, uera eſt recipienda Myrtus, quæ in Hiſpania, Narbonenſi Gallia, & Italia naſcitur. Non illa adulterina, in omnibus Germaniæ ſyluis & montibus proueniens, cuius baccas patria lingua *Neudelber* nominamus. Qualis autem ſit uera Myrtus plerique noſtum eſt, qui uerò hunc ignorant, eos ad Myrtum ſimitum, de quo infra hoc ipſo libro diſſeremus. Nouiſſe etiam legentes oportet, noſtra ætatis medicos uulgo non uti Myrtino, quod Dioſcorides conſicere docet, ſed eo cuius compoſitionem Arabes authores in ſuis ſcriptis reliquerunt.

DE LAVRINO OLEO. CAP. 50.

Laurini olei uaria eſt præparatio: noſtra autem ætate, hoc frequentī in uſu eſt,

est, quod ex oliuæ oleo & Lauri frondibus oleo incoctis conficitur. Id nonnulli malignones ut iucundiore colore uireat trita ærugine tingunt, non sine ementium & utentium periculo. Porro si diligenter præparetur, satis hilarem acquirit colorem, ut non sit opus ærugine colorem genuinum æmulari & mentiri.

DE LENTISCINO OLEO. CAP. 51.

Lentiscinum oleum fit maceratis & incoctis acerbo oleo Lentisci arboris maturis fructibus, quos *Σκνιδας* Græci uocant. Apud nos nullus est huius olei usus, quoniam neq; aliunde affertur ipsum oleum, neq; in nostris regionibus Lentiscus nascitur, cuius baccis conficere nobis liceat.

DE MASTICHINO OLEO. CAP. 52.

Mastichinum oleum quod uulgo in Pharmacopolijs oleum masticis nominatur, iuxta ueterum traditionem conficitur pura & leuigata Mastiche, hoc est lentisci resina, oleo acerbo incocta & dissoluta. Nostra uerò ætate hoc oleum præparatur eo quo Arabes docent modo.

DE VNGVENTIS. CAP. 53.

Vnguenta preciosa, quæ *μύρα* Græci uocant, antiquitus odoris & uoluptatis gratia inuenta & præparata sunt. Postea cum ratio medicæ eorū uim deprehenderet, & experientia comprobaret, coepit id quod ad luxuriam tantum inuentum erat, etiam ad salutem humanæ sanitatis cedere. At quoniam utilitati odoris fragrantia mixta esset, auxit ijs precium uoluptas, & quanto preciosiora erant, tanto magis expetebantur. Fuit autem quotidianus eorum in conuiujs usus apud Græcos, Persas & alios cultiores Orientis populos. Vngebantur enim conuiuantium capita, capilli & barbæ, qui mos deinde etiam ad Romanos defluxit, sed serò admodum. Hinc Latini poetæ toties in iucundis conuiujs ad hilaritatem excitandam, liquidos odores, Achæmeniam Nardum, & alia huiusmodi requirunt. In Germania uerò hucusq; nunquam in usum hæc unguenta recepta sunt. Nam quæ uulgo in Pharmacopolijs ex multis & diuersis medicamentis conficiuntur, olea potius sunt composita ad propulsandos ab humano corpore morbos inuenta, quam unguenta. Et si enim non tantum id, unde cognominantur, recipiant, sed multa alia etiam odoramenta, tamē quia neq; antea spissatur certis aromatibus oleum, neq; quæ ingrediuntur aromata odoris gratia expetuntur, unguenta hæc olea nominanda non sunt. Plerumq; enim nullam habent odore fragrantiam quo olfacentes inuitent, sed medicam quandam facultatem, quam faciunt homines, quantum uis uoluptatibus dediti auersantur. Talia sunt quæ hodie in nostris Pharmacopolijs conficiuntur ex Hyperico, Costo, triplici piperis genere, Caparum radicibus, Euphorbio, uulpe oleo incocta, Scorpionibus, & id genus alia. Ergo non tantum *μύραν*, hoc est, unguentum, id uocandū est, quod etiam alia quædam, præter id unde nomen habet, recipit, sed quod aromatibus conficitur & odoris suauitate delectat.

DE ROSACEO VNGVENTO. CAP. 54.

Duplex est apud medicos Rosaceum. Alterum, quod simpliciter fit maceratis in acerbo oleo Rosarum rubentium nondum penitus explicitarum folijs. Et alterum quod admixtis oleo odoramentis conficitur: hoc autem propriè unguentum, illud uerò oleum Rosaceum probatis authoribus dicitur. Nostræ autem ætatis medici Rosaceo oleo utuntur: nam unguentum rosaceum, quod admixtis odoramentis constat, nusquam confici uidimus.

DE ELATINO VNGVENTO. CAP. 55.

Ex palmæ arboris nondum florentis folio operimento (quod *ελάτη* Græcis dicitur) Elatinum olim fiebat unguentum, hodie uero fieri desiit. Quidam eius loco faciunt unguentum ex semine abietis: creduntq; in huius unguenti compositione abietem *ελάτης* appellatione significari: sed malè admodum. Aliud enim est hic à Discordi de descriptum Elatinum unguentum, quam oleum ex abiete, quod Galenus Acofū *σι ελάτης* uocat.

DE MELINO VNGVENTO. CAP. 56.

Melinum ex malis Cotoneis adhuc conficitur, non tamen aromatis odoratur, sed simpliciter fit maceratis ad solem in oleo Cotoneis malis, uocaturq; Oleum Cotoneiorum à Pharmacopolis.

DE OENANTHINO VNGVENTO. CAP. 57.

Oenanthinum ex Labruscæ (quæ uitis agrestis est) floribus, Græcis οινάνθη appellatis conficiebatur. Nunc uerò eius nullus apud nos usus.

DE FOENOGRAECINO VNGVENTO. CAP. 58.

Hoc à quibusdam adhuc præparatur, sed simpliciter ex Fœnigræci seminibus oleo incoctis, uel ad solem maceratis.

DE SAMPSVCHINO VNGVENTO. CAP. 59.

Sampsuchinum ex Maiorana, quam Græci Σάμψυχον appellant, fiebat, admixtis aliis aromatibus: nunc uerò hoc modo non amplius præparatur. Nam omnia ferè unguenta quæ olim odoris gratia cōficiebantur, hodie in Europa fieri desierunt. Recentiores tamen aliud substituerunt, quod Oleum Maioranæ uocant.

DE OCIMINO VNGVENTO. CAP. 60.

Ex Ocimo hoc quondam conficiebatur.

DE ABROTONINO VNGVENTO. CAP. 61.

Ex Abrotono nigra seu Mascula hoc olim fiebat unguentum: nunc quidam ad solem cum Abrotono maceratum oleum, Abrotoni oleum uocant.

DE ANETHINO VNGVENTO. CAP. 62.

Hoc hodie simplici ratione ex Anethi floribus in oleo ad solem maceratis conficitur: quidam etiam Pharmacopolæ secundum aliam descriptionem conficiunt. Vulgo in Pharmacopoliis Anethinum oleum uocatur.

DE LILINO VNGVENTO. CAP. 63.

Lilinum, quod Græci non tantum λιλίνον, uerum etiam Σείριον Persico uocabulo appellant, Persis Lilium susan nominantibus: adhuc fit, sed tantum in oleo maceratis candidis liliis.

DE CROCINO VNGVENTO. CAP. 64.

Crocinum nostris quoq; temporibus fit, non tamen secundum hanc descriptionem: Pharmacopolæ hoc suo more præparatum oleum Croci appellant.

DE NARCISSINO VNGVENTO. CAP. 65.

Non amplius confici Narcissinum unguentum Medici curant, cum uulgo Narcissus non cognoscatur: Quid autem sit Narcissus in quarto huius operis libro ostendemus.

DE LIGVSTRINO VNGVENTO. CAP. 66.

Ex Ligustri floribus, quoniam odorati sunt, hoc olim conficiebatur unguentum. Nunc uerò nusquam conficitur. Quid autem Ligustrum sit, hoc ipso libro non longè post.

DE IRINO VNGVENTO. CAP. 67.

Ex Illyrica Iride hoc præparabitur unguentum. Recentiores alio modo confectum oleum Irinum nominant.

DE GLEVCINO VNGVENTO. CAP. 68.

Simplex hæc est Gleucini cōfectio, quæ à Dioscoride ponitur. A Galeno hæc ipsa etiam de compositione medicamentorum κατὰ γένος libro septimo recensetur, & ad Dioscoridem refertur: & præter hanc aliæ tres indicantur, quæ plura recipiunt aromata siue Medicamēta. Nomen à musto, quod λεύκη à Græcis dicitur, accepit. Hodie uerò non amplius, quod quidem sciamus, conficitur.

DE AMARACINO VNGVENTO. CAP. 69.

Diuerſum hoc eſt à Sampſuchino, quamuis utrumq; Sampſuchum & Amaracum capiat. Alia uerò Aromata, quæ ingrediuntur, differunt. Quare ut diſtinguantur ab inuicem hoc Amaracinū, illud Sampſuchinū, appellarūt. Hodie autē hoc fieri deſiūt.

DE MEGALIO VNGVENTO. CAP. 70.

Hoc hodie nō conficitur, nam Dioſcoridis etiam ætate nō amplius conficiebatur.

DE HEDYCHROO VNGVENTO. CAP. 71.

Hedychroon ab hilaritate coloris nomen accepit, hodie uerò non præparatur. Paſtilli etiam qui Theriacam Andromachi ingrediuntur, ſimiliter Hedychroi appellantur, qui plurimum ab hoc unguento differunt. Quapropter ineptè apud Paulum Aeginetam libro ſeptimo in Theriacæ compoſitione, uocabulo Hedychroi adiecit unguinis appellationem interpres Albanus Torinus Vitodurenſis.

DE METOPIO VNGVENTO. CAP. 72.

Metopium Galbanum recipit, propterea à Galbani planta ab Aegyptiis Metopion appellata nomen accepit. Non præparatur hodie.

DE MENDESIO. CAP. 73.

Mendefio unguento, quod ab Aegypti urbe Mendefia nomen accepit, hodie nō amplius Europæ medici utuntur. Nulquam enim in Europa conficitur, niſi quis ſingulariter id fieri curauerit.

DE STACTE. CAP. 74.

Diſta eſt Staſte à ſtillando. Eſt autem recentis expreſſæ Myrrhæ deſtillans pinguiſſimus flos. Antonius Muſa Styracem liquidam, Staſten eſſe cōſtanter affirmat, ſed malè meo quidem iudicio. Sunt enim natura penitus diuerſe Styracis & Myrrhæ arbores; & huius lachryma in aqua reſoluitur, illius uerò in oleo, uel oleo ſimili humore tantum. Myrrha præterea optima ex * aqua fit. Staſte per ſe magno emitur. Styrax uerò liquida admodum paruo. Quare cum ex plurima Myrrha, quantumuis bona, minimum exprimitur Staſte, & Storax liquida longè minoris, (quanquam Myrrha etiam uiliſſimo ueneat) nemo temere affirmabit eam Staſten eſſe. Quod ſi non faſtis eſt, cax hoc argumentum contradiſcentibus uidebitur, electa Myrrha Staſten expreſſimus: qua uix aliquid reperiatur, quod diutius & latius oleat, odore aromaticum modo iucundum. Sed propter grauitatem aliquam ſenſoriis irrepentem, facile ſomnū conciliat. Poſſunt noſtro exemplo uolentes ſi ueram Myrrham eamq; optimam eligant, non magno labore eam exprimere. Nam uulgo hodie apud nos non exprimitur ob recentis Myrrhæ inopiam, ſed in Arabiæ Mecha copioſe adhuc confici negotiatores referunt.

DE CINAMOMINO VNGVENTO. CAP. 75.

Cinamominum à Cinamomo (quod baſis huius unguenti eſt) nomen accepit. Hodie non præparatur.

DE NARDINO VNGVENTO. CAP. 76.

Nardinum ex Indiæ Nardi Spica, & aliis quæ à Dioſcoride recensentur, fiebat. Nuncautem præparatur quibuſdam demptis, & quibuſdam additis medicamentis, uulgo Nardinum oleum uocatur: ſed hoc odore & uiribus, eo quod olim fiebat, multo ignauius eſt. Galenus Romano uocabulo Nardinum paſſim in ſuis libris, Spicatum à Nardi Spica, quam capit, appellat. Quidam uerum Nardinum unguentū hoc eſſe credunt, quod ex Spica Lauendulæ diſtillatur, ſed longè falluntur.

DE MALOBATHRINO VNGVENTO. CAP. 77.

Malobathrinum præcipue Malobathro cōſtabat: hoc ut Galenus libro tertio de compoſitione medicamentorum κατὰ γένος refert, Romæ foliatum dicebatur, quem admodum Nardinum, Spicatum.

DE IASMINO VNGVENTO. CAP. 78.

*Hoc caput in nonnullis editionibus Dioſcoridis deſideratur.

In Perſide Iaſmini naſcuntur flores, Violis quadantenus ſimiles: Ab Arabibus Ieſemia

Iesemini & Zambach appellantur. Ex his unguentum illud conficiebatur, quod ab Arabibus etiā Oleum de Zambach nominatum fuit. Vnde imperiti putant hoc ex Sambuci floribus fieri maximo (& qui etiam pedibus palpari possit) errore. Iasmini autem flores hodie à quibusdam non tantum in Italia, uerum etiam Gallia & Germania, uitiū modo sati, uiticulis suis pergulas & concamerationes hortorum ascendant & integunt, Iasmini uocabulo in Iesemini detorto. Non autem temere quidam huius unguenti odore delectati sunt, cum apud nos etiam cœlo multo quā in Perside frigidiore, nimia odoris bonitas delicatæ naris hominibus fastidium pariat. Itali primam litteram quasi S consonantem pronunciant; unde quidam eo ignorantia peruenerunt, ut Sefaminum semen & Sefeminam appellatum florem eandem rem esse credant, sed malè.

DE MYRRHA. CAP. 79.

Iandudum de Myrrha incidit controuersia, negantibus etiam doctissimis uiris nos ueram Myrrham habere. Qui uerò res ipsas diligenter inquisiuerit, non poterit nō uidere, quod non tantum mediocris, uerum etiā optima Myrrha afferatur, quam uis hoc fiat rarius. Quod autem non frequentius contingat, sola in causa est aromastopolarum, quos hodie materialistas uocant, ignauia & inscitia. Hi enim cum partim etiam in Alexandriam nauigent, facile possent optima quæq; eligere & adportare, nisi sumptibus parcere mallet, quā humani corporis salutem consulere. Verum hoc nequaquam omnium institutum est, cum nonnulli longè alium finem, scēdum uide licet lucrum & priuatum commodum, sequantur.

DE BOEOTICA MYRRHA. CAP. 80.

Boeoticam Myrrham necesse est similiter lachrymam esse: quemadmodum enim propriè uocata Myrrha, arboris sui nominis lachryma est, quæ in aqua dissoluitur: hoc addo ut à resinosi lachrymis, quæ in aqua minimè resoluantur, distinguui possit. Sic etiam par est Boeoticam Myrrham, ex alicuius arboris parte aliqua manare. Non enim frustra, sed ob similitudinem substantiæ & qualitatis, quas cum Myrrha paulò minus quam easdem habet, Myrrhæ uocabulo appellata fuit. In hoc uerò Dioscoridis exemplari, quod Marcellus Virgilius interpretatus est, clarè legitur Boeoticam Myrrham nascentis cuiusdam in Boeotia arboris radicem esse, sed malè quantum mihi uidetur: neq; hoc interpretis culpa, uerum exemplaris Græci uitiū factum est, in quo sic scriptum reperitur, ἡ δὲ βοιωτικὴ σμύρνα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ τῆς βοιωτικῆς γέννας μὲν ὅτι τὴν μύρην, hoc est, Boeotica uerò Myrrha est arboris cuiusdam in Boeotia nascentis radix incisa. Fuisse autè alium uerborum ordinem & sensum in hoc capite Serapio indicat, cum in Myrrhæ capite, sic ait. Sed Myrrha quæ est ex terra, quæ dicitur Laptoteno (id est, Boeotia) abscinditur ex radice arboris quæ est in terris illis. Sic ille hoc Dioscoridis caput reddidit, nec dicit Boeoticam Myrrham incisam esse radicem, sed ex radice excindi, quemadmodum solent incisione elici reliqui liquores: Idem nobiscum sentit in suis commentariis Marcellus Virgilius interpres. Myrrha autem hæc hodie omnino non cognoscitur.

DE STYRACE. CAP. 81.

Styracis & Myrrhæ arbores natura penitus esse diuersas in Staete præmonuimus, quod etiam ad natales attinet, nihil prorsus commune habent: Hæc enim in India & Arabia, illa uerò in Asia minoris Pisidia & Cilicia diuersi cœli regionibus prouenit. Si uerò substantiam ipsam quæ ex his emanat lachrymarum considerauerimus, omnino diuersas deprehendemus. Lachryma enim quæ ex Styrace manat, præter omnes alias quas iam taceo notas, resinosa est substantiæ: cuius proprium est in sibi simili humore aliquo resolui, & minimè in aqua. Quæ uerò è Myrrhæ arbore distillauerit lachryma, faciliè etiam propter substantiæ similitudinem in quouis aquoso humore dissoluetur. Hæc ideo dico, ut sciamus liquidam Styracē nihil minus esse quā Stacten, quod pluribus etiam demonstrare argumentis possemus, si huius loci esset falsas doctōrum opiniones & iudicia confutare. Styracis autem triplex hodie habet

tur differentia. Est Styra calamita quæ in candicantes & rufescentes grumos cõcreuit. Est & liquida Styra, quæ in duas diuiditur differentias: altera enim resinosa est pinguedo ex arbore quadam sponte destillans, aut coctura elicitæ: & altera, quæ ex Styra nucleis exprimitur: sed huius rarissimus apud nos est usus. Tertia differentia Styra sicca est, à quibusdam etiam Thymia uocata: estq; cortex in ruffo colore nigricans, quem aiunt è Styra arbore colligi. Quidam improprie siccam Styra cem etiam rubeam cognominant. Rubra enim Styra est Calamita Styra, quæ non candidum sed ruffum colorem habet. Hodie autem Pharmacopolæ non amplius Styra, sed Storax pronunciant.

* Nascaphthum corticem improprie Storacem rubeum uocant: cum Styra ruber, non cortex, sed huius coloris liquor sit.

DE BDELLIO. CAP. 82.

Substantia & qualitate Bdeillum cum Myrrha magnam habet cognationem, suis tamen distingui possunt notis, quas etiam ipsi (ut uocant) Materialistæ ut plurimum ignorant, quo factum est, ut hactenus aliquot seculis Myrrham pro Bdeilio allatam uendiderint. Nunc uerò genuinum rursus affertur, iis, quibus ab authoribus descriptum, notis cognoscendum. Nomen suum in Pharmacopoliis retinet.

DE THVRE. CAP. 83.

* Diuerse species thuris, permixte nobis adferuntur. Thus etiam optimum nos habere nemo dubitare debet, neq; tamen inficias eo, interdum resina aliis quibusdam adulteratum afferri. Est autem Thus in Arabia nascentis arboris resinosa substantia lachryma, candicans, pinguis, & interdum geminis guttis testiculorum modo concrefens, quod optimum est, & masculum uocatur: Pharmacopolarum quidam Thus, quidam uerò Olibanum, græca appellatione uocant. Germanis quoniam in templis ad sacros suffitus accenditur, Weybraud/ quasi consecratorius fumus nominatur. Aliud à thure est quod in inferiori Germania Incensum uocant, quamuis etiam Thus à nonnullis Incensum nominetur. Quod etiam nostri Incensum appellant, Resina est Pini, aut alterius cuiusdam Pino cognatæ arboris.

DE THVRIS CORTICE. CAP. 84.

Thuris cortex unà cum adhærentelachryma arbori suæ aut fuscus sæpe affertur, maiore adstringendi & siccandi ui, quam Thus ipsum præditus.

DE THVRIS MANNA. CAP. 85.

Frequenter huius Mannæ in libris Galeni de compositione medicamentorum mentio fit, & apud multos alios ueteres scriptores: ubi interpretes interdum mannam Thuris scriptum inueniunt, ex una re diuersas faciunt: ut, si scribatur, Recipe Mastiches, Mannæ thuris, uirgula distinguentes. Quare quotiescunq; Mannæ uocabulum Thuris nomen immediate antecedit aut sequitur, perpendendum an sola Thuris manna, an utrunq; accipiendū sit. Nam interdum simpliciter Mannam, nonnunquam etiam Thuris Mannam hoc medicamentum medici uocant. Est autem hæc Manna tenuis ex masculo thure puluis & pollen, qui in grumorum attritu resoluitur. Huius olim in Emplastris fuit usus, sed hodie paucissimi eam expectunt: nam eius loco contrito utuntur thure. Porro Mannæ nomine uulgo nunc ærium seu roscidum mel, Manhu ab Israelitis olim appellatum, ostenditur: de quo plura, secundo huius operis libro in mellis capite, dicturi sumus.

DE THVRIS FVLIGINE. CAP. 86.

Fuligo etiam ex Thure quemadmodum ex omnibus resinosis & oleosis rebus colligi potest, eo quo Dioscorides docet modo. Est autem Fuligo ex incensa pingui quacunq; re resolutus tenuis fumus, imposito quodam concauo uase exceptus, qui Germanico uocabulo Aham & Schmuze uocatur:

DE PINO ET PICEA. CAP. 87.

Magnam nonnulli Græcorum scriptorum controuersiam nobis reliquerunt in uocabulis *πίτυς* & *πύκνυ*. Non quod ipsi Græci tantum in horum significatione uariant, sed etiam interpretes interdum *πίτυν*, Pinum: *πύκνυ* Piceam uertit: & Ruellius contra, interdum *πύκνυ* Pinum, *πίτυν* uero Piceam: quæ uarietas magnâ in demonstrandis & iudicandis rebus difficultatem parit. Theodorus Gaza in Theophrasto præterquam quod *πύκνυ* Pinum & *πίτυν* piceam uertit, etiam ipsam *πίτυν* Laricem interpretatus est, quem sequutus est † Plinius, & Plinij Virgilius Marcellus, qui præterea *πύκνυ* Tædam interpretatur, sed male. Non tamen est quod hanc culpam aliquis ad interpretum ignorantiam reiciat. Cum ipse Virgilius Marcellus (suo in hoc capite commentario fateatur & concedat) posse etiam aliam quam ipse interpretatus sit, horum uocabulorum significationem ex authoribus afferri, nec hodie tantum ista est in his uocabulis controuersia: nam olim quoque in ipsa Græcia & Macedonia sua nomina permutabant *πίτυς* & *πύκνυ* arbores. Laricem tamen *πίτυν*, *πύκνυ* Tædam interpretari absurdus est. Multum enim differunt *πίτυς* Larix, *πύκνυ* & Tæda. Ego autem potius Ruellium sequor multis argumentis rationibus adductus, & *πίτυν* Pinum, *πύκνυ* uero Piceam interpretandam esse censeo. Longum foret & non est huius instituti omnia afferre argumenta & rationes, meum tamen iudicium de huius generis arboribus hoc esto: *πίτυς* est Pinus, quæ cum sponte provenit Pinafter uocatur: nam aliâs etiam in hortis feritur. Hæc in Germania rarissimè feritur. Syluestris uero Pinus, seu (quod idem est) Pinafter, copiosè in albis nostris provenit: eum patria lingua *Erbelbaum* appellamus: *πύκνυ* est picea, quæ & ipsa duas habet differentias, una est longis setis comosior, deorsum pendens uis ramis, hæc fructus fert in longo cono Pineis nucibus similes, minores tantum. Conus à Pini cono differt: quod Piceæ conus longitudine ferè dodrantem æquat, crassitudine autem manum propemodum complet: Pini uero conus multo breuior latiorque existit: habetque pyramidalem figuram. Illius etiam squamæ tenues sunt, & ab inuicem resolutæ, ita ut fructus siue nuces sub squamis uideri queant: Pini uero squamæ crassiores, longioresque sunt & compactæ: propterea non uideri possunt nuces. Si uero pini Conus in calido æstuario, aut ad solè suspèdatur, resolutis magno fragore squamis dissilit, nucesque spargit, quas *Sirbel* uij. ii appellamus. Picea autè quæ Pino similes nuces fert, à Germanis quibusdâ eodè quo Pinafter nomine uocatur. Hanc arborè, in Germania ad Alpes nasci scimus, & à quibusdâ etiâ Pini uocari, sed male. Picea uero syluestris Conus huic similem fert, & in eo minutum, & alatum nucleum, qui in minimo duroque cortice contineatur. Hanc Germani ein *Fiechten* uocant. Abies quæ Græcis *ελάνη* uocatur, ea est sine dubio arbor quæ à nobis ein *Tanne* appellatur, similes Piceæ syluestri Conos ferens, sed torosiores. Huic similis est *Milax* arbor, siue *Taxus*: Germanicè ein *Eibe* uocatur: suntque ex ea hodie, non minus quam olim, arcus & scorpiones. *Δάς* est propriè Tæda arbor, quam nos ein *Birch* / *Binbaum* & *Feuren* uocamus. Ex qua sumpta pinguislima materia, Tæda Græcis, *Rin* † Germanis similiter ut arbor ipsa nominatur. Vnde etiam faces *Αλάς* à Græcis dicuntur. Huic similis est *Larix* Latinis, ein *Lerche* Germanis appellata, Alpibus etiam iuxta Germaniâ, & interiori quoque Germaniæ familiaris: quam an Græci habuerint uel cognouerint, & quomodo eam appellent, nullus adhuc Latinorum aut nostrorum prodidit. Nos uero non sine ratione affirmamus Laricem eam esse arborem, quæ ipsis *κεδρίων* uocatur, quod tanquam obseruatum & cognitum dignum rerum studio si diligenter animaduertant.

*Picea, Dechbaum: Piceaster, ein *Fichte*: Pinus, *Sirbel*.

DE PITYIDIBVS. CAP. 88.

πυτιδία Pini & Piceæ nuces sunt, auellandarum propemodum magnitudine & figura, oblongiores tantum in Conis prædictarum arborum enatæ. Exempti corticibus suis nuclei ad nos ex Italia afferuntur, suum in pharmacopoliis nomen retinentes. Nunc uero Pinearum nucum frequentior est in medicina usus quam Picearum.

DE STROBILIS. CAP. 89.

Strobili priuatim dicuntur in Pineo cono inueniente nuces, ut à piceæ nucibus distinguantur. Totus etiā pini conus cum fructibus siue nucibus, Strobilus uocatur. Quæ propter bis hoc capite Strobilorum mentionem facit Dioscorides. Primum enim exemptos ex Cono & purgatos fructus intelligit, Secundo totum cum nucibus Conum.

DE LENTISCO, [arbores Mastiches.] CAP. 90.

Lentiscus *Σχίζος* à Græcis uocatur. *Σχίζος* uerò eidem genti teretem aromaticum luncum significat: quæ uocabulorum similitudo quosdam in errorem coniecit, alterum pro altero apud authores accipientes. Ideo ne quis in similem errorem incidat, utrumque uocabulum suis literis scriptum posuimus. Est autem Lentiscus procerus ex resiniferarum genere arbor: folia tamen differunt, quæ lenti similia sunt, sed maiora. Nascitur præcipuè in Chio, aliisque Græciæ locis. In Italia autem ab admodum paucis in hortis plantatur. Germaniæ uerò incognita est arbor.

*Aliqui hodie *Sandaracha Mastichen* adulterant.

DE LENTISCINA RESINA. CAP. 91.

Ex Lentisco resina in guttas concreta fluit: quæ priuato nomine *μασίχη* Græcis appellatur, quæ adhuc in usu est medicis. Nomen uerò ipsius corruptum mutatum, *χ*. Græca litera, *ch* ualente, in *x* Latinam, quo fit ut non amplius *μασίχη*, sed *masix* uulgo hæc resina nominetur.

DE TEREBINTHO. CAP. 92.

Terebinthus (quam Græci *τέριμβινος*, Arabes uerò Bato, Boton, uocant) etiam ex resinam ferentium arborum genere est. Folia eius eodem quo in Lentisco ordine in pediculis disposita sunt, multo tamen maiora, & ad Laurinorum magnitudinem accedentia. Nascitur in Græcia, Cycladibus insulis, Petra Arabia, Syria, Cipro, Africa. Nobis omnino est incognita, præterquam quod frondes & fructus eius, sicut & Lentiscinam nunquam ad nos afferantur.

DE RESINIS ALIIS. CAP. 93.

*Terebinthinam hodie uocant, quæ Laricina est resina. Resinæ ex multis arboribus fluunt, quæ autem ex Terebintho, Terebinthina Latine uocatur, Arabibus Gluten Albotin. Hæc rarissime affertur, eius tamen loco Laricis resina utimur, similiter Terebinthinam uocantes, sed malè. Quæ uerò ex Lentisco fluit Lentiscina Latinis, Græcis *μασίχη*. Arabibus Gluten Romanum appellatur. Pineæ ex pino destillat. Abiegna ex Abiete. Picea quoque resinā fundit. Strobilicam resinam malè pineam interpretatur Virgilius Marcellus. Antea enim eius mentio facta est sub *πινυίν* uocabulo, Pineæ autem resina differt à Strobilina. Pithyina siue Pineæ est, quæ ex arbore sua sponte aut profundius inciso caudicis cortice manat. Strobilina uero in Strobilis, hoc est, in pini conis concrefcit. Ex Colophone olim ante tempora Dioscoridis liquida etiam resina afferebatur, quam uocabant Colophoniam, ea hodie non est in usu. Ipsi apud nos liquidam resinam copiosam habemus, propterea etiam olim ex Germania in Græciam portabatur: habent tamen adhuc Colophoniam nomine sicciſſimam resinam, quæ an Brutia, aut Cedri pix sit, nondum ausum certò affirmare. Certe nostra adhuc ætate multi eam picem Græcam uocant: Colophoniam uero liquida fuit. Ex Gallia quoque in Græciam allatam esse resinam liquidam testatur Dioscorides. Deinde subiungit: Affertur liquida & ex Galatia quæ ad alpes est, (hoc est ex Germania) quam patrio uocabulo Larignam regionis eius incolæ dicunt. Hæc adhuc à nobis Terebinthina uocatur, ab Italis Largatum. Porro quod Larignam resinam ex Germania in Græciam dicit allatam esse, factis indicat in Græcia non adeo frequentem esse Laricem, ex qua illic colligi possit. Hinc coniecto non multis in Græcia cognitam fuisse: nullum enim nomen quo eam indicent authores apud Græcos inuenire potuerunt. Nos uerò ante diximus

mus proprium eius nomen *κελελάττον* esse. Est & aliud resinæ genus quod Gale-
nus *πιττινόν φυσικόν* uocat, quasi pineum abscissum: non tamen in pino tantum hic
abscissus excernitur, uerum etiam in abiete & aliis huius generis arboribus. Cum in
abiete gignitur, à Germanis *ein Tanne* b. arbor eadem significatione uocatur. Est
autem extuberans abscissus, resina plenus in resiniferis arboribus enatus. Ex cupre-
so etiam resina liquida fluit. Huius uero nostra ætate nullus est in hisce regionibus
usus. Coquebatur olim omnis liquida resina: cocta acrimoniam, odorem, & partium te-
nuitatem omnem deponit. Quare ea utebantur ad suffutis, quale Cyphi est, ut resina
quedam facile accensa alia etiã facilius accenderent, nulloque interim suo odore resina-
rum aromatum fragrantiam retunderet. Eadem etiam odoratis unguentis sub-
stantiæ crassitudinis causa miscebatur.

FVLIGO RESINAE. CAP. 94.

DE PICE LIQVIDA. CAP. 95.

Liquide picis nullus hodie uel rarus in medicina usus existit, quamuis copiose hæc
apud nos & in septentrione è Tæda arbore fiat.

* Aliud liquide picis genus est, quo currum axes ungunt. Vide mox in Bitumine.

DE OLEO PICINO. CAP. 96.

Nec hoc hodie preparatur. Si autem preparare quis uellet, poterit meliorem modo
per destillandi (ut uocant) artem ex quacunque pice & resina colligere.

DE PISIS FVLIGINE. CAP. 97.

Quid fuligo sit, & unde colligatur, antea ostensum est in Thuris capite, quapro-
pter non opus est eam repetere.

DE SICCA SIVE SPISSA PICE. CAP. 98.

Siccæ pix omnibus nota est. Germani *Bech* & *Pech* uocant. Quomodo autem
fiat, Theophrastus docet, noueruntque omnes qui Hercyniam syluam accolunt, præser-
tim has eius partes quæ Bohæmica et Thuringiaca syluæ uulgo appellantur.

DE ZOPISSA. CAP. 99.

Ζώπισσα est pix naualis, quam Græci etiam *ἐπίχουα* uocant, alia est ab hac pice na-
uali, quæ in Germaniæ maritimis locis habetur. † Græci enim naues suas resina & ce *bech* / *βασ*
raillinebant. Nostri uero è piceliquida plerumque suam naualem picem coquunt, *bech*.
Quidam etiam Bitumine ad hoc utuntur.

DE BITUMINE. CAP. 100.

Bitumen Græci *ασφαλτον* uocant, Germani *Erdbe* n. quod substantia & uiribus
Pici cognatum sit, & in terra nascatur. Est autem ceu pinguis terræ adeps, Pice colo-
re, substantia, quo fit ut facile flagret, accensum. Sunt autem multæ Bituminis diffe-
rentiæ. Quod solidius & colore in nigro purpureum & splendidum est, Iudæi-
cum à Iudæa ubi gignitur cognominatur. Gignitur autem plurimum in Asphaltiti-
i lacu, quem mortuum mare nominant. Hoc humanis ossibus in Alexandria & Al-
kairo Mangones illinunt, & pro Mumia uendunt, cum tamen Mumia nihil aliud sit
quàm bituminis genus quoddam, ut paulo post referemus. Liquidum Bitu-
men quale in Sicilia reperitur, copiose etiam in Germania gignitur, maximè circa
Brunsvicum & Borchtorpium in Saxonia, quo ad axes ungendos, tumentorum sca-
biem & lucernarum lumina utuntur. Hoc Germanice *Tier* siue *Sh* uocatur: ab
aliquibus etiam à fetore *Teure* dictum nominatur. Est & liquide picis genus
de quo paulo ante diximus, quo similiter currum axes ungunt. Quod nequaquam
ad hoc liquidum Bitumen referendum est. Simile quiddam etiam ex betula
arbore igne elicitur: quo coria Liouoni & Russi ungunt. Hoc à Germanis † *Dager*
& *Pieusscher* *ges* *binack* uocatur, à Plinio Bitumen Betulæ arboris, quam nos
etiã *Birde* uocamus.

Mumia A-
rabum.
Mumia uni-
garis.

Pissasphaltus talis, qualem Dioscorides describit, non tantum in Cerauniis montibus, uerum etiam quibusdam Germanicis locis, ut in Transyluania & alibi fluminum impetu è montibus defertur. Quod incolæ haurientes à sordibus purgant, eoq; ad faeces pro cera utuntur. Vnde etiam à Germanis *Leitwachs* & *Bergwachs*, id est, in terra siue montibus genitacera uocatur. Notandum autem est hanc pissasphaltum idem esse cum Mumia. Nam Arabes scriptores in sua Mumia Dioscoridis caput de Pissasphalto citant. Differt tamen quæ uulgo uenditur Mumia à Pissasphalto. Siquidem Pissasphaltus natia est, Mumia uero quæ in pharmacopoliis uenditur, iudicatur cum Bitumen est, humani cadaueris tabo mixtum. Quod autem hæc Mumia ex ludo bitumine fiat, sentit etiam Antonius Musa Brasauolus. Quidam enim ueram Mumiam esse dicunt quod in sarcophagis reperitur, Opobalsamo, Aloë, Myrrha, atque humano tabo commixtum. Nam istis aromatibus diuitum cadauera in oriente antiquo more condiuntur. Hæc autem Mumia, nunquam ad nos affertur, sed ea tantum quæ Bitumine & humano tabo constat. At neq; hæc genuina, sed quæ industria fit cadaueris ossibus infuso & circumfuso in humanam figuram bitumine. Quemadmodum enim diuites Aloë, Myrrha & Balsami liquore inuncti reponuntur, ita pauperes bitumine conditi sepeliuntur. Talis est Mumia quæ hodie affertur, quæ ne tantillum quidem Myrrhæ uel Aloës uel Balsami admixtum habet, quod colore, odore, & sapore manifestò deprehendi potest.

Petroleum.

* Item Ca-
phora &
Ambra.

Naphtha etiam Bituminis genus est: sed omnium liquidissimum, calidissimum, & tenuissimum substantia & qualitate. Quapropter cum simul etiam oleosa sit substantia facillimè accenditur, ac ignis rapacissimum meritò existit. Sunt autem tres Naphthæ differentia: Nigra enim quædam, & candida quædam, & flaua quædam reperitur: illa, crassior: hæc uero, aquæ modo liquida sunt. Gignitur autem ex Bitumine natura in terra & montibus accenso, tenuissimis eius uaporibus sursum elatis, & ad frigidiore saxa in tenuem liquorem resolutis: qui deinde per suos meatus è montibus fontium modo scaturit. Hoc autem Naphtha ab alio quouis liquido Bitumine differt, quod igne facta sit. Nam aliaque liquidi Bituminis species absq; igne, aut Bitumine accenso, per se in terra gignuntur. Porro multum differunt in terra contenta diuersis locis Bituminis genera, quò fit ut ipsi etiam unde Naphtha generatur uapores magnam habeant differentiam. Ex crasso enim & terrestri Bitumine, crassa: ex tenui & puro, pura etiam & tenuis gignitur Naphtha. Hodie in pharmacopoliis Oleum petrae siue & petroleum uocatur: Germanicum eius nomen est *Steinöl*. Ad Bituminis autem genus etiam referri debent lapis Gagates, Thracius, Terra Ampelitis, Succinum, tam candidum quam fuluum *. Quod omnibus fortè paradoxon uidebitur. Verum nequaquam sine certis argumentis & rationibus id affirmamus.

† Loco petrolei oleo latericio uti licet, Naphtham candidam efficacissimam aiunt: deinde fuluam: postremum locum nigrae tribuunt.

Chamaecy-
parissus.

Cupressus procera & semper uiuens arbor est, cono ferens Alni galbulis figura similes, magnitudine uero ad tædæ & laricis conos accedentes: in quibus rubentia & angulosa nascuntur semina, quæ ex arefactorum conorum resolutis squamis, cum matura facta fuerint, excidunt. Quidam hos integros cupressi fructus, galbulos, piliulas, & nuces uocant. Posteriore uocabulo hodie pharmacopole utuntur. In Germania hanc arborem nusquam enatam uidimus sponte. In Gallia uero calidiore parte et Italia copiose prouenit, unde ad nos eius coniferuntur: (quos ut diximus) phar-
macopole nuces Cypressi uocant. Est & fruticulus Chamæcyparissus à Plinio uocatus. Hic apud nos in hortis & ficilibus ad coronas feritur. Est enim odorata, & semper uiridem seruat comam: hinc etiam hibernis coronis inseritur. Germani *Cypripfen*, ut ipsam arborem, uocant. Nonnulli tamen hanc Chamæcyparissum, Ab-
sinthium Santonicum esse opinantur, de quo suo loco dicemus.

DE IUNIPERO. CAP. 104.

Iuniperus arbor Græcis *Ἀγνυδις* dicitur: baccae eius, *Ἀγνυδίδες*. Sunt autem, ut auctores tradunt, duo eius genera. Altera ad iustæ arboris proceritatem se attollens, baccis auellantæ parvæ magnitudine. Et minor altera, quæ paruum fert fructum, vulgari pisco æqualem. Color utriusque baccis niger, non rufus ut Cedri. Nam quidam etiam docti uiri eò erroris delabuntur, ut Cedrides, quibus fulvus est color, maioris Iuniperi fructum esse credant. Procera Iuniperus Germaniæ nostræ incognita est. Minor uero ubique copiose nascitur, asperis & editis locis, quam patria lingua *† Westholder* *† Helvetij* *holder* *Wachholder* *Wachaueln* & *Krametstaude* nominamus. Eius nos *Rechhol-* *der* *forst* multorum annorum obseruatione duplex deprehendimus genus: alterum floret & nullum fert fructum, alterum uerò non floret, nihilominus tamen fructum parit: qui initio tertii anni demum ad maturitatem peruenit, quo fit ut uere in hac Iunipero triplices conspiciantur fœtus; iam iam nascentes alii, & iustæ magnitudinis alii, sed uirides adhuc, & omnino maturi alii, quibus niger est color. Itaque uerum est quod auctores tradunt, & uulgò fertur, Iuniperum uidelicet parere usque ad tertium annum arbori suæ inhaerentem fructum:

† Iuniperi maioris resinam, Sandaracham uulgò appellant. Sed pro resina melius dicitur Sandarax, pro metallo Sandarachæ.

DE SABINA. CAP. 105.

Sabina, Græcis *Βαδύς*, recentioribus medicis Sauina, Germanis *Seuenbaum* ** Sagebaum* & *† Saterbaum* uocatur. Est autem pumila & in latitudinem se diffundens arbor, cuius duæ sunt species. Altera miti, ceu Tamarix, est folio: altera cupresso simili & aculeato. Plinius negauit Sabinam fructum ferre, cum dicit: *Sabina herba* propagine feritur & auulsione. Et paulò post: iisdem modis Rosmarinum ferunt, & ramo: quoniam neutri semen. Qua in re nemo temere Plinio fidem adhibere debet. Vtraque enim tam Rosmarinus quam Sabina semina ferunt, testante id annua experientia. At Sabina, de qua nunc nobis sermo est, non semina tantum sed & fructum fert, Iuniperi baccis colore & figura similem, sed paulo maiorem & gustu multo acriorem. Miror etiam quod herbam appellet, Plinius Sabinam, cum omnibus constet arborem esse, non herbam.

DE CEDRO. CAP. 106.

Cedrus, quam Arabes Serbim uocant, procera est arbor, Syriæ & multis aliis calidioribus regionibus familiaris, Germaniæ hactenus incognita. Neque enim sponte prouenit apud nos, neque feritur. In Italia autem nonnulli tanquam peregrinam in hortis suis excolunt. In Narbonensi uerò Gallia etiam sponte prouenire ex relatione Petri Bellonii Cenomanni nouimus, non quidem proceram sed paruam. Nam quemadmodum in Iunipero quædam procera, quædã humilis est: ita etiam in Cedro, altera magna, altera humilis reperitur. Fert hæc fructus Myrtæ baccae magnitudine, colore rufos, quos ad nos ferunt negociatores, baccas Iuniperi maioris uocantes: cum tamen non sint Iuniperi, sed Cedri minoris fructus. Ruellius Cedrum Galiliæ suæ solo nomine cognitam existimauit. Hinc apparet eum Montis Pessulani agrum non perlustrasse, in qua parua Cedrus nascitur. Magna autem Cedrus Iunipero procera perquam similis est, caudice erecto, aculeatis foliis, fructus figura & magnitudine. In summa nihil aliud est quam peregrina Iuniperus. Hinc etiam nonnulli ueterum, quemadmodum etiam recentiores, Cedrum cum Iunipero procera confundunt, utramque Cedrū appellantes. Sed eã quæ propriè Cedrus sit, & de qua nunc agimus, *† ὄξυς* Græcis uocatur, quoniam duriora & spinosiora Iunipero folia habeat. Differt etiam materia soliditate, & spadicæ colore, à Iunipero: quinetiam fructu qui Cedro rufus, Iunipero niger datus est. Quos, cum nuper in Germaniam importarentur, nonnulli etiam doctissimorum uirorum Iuniperi maioris baccas crediderunt, non animaduertentes, manifeste auctores Iunipero nigrum, Cedro uerò rufum tribuere fructum.

Quæ autem *† ὄξυς* Græcis, & Latinis Cedria, Arabibus pix Alkyran uocatur, liquida Cedri pix est, eum quæ pariter dum uritur pix a quosus & serosus defluit humor, colore fuluus aut rufus, Cedrium ab authoribus dictus,

Oxycedrus.

Cedria.

dictus, & Cedrinus liquor. Porro quemadmodum Ἀρκυρίδιος, Juniperi: ita etiam Ἀρκυρίδιος Cedri fructus nominatur, de quibus iam diximus.

* Galenus Cedrum, Juniperum adpellat: & contra etiam, Gummi elemi uidetur Cedri lachryma: pro ea uti licebit liquore. Deget Germanice dicto: de quo leges supra ad finem Capituli de Bitumine.

DE LAVRO. CAP. 107.

Laurus Græcis Δάφνη, fructus ejus δαφνίδες dicuntur. Germani Lorchen & Lorberbaum/arborem: fructus uero Lorber nominant. Arbor non magna est in calidioribus quam nostra est regionibus nascens. Itaque sponte apud nos non nisi sata prouenit. Sunt autem geminae lauri differentiae. Altera enim latifolia, altera tenuifolia existit, est etiam in fructu differentia. Siquidem alterius in rotundo modice oblongus est: alterius oblongus, gracilis, & utrinque ouato mucrone turbinatus.

* Laurus diuiditur in syluestrem & satiuam: ac rursus utraq; in syluestrem & satiuam.

DE PLATANO. CAP. 108.

Platanus peregrina quondam ipsi Italiae arbor fuit, in quam primum ex oriente allata est: ubi in magna aestimatione, propter foliorum latitudinem solis aestum arcentem, habebatur. In Germania eam sponte nasci nemo speret. Quare non assentior illis qui Abotni dictam Germanis arborem Platanum esse contendunt. Ea enim acer est: foliorum tamen figura ad Platanum accedit, reliqua discrepant. Platanum autem proprie appellatam, adhuc apud Hispanos, Siculos, & Constantinopolitanos in diuitum hortis excoli scimus.

DE FRAXINO. CAP. 109.

Fraxinum Græci Μελίαν, Germani ein Asche & Esche appellant. Est autem duplilis generis. Altera quæ simpliciter Μελία hoc est fraxinus: & altera quæ Βαμλία, hoc est, bubula fraxinus uocatur. Prior minoribus & angustioribus foliis & semine seu fructu graciliore. Altera uero latioribus maioribusque tum foliis, tum fructibus conspicitur. Eius frondes ad Bouum pabula quidam adhuc non minus quam olim reponunt: unde Bubulæ cognomen tum apud Græcos inuenit, quamuis etiam à magnitudine ita cognominari potuerit. Nouisse quoque legentes oportet, reirusticæ scriptores latifoliam & syluestrem, hoc est, incultiore fraxinum, Ornum appellare. Ergo meo quidem iudicio † Ornus nihil aliud est quam magna illa latifolia Fraxinus, montibus familiaris. Ruellius aliam arborem Ornum esse putat, cui folia quidem sunt Fraxino positi non dissimilia, sed multo minora, cum Orno maiora tribuantur. Sed quia hæc racemoso florum & fructuum habitu, acerba ui, & foliorum figura sorbo simillima sit, ad nullum aliud arboris genus, quam sorbi merito referri debet, quare paulo post hoc eodem libro dicturi sumus.

Ornus Ruellius.

* Fraxinus alia Germanis dicitur Eyschesch/alia Steinesch. Siliqua Fraxini, pharmacopole linguam auis nominant.

† Ornus, Fraxinus latifolia, etc. Sed alia Fraxini species uidetur, quæ Orni nomen circa Romam hodieque seruat: in Germania non proueniens.

DE POPVLO ALBA. CAP. 110.

Duæ sunt apud Dioscoridem Populi species: nigra altera, & alba altera, de qua nunc agimus. Nec immerito hæc alba cognominatur, cum inferior foliorum pars, candore etiam cum niue certet. Propterea Græcis λεύκη, Germanis Weiß alberbaum/Weiß popel, & † dalunt inferior candida uocatur. Porro quod ad lachrymam & prima germina huius arboris attinet, non ita efficaces in medicina uires habet, ut nigra, de qua iam dicturi sumus. Nascitur autem hæc arbor pingui fecundoque solo, & circa pagorum fossas. Falluntur qui albam populum esse existimant arborem, quæ à Germanis ein Aipe nominatur. Hæc enim tertia est populi species à Plinio Libyca siue alpina, & à recentioribus Latinis tremula dicta: quoniam longis pediculis pendenti folia, afflatu leuissimæ auræ tremunt.

DE POPVLO NIGRA. 111.

Albæ nigraeque populis tria interponuntur capita, in uulgaribus Dioscoridis exemplaribus.

* Germanis Alberbaum/Abelen.

plaribus. Cum uerò author hic non soleat cognatas res diucllere, post albam populum nigram statim recensere maluimus. Non enim uerisimile apparet, Dioscoridem eas interiectis aliis & minime cognatis rebus discreuisse. Est autem nigra Populus arbor, quam Græci *Αΰγαρον*, Germani *Popel weiden* & *Popelin* uocant: ex cuius recentibus erumpentibus oculis unguentum Acopon fit, quod pharmacopola Populeum nominant. Veteres Latini utramque Populum Farfarum appellarunt, Farfarum. Est etiam herba Farfarus & Farfarella, à similitudine quam cum Populi foliis habet dicta: de qua alibi dicemus. Porro nigræ Populi lachrymam ad Eridanum fluium in electrum, quod succinum Latini uocant, densari, ut poetæ fabulati sunt, & plerique crediderunt, minime uerum est, ut suo loco ostendemus, cum de Lyncurio nobis sermo erit.

DE MACERE. CAP. 112.

Conuenit inter omnes propemodum doctos, Macer, corticosum illud aroma esse, à pharmacopolis Macis appellatum, ipsis Arabibus etiam id testantibus: qui in descriptione sui Macis, Dioscoridis caput de Macere allegant. Nemo autem miretur, cur hic author suum Macer arboribus misceat, cum potius inter aromata de eo agere debuerit. Venia dignus est in hacre Dioscorides, cuius ætate res noua, nec penitus cognita fuit. Credebant tamen arboris corticem esse: quapropter hic inter arbores recensetur. Nostra uerò ætate, quid re uera sit, cognoscere incepimus. Nam Arabes clarescunt corticem esse nucis Moschatae. Cum uerò Moschata nux plures habeat (quibus munitur) cortices, dubium est quotus in ordine Macer cortex sit. Idcirco quidam tradunt exteriorem esse, quod tanquam falsum ipsa experientia improbat. Possunt tamen qui hoc scribunt isto modo excusare. Nuces Muschatas, ut hactenus ad nos allatae sunt, duabus corticibus uestitas conspexerunt, quorum interior qui nucleum ipsum proximè ambit, durus, lignosus & insipidus existit: qui uero hunc circumdat, Macer est. Tertium uero & extremum non uiderunt: itaque opinati sunt Macer exteriorem eius corticem esse. Nos uerò cum integros Moschatae nuceis fructus iam sæpe uiderimus, non pigebit totius fructus habitum indicare. Est ergo nux Moschata iuglandi, adhuc in arbore cum omnibus corticibus hærenti, magnitudine & forma omnino similis, cortice foris carnosio crassoq: qualis est uiride illud & carnosum iuglandis putamen. Sub hoc Macer est: quod lignosum corticem, nucleum ipsum (hoc est, nucem Moschatam in se continentem) ambit. Inditotus hos fructus non aliter quam nos iuglandes purissimo Zacharo aut melle condunt, & conditos nobis mittunt. Tales fuerunt qui proximo anno M. D. XXXVI: à nato Christo Francofordiam ex India ab Hispano quodam ferebantur. Porro hi maxime errant, qui Cinamomum credunt Caryophyllos & nuces Moschatas ferre. Neutrum enim fert, sed paruum fructum glandibus, in acetabulis siue caliculis adhuc hærentibus, similem, multò tamen minorem.

DE VLMO. 113:

Vlmus, quæ *πτελία* Græcis uocatur, magna & procera est arbor, lutosum amans solum. Folia habet *Tiliae* & *corylo* non dissimilia. Eius duo sunt genera: alterum simpliciter *πτελία*, hoc est Vlmus: alterum uerò *ὀρεπτελία*, hoc est, ut Theodorus Gaza apud Theophrastum conuertit, Montium Vlmus nominatur. Sunt autem Vlmii istæ arbores, quas Germani† *Aosterri* uocant: & alterum genus *Vlmei* siue *Pl.† Rūmen*. * Quid uero inter utranq: sit discriminis fabri lignarii nouerunt, & nos quoq: sterni, in historia arborum differentias earum indicauimus.

* Bist Germanis, Vlmii uel *Tiliae* cortex fissilis est.

DE CARIE LIGNORVM. CAP. 114.

Vetustos arborum truncos, & intempestiuè caesa atq: edificiis nimia uetustate corrupta ligna, uermes atterunt. Qui autem farinæ similis est foraminibus excidit puluis, Caries Latinis, Græcis *σάπρος ξύλον*, Germanis *Wurm* mel uocatur. Differt autem hæc secundum lignorum diuersam naturam. Papyrus grandis & triquetra herba est, in Aegypti palustribus locis iuxta Nilum iunci modo nascens. Ex hac chartæ olim fiebant, & quo

quo Plinius docet modo, hinc nostris etiam & nuper inuentis chartis Papyri non
[†]detrahitur. mē manſit. Vidimus nos † detractos medulla papyri cortices ex Aegypto allatos.
 Vidimus etiā in uetustiffimis Germaniæ Bibliothecis Papyri chartis ſcriptos libros.

IN NOSTRIS CODICIBVS HARVNDI ET PAPYRVS. CAP. 115. 116.

DE TAMARICE. CAP. 117.

Tamarix Græcis *Myrica* appellatur. Eſtq; duum generum, ſatiua & procerā altera,
 in Aegypto naſcens: & humilis altera, quæ diminutiuā formā Tamarifcus dicitur. Ei
 us duplex genus in Germania inuenimus: alterum ſolidiore ligno, medullaq; ad
 modum exili, & foliis tenuioribus, copioſe ad Rhenum circa Argentoratum naſ
 ſcens: alterum ampliore medulla, foliis latiſculis, lignoq; non uſque adeo ſolido,
 quod frequens in Danubii & Vuertachii ripis in Vindelicia prouenit, præſertim
 iuxta Auguſtam. Minoris autem Myricæ folia & cortices pharmacopolæ ad medi
 cinæ uſus ſeruant. Fiunt etiā hodie, non minus quā olim, ex ligno eius circulis
 doliorum modo circumdata apud nos pocula. Germani pariter Græcis minorem,
 Tamarixē uocant. Male hæcenus Grammatici Myricam eum eſſe fruticem in
 terpretati ſūt, quia Germanis Heyde appellatur: cuius flore, præſertim apud nos in
 Lunenburgienſi ſolitudine, apes mel copioſum colligunt, ſed minime generoſum, ut
 Dioſcorides proximo capite manifeſte teſtatur.

DE ERICA. CAP. 118.

Erica abſq; dubio eſt illæ Myricæ ſimilis, ſed minor frutex, quem Germani Heyde
 appellant: in Lunenburgienſi ſolitudine ad duum & trium nonnunquam cubitorum
 altitudinem aſurgens. Hunc Myricam hæcenus aliqui opinati ſunt, ſed male, ut pro
 ximo capite indicauimus.

DE ACACALIDE. CAP. 119.

Non cognoscitur in hiſce regionibus Acacalis, cum in Aegypto naſcatur, neq; fru
 ctus eius amplius afferatur: niſi aliquis ex Myrobolanis Emblicum ſeu Bellaricum
 hunc eſſe exiſtimet: quod ut non affirmamus, ita etiam nondum negamus.

DE RHAMNO. CAP. 120.

Rhamnus etiam alba ſpina Latiniſ nominatur. Cautos tamen nos eſſe oportet, ne
 res diuerſas hoc nomine confundamus. Nam præter Rhamnum ſpīnam a bore ſcen
 tem, in herbaceo genere duo Cardui, albæ ſpinæ nomine paſſim ab authoribus indi
 cantur. Ouidius uerò ſexto ſaſtorum per ſpinam albam & uirgam lanalem, Rham
 num intelligit nec ſine cauſa in hunc modum de Rhamno ſcribit.

Sic ſatus ſpinam, quæ triſtes pellere poſſit

A foribus noxas, hæc erat alba, dedit.

Et paulo poſt:

Virgæq; lanalis de ſpina ſumitur alba,

Qua lumen thalamis parua fenestra dabat.

Cum ipſe Dioſcorides eadē Rhamno uires, quas Ouidius ſpinæ albæ ſeu lanali
 uirgæ tribuit, interprete Marcello, dicens: Fertur præterea Rhamnus, appoſitis præ
 foribus fenestris ſue ramis eius, omnium ueneficiorum arcere maleficia. lanalis autem
 uirga, Rhamni uirga dicitur. Quod Janus eam Cranæ Nymphæ (qua potitus erat)
 contra Strigum noxas pro amuleto dederit. Sunt autem Rhamni præcipuæ ſpe
 cies duæ: candida, & nigra, ut Theophraſtus ſcriptum reliquit & nos aliquoties ui
 dimus, quæ tamen non in Germania enatæ, ſed ex Italia & Gallia allatæ nobis ſunt.
 Quapropter non indicamus Germanicum eius nomen, utraq; longis tenuibuſq;
 aculeis horret. Fructus candidæ, candidus: nigræ, niger: quemadmodum & folium,
 quod oblongum paruumq; eſt. Fructui orbiculata eſt figura, qui in medio turgēt, in
 margine uero tenuior & uelut foliaceus exiſtit, in ſumma, uerticillo, quo ceu ponde
 re fulſis infixio utuntur mulieres, ſimilis eſt, non tamen perforatus. Dioſcorides &
 terrā Rhamnum recenset, cuius ſemen in quibuſdam Dioſcoridis exemplaribuſ
 ſpondylis, in quibuſ etiam Aſphodelo, comparatur, diuerſis natura plantis. Nos
 ſpondylis, hoc eſt, uerticillo, ſimilem eſſe etiam oſtendimus: quare non Aſphodelo, ſed
 ſpondylis

spondyliō legendum censemus. Rhamnīs quidam etiam annumerant Crispinam uuam ferentem spinam, sed cum foliis & fructu plurimum discrepent, sui generis spinam esse credimus.

* Quidam Bergorrobēbe esse putant, (uuam Crispinam puto) sed folia dissimilia sunt.

DE HALIMO. CAP. 121.

Halimus frutex maritimis locis prouenit, gustu salus, unde et nomen inuenit. Nobis propterea incognitus est in mediterranea regione habitantibus. Quamuis autem Germaniam quoque spaciōsissimum mare alluat, tamē quia nostrum littus septentrionem spectat, nō temere in eo Halimum prouenire quis credat, qui calidioribus et soliaduersis littoribus nascitur. Confuderunt aliqui hunc fruticem cum asphodelo, qui etiam Albucus dicitur. Hinc enim in hoc capite quoque Albuci uocabulum legitur, sed admodum male: non enim à Dioscoride, sed ab alio quodam imperito adiectum est. Videndum in hac planta erit, quomodo conciliantur Dioscorides & Serapio: ille enim ait Rhamno simile esse Halimū, sed spinas non habere: hic autem plures illi quam Rhamno spinas tribuit. Vocatur autem ab Arabibus hæc planta Molochia & Atriplex marina. Quare hoc nomine apud Serapionē querendum erit Halimon. Plinius ueterum quorundam autoritate, plures eius species describit.

* Halimus frutex est maritimus. Alimus uerò, Asphodelus.

DE PALIRO: CAP. 122.

Varia est apud authores Paliuri historia siue descriptio. Sunt enim multæ eius species, uerum in tanta historiæ diuersitate, quidquam certi sine firma ratione indicare, temerarium foret. Nos illud affirmamus uulgo non cognosci, neque in medicinæ usu nunc esse paliurum. Est autem ut tradunt scriptores duplex paliurus. Altera procerior & arborescens, Aphricæ familiaris: & humilior altera, quæ spinis & agrorum pestibus adnumeratur.

* Alein Straßel wicken, folijs similibus uicij.

DE OXYACANTHA. CAP. 123.

Oxyacantha, (quæ Theophrasto etiam masculino genere οξύανθος & οξύανθον nominatur,) ab omnibus esse creditur spina illa fruticosa, rectis uirgis arborescens, binis, ternis, & nonnunquam quaternis aculeis ad pungendum infestis, ex interuallo armata: quam Arabes eorumque interpretes, & recentiores cum medicis tum pharmacopœ omnes uno ore Amiberberim & Berberim appellant. Cui sententiæ nos minime refragmur, sed potius conquerimur, confundi apud authores hoc nomine duos frutices natura diuersos. Quæ enim hic apud Dioscoridem extat Oxyacanthæ descriptio, nihil minus designat quam Berberim. Alia enim est Oxyacantha, cui Galenus adstringendi & pariter incidendi uires tribuit, ab hac spina quæ à Dioscoride sub Oxyacanthæ nomine describitur: quod iam ostendemus ab ipsa fruticis descriptione exoriri. Principio Oxyacantham suam Dioscorides Achradio, hoc est, syluestri piro, similem dicit, minorem tamen & spinosiorē. Similitudo autem semper ad formam & figuram rei refertur. At diuersissima est Berberi à pirastro figura, ut iam declarabimus. Piraster enim plerumque singulari caudice assurgit, non ita recto, in diuaticatos & intortos ramos diuiso. Berberis pluribus uirgis fruticis modo se attollit, iisque minime intortis, sed rectis. Pirastro, antequam omnino senescat, cortex est lenis, glaber, in flauo spadiceus, in cæsis candicantibus maculis uariatus. Berberi uerò longæ diuersus colore, & in ipsa adolescentia rimosus & rugis contractus. Quapropter neminem esse credo, modo semel tantum utrumque uiderit, qui Berberim Pirastro similem fructum eumque rubentem. Berberique rubeus est fructus, sed Myrtæ bacca dissimilis. Hęc enim rotunda & globosa existit, ille uerò oblongus & utrinque acuminatus. Oxyacanthæ deinde fructus οβύρατος, hoc est, friabilis describitur. Sed Berberis bacca, quoniam lenta cute succulentam carnem continet, minime friabilis esse potest. Friabile enim non de re quapiam, lenta, humida et succosa dicitur, sed de fragili, arida, quæ digitis facile uelut in puluerem atteri queat, talis autem fructus Berberi non est, quare nemo ipsum friabilem dixerit. Reliquas notas cum aliis etiā

Pyracantha.

communes an sint, nō discutimus. Censemus itaq; aliā esse spinam quā à Dioscoride describitur, ab ea quam Galenus & Arabes Oxyacanthē & Berberis nomine describunt. Qualis autem ea sit nunc declarabimus. Dioscorides inter Oxyacanthē synonima etiam *πυρίαν* numerat, cū uero apud nullum auctorem hæc uox extet, perperam esse exaratam suspicamur. Ipse tamen Dioscorides hoc eodem libro Pyracanthē meminit in Mespili capite. Eam esse censemus quē hic corrupto nomine *πυρίαν* uocatur. Facilis enim lapsus est scribentium. Idcirco Dioscorides pro Berberi, quæ uera est Oxyacantha, Pyracantham descripsit. Est igitur, ut nos iudicamus, hoc loco Oxyacanthæ nomine descripta Pyracantha, hoc est, spina quæ inter arbores à ueteribus Latinis simpliciter spina, à Gallis Aulbe spine, hoc est alba spina, Germanis *Hagedorn* & *Weydorn* nominatur. Non tamen intelligimus Rubum syluestres ferentem rosas, qui ab usque nobis *Hagedorn* uocatur, sed eam spinam, quam aliqui ex nostris Cornum esse falsò opinati sunt, fiunt ex ea uiuæ in Hestia sepes: hæc enim habitu figuratè Phæstro similis est, minor tamen spinosiorq;. Fructum fert Myrteis bacis æqualem, rubentem, nucleos intus habentem, mollem, & omnis succi expertem, ideoq; friabilem. Idē testatur Plinius, cum dicit Aquisfoliæ et spine baccas sine succo esse. Accedit etiam foliorum figura, quæ Apio similia sunt: nam talia Pyracantha habere debet, Dioscoride Mespili folia Pyracanthæ foliis comparante & Theophrasto Mespili folia Apio similia describente. Pronunciamus itaq; Oxyacantham à Dioscoride descriptam, esse Pyracantham: ueram autem Oxyacantham de qua Galenus scribit, Berberim esse. Nihil enim obstat quod quædam ex Dioscoride Galenus in suæ Oxyacanthæ descriptionem transfulerit.

Oxyacantham Dioscoridis, esse Spinam Album uulgò dictam: Germanis *Hagedorn*. Galeni uerò Oxyacantham, cui adstringendi & pariter incidendi uires tribuit, Berberim uulgò dictum esse, *Saxenich* & *Salsendorn*.

DE CYNOSBATO SIVE CYNORRHODO. CAP. 124.

* Cynobatum.

Κυνόσβατον, Canirubum Theodorus Gaza apud Theophrastum interpretatus est, idem frutex alio nomine Cynorrhodos, id est, Canis Rosa, uocatur. Est autem nihil aliud, quàm syluestris & aculeata hamatus spinis rubus, Rosas syluestres ubiq; in campis proferens, Germani *Feltrosen* uocant. Suntq; tres aut quatuor eius differentiae: procerior una: & altera hirsutioribus foliis, cuius frutex totus suauissimum odorem spirat. Hunc Engländerum uulgo appellat. Tertia omnium minima est, nec multum à terra attollitur, quapropter à nobis *Erdrosen* quasi *Chamaerhodos* appellatur. Quarta maiora & lanuginea & incana habet folia & rosas in candido suauiter rubescentes. Plinius Cynosbatum cum uulgaris rubo confudit. Quidam etiam hunc fruticem Arbutum esse credunt, sed malè.

† Fortè lanuginea, uel lanuginosa.

DE LIGUSTRO SIVE CYPRO. CAP. 125.

Ligustrum sine dubio arbuscula est, quæ Græcis Cyprus uocatur. Propterea Plinius idem scripsisse nunquam peniteat. Germanicè *Wundtweyden* siue *Reinweyden* nominatur, propterea quod salici similis sit, orisq; ulceribus medeatur, & in Rheni ripa copiose nascatur. Male hætenus crediderunt Virgilii commentatores Ligustra Conuoluuli flores esse, quos Germani *Saunglocken* appellant.

* Arabicè *Alkanna*, Henne, Germanicè *Reinweiden* / *Wundtholz*.

DE TILIA, [uel potius Phillyrea. Nam Tilia, Philyrea est Græcis.] CAP. 126.

Quæ hoc capite à Dioscoride describitur Tilia, omnino eadem est cū Ligustro, si inuicem utriusq; descriptionem conferant. Galeni & Aeginetæ ætate talis Tiliæ historia in Dioscoride legebatur. Siue autem Tilia à Dioscoride sic descripta sit, siue ab alio hæc descriptio adiecta, falsa est, cum nullus neq; ex præcis neq; recentioribus historicis notis eam depinxerit. Omnes enim manifeste describunt Tiliæ appellatione eam arborem, quæ Germanis ob ligni lenitatem & molliciem etiam *Linde* uocatur. Miror autem hoc nullum hætenus animaduertisse. Nam omnes qui post Dioscoridem de rebus scripserunt, aut alios interpretati sunt, usq; ad nostram ætatem eam controuersiam de Tilia inter Dioscoridem & Theophrastum silentio præterierunt. Superua cuius igitur est hæc Tiliæ historia quæ in hoc auctore legitur.

† Resutat hanc opinionem Matthiolum: & Phillyream à Ligustro diuersam pingit, Arabum (ut ait) *Mahaleb*.

DE CISTO. CAP. 127.

Iamdudum ostensum à Leoniceno est, confudisse Plinium natura diuersas plantas, Ciston & Cison, quantumuis frigidis argumentis Plinium defenderit Collinutius. Cistus autem in hisce regionibus incognita est. In Italia uero frequens nascitur. Scimus etiam in Gallia quibusdam locis tanquam peregrinum à Magnatibus in hortis ferri, unde & nos semina accepimus: quibus satis enatus est frutex, omnibus quibus à Dioscoride describitur notis conspiciendus.

* Cistus etiam in Basi-
liana nasci-
tur.

DE HYPOCISTIDE. CAP. 128.

In Italia collibus, & alibi ubi copiosè Cistus prouenit, sub ipso frutice ad radices eius nascitur quiddam, ex argumento Hypocistis dictum, quoniam non alibi quam sub Cisto proueniat. Est autem brevis herba, si modo herba dicenda est, ei quam caudam leonis appellamus non dissimilis, sine foliis, pinguis, carnosaque & tota ueluti Hyosciami utriculis aut puniçi malicytinis constans: succo prægnans, qui expressione aut coctura elicitus & ad ipsitudinem coctus, uel in sole densatus, herbæ suæ nomine in pharmacopoliis serratur. An uero, quæ passim in pharmacopoliis habetur, Hypocistis omnis huius herbæ succus sit, huius loci non est in dubium uocare.

Hypocistis est planta ex ea succus dicitur. Plantam eandem aut cognatam putant, quæ ab aliquibus cauda leonis dicitur, Germanis Onblat, quasi sine folijs: Dioscoridi Orobanche.

DE LADANO. CAP. 129.

Ladon Cisto similis frutex est, cui lenta, resinosa & odorata pinguedo adhæret, quæ Ladanon dicitur. Hodie uero in pharmacopoliis Laudanum. Galenus Ladon nihil penitus à uulgarì Cisto differre credit, sed meliorem & calidiorem esse, quoniam in calidioribus regionibus nascatur. Quod an uerum sit, non ausim affirmare, cum ipse Dioscorides Ladanum ex calidioribus locis (qualia sunt Arabia & Libya) damnet: ex Cypro uero, frigidiorè quàm Arabia uel Lybia regione, probet. Ergo non caliditate regionum à uulgarì Cisto diuersas uires nactum est Ladon. Porro substantia multum utriusque succi differunt. Hypocistis enim aqua resoluitur, Ladanon in oleoso liquore. Illa etiam Cisti radicibus adnascitur: hoc uero ramulis & folijs adhæret.

DE EBENO. CAP. 130.

Incognita est hodie Ebenus nostris Medicis, Quidam tamen Guaiacum lignum, Ebenum esse continent. Quoniam pondere & densa soliditate Ebenum æmuletur. Nos ueram uidimus Ebenum Augustè Vindelicorum apud Conradum Relingerum Patricium Augustanum: & Norimbergæ faciunt ex Ebena delicationibus cultellis capulos. Veniunt tamen hodie non minus quàm olim, Indica & Aegyptiaca spinæ, hoc est Acatæ materia pro Ebena, quæ propter similitudinem facile ementibus imponit. Porro illi maxime errant qui Ebenum putant eam esse arborem, quæ Germanis eit Eybe uocatur, de qua in Picea etiam est dictum. Ebenus enim calidissimus nascitur locis, qualis India est. Eybe uero frigidissimis ferè regionibus, & earum etiam frigidis & gelidis montibus. Qualis autem arbor sit quæ Germanis Eybe uocatur, in picea indicauimus, & libro quarto in Taxicapite repetemus. Porro ipsam Hebenum Germani Heben siue Eben appellant.

Ebena
Acacia

* Adfertur in Germaniam quocumque hodie: & à diuilibus quibusdam Noriberge ac alibi possidetur.

DE ROSIS. CAP. 131.

Rosæ multiplices habent differentias, quibus ab omnibus dignosci queant: rubentes uero à medicis receptæ sunt, de quibus etiam hic agit Dioscorides. Debent autem tempestiue colligi, antequam penitus aperiantur, & cum adhuc clausæ, conifiguram imitantur, & in umbra siccant: sæpiusque, ne situm contrahant, uersæ ad suos usus reponi.

DE ROSEIS PASTILLIS. CAP. 132.

Pastilles, hoc est, Rosei pastilli, in pharmacopoliis Trochisci de roseis uocantur. Asilia tamè est & diuersa eos præparandi ratio nunc in pharmacopoliis, quàm olim cum

D ij

Dioscorides hæc scriberet. Possunt igitur uolentes aut ueterum aut recentiorum more habito morborum respectu Roseos pastillos componere. Quæ enim à Dioscoride traditur Rhodidum descriptio ad minuendū sudoris & hirci uirus inuenta est. Quæ uerò ab Arabibus descripta est, constringendi & confortandi uires habet.

DE LYCIO. CAP. 133.

Lycium è Pyxacantha, eo quo Dioscorides docet modo, conficitur. Conficiebatur & è Rhamno & aliis quibusdam similiter, ut Oxyacantha, adstringentibus spinis. Copiose quondam in Lycia fiebat, unde & nomē inuenit. Quod uerò hodie in pharmacopoliis habetur, neq; è Pyxacantha, neq; Rhamno, neq; Oxyacantha (nā ex hac quoq; non cōtemnendum confici potest) excoquitur: sed ex matrixylua tuocato frutice, qui sæpes & arbusa uitis modo ascendit, & ex aliis quibusdam plantis, nihil aut admodum parum adstringentibus. Falluntur qui Pyxacantham esse putant aculeatis undiq; & semper uirentibus arborum foliis, Germanis, Hols, Gallis Hous, Latinis Aquifoliam dictam, ea enim sui generis arbor est, ut in Quercu dicemus.

DE ACACIA. CAP. 134.

Omniū hodie magno errore persuasum est, Acaciā ueram Prunellorum agrestium, quæ Germanis Schlehen uocatur, succū esse. Est enim Acacia secundum omnes Græcos, Latinos, & Arabes scriptores in Aegypto nascentis spinosa arbuscula, quam Theophrastus etiam simpliciter interdum Acantham uocat. Fert hæc spina lupino similis siliquas & semina, sæpe a me, in Gummi Arabico uocato, quod ex Acacia arbore manat, ut omnes Græci & Arabes testantur, inuenta. Quapropter non est dubium, quin Acacia careamus: quam facile habere possemus, nisi deesset mercatorum diligentia: si enim Acaciæ Gummi totæ naues onustæ ad nos peruenire queunt, cur non & succum è siliquis expressum expectimus?

DE GUMMI.

In Dioscoridis codicibus nostris nullum hic peculiare caput est de Gummi.

Gummi appellatione intelliguntur omnes arborum lachrymæ, quæ tamen non resinosa constant substantia. Quamuis enim interdum promiscuè hanc uocem ad omnium arborum & herbarum tam resinosas quam aqueæ substantiæ lachrymas referamus, proprie tamen Gummi appellantur, quales ex Acacia, ceraso, pruno & Amygdalo lachrymæ fluunt: ex quibus omnibus lachryma quæ ex Acacia manat, Gummi simpliciter, propter excellentiam, uocatur. Arabes uerò Arabici appellatione adiecerunt, et ubiq; in pharmacopoliis sub Arabici Gummi nomine uenditur. Erant uehementer qui Arabicum Gummi, Tragacanthæ lachrymam esse putant, uirium similitudine decepti. Est enim longe diuersa ab hac Tragacanthæ lachryma, ut suo loco ostendemus.

DE AMVRCA. CAP. 135.

Tritis & expressis Oliuis, qui defluit humor in tria discedit, quorum superius est Oleum, inferius autem quod crassius & feculentius est, fraces nominatur: quod uero inter utrumq; constitutum est, substantia aqueum, aliquantulum uinosum, acre & acerosum, Amurca Latinis dicitur. Est autem nihil aliud quam succus, qui præter Oleum in Oliuis gignitur. Cuius medicamenti apud nos nullius est usus.

DE VITICE. CAP. 136.

Vitex, quæ Græcis *ἄμεινον* à castitate quam facit uocatur, copiose etiam in Germania provenit ad Oenum fluuium, non longe ab Oeniponte oppido, quod nos *Inspruck* nominamus, & aliis uicinis locis. Quinetiam in Italia nascitur, fructus eius in pharmacopoliis habetur, quem Agni casti semen uocant. Differt uitex multis notis à Silere, hoc est, à parua illa salice, quam quidā Viticæ falso esse credunt. Theophrastus etiam tertiæ speciei Agni quā *Eleagnū* uocant, quod mediā inter Oleam et Viticæ figuram & formā habeat, mentionem facit, aitq; nasci circa Orchomenū lacum. Eadem *ἄμεινον* copiose in Cauchorum paludibus inuenitur. Estq; tota odorata: Semen fert Pipiti longo non dissimile, Cauchi quoniam lupulum paucicolum, eius frondes & semina sunt cereuisiæ pro lupulo incoquant: quæ somnū conciliat & cito inebriat. Vocatur

↑
Id est, Periclymeno.

Seibim in
sacris literis
uocatur.
Acantha
simpliciter.

Siler.
Eleagnus.

Vocatur ab illis hæc arbuscula † *Alce* et a nonnullis etiā *Potiff* a Vuestphalis *Gunt*.
Nos totius arbusculę figurā & naturam, in arborum † & fruticū historia diffusius
tractauimus: quod historiam eius legere uolentes remitto.

† *Alia*
† *se. m.*
†

DE SALICE. CAP. 137.

Notæ sunt, & ubiq; in aquis proueniunt Salices, quas Germani generali uoca-
bulo *Wyde* nominant. Sunt autem plures Salicis differentię agricolis probè no-
te. Genera eius sūt, Viminalis & Perticalis. Viminalis, ut Plinius est author, dicitur,
quæ Viminum gratia in agris talea sesquipedi feritur, ut Vimina qua uites ligen-
tur facile sine scalis detondeantur. Viminalis in Francia nostra copiose propter uites
feritur. Perticalis in Saxonia, ad lupuli pedamenta Perticalis est quæ longiore talea
siue pertica pangitur, ea nō singulis annis putatur, ut Viminalis, sed quarto demum
anno. Longiorem enim ætatem Perticę quā Vimina requirunt. Atq; hæc generum
sunt nomina: pæter uero, quę certo demonstrari uetustis nominibus possunt, Vi-
tellina & Gallica. Vitellina est, quę Germanicę *gelbe Wyde* & *Totterweyden*
uocatur, frugiens in Francia nostra, cum Perticalis, tum Viminalis. Gallica uerò est
quę in obsoleto purpurea proleat & omnium tenuissima Vimina. Nos † *Harwey*
de hoc est, Capillares salices, a gracilitate uocamus. Porro qui salicum figuras
ignorauerint, Leonharti Fuchsi herbarium consulant, qui plurimum si ceterum ima-
gines delineari curauit.

Non extat
in ijs quę
habentur.

† *Alia*
† *se. m.*
† *inter-*
† *pretantur,*
† *Harwey*
† *de.*

DE OLEA SATIUA ET SYLVESTRI. CAP. 138. & 139.

Olea arbor est, ex cuius fructu Oleum quod uulgo uocant oliuarum, exprimitur:
nos et. *Oelbaum* nominamus. Ea duplex est: Satua, & Syluestris altera, utraque
calidis regionibus familiaris. Syluestrem de qua nunc sermo nobis est Græci *ἄγριον*
λαύρον & *κόρινον*, Latini Oleastrum appellant: quā delicatiora etiam apud nos confici-
untur opera. Materia constat crassa, mauiosa & uersicolori.

DE COLYMBADIBVS OLIVIS. CAP. 140.

Nondum maturos oleæ fructus, cum adhuc flauis sunt, marina aqua & Thymo
conditos, quoniam Muria innatant, Græci *κολυμβάσας* uocant. Afferuntur autem
ex Hysania & Lalia ad nos. Vulgo *S. uen* apellantur, quæ grato sapore &
salubri stoma.cho in cibo cum assis carinibus comeduntur.

DE OLEASTRI OLEO. CAP. 141.

Exprimitur etiam ex Oleastri fructu Oleum, quod ad nos non affertur. Est autem
ex urbana olea expresseo acerbius. Nasitur etiam apud nos parua quædam & sylue-
stris Olea, in Danubii, Vertachi, & Lycipis in Vandicia: è cuius baccis & aceto-
sum & acribum exprimitur Oleum, ori, donec recens est, gratum, id uetustatem fer-
re non potest. Exstimamus autem hanc Oleam esse quā Columella Cilibracam ap-
pellat. Nec nos latet plerūq; Cilibracam Oleam credere eandem esse cum Chame-
braca, quā Arabes Mezereon uocant: quē errorem in quarto libro cum locus re-
quiret, detegemus.

Oleaster
Germani-
cus.
Olea Cilio
braca.

DE ÆTHIOPICÆ OLEAE LACHRYMA. CAP. 142.

Nascitur & in Æthiopia Oleaster calidioris temperamenti, è quo hæc fluit lachry-
ma, quæ hodie incognita est. Quidam tamen eam esse credunt Gummi dictum Ele-
mi, † quod ut non negamus, ita etiam non affirmamus. Considerantibus autem no-
bis hanc Æthiopica Oleam circumspicientibus, nulla inuenta est
quæ æque eius habitum referret, ut lignum quod Rhodii aut Rhodii cognomine
circumfertur, & sæpissime ignaris pro Agallocho, hoc est, Xyloaloe substituitur.
Causas autem & argumenta quibus inducti sumus, ut statuamus Rhodium lignum,
Æthiopica Olea materiam esse, antea polliciti sumus hoc loco nos allatu-
ros, cum de Aspalato & Agallocho ageremus, id autem nunc præstabimus. Principio nouis-
se legentes oportet, & probè perspectam habere, uulgaris (hoc est, alibi quā in
Æthiopia nascentis) Oleastri materiam, eius autem figuram, quoniam multos non

† *Gummi*
† *Elemi*
† *iusti*
† *cantur ali-*
† *qui esse la-*
† *chrymans*
† *Cedri.*
† *Lignū Rho-*
† *dium uulgo*
† *dictū, olea*
† *Æthiopia-*
† *cam uidetur.*

uidisse scimus, indicabimus. Est itaque Oleastri materia nodis tuberosa (quo fit, ut Herculis etiam clauam ex Oleastro caesam tradant poëtae) densa, solida, intortis & sinuosis Venis seu pectinibus crispa: pallidis, subfuscis & spadiceis maculis uaria, aliquantulum odorata, gustu amara & acris & uetustati ferendae maximè idonea. Eas autem omnes notas, si quis diligenter discusserit, in Rhodio ligno repperiet. Est enim æquè nodosum, & in tubera conuolutum. Quinetiam densa soliditate uulgarem Oleastrum superat, nec immeritò, cum sicciori & calidiori loco proueniat. Refert etiam fluctuantibus uenis crispum Oleastri habitum, nec defunt totidem colores, & macularum uarietas. Est etiam acre & odoratum, atque gustu Oleastri acrimoniam & amaritudinem respicit, sed utranque uehementiorem. Quoniam terra & cœlo sitienti & seruido enatum est. Differt autem tenuitate sola à uulgari Oleastro, quoniam alimentis copia in sicienti solo & cœlo defuit. Quapropter cum omnes huius ligni notae Oleastro conueniant, & manifestè constet id ipsum ex Alexandria Aegypti, Aethiopiae uicinæ, afferri: & auctores tradunt Chameleæ materiam & radices nonnunquam pro Xyloaloe uendi, neminem profecto futurum arbitramur, qui neget Rhodium lignum Aethiopicæ Oleastri materiam esse: *Chamelea*. Porro quod Aethiopica Olea, etiam Chamelæa dici possit, antea in Agallocho ostendimus.

DE QUERCIV. CAP. 143.

Non habent Latini quo glandiferarum arborum genus comprehendant uocabulum, quemadmodum Græci, qui *αἰὲς* appellatione non Quercum tantum, uerum etiam omnes alias glandes propriè dictas ferentes significant. Quamuis Theodorus Gaza credat Roboris nomen apud Latinos æquè latam significationem ut apud Græcos *αἰὲς*, habere. Sed nos non meminimus hoc aliquem probatis authoribus dixisse. Quare non est quod Gazæ hac in re assentiamur. Sunt autem diuersæ huius generis arbores, partim etiam apud Latinos suis nominibus distinctæ: ut sunt, Quercus, Robur, Cerrus, Esculus, Ilex & Suber. Eas omnes Græcis nominibus indicare, ualde operosum esse omnes intelligent, qui Theophrastum de his agentem considerauerint. Nos uerò rerum ad historias collatione, & Gazæ uersione freti nostram de eis sententiam ferre non detrectabimus. *αἰὲς* est uulgaris illa ramosa in latitudine diffusa glandifera arbor, caudice nequè adeò procero, nequè recto, crasso tamen, eam Latini propriè Quercum uocant, Germani *cin* *Eiche*. Theodorus nunc Placidam, nunc Quercum apud Theophrastum uertit. *αἰὲς* specialiter uocata robur est (siquidem Theodoro credendum) nisi enim ita Robur Græci appellarent, non temere aliud nomen esset reperire, quæ ea gens eam arborem indicare. Caudice assurgit Robur recto, procero, paucisq; ramis brachiato. Italis adhuc Rouer uocatur, Germani *cin* *Stemeyche*, à soliditate, quasi lapideam Quercum dicas. Frequentissima est hæc in Hælia arbor. *αἰὲς* Cerrus est, Roboris figuram referens, sed hæc etiam eo tum rectior, tum procerior existit, ramosq; non nisi in summitate habens, Germani *cin* *Tanneiche* uocatur, quoniam Abietis modo recto proceroq; constet caudice. *πλατύφυλλος* est, quam Esculum Latini, & *ὀκρυς* *τελευχέ* Germani appellant, Saxonice syluis in plano familiaris, huic latissima folia, unde & apud Græcos nomen. Hæ sunt glandiferae arbores, quæ hoc capite *αἰὲς* *πᾶσι* à Dioscoride nominantur, & propriè uocatas glandes ferunt.

GLANDES. CAP. 144.

DE PHEGO ET ILICE. CAP. 145.

Mirabuntur fortasse complures, quòd non fagum potius quam phegum Græcorum *φηγόν* uerterimus. Cum fagum non tantum recentiores authorum interpretes, uerum & ipse Plinius per *φηγόν* intellexerit. Nos illud minimè latet, est aliud quod nos nomen mutare compulerit. Græci enim suam *φηγόν* glandiferis arboribus adnumerant, quibus dissimillima est quæ à Latinis Fagus dicitur arbor. Quid enim commune Fagus cum Quercu aut Illice habet? profecto nihil. Quare diligenter notent rerum studiosi, *φηγόν* longe aliam arborem esse ab ea quam Latini Fagum appellant, quamuis Latinum nomen à Græcorum *φηγός* deductum uideatur.

deatur. Nam ut alia omittamus omnia, quibus discrepant, Græci suæ phego Glandem tribuunt, non aliarum modo oblongam, sed rotundā. Fagus uerò Latinis dicta, glandem proprie non fert, sed in Echinate pericarpis castanearum more pingues & oleosas nutes, easq; triquetras & acuminatas: quæ figura è diametro cū rotunda pun-
gnat. Qui uerò phegum nouisse uoluerit montanas lustrat syluas, in quibus prouenit hæc arbor. Figura illi non dissimilis Quercui, sed strigolior & tristior. Glandes fert omnibus agrestibus notas, figura rotundas: quæ nota tanquam præcipua ab aliis Glandiferis distinguitur. Porro non licuit hactenus rescire, quo nomine nostri agrestes hanc Phegum appellant. Glandes uerò, adiecto rotundarum cognomento, à reliquis distinguunt. At quæ Romanis Fagus appellatur, proprii & simplicis generis arbor est. Et diligenter quidem à Theophrasto Oxyæ nomine descripta, unde uolentes historiam eius petere possunt. Est itaq; *Oxyæ* Quercus species, quam nos Phegū, ut à Fago distinguatur, uocamus. Fagus uerò simplicis generis arbor, quæ Theophrasto ipsa nominatur. Theodorus scissimam uertit: quoniam materia eius facile in tenuissimas laminas findatur. Ilex autem quæ Græcis *πῆγες* est, & ipsa glandiferis adscribitur: quo autem nomine Germanis nota sit, fatemur nos nondum rescire potuisse. Sunt præter has glandiferas & aliæ arbores, in quorum numero est quæ *φῆλος* Græcis, Latinis Suber, Germanis *† Krachbaum* nominatur, Pyrenæis montibus familiaris. Cortex ad calceamenta & alios usus expetitur, iccirco in copia etiam ad nos uehitur: est autem rarus, leuis & fungosus, cum nostri *† Krachbaum* uocant, quem sub pedibus edit calceis insutus.

Oxyæ.
† Fissim. &
Ilex.
πῆγες;
Suber.
Phellos.
† Krachbaum.

* Fagum nostrum, seu Latinorum, Theophrasti Oxyam facit: Phegum uerò Græcorum, arborum Quercuini non dissimilem, strigiosorem: quæ glandes rotundas proferat, &c.
† Ilex alia est Aquifolia, Germanis Holo uel Hu.e.

DE CASTANEIS CAP. 146.

Castanea arbor sui nominis fructus fert, omnibus notos, qui Græcis *ἀπὸ βάλλανος*, *Σαρδανὰ βάλλανος* λέπτις & *κέραν* uocantur. Germanis Castanien & Kesten. Plinius numerosam facit earū differentiam. Apud nos triplex habetur genus: unū syluestrium, & duo satiuarum. Syluestrium syluæ sunt in ulteriori Rheni ripa in Treu-
bochis supra Argentoratum, & in toto illo montano tractu. Proueniunt etiam in ci-
teriore ripa, sed parcius. Satiuarum quædam sunt minores, quædam uerò grandes è Narbonensi Gallia, primum ad nos allatæ, quas Marones appellant.

DE GALLA. CAP. 147.

Multa præter fructum glandiferæ ferunt arbores: præsertim Quercus, Ilex, & Robur: in quorum numero etiam Gallæ sunt, medicis, librariis, & artificibus quibusdam expetitæ. Hæ pediculis, ut glandes, furculis adherent. Ferunt etiam in foliis similes Gallis pilulas, sed rariores corpore: in quibus ueluti Muscæ quædam & Culi-
ces gignuntur. Hæ quamprimum deciderint, flaccescunt: decidunt autem ut plurimum citò, nec Gallæ modo in parente sua indurantur. Ipsæ autem Gallæ *Galla ôpffel* & *Ëyôpffel* uocantur. Pilulas uerò Gallis similes, & foliis adnatas *Dauibe Gallôpffel*: il nominamus, quasi surdas, fatuas, & inanes Gallas. Suntq; optimæ Asiæ, quas hodie Turcicas nominant.

* Gallæ alia inanis est, quæ folijs adnascitur. alia solida: cuius tres species adferuntur: Turcica, sbrice quæ parua sunt, & nostrates magnæ.

DE RHV. CAP. 148.

Ρόυς frutex paruus satum ferens & lentibus similem fructum, eumq; copiosum, confectum & corymbaceis racemis coherentem, qui Arabico uocabulo hodie in phar-
macopoliis Sumach appellatur. Theodorus Gaza Rhun fluidam interpretatus est, apud Theophrastum nomen illi à *ῥῆω* factum esse existimant.

DE PALMA. CAP. 149.

Palma arbor est quæ palmulas fert, quas hodie Dactylos uocant. E quibus fit

purgans medicamentum, quod Diaphthenicon à palmulis nominant. Sunt autem multa & Palmae & Palmularum genera. Plinius quædam Nicolaos uocat, earum quaternæ cubiti longitudinem habent, quæ uerba male intelligens Hermolaus Barbarus in magnum errorem incidit, scribens Nicolaos palmulas, quaternum cubiterum habere longitudinem. Auxit itaque Barbarus decies & sexies earum mensuram. Locutus est in Corollario huius capitis. Palmulas autem Germani Dactelo uocant, corrupto Latino nomine. Palma autem proceræ est arbor: materia rara fungosaque, quæ tota ueluti teretibus & sinuosis neruis per medullam transeuntibus, & ceu fluctuantibus constat. Cortice uellitur carne & capillaris neruis concreto, qui ex interuallo ueluti in orbes, circulos & uerticillos extuberat, quibus se ascensuris ueluti gradibus ad hoc natis scanfilem præbet. Folia proter longa, uenosa, harundinea, quorum singula gemina. & ceu complicita conspiciuntur, hunc ex cortice funes. E foliis funes, sportæ & tegetes, quibus incluse quædam peregrinæ merces ex India & aliis calidioribus locis afferuntur. Trabes è palmarum caulis, etiam in alios ferra secantur: his cistas componunt, quibus inclusum saccharum ex Indiarum occidentalis Insulis nostri mercatores reuehunt. Vidimus nos palmarum frondes, materiam & corticem, adeoque magnos corticem circulis adhuc circumdatos truncos: quod ideo referimus, ne ex relatione aliorum hæc scripserit, aut ex Plinio excerptisse uideretur. Porro nequaquam silentio prætereundum exit manus, quod principio huius capitis Dioscorides Arabicæ Myrobalani mentionem faciat, ut rerum studiosi etiam hoc scirent, quid per eas intelligat hic author. Nos itaque censemus Arabicas Myrobalanos eos esse fructus, qui adhuc in omnibus Pharnacopolis Myrobalani appellatione cognoscuntur, non tamen omnes quinque intelligimus, sed tres præcipuas: uidelicet Indam, Citrinam & Chebulam, quæ tres differentie non in diuersis, sed una eademque arboris nascuntur, ut palam ostendimus in peregrinorum medicamentorum historia: ubi docuimus Indam Myrobalanum primum fructus rudimentum esse, quam Plinius Oliuæ nucleo comparat, atque Adypson appellat, & Citrinam maturiscentem, Chebulam uerò maturum fructum.

Myrobalanus Arabicus.

PALMAE THEBAICAE. CAP. 150.

DE PALMAE ELATE. CAP. 151.

Elææ siue *ἑλάει* oblongum, mucronatum & squamatim compactile florentissimum & adolefcere incipientium palmarum tegmen & operimentum est, pingue, crassum & odoratum, quo antiquitas ad pillanda unguenta usa est: nunc uerò nostris medicis non expetitur. Vidimus aliquoties cum palmulis casu allatam, sed aridam & inueteratam.

DE PVNICIS MALIS. CAP. 152.

Mala punica hodie granata, à granis quæ intra se claudunt, uocantur. Habent hæc surs ex sapore differtias: Inueniuntur etiam & arte sic nasci coguntur, quæ nullum in acinis semen habeant: ea græcis ex argumento *Ἀνωρηνα* uocantur. Atqui non tantum in Africa apud Pœnos, à quibus nomen intulerunt, Punica mala nascuntur, proueniunt etiam copiose in Hispania Gallia Italia, aliisque pluribus locis atque in ipsis alpebus soli aduersus, & in decliuis campis imminuentibus, qua Germania Italiam attingit. Nos hæc mala *Ἰνδανὰ* & *Ἰταλικά* & *Ἰσπανικά* & *Ἰνδὰ* & *Ἰταλὶα* & *Ἰσπανία* nominamus.

Æ Punica mala alia sunt syluestria, alia satia: hæc rursus, uel dulcia, uel uinosa, (quæ *Μυζα* uocant, quasi *μυζα*) uel acida.

DE CYTINIS ET BALAVSTIIS. CAP. 153.

Cytinos Puniceæ flores esse tradit Dioscorides jam sequenti capite: Balaustia quoque Puniceæ sed syluestris flores esse dicit. Nos uerò non temere arbitramur alio modo differre, Cytinos & Balaustia. Cum enim utriusque Puniceæ flos eandem habeat formam, Balaustium & Cytinus diuersam, necesse est aliam subesse differentiam, quæ talis est. Cytini sunt Puniceæ tenelli fructus, qui statim post flores decidunt, ut in omnibus malis fieri uidemus. Quod enim Dioscorides scribit Cytinum florem esse Puniceæ, non intelligendum esse de toro flore censemus, sed de posteriori eius parte, quam fructus

fructus rudimentum est. Nam hæc etiam Balaustii nomine in pharmacopoliis cognoscitur. Balaustium uero est flos sylvestris Puniceæ, quæ decidit sponte: quoniam inter pediculum & floris folia non habet caput, ex quo fructus fiant. Tales abortini flores in multis arboribus & herbis uidentur, præsertim in Cucurbita & Cucumeratis omnibus generibus, & hæc est uera Balaustii à Cytino distinctio, quam neminè spero temere reprehensurum, si ea quæ de abortiuis floribus dixi intellexerit, uiderit, & animaduertit. Possunt tamen tam in sylvestri, quam satiuâ Punice & Cytini & Balaustia nasci.

DE SIDIO. CAP. 154.

Sida, uel in plurali numero *Sidae*, Punici mali cortices, Græci uocant: Latini *Mallicorium*. Veteres enim *Sidam* Punicum *Malum* nominabāt. Est & herba palustris fructu huic similem ferens, quæ *Sida* appellatur: cuius etiam *Nicander* in *Theophrasti* suis meminit. *Sidium* uero hodie corrupto nomine † *Sidia* uocatur in *Pharmacopoliis*. † *Psidia*.

DE BALAVSTIIS PRIVATIM. CAP. 155.

Quemadmodum *Cytinia* Græco uocabulo *κυτόν*, profundum uasculum significante, propter figuræ similitudinem, dicti sunt, ita etiam *Balaustia* à uerbo *βάλλω* nomen suum sumpsisse nobis uidetur. Decidunt enim hi, & à matre sua tanquam abortiui excutiantur. Quicquid enim *Punica* flores posteriori sui parte inter floris foliola, & quo surculis adherent peciolum, non habuerint oblongum & tuberosum capitulum, steriles sunt, ideoq; tanquam excrementum quoddam superfluum ueri fructus alimentum consumens, expelluntur. Quare si quis horum *Balaustiorum* figuram considerauerit,prehendat, ea non *Cytino* aut oblongo uasculo simili tuberculato, sed dilata ueluti bali foliola sua complexi. Est autem figura *Balaustio*, *Rosa* non dissimilis, sed multo pluribus foliolis stipatus est. Differunt autem colore *Balaustia*, ut *Dioscorides* etiam testatur, ad nos uerò ut plurimum feruntur, quæ rosas etiam colore imitantur. Habentur passim in omnibus pharmacopoliis, & nomen suum retinent. Quoniam nonnulli non simpliciter *Balaustia*, sed flores *Balaustiorum* appellant.

DE MYRTO. CAP. 156.

Myrica Græcis, Myrtus & Murtus Latinis uocatur, frutex celebris poetarum carminibus, uerum uiribus quas in medendo præstat multo celebrior, qui quoniam nusquam apud nos sponte prouenit, Germanico nomine destituitur. Non enim est exiguus ille fruticulus, quem Germani † *Heydelsfrauch*, & cuius baccas *Heydel* † *al. Heide* ber appellant, ut hæcenus falsò pleriq; crediderunt etiam docti: Vera autem Myr- *del uel* tus duplex est, candida & nigra. Illa candidas, hæc uerò nigras baccas parit: unde & *Heidels* Ouidius de ea sic scriptum reliquit. *Myrica sylua subest bicoloribus obsita baccis.* † *fraud.*

Prouenit autem copiosè in Narbonensi Gallia, maxime in eius parte maritima, quæ Prouincia uocatur. Seritur etiam à plerisq; in hortis, etiam in Italia. Est autem in aliquam proceritatem, si studiosè colatur, adolescens frutex, aut etiam arborescens: foliis Lentisco uel Buxo similibus, acuminatioribus tantum, gustu aliquid aromatis præseferentibus & odoratis, quæ hodie cum fructu ex Italia afferunt. Habent sane ueri Myrtilli insignes differentias quibus à nostris baccis, quas *Heydelber* uocamus, dignosci possunt.

DE MYRTIDANO. CAP. 157.

Myrtidanum Myrti adnatum siue accidens est: † quod ad nos non adfertur: pro-
pterea in nullo usu apud nos habetur.

DE CERASIIS. CAP. 158.

Ceraui arboris multe sunt forma et facultate distātes species, quapropter earū etiā fructus diuersas in cibo et medicina uires habēt: austera et maiora, quē nō ita in magnis arboribus nascūtur, ē Pōto primū in Italiā Lucul. attulit: Quē uerō dulcia sunt et in proceris arboribus nascūtur, spōte sua ubiq; in Germaniā proueniūt. Proueniūt etiā sponte

sponte in Misnia & Saxoniae finibus, nō longe ab Hala, paruae & duos cubitos raro excedentes Cerafi, fructu mediocris magnitudinis, quas non sine causa Chamæcera-
fos sylvestres appellare possumus. Nos generali uocabulo omnia Cerafa *Äyr, en* no-
minamus.

DE SILIQVIS. CAP. 159.

A cornuum similitudine Græcis *κεράτια* hi fructus uocantur, Latinis uerō Silique:
quoniam leguminum siliquis similes sint: in pharmacopoliis corrupto uocabulo
Xylocaracta & Xilocataracta pro Xyloceratia uocantur. A Germanis autem *Jo-*
hansbrot/ quoniam credunt diuum Iohannem Baptistam hoc fructu loco panis in

† *Bocke*
horn &
banais.

DE MALIS OMNIBVS, ET PRIVATIM COTONEIS. CAP. 160. & 161.

Plurimas habent mala differentias, non tantum secundum diuersas regiones. Va-
riant etiam oppidatim iisdem regionibus. Quare non facile aliquis omnia suis appel-
lare nominibus poterit. Cydonia uerō siue Cotonea omnibus nota sunt, ē quibus in
pharmacopoliis multa ad medicinæ usum fiunt. Habent ea tres præcipuas apud nos
differentias: quædam maiora sunt & malis similia, quædam uerō minora, & pyri mo-
do turbinata. Maiora etiam *εργαδια* Græcis dicuntur. Tertium genus sponte sua Da-
nubii Petrosi ripis in collibus prouenit: plurimumq; supra Ratisbonam usq; ad pe-
trea fauces, per quas Danubius labitur. Est autem hoc cæteris, pomo quidē minus,
sed adstringendi ui multo efficacius.

DE MELIMELIS. CAP. 162.

Melimela siue Glycymela, à melle & dulcedine nomen habent. Hæc si alia accede-
rent, crederē esse quæ Germanis *Hönigbpfel* & *Augstbpfel* uocantur. Sunt enim
admodū dulcia & suauia, & pueris ac delicatis mulieribus expetuntur, unde & Ma-
trialis in hunc modum de iis scribit:

*Infanti Melimela satuasq; Mariscas.
Nam mihi quæ nouit pungere Chia sapit.*

DE EPIROTICIS MALIS. CAP. 163.

Qualia Epirotica siue orbiculata mala sint, hodie nō facile indicauerit quis. Apud
nos tamen habentur in latitudinem compressa mala, quæ ab orbiculata figura patrio
sermone *Heybpfel* nominamus, idem significante uocabulo quod Latinis or-
biculata. Succus iis uinosus & gratus palato. An uerō eadem sint cum Epiroticis, nō
ausumus affirmare, in tanta Malorum diuersitate.

DE AGRESTIBVS MALIS. CAP. 164.

Agrestia mala ubiq; nascuntur, habentq; multas etiā ut satiuæ differentias. Faciunt
ex his & pyris agrestibus & sylvestribus prunis, omnibus cōtulis per se expressis, aut
affusa aqua, multo similē potum, qui Heliam incolunt rustici, quem Appeltrant/
hoc est, ē malis confectum potum appellant.

DE PERSICIS MALIS. CAP. 165.

† *Persich*
fen. Persica mala, quæ Germanis *Pfersichen* nominantur, omnibus cognita sunt. Dis-
ferunt tamen à Persicis. Genera eorum plura: quædam parua sunt, quædam grandia,
& crocea carne constant, quæ omnibus saporis bonitate præferuntur.

DE ARMENIACIS MALIS. CAP. 166.

† *al. etiam*
Armenel
fen. Ex Persicorum genere sunt & Armeniaca, minora tamen & ori suauiora, colore
subflauo, & cito maturescunt, quapropter præcoqua & præcocia à Romanis uocan-
tur. A Germanis uerō † *Warelle* / *Sommerpfirsichen* † *Walatheyn* / & *Boit*
pfirsichen. Arbor cum foliis & floribus mediam inter malum persicam & minorem
† *al. Ma*
lerlin, cerasum figuram & magnitudinem habet.

DE MEDICO MALO. CAP. 167.

Medicum malum Assyrium, Persicum, Citreum, Cedromalum & Citrinum uocatur. Grande est & oblongum ouata figura malum, lentam habens carnē, & in medio acetosum circa semina siccum, ex quo Syrupum de acetositate Citri dictum faciunt; Corticem habent colore citrinum, unde & nomen inuenit. Porro hoc malū in Cedro non nascitur. Propterea uidendum est ne diuersæ arbores confundantur. Sunt etiam huius generis Limones, Poma Adami, & Arangia, ab Italis Naranzia, Germanis *Pomeranzen* appellata. Ea omnia aurei mali nomine comprehenduntur. Habetur ænigmaticum de his malis carmen, quod est: *Medica mālā quidem nec mālā, nec medica: quod quiritis profodiā gnarus facile intelligit.*

*Germanis tres species nominantur Citrinaten / Limonen / Pomeranzen.

DE PIRIS. CAP. 168.

Pira non pauciores quam mala differentias habēt, quod quidem ad formam attinet. Facultate tamen omnia, sed alia aliis magis, astringunt: Germanis *Piren* & *Biren* uocantur.

DE PIRASTRO. CAP. 169.

Agar uocatur Græcis, Pirafter, hoc est, Pirus syluestris: Quamuis autem Dioscorides Achradem certam syluestris speciem esse dicat, tamen quia Theophrastus simpliciter Pirastrum, Achradem appellat, nos quoque Achradis uocabulo quamecunque pirastrum significari censemus. Sunt enim diuersæ eius differentia.

DE MESPILO. CAP. 170. 171.

Mespilus arbor eiusdem nominis parua mala † producit. Sunt autem duæ præcipuæ eius species. Prima Tricoccus Græcis, & propriè Mespilus uocatur: Italis atque Arabibus Alzarola siue Azarola. In Germania hæc arbor incognita est. Altera uero Mespili species, Græcis Epimelis & Hamamelis uocatur, quod iuxta malos soleat nasci. Hæc copiose in Germania & sata & sponte prouenit. Cum uero sponte, semper uicinam habet agrestem malum: unde & nomē a Græcis illi factum existimo. Huius fructum Itali etiam Vnedonem uocarunt, propterea quod præter unum nemo comedere & deglutire possit, antequam mollescat: adeo enim fauces adstringit. Non me lateat arbuti etiam fructum a quibusdam Vnedonem uocari, quod tantum unus elitari debeat. Sed ipse Galenus epimelida, Vnedonem ab Italis rusticis appellari, testatur. Sed male illi arbuti uicia assignat. Cuius fructus etiam a quibusdam Vnedo uocatur, stomacho noxiis & capitis dolores excitans, quæ uicia immerito Epimelidi adscribit Galenus. Cum constet experientia Epimelida (quæ Mespilus in Germania etiam uocatur) stomacho non inimicam esse, nec capitis dolores facere. Porro quæ a Germanis *Mespeln* uocantur, Vnedones sunt, hoc est, Epimelidis fructus, non propriæ uocatæ Mespili ut hætenus omnes credunt. Eum errorem nescio an aliquis ante nos deprehenderit. Vt cumque se res habeat, nouisse legētes oportet, Mespilo, Apio similia folia tribui, & singulis fructibus ternos nucleos. Vocata autem uulgo Mespilus nequaquam incisa & Apio similia, sed indiuisiua, oblongaque, ut Malus, folia habet, angustiora tamen. Præterea non ternos, sed quinos semper nucleos singula eius mala cōplectuntur, nisi fortè interdum præter naturam aut plures aut pauciores contineat. Quod autem Galeno non assentiamus, Epimelidi, Memæcyli uicia adscribere, nonnulli fortasse male interpretabuntur qui in unius magistri uerba iurauerunt.

DE LOTO ARBORE. CAP. 172.

Commune est & multis plantis proprium Loti uocabulum. Hoc autē loco de Loto arbore sermo est Dioscoridi: quæ plurima in Aphrica, etiam adiacentibus insulis prouenit. Sunt autem plures Loti arboris species, ut uolentes apud Theophrastum inquirere possunt. Latini Celtim hanc uocant. Quo uero nomine nunc cognoscatur & quid sit hæc Lotus, non conuenit inter authores. Nam quod Ruellius, Barbari, fretus testimonio, scribit eam esse quam Calamum Genomanni appellant, haud induci

Cerasi
species.

induci possum ut credam. Idem Pongeracum, Visciolum & Ciceraginem ab Italis uocari scribit, Gallis Alysam & Alyserum: quod æque falsum esse cognoscet, quicumque arborē, quam his nominibus appellat Ruellius, nouerit. Est enim Cerasi species cuius Bacce recentioribus Visciola, Germanis uero Weysslein dicuntur. Est autem arbor non tantum Italiæ aut Galliæ familiaris, uerum etiam Germaniæ, in qua etiam frequentius sponte nascitur, quam in hortis seratur. Itaque nos plurimum inter hanc & Lotū interesse censemus. Siquidē hæc frigido sub Septentrione cælo, lotus uero torrida & semper æstuanti Africa prouenit: quinetiā huic Cerasi folium est, loto uero Illicis tribuitur, hæc est, figura Quercus per ambitū profundius incisum sinuosumque. Differt etiā utriusque materia plurimum. Nos autē iis subscribimus qui Lotū arborē

*Sandalum
rubrū aut
Lotum esse
se, aut falsū
tem pro ea
recte in uisum
uenire posse.

Sandalum esse arbitrantur, quod multis argumentis demonstrare & obtinere possemus, nisi breuitati consuleremus. At non quamuis Sandalum intelligere legentes oportet, sed eam tantum quæ rubræ cognomentum in pharmacopoliis habet, quæ & ipsa habet plures differentias, quemadmodum de Loto scribit Theophrastus. Eo autem libentius hoc pronunciamus, quoniam Sandali rubræ folia uidimus Nurebergæ apud Georgium Ollingerum pharmacopolam, qui miro cognoscendarum rerum studio tenetur. Figura iis erat eadem quæ Quercus & Ilignis, sed concinnior & pulchrior: magnitudo uero minor & in angustum contracta, substantia densa, qualem Laureæ habent. Quare non aberraturos se uereantur, qui Sandalum rubræ accipient, ubi ueteres Loti materiam requirunt: quæcumque enim uires à Græcis Loto adscribuntur, eas etiam Arabes suæ rubræ tribuisse neminem ignorare putamus.

DE CORNO. CAP. 173.

*Pyracantha, aliud
quàm Cornus.
† Alij scribunt Cornu
lebaum.
† Cornū

Cornus nequaquam est, ut hactenus plerique crediderūt, arborescēs illa Spina quæ ueteres Græci (ut antea retulimus) Pyracanthā, Latini Spinam, Itali Spinū albū, Galli Aubepine, Germani Weissdorn & Nagedorn uocāt. Quod quilibet & alpebit qui Theophrasti & huius authoris uerba de Cornu, cum Italorum Spino albo & Germanorum Nagedorn conferet. Vera autem Cornus duplex est: syluestris, & satia: utraq; in Germania nascitur, & a nobis Latino uocabulo Cornu lebaum uocatur. Nam Cornū, id est, fructus eius Cornu leuocamus. Habemus & alia nomina præter Latinum quibus eam iudicamus, ut Dirlen, Dornstirsen & Dertigen: fructum fert Oliuæ mediocrius quantitate, cito & medicinæ propter suam adstringendi uim, idoneum. Nascitur syluestris Cornus pinguibus montanis locis: distinguitur etiam alio modo, siquidem altera mas, altera fœmina existit. Mas apud nos montibus familiaris, quinetiam in hortis seritur: statim ueris initio flores lutei coloris pro ducit. Fœmina etiam in plana descendit: florem in pallido candicantem serius emit, & serius fructum percoquit. Inuenitur fœmina Cornus, quam Græci θάλακτιαν uocant, plurima inter Danubii Vuerdam oppidum & Augustam Vindelicorum.

*Corni maris lignum est solidum, fœmine rariius. Cornum syluestrem aliqui interpretantur Saulholz/ Saulbaum: sed in alijs locis alios fructes aut arbusculas iisdem uominibus appellant.

DE SORBIS. CAP. 174.

† Alij Sporobien/
Species ling.
Sorbis torminalis.

Sorbanon sunt, ut quidam falsò credunt, syluestria mala, quorum antea ab hoc autore mentio facta est, suum enim propriū ab his genus habent. In Italia sei & omnia sunt cognita Sorbus arbor est. Fructus eius in una specie ouatus, in alia rotundus & globosus, in alia turbinatus est. Germani parum deflexo uocabulo & transpositis literis Sporöpfel & Sorböpfel ac Esbröpfeln uocāt. Nascuntur tum sponte in montanis quibusdam tractibus, tum etiam in uineis sata. Plinius Romana autem thoritate quartum statuit Sorbi genus, quod Torminale uocat. Constat hæc arbor, ut ipse refert, folio Platanij, & Pomo, si prioribus conferatur, minimo. Eam arborem Theophrastus ē Mespilorum genere esse putat, nec immerito, siquidem fructus & figura & sapore Mespilaceus existit: æmulatur etiam folio ueram Mespilum, nisi multo maius esset. Proprio autem nomine κράταυον eam Theophrastus appellat. Porro quantum nos iudicare possumus hæc torminalis Sorbus est, quam Germani Elschenbaum

Cratæus.

batum/ & cuius fructus Elæber nominant, quibus tanquam singulari & presenti remedio contra tormina utuntur, qui Hercynios montes accolunt rustici. Conueniunt historiæ, flores, fructus, eorum fauaceus & racemosus habitus quemadmodum & folia. Itaque neminem futurum arbitramur, qui huic nostræ contradicatur sit sententiæ.

† Nobis placet etiam quintum Sorbigenus his addere, quod Aucuparium cognominamus: quamuis merito quartum in numero esset, quoniam tota figura, foliis, & flore ueræ Sorbo tam similis sit, ut non facile à quouis dignosci queat, nisi pomo, quod omnium minimum & Piso maius est, colore rufum, gustu austerum, quemadmodum alia Sorba. Nostri aucupes fructu eius auibus inlidiantur, qui eos Vogelb: r. † nominant. Ruellius hanc arborem Ornum esse credit, ut ante etiam retulimus. Sed alia, ut præmonstrauimus, ab hac est Ornus.

†
Sorbus aucuparia
Ebera sch
†
Quintus
schelber
Stolberge.

DE PRUNO. CAP. 175.

Prunus arbor uaria habet genera: unde etiam fructus diuersa magnitudine, figura, & temperamento consistere necesse est. Sunt enim quædam aluum sistentia: sunt & soluentia, quæ uis facile gustu deprehendi potest. Quæcunque enim dulcia sunt, aluum soluunt: quæ uerò acerbæ & austere, eam cohibent. Damascena etiam pruna ad huc in Pharmacopoliis exiccata habentur. Quemadmodum etiam magna illa Hungarica, ab ipsis Hungaris Damascena, & à Germanis grosse Zwetschen & Vingerische Pflaumen uocata. Quidam his pro Damascenis utuntur. Pruna autem omnia generali uocabulo nobis Pflaumen nominantur. In Hestia quoque Praymen/ quæ uox à Prumno deducta uidetur. Nam sic Galenus syluestre Coccymeleā, hoc est, syluestrem prunum in Asia uocari testatur. Exiccata etiam pruna ad nos ex Hungaria, Bohemia, Austria, Transsylvania & Morauia afferuntur, quæ omnia communi uocabulo Zwetschen nominamus. Sunt & cerea pruna quæ Spilling Germanis dicuntur. † Brabyla quidam priuatim interpretantur Briecken.

Prumna.
Cerea pruna
Ba.

DE ARBUTO. CAP. 176.

Κόμαρος Græci arbutum uocant: in Germania nondum sponte natum conspeximus: non enim est syluestris Rosæ frutex, quem Cynosbatum esse antea diximus. Vera autem Arbutus in Italia nascitur, folio crasso, Laurini figura, crassiore tamen, minore & pro sua magnitudine latiore. Fructum fert mediocris siue parui pruni magnitudine: figura Fragi, intus similiter, ut fraga paleacea & acerosa grana habentem, gustu iniucundum. Respexit autem ad Arbuti & Fragi similitudinem quam inuicem habent. Ouidius cum ait: Arbutos fortis montanaq; Fragalegebant. Plura lege supra in Mespilo.

DE AMYGDALIS. CAP. 177.

Amygdala duplicis est differentiæ. Fert enim quædam dulces, quædam amaras nuces. Appellatur etiam alio nomine Græca nux Amygdalus. Cognita omnibus hæc est arbor apud nos, maxime qui Rhenum accolunt populis. Primas autem in Germaniam nascentibus tribuitur in Spirensi agro natis. Germani arborem ipsam Wandelbaum uocant. Fructus uerò Wandeln. Notæ autem omnibus hæc nuces sunt. Expriimitur ex utriusque nucibus oleum, quod in suos usus seruetur à Pharmacopolis.

DE PISTACIIS. CAP. 178.

Pistacia, uel ut Nicander uocat, Pistachia, quæ & iam Phisica † & uulgo in Pharmacopoliis Pistacia dicuntur, nuces sunt in Syria natæ, lento & ueluti osseo putamine munitæ, quæ eodē nomine adhuc ab omnibus medicis & Pharmacopolis cognoscuntur.

† Pistacia
uulgo.

DE IVGLANDIBVS. CAP. 179.

Nux regia siue Persica, uel simpliciter nux uocata notus omnibus est fructus, in procera & ramosa arbore nascens: quæ lata & odorata habet folia. Germani simpliciter Nuss siue Welsche Nuss uocant. Persica autem cognominatur, quoniam ex Perside primum in alias translata est regiones.

Ponticæ nuces quas alio nomine Græci *Λεπτοκάρυα* uocant, Latinis etiam Auellanae dicuntur. Sunt uerò duplicis differentiae: quædam sponte ubiq; in Corylo uulgari nascuntur, quæ à Germanis *Naselnuß* nominantur: quædam uerò in hortis sylvestribus Corylo simili, sed fructu oblongiore & toto ceu barbato putamine uestito: nucleus ruffa ut plurimum membrana cingitur. Plinius has nuces barbata in Xyli descriptione appellat. Est & tertium Auellanae genus in hortis satum, syluestri simile, sed maius nucleo, & gustu suauius. Quartum genus est, quod in Macedonia nascitur, arbore non quemadmodum apud nos multiplici, caudice fruticoso, sed singulari, procero, & iustam arborem æquante: foliis latis, nucibus in grandem racemum pingui magnitudine congestis. An autem ueteres hanc cognouerint, neq; negare neq; affirmare ausim. Certè apud eos qui nunc extant authores, nulla extat descriptio quæ eam referat. Inuenerunt autem hanc Corylum in Macedonia & Hæmo Thraciæ monte legati quidam à Buda Constantinopolim missi, inter quos fuit & Paulus Rubigallus qui hæc nobis retulit.

Morus omnibus nota est arbor, quæ Germanis *Waulberbaum* nominatur: fructus uerò, id est, Mora + *Waulber*. Nascuntur etiam in Rubo mora his quæ in arbore nascuntur similia, sed minora & sui generis. Nam Rubus multum à Moro arbore differt. Conficitur ex utriusq; mori succo medicamentum, quod *Diamoron* appellant, oris & faucium uiciis accommodatum. Porro duplicis est differentiae Morus: altera nigra, altera candida fert Mora: sed quæ candida fert, in Germania non ita frequens habetur.

Sycomorus, siue quod idem est Sycamirus, copiosè in Aegypto nascitur & aliis quibusdā locis: apud nos uerò incognita est arbor, quemadmodum etiam altera Sycomorus quæ in Cypro gignitur. Habetur in Italia planta multifidis & fissis foliis, in cuius summis furculis baccis simile pomū est, nucleo intus ligneo & anguloso: eam Sycomorum esse quidam Itali credunt: & nobis quidem eius missa sunt semina: quæ terra obruta singula quinas emiserunt plantas. Sed nihil minus est quàm Sycomorus: parua enim est, & fructus in extremis fert furculis: cum Sycomorus magnitudinis iustæ arbor sit, fructus suos non furculis, sed ipso caudice producens.

Ficus uulgaris est arbor, cuius fructus Ficus dicuntur Latinis, Græcis *σῦκα*, Germanis *Feygen*. Multæ Ficuum apud ueteres sunt differentiae. Hodie tantum tres in hæc regionibus nouimus. Afferuntur enim flauæ quædam in sparteis corbibus compactæ, quas Germani *Korbseygen* nominant. Aliæ etiam in cistis laurinis foliis commixta ad nos ueniunt, quas à foliis *Laubseygen* nominamus. Tertium uerò genus ex Massiliensi Prouincia affertur, minutis & turbinatis sparteis corbibus inclusum: hæ parua quidem sunt, sed suauitate præstantes: Germanis *Warstlische Feygen* uocantur. Quidam etiam Caricas siccatas Ficus nominant, quam uocem Virgilius Marcellus malè in Dioscoridis contextum posuit: habent enim Caricae ficus suum peculiare genus, ut ex Plinio colligimus: & Hermolaus Barbarus in corollario huius capitis testatur.

Est & syluestris Ficus, quam Græci *Ερινός*, Latini Caprificum appellant, Germaniæ incognita: Romæ frequens prouenit, in uetustotum ædificiorum ruinis & muris.

ὀλωδοί, quos Latini Grossos & Grossulos uocant, Caprifici fructus sunt, Ficis multo minores.

DE LIXIVIA E CREMATIS FICI RAMIS. CAP. 187.

Fic Lixivia macerato in aqua utriusq; Fici cinere, quæ admodum acris existit. No-
stri medici perquam rarò ea utuntur.

DE PERSEÆ ARBORE. CAP. 188.

Perseæ arbor plurimum differt à malo Persica vulgari, quamvis & ipsa Persica uo-
cetur, & utraq; ex Perside in alias regiones translata sit, tamen Persica etiam Septen-
trionalibus plagis cito & ante frigoræ fructum suum percoquit. Perseæ uerò etiam in
Rhodo calida regione, ad florem tantum peruenire potuit, ut auctores tradunt. Qui
uerò plura de Perseæ legere uoluerint, Theophrastum consulant, qui historiam eius
diligenter absoluit.

LIBRI PRIMI CONCLUSIO.

Primum hunc Dioscoridis librum Perseæ caput claudit: quamvis in quibusdam
exemplaribus etiam aliquot herbæ sequantur, ut Iberis & Halicacabus, ab imperiti-
ribus adiectæ. Nam Iberis idem est cum Lepidio, quod in secundo libro describitur.
In capite etiam Halicacabi, quod Hiberida sequitur, tres herbæ confusæ sunt, ut Ha-
licacabus, Solanum somnificum & Dorycnium. Propterea hæc capita imposita
sunt & non genuina.

VALERII CORDI SI-
mesusij, in Pedacij Dioscoridis
ANAZARBEI SECVNDVM DE ME-
dica materia Librum, Annotationes.

Libri secundi partes sunt tres. Prima, De animalibus, & eorum partibus.

Secunda, De Frumentaceis.

Tertia, De Oleribus & condimentarijs herbis.

IN PRÆFATIVNCVLAM; QUAM DIOSCORIDES SECVNDO LIBRO
præponit, Annotatio.



NUMERAT AVTHOR QVO ORDINE RES IN PRIMO LI-
bro descripserit, & quo in hoc secundo libro pergere uelit or-
dine. Nullam autem mentionem facit quod Herbacea quæ-
dam & acrimoniam habentia præter aromata in primo libro
recensuerit. In secundo uero se de Oleribus & acrimoniam
habentibus herbis scripturum pollicetur. Cum ergo Iberis
oleracea sit & acrimoniam habens herba, ut in secundo libro
describatur necesse est. Nihil enim commune habet cum ar-
boribus, quare inter has describi debeat. Sed ne quis à dictio-
ne, acrimonia, causam cauillandi arripiat, necesse est ut indicemus, qualem acrimoniam
cum Dioscoride hoc loco intelligamus, ne quis nobis hac ratione persuadeat, bene
describi in primo libro Iberida, cum multa alia acrimoniam habentia in eodem recen-
seantur: ut Acorus, Meon, Cinamonium, Costus, & alia quædam manifestam resi-
pientia acrimoniam. Verum ad hanc obiectionem respondemus, Dioscoridē de hu-
iusmodi acrimonia, quam prædicta aromata habent, hoc loco non locutum esse, non
enim eadem omnibus plantis est acrimonia: quædam enim solam eam habent, adiu-
cta interduinamaritudine, dulcedine, & quibusdam aliis saporum differentiis. Talia
E ij

autem sunt Allium, Ceba, Sinapi, Nasturtium, Eruca, Lepidium siue Iberis, & quæcunque his similem præferunt gustu qualitatem. Hæc simpliciter acria dicuntur: suntque omnia ista oleracea herbae: de his autem in secundo se scripturum dicit. Longè uerò aliam acrimoniam habent, Acorus, Costus, & reliqua quæ in primo describuntur. Non enim eam in terrestri habent corpore ut exulcerare ualeant, quemadmodum illa oleracea: sed omnia præter lenem & gratam acridinem, etiam partium tenuitate constant, quæ facile per corpus penetrare possunt: non enim sui saporis & facultatis uim uni loco imprimunt, nec eidem distus inhaerent, propterea exulcerare minimè sunt apta. Partium etiam subtilitate gratum & iucundum odorem coniunctum habent: & quæ talia sunt, aromata dicuntur. Differunt tamen hæc ipsa secundum diuersorum elementorum diuersam mixturam: quare facultatem etiam eorum diuersam esse necesse est. Hinc est quod Costus fere solus ex aromatis ruborem cuti impositus excitet, quoniam suam acrimoniam magis in terrea substantia quam cætera aromata habeat. Porro quamuis Piper atque Zinziber etiam aromatis adscribantur, tamen quia horum maior in culinâ quam medicina usus sit, maluit ea acrimoniam habentibus & olerum condimentis, quam aromatis adscribere Dioscorides, & bene quidem, cum hæc duo inter omnia aromata plurimum acrimonie & parum aromaticæ qualitatibus habeant. Siquis igitur hæc probè intellexit, facile iudicabit Iberida non primo, sed secundo libro, describi debere. Simile etiam de Halicacabo intelligendum est, quæ non arbor sed herba est, & ad deleteria refertur. Quare in primū librum non erat ponenda, sed in quartum, ubi ex professo de ea in deleteriis & frigidis simplicibus agit. Antea enim promissit se forma & facultate cognata coniuncturum.

DE MARINO ERINACEO. CAP. 1.

Ερίνον θαλάσσιον, quem Latini Erinaceum marinum, Germani ein Meerjgel uocant, nouerunt qui maritimis locis habitant. Terrestri similis est, rotundior, minor, & breuioribus aculeis circumuallatur.

DE TERRESTRI ERINACEO. CAP. 2.

Ex terrestrium Erinaceorum genere etiam Hystrix est: quod animal Africa & India gignit, magnitudine semestris porci, pedibus urinis similibus: dentibus, & labiis lepori, sed his crassioribus, pinguioribus & fuscis, longis & in ceruice erectis setis, à collo usque ad scapulas uestitum. Cætera, præter uentrem, pedes longioribus, candicantibus, & nigro distinctis, aculeis munitum, quos irritatum contra lacessentes uallimodo prætendit, & nonnunquam ei aculeatur tanto impetu, ut sagittarum modo parietibus affixi hæcant: talis est Hystrici forma & natura. Circumferunt Hystrices, Mimi & circulatores, inter alia, quæ lucris causa oppidatim circumducunt. Habet etiam præter eas quas recensuimus alias proprietates, quas breuitatis causa præterimus. Non enim huius instituti est, exactam omnium rerum historiam scribere. Hystricem Hispani Porcapie, Germani ein Stachelsau uocant, quasi aculeatum porcum. De hoc autem Erinaceorum genere hic non scribit Dioscorides, sed de minoribus, qui in tumulorum cauernis latitant: quorum Germani duplicem statuunt differentiam. Est enim alter, cui caninum sit caput: alter, cui suillum: hunc nos Schweinejgel: illum uerò Hundejgel à capitum similitudine uocamus. Porro apud nos Erinaceorum nullus est, neque in sanitate neque in medicina usus.

DE HIPPOCAMPO. CAP. 3.

Nomen hoc grandem Erucam (insectum uidelicet) significat, cum tamen paruum sit animal in mari uiuens. Quoniam uerò uulgaribus Erucis grandibus simile sit, nomen suum inuenit, Nobis in continenti habitantibus incognitum est.

PURPURAE. CAP. 4.

BYCCINA. CAP. 5.

CIONIA, id est, Purpurarum & Buccinorum mediae partes. CAP. 6.

DE MITVLIS, TELLINIS, HIATVLIS. CAP. 7. 8. 9.

Μύαες, Τελίνας & Χήμας omnes Concharum species sunt, sed singulas suis nominibus non facile quis indicabit. Referuntur etiam ad hoc genus quæ ex Hispania à Sancto Iacobo feruntur Conchæ. Item illæ ex quibus in maritima Germania calx uritur:

DE CONCHVLA INDICA. CAP. 10.

Indica conchula oblongi unguis formam habet, quapropter à Græcis ὀνύφ appellata est. Plures hæc differentias habet; quarum uilissima hodie in Pharmacopoliis habetur sub Blaccæ Bizantiæ nomine. Erat olim in Thymiamatū cōfectionibus huius Conchulæ frequens usus, ut etiam sacræ literæ testantur.

DE TERRESTRIBVS COCHLEIS. CAP. 11.

Cochlearum quas aliqui Límaces uocant, quædam terrestres, quædam marinæ, & quædam fluuiatiles sunt. Omnes Germanicè *Schnecken* nominantur. Singulorum autem generum multiplex differentia existit, quare ex magitudine & formæ diuersitate dignosci facile possunt: in quibusdam regionibus terrestres & marinæ eduntur. Quæ uerò ex terrestribus, fruticibus adherent, priuatim *Σείριδοι* à Græcis uocantur. Fluuiatiles uirius habent, quapropter à nullis eduntur. Quod si quis fluuiatiles Conchas manu aliquandiu clausas teneat, uehementem Vrticæ modo excitabūt pruritum, quod quidem nos in paruis experti sumus. Sunt etiam Limaces, qui Conchis siue testis carent, colore nigri aut ruffi, herbosis hortorum & sylvarum locis gaminē uiuentes, quos Germani *Schneegel* appellant.

DE CÂNCRIS. CAP. 12.

Noti sunt omnibus fluuiatiles Cancrī, de quibus hic agit Dioscorides, ideoquæ non est operæ precium longius de iis differere. Marini uerò, quamuis & ipsi ad mare habitantibus cogniti sint, difficile suis nominibus, quæ quidem apud Aristotelem & Plinium extant, indicari possunt. Nos ne omnino rem intactam prætereamus, nostrū iudicium de uno atquæ altero effereimus. Qui propriè Marini appellantur Cancrī, fluuiatilibus dissimiles sunt, exceptis Chelis & pedibus: caudam enim nō habent: & corpus non oblongum ut fluuiatiles, sed rotundum. Horum apud Græcos præcipua genera *μύαες, πάγγοι & ἰσθακλωτικοί*. Maximi autem eorum, ut Aristoteles tradit, sunt *μύαες*: quos etiam Plinius Masas uocat. Itali Granceporos & Granceualos: Germani *Meer-spinen*; hoc est, marinas araneas appellant, quoniam rotundo corporis habitu, & pedibus in orbem ferè exeuntibus, Aranei similitudinem referant. Hi ab Italis alio etiam modo distinguuntur: dura testa præditos, Masaneccos; molli uerò, Molleccos uocantibus. Quæ quidem differentia temporī referenda est: eiusdē enim sunt generis Masanecci & Mollecci: sed Mollecci dicuntur qui deposita ueteri testa nouam; tenuem & mollem induerunt: Masanecci, qui eam nondum deposuerunt, & teneram nondum induerunt. Inueniuntur tamen quibus cæteris duriorem testam natura dedit, ita etiam hic robore & corporis magnitudine quoscunquæ alios Cancros superat. Nam inuenitur sæpe cubitali & bipédali longitudine, idquæ in nostro mari: nec dubito alibi etiam maiores capi. Qui autem *κράββοι* dicuntur Græcis, rectè meo quidē iudicio, Locustas in Aristotele uertit Theodorus: omnia enim quæ Carabīs tribuit Aristoteles, Locustæ habent. Germani Græco uocabulo parum corrupto *Crabben* appellant. Locustæ autem Latinis dictæ nobis uidentur: quoniam saltu

terrestres Locustas æmulantur. Perro καρίδες dictæ sunt, quas Latini Squillas nominant, nostro etiam mari familiares.

DE TERRESTRI SCORPIONE. CAP. 13.

Terrestres Scorpiones in Germaniæ calidioribus locis gignuntur quidē, sed admodum pauci. In Italia uerò & similibus regionibus magna illorum copia est: nos tutius eorum frequentia caremus. Macerantur in oleo, additis quibusdam aliis: quod olei Scorpionum nomine in Pharmacopoliis seruatur.

MARINVS SCORPIO. CAP. 14.

DRACO MARINVS. CAP. 15.

DE SCOLOPENDRA MARINA. CAP. 16.

Marinam Scolopendram an uerum studiosi uel piscatores cognoscant, nondum *Terrestris.* comperi. Terrestris uerò Scolopendra, sine dubio est utrinque (triemis modo) multis pedibus ingrediens insectum, colore spadiceum, minimi digiti longitudine: quod noctu cum in humido pavimento repit, ut cicindela lucet, non tantum adhuc uiuum & integrum, uerum etiam in partes minimas comminutum, modo uiua dissecetur: Idem si digitis attrectetur, pruritus, ut marina Scolopendra excitat. Germani eius Ossei siue ʒʒossi nominant. Inuenitur in humidis domorum partibus, nonnunquam etiam hortorum areis & æstate siccatis paludibus.

† Scolopendræ terrestres si in domo sint, ad puluerem Sacchari Thomæ congregantur.

TORPEDO. CAP. 17.

DE VIPERÆ CARNIBVS. CAP. 18.

* *viperas quidam Brande= schlangē esse putat.* Vipera qualis sit serpens, & quibus à reliquis serpentium generibus differat, diligenter Nicander, Aristoteles, Galenus, & Aëtius scripserunt: nihilominus tamen eo ignorantiae peruenimus, ut multis sæculis ignota fuerit. Nicolaus uerò Leonicienus solidæ doctrinæ uir, constanter affirmat in Italia frequentes esse, & uulgo Marassos siue Scurziones appellari. Nobis uerò hætenus eas in Germania uidere non licuit. Carnes eius coctæ in pastillos conformantur, qui in Andromachi Theriacam ingrediuntur.

DE SENECTA ANGVIVM. CAP. 19.

Pulchra est apud Nicandrum de anguina senecta fabula. Est autē anguina senecta, siue, ut Plinius nominat, uernatio, serpentium exterior similis membranæ cutis, quam primo uere lapidū uel fruticū angustis exuunt. Germani Schlangenhaut appellant.

DE VTROQUE LEPORE. CAP. 20. 21.

Duplex leporum genus inuenitur: alterum in terra syluas incolit: alterum uerò in mari uiuit. Hic an cognitus sit, neque affirmare neque negare audemus. Terrestis uerò omnibus est notissimus, cuius coagulum aduersus uenena medicinam facit. At totus, nulla dempta particula, in cinerem crematus, calculos frangere dicitur.

DE PASTINACA MARINA. CAP. 22.

Τρυγών, hoc est, Pastinacam marinam Otho Brunfelsius esse credit latum illum piscem, quem nos ein ʒochen uocamus: sed cum hic Raia sit, alius est circumspectendus cui Pastinacæ nomē imponamus. Talis autem est quæ Germanis ein schwarzer ʒochen, hoc est, Nigra Raia, uocatur. Raia figura non admodum dissimilis est, nigrior & longiore cauda conspicuus.

† Querendum de hoc nomine diligentius: dubitari enim potest, cum radij non meminerit.

Germanicē
Blackfish
fiscus.
† ceu pueri
tudo.

DE SEPIA. CAP. 23.

Sepia à putredine habet nomen. Est autem Marinus piscis, sanguine atro ceu putrido pleno, qui à quibusdam Sepiæ atramentum dicitur. Germani Blackfish, quasi

quasi atramentarium piscem nominant. Habet Sepia in dorso spine loco, longum, satum & candidum os, quod facile in puluerem friatur: eo Aurifabri ad annulorum fusuram, Medici uero ad dentificia utuntur. Vocat id nostri *Sisydium*, estque omni bus cognitum.

DE MVLLO PISCE. CAP. 24.

Mullus quibusdam esse creditur, quem Barbum & Barbionem uocamus, quoniam Barbam habet, quæ Mullo tribuitur. Cum uero Mulli in mari uiuant, & in uiuariis piscinisque non crescant, (ut Plinius ait) hoc ipsum non affirmamus. Non tamen inepte quis Barbionem, fluuiatilem Mullum appellabit.

DE HIPPOPOTAMI TESTICVLIS. CAP. 25.

Hippopotamus in magnis fluuiis & calidis regionibus uiuit, qualis in Aegypto Nilusest. Hodie Caballus marinus, siue Aquaticus uocatur ab his qui Aphricam terra marique perlustrarunt. Est autem equo, dorso, iuba, et hinnitu similis: unde & nomen inuenit. Eius testes, quemadmodum & fibri, contra uenena medicinam faciunt. Apud nos uero in pharmacopoliis non habentur.

DE FIBRORVM TESTICVLIS. CAP. 26.

Κέρας Græcis, Fiber Latinis, uocatur animal anceps, in terra & aquis degens, quod Germani cū *Biber* nominant: Castoreum uero *Bibergeylen* hoc est, fibrinos testes. Vbiq; cognitum animal est, eiusque testiculi frequentem usum habent.

DE MVSTELA DOMESTICA. CAP. 27.

Γαλή Græcis, Mustela Latinis uocatur, quadrupes animal, quod nos *ein Wisel* nominamus. Cuius duo genera quidam faciunt. Sunt enim syluestres quædam: & quædam in domibus nostris habitantes, Gallinis infestæ, maxime hæ, quas *irridies* Græci dicunt. Hæ procul dubio sunt, quæ in rusticis ædibus & uillis oberrantes Gallinis insidiantur, a nobis *Jltes* nominantur, non multum a Græco abrudente uocabulo.

DE RANIS. CAP. 28.

Ranæ omnibus notissimæ sunt. Hoc autem loco de uiridibus & uocalibus sermo habetur, quæ edendo sunt & in fluuiis & stagnis uiuunt. Reliqua enim genera uenenosa, ut *ὀφύων*: quæ Aristoteles *ὀφύων* appellat, Latini rubetæ, Germani cū *Brotte*. Et muta uulgaris Rana, in herbosis hortorum locis uiuens, colore pallida. Atque muta palustris Rana, Rubetæ similis, sed minor: Buffo recentioribus Latinis, Germanis cū *Pfille* et *otte* uocata, hoc est, Rubeta palustris. Hæc autem quamuis muta cognominetur, uocalis tamen est, sed breuem, tristem, & minime canoram aut argutam aliarum modo edit uocem, ideoque mutam appellant. In fine uero huius capituli alias uirides Ranas intelligit, quas Græci *βελίαντας* & *καλαμίτας*, Germani *Laubfrosche* uocant, ut ex Galeno indicare possumus, qui de simplicium facultatibus libro decimo de sanguine harum idem scribit quod Dioscorides. Cum uero aliquando harum sanguini descriptas uires experiri uellet, facto periculo, deprehendit eas promissum non præstare.

DE SILURO. CAP. 29.

Qualis sit Silurus piscis hodie non certò doctis constat. Idque ideo, quoniam nulla extat ne apud Aristotelem quidem, quæ figuram eius indicet historia. Plinius alibi Nilo familiarem dicit alibi Mœno, Germaniæ amni, in quo præcipue grassetur, etiam innarates equos sepe demergens prope Lisboum. Difficile igitur est hunc indicare. Tradit tamen auctores maximè esse omnium fluuiatilium piscium, & Thynnos etiam equare qui marini sunt. In nostris autem fluminibus Hauso, Sturio, & quem patralingua *Wels* uocamus. Sed Hauso Germanis dictus (quod sciam) nō nisi in Danubio apud nos capitur, in quem è Ponto meat. Non temere ergo quis opinetur aliter: rursum è reliquis duobus Silurū esse. Nam Mœnus quoque, ut Plinius refert, Siluros habet, in quo scimus nunquam maiores capi aut cerni pisces quam sturiones & *Wels* ipse, idque raro. Nō enim utique adeo profundus est amnis, præterquam qua Rheno misce

tur ē regione Moguntiaci. Certe ferociam & lasciuiam, quæ Siluro tribuitur, in stirione omnes nouerunt piscatores. †

† *Gesperus Vucifum uulgo dictum piscem, omnino Silurum esse, in Aquatiliū historia monstrat.*

SMARIS. CAP. 30.

MAENA. CAP. 31.

GOBIVS. CAP. 32.

DE THYNNO ET OMOTARICHO. CAP. 33.

Θυγγός, hoc est, crudum falsamentum falsa Thynni caro est: quæ aliis ueteribus simpliciter τήγγος, hoc est falsamentū uocatur. Qualis autē sit Thynnus piscis, doctis non constat: marinum esse certum & quidem grandem. Tradunt Aristoteles et Plinius, Thynnos Pontū uerno tēpore gregatim intrare, nec alibi fœtificare. Quæ cōiectura colligimus eos dulci aqua delectari. Pontus enim est reliquo mari dulcior, quoniam in eum maximus fluuiorum numerus se exoneret. Quo fit ut suspicemur † Thynnum esse quem Germani etn Hausen appellant in Danubio, quem aduersus ē Ponto petit dulcedine aquarum allectus. Nolumus tamē quidquam certi affirmare. Nouimus enim probē Plinium, ubi maximos omnium pisces recenset Danubio etiā Marionem tribuere (si modo integer locus est) qui fortasse idem cum Thynno esse poterit: sed hoc statuere ualde ambiguum est, cum multi sint cetacei in Danubio pisces præter Hausonem, qui ē Ponto in eum ascendant.

† Fallitur. Nam Huso uulgo dictus, Antaceorum seu Oxyrhynchorum generis est.

DE GARO. CAP. 34.

* Germanis
Lan-
cæ.

Garum Latini pariter ut Græci, appellant salforum piscium succum, sale & pisciū sanguine constantem. Expetebantur autem ad confectionem eius præcipue exta & uiscera, quæ aliās abiicienda erant. Nomen uero inuenitā Garo pisco, ē quo primū coepit fieri. Purissima & clarissima Gari pars liquamen uocabatur. Turbida uerò, crassa & feculenta Halex, à sale, ut nos credimus, in fundo cophinorum subsidentē. Erant autem multæ Gari differentiæ, ut uolentes apud Plinium & Barbarum inquirere possunt, nobis satis est quid sit in dicasse. Porro ijs nequaquam adhibenda fides est, qui Gelatum, & aromatis præsertim croco conditum recentium piscium ius, Garum esse contendunt: recentiores etiam Muriam appellant, sed malē. Et si enim falsi Thynni liquorem ita appelleret Barbarus, fretus obscuro quodam Plinii testimonio, omnes tamen probati auctorēs cum medici, tum rei rusticæ scriptores, rem longē aliam à Garo Muria uocabulo intelligunt, quemadmodum & ipse Plinius, ut suo loco indicabimus. Nos qui exquisito hoc Garo caremus, eius loco Haringorum Garo uti poterimus. Quamuis autem omnes alii piscium salforum liquorem hoc nomine appellent: Dioscorides tamen ad carnes etiam transtulit non impropriē, ut nobis uideatur, cum ex carnibus etiam falsamenta fiant, qui mos etiam apud nos uetus est.

DE RECENTIVM PISCIVM IVSCVLO, CAP. 35.

Iusculum hoc, ut ipse Dioscorides hoc capite ait, sit ē recentioribus saxatilibus piscibus cum aqua, sale, Oleo & Anetho coctis. Ita enim Græci præparabant. Nostri uero alio modo, eoq; multiplici, parant. Porro quos recenset Saxatiles pisces Dioscorides quales sint, & quibus nominibus nunc cognoscantur, ingenue fatemur nos cum multis eruditis ignorare. Percas tamen seu Percides solas ex hiis cognitās habemus. Earum plures in annibus nostris & lacubus differentiæ, sed omnes generali uocabulo *Perfæten* Germanis nominantur.

DE CIMICIBVS. CAP. 36.

Cimices, Græci Κόπρε, Germani Wanzen/ siue Wandlense/ hoc est, parietinos pediculos, uocant. Notum omnibus & inuisum fœtore suo animalculum est. Barbarus hic lectorum cimices dici putat, ad differentiam syluestrium in Malua nascentium.

Sunt

Sunt autem quos Barbarus sylvestres Cimices appellat proprio nomine Buprestides dicta insecta, ut paulò post referemus, figura & scetoris fastidio Cimicibus similia.

DE MULTIPEDIBVS. CAP. 37.

Multipedes, Græci *καβαπίδες*, ὄντες & ὀνίοντες, Germani *Eselchen*: Italinum Porcelliones uocāt. Parua sunt animalcula, colore liuido ceu asini, unde etiā nomē: multisq; pedibus ingrediuntur. Inueniuntur in humidis muris, sub lapidibus & aquariis uasisbus. Atqui Scolopendra etiam Latinis centipes & multipes interdum uocatur. Videndum igitur ne synonymis decepti, res natura diuersas confundamus.

DE BLATTIS. CAP. 38.

Blatta Græcis, Latinis *Blatta* uocatur, insectum ex Scarabæorum genere, quod à Germanis *cin Diotsefer* & *Wältefer* appellatur. Circa furnos & cistas quibus farina reponitur, uiuens. Eius plura sunt genera, magnitudine, figura & aliis proprietatibus quibusdam dignoscenda. Vnum est quod ante paucos annos Nurenbergæ apparere cœpit. Nurenbergenses *Schwaben* uocant, hoc est, sueuos, quoniam ab hac gente in eam urbem allatum credatur. Est & aliud genus ex acuta clune & odoris terdio inuisum. Frequens hoc in cubiculis tenebrosis, non in sublime, sed in terra constructis, et libero aërenò perflatis. Altis hoc pedibus, lentoq; graditur incessu. Ottho Brunfelsius ratur est, Blattas esse uocales illos & totas noctes circa fornaces in æstuariis & focos dormienti familiæ obstreperentes Gryllos, quos Germani *Heimen* & *Heim* pariter Latinis, *Grillen* appellant, sed hi suum genus à Blattis diuersum habent.

DE MARINO PVLNONE. CAP. 39.

Marinus Pulmo ex eorum est genere, quæ Græci *ζωόφυτα* uocant. Est autem partim pulmōni, partim spongiæ similis. Exiccatus contrahitur, aquæ uerò immerfus mirum in modum intumescit. Affertur interdū ad nos cum spongiis. An uero in nostro quoque mari nascatur, nondum comperimus.

SVILLVS, AGNINVS, VRSINVSQVE PVLMONES. CAP. 40.

DE VVLPINO PVLNONE. CAP. 41.

Vulpinus Pulmo in omnibus pharmacopoliis repositus, seruatur ad humani pulmonis uicia. Fit ex eo Eclegma, uulgo *lohoch* de pulmone uulpis dictum, ad eadem utile.

DE IOCINORIBVS. CAP. 42. 47. 48. 49. 50.

Asininum, Aprinum, Hircinum, canis rabidi & Mergii iocinora, de quibus deinceps diuisis capitibus in quibusdam exemplaribus agit Dioscorides, nullum hodie in medicina usum habent. Vulpinum uero hepar, in omnibus pharmacopoliis reponitur, hepatis humani infirmitatibus quibusdam expetitur.

DE MARIS CERVI GENITALI. CAP. 43.

Cervi genitale uulgo in pharmacopoliis medicinæ gratia non seruatur. Principes uero quidam, nobiles, & uenatores, id tanquam singulare medicamentum aduersus pestem, morbum comitalem & ad excitandam emortuam uenerem, repositum custodiunt.

DE ASINI CAPRARVMQVE VNGVLIS. CAP. 44.

Nota sunt hæc animalia eorumq; ungulæ, de quibus hoc loco Dioscoridi sermo est. Vtuntur iisdem suffitis nonnulli contra muliebrum locorum strangulationem.

DE EQVORVM LICHENIBVS. CAP. 45.

Lichen, sive ut Latini uocāt *impetigo*, in superfice cutis serpēs exulceratio est, quæ à Germanis *Slechten* dicitur. Simile his in equorum cruribus infra genua nascuntur lichenes,

lichenes, qui calli speciem & duriciem habeant, & odore uirosi sentiantur, quos non nulli equites Gallen appellant. Eos etiam ueteres ad Medicinam recipere non dedignati sunt,

VNGVLAE CAPRINAE. CAP. 46.

DE VETERVM CALCEAMENTORVM CORIO. CAP. 47.

Calceamentorum ueteri Corio & soleis in cinerem uitis uulgus quoque adhuc, contra intertrigines & humentes infantium in feminibus exulcerationes utitur.

GALLINACEI CAP. 48.

DE OVIS. CAP. 49.

Ouorum diuersa genera quemadmodum & auium inueniuntur. Hoc tamen loco Gallinarum oua intelligenda sunt, quibus quotidie in sanitatem, & pariter in aduersa ualitudine uestuntur homines.

CANDIDVM OVL. CAP. 50.

DE CICADIS. CAP. 51.

Cicadae in Germania non nisi calidissimis regionibus reperiuntur, praesertim in superiori Pannonia, sed non frequentes. Nequaquam enim sunt in saeco salientia insecta, quae Germani *Heuschrecken* uocant. In Italia uero Cicadarum magna est frequentia. Germani eas *Baumzigen* & *Hauerbocke* / iocularibus nominibus appellant, quasi arboreas capras & Auenarios capros, quae nomina illis a militibus nostris qui in Italia res gesserunt sunt indita.

DE LOCUSTIS. CAP. 52.

Quoniam autem aliquam similitudinem cum Cicadis Locustae habeant, has illis statim subiungit. Sunt autem diuersa Locustarum genera. Vulgares illae, quae multiplicem habent differentiam, Germani *Heuschrecken* uocantur, quoniam per saeculum ambulantes repente ac improviso saltu terreant. Sunt & peregrinae nobis in Africa & Oriente, quibus diuersae gentes uestuntur: haec gregatim sublatae, diuinitus ultrices scelerum nostrorum poene, in varias orbis partes feruntur tanta frequentia, ut solem arceant & totas regiones cum se demiserint, obtegant, uirentem segetem, & quidquid tenerum & herbaceum, depascentes. Venerunt hoc autumno etiam ad nos in Germaniam: quod ideo referimus, quoniam antea inauditum & nulla historia traditum fuit. Suntque haec nostratibus multo maiores, formaque & habitu insolentiores: alasque plures & latas habent, quibus non ex intervallo ceu salientes uolant, sed continue aliarum auium instar per aera feruntur. Quotquot autem in Germaniam uenerant, pruinis oppressae perierunt, magna putredine & foetore regiones inficientes. Metuebant agricolae ueris initio multo numerosiorem sobolem ipsos parentes secuturam, sed sine causa, gelu enim siderata earum oua impossibile fuit adulescere.

DE OSSIFRAGO AVE. CAP. 53.

ὄρνις, Romanis ossifragus & ossifraga uocatur. Est autem ex Aquilarum genere, quo autem nomine Germanis appelletur, & an in Germania reperiatur, nondum comperimus.

DE GALERITA AVICULA. CAP. 54.

καρὺδαλος Graeci, Latini Galeritam & Gallico uocabulo etiam alauidam auiculam dicunt, quam Germani ein Lerche nominant. Eius non unum est genus, sed plura. Quaedam in Ericetis, quaedam in agris uiuunt. Aucupes suis nominibus ea diligenter distinguunt. Nam Sancti lecher uocant Canoras illas ex agris in caelum euolantes. *Deyderchen* / quae in Ericetis agunt, non ita uocales & canoras.

DE HIRVNDINE. CAP. 55.

Hirundinum species omnibus cognitae sunt. Germani eas *Schwalben* uocant, generali

generalī omnes uocabulo. Sunt urbanæ in domibus nidificantes, sunt Murariæ & Littorales, quæ ripas et cliuos excauant. Quædam etiam Apodes dicuntur, breuibus admodum pedibus, quibus neque ingredi, neque attollere se ualent; itaque sine pedibus creduntur. Sunt hæ nigriores reliquis & torosiores. Eædem uenenosæ à quibusdam creduntur.

DE EBORE. CAP. 61.

Soli Elephantorum dentes Ebur sunt. Fuit hoc omnibus sæculis preciosissimum. Hodie uero non raro Marinarum quarundam belluarum dentes pro Ebo restenduntur: sed facile fraudem ostendit rarior & fungosior materia, cum Ebori quo (unde pectines & alia quædam delicatiora opera) densior & compactior, atque ueluti * remulata sit. Germani Ebur Delfsenbein / hoc est, Elephantī ossa appellant.

DE SVIS TALO. CAP. 62.

Talos os est in iunctura pedum, quod Germani ein Rôte uocant. Non tamen quæuis animalia Talos habent, sed bisulca tantum.

DE CERVICORNU. CAP. 63.

Ceruorum cornua omnibus nota sunt. Plurimum tamen refert (ut credunt) quo tempore Ceruis decidunt aut reponantur, si iis in medicina uti uoluerimus. Habent autem multas & efficaces in medicina uires: & præstaret eo potius contra uenena uti, quàm ostentoso unicornis Indici cornu, quod nunquam uerum uulgo habetur. Vna est in Germania Respub. quæ integrum habet. Fertur & Venetos duo in Theauris suis habere.

DE ERVCIS. CAP. 64.

Erucae nomen insecto & oleri commune est. Hoc autem loco de herbas erodentibus Erucis sermo habetur, quæ Germanis Raupen uocantur.

DE CANTHARIDIBVS, BUPRESTIBVS, ET PICEARVM

ERVCS. CAP. 65. 66.

Κανθαρίδι Græcis Scarabæum significat: unde diminutiua forma κανθαρίδιος dicuntur, parui & in uiridi aurei coloris & oblongi Scarabæi, qui Germanis Golt Eßer appellantur, quorum adhuc est in medicina usus: frequenter hæ in fraxino & ligustro apud nos reperiuntur, nam harum foliorum pascu mirum in modum alliciuntur. Sunt autem fœdi odoris insecta. Pinerucae uero, quæ Græcis πιτρικαίαι dicuntur, Erucæ sunt in Pino genitæ, quarum hodie nullus est usus. Βύπρεστις uero sine dubio est ueluti syluestris cimex, qui Germanis ein Qualster uocatur, quo deuorato boues rumpuntur: unde & nomen illi à Græcis factum est. Formam hoc animal Scarabæo cuidam paruulo, sed multo magis Cimici similem habet, altis ingreditur pedibus, & fetore ipsos Cimices superat: qui etiam frondes & fructus inficit, si quando per eos repserit. †

† Buprestis etiam est herbe genus, nostra Berentflaw / ut quidam putant.

DE SALAMANDRA. CAP. 67.

Salamandra reuera est pigrum illud & ignauum lacertarum genus, quod Germani ein Molch siue ein Olm uocant. Multis hoc demonstrari argumentis posset, nisi breues annotationes & non integram rerum historiam scriberemus. Viuit umbratilis in fœcis & roscidis conuallibus, solo pingui, præsertim circa fontes, color illi uariis, luteis & nigris maculis distinctus, cum irritatur lacteum uirus sudat, *

DE ARANEIS. CAP. 68.

Αραχνῆ, hoc est, Araneorum multa sunt genera, cum uerò qui retia ad capiendas Muscas prætendit Αραχνης, id est, Venatorem Græci uocant. Aliud genus sunt qui non ita artificilabore rudes telas in domibus texunt. Germani omnes Araneos generali

† Μόλχη, Græci, quod cum Germanico conuenit. * Sues eis libenter uiscuntur.

ANNOTAT. VALERII CORDI

generali uocabulo *Spinnet* uocant. Græci etiam Phalangia interdum Araneos uocant, quamuis præter Araneos etiam diuersum Phalangiorum genus reperiatur, La certis paruis potius, quam Araneis, simile, quod † Tarantula ab Italis uocatur.

† Tarantule nomen ab alijs in Italia stellioni tribuitur, ab alijs Phalangio. Cordus diuersa animalia confundere ui detur.

DE LACERTA. CAP. 69.

Σάυρα Romani Lacertum, & Lacertam: Germani † *Heideren* uocant: notus om nibus repens in terra quadrupes serpens est, colore ut plurimum uiridi.

DE CHALCIDICA LACERTA, SEV SEPE. CAP. 70.

Chalcidicam lacertam siue sepem Nicander & Dioscorides lacertis similem esse di cunt. Seps autem à putrefaciendo dictus est, putrescit enim saniemq; olidam emittit il lius morfu factum uulnus. Chalcidice uero nomē habet quod non uiridis sit, ut cete ræ lacertę sed græi coloris. Est etiam aliud serpentū genus quod similiter seps uoca tur, sine pedibus, uiperę simile, cuius Aëtius meminit, diuersum penitus à Chalcidia ca lacerta.

DE SCINCO. CAP. 71.

Scincus terrestris crocodili genus est, magnitudine lacertę, quo multis annis carui mus. Sed iam quorundam diligentia factum est, ut rursus ex Aegypto ad nos perfe ratur. Pharmacopolæ quos materialistas uocant, paruas quasdam aquatiles lacertas Salamandris similes, pro Scincis, Scincorum marinorum nomine uendunt, quarum usum omnes cauere optarim, quoniam idem quod Salamandrę uirus habent. Quo circa nec antidotis nec uenerem cōciliantibus medicamentis miscendas suademus.

DE VERMIBVS TERRÆ. CAP. 72.

Terræ uermes Græci *ῥῆντρα*, hoc est, terræ intestina, Latini Lumbricos, Germa ni *Erdwurme* siue *Regenwurme* uocant, qui omnibus noti sunt.

DE MURE ARANEO. CAP. 73.

Murem Araneum Græci *Μυγάλη* uocant, quod mediam inter Mustelam & Mu rem magnitudinem & formā habeat, non quod ex Mustela & Mure nascatur, ut qui dam credunt: quoniā natura inimicitie sunt inter Mures et Mustelas. Quo autem no mine Germanis appelletur, non certò affirmare audemus. Suspiciamus tamē magnos illos Mures, quos *Carten* Germani uocant, Mygalas esse. Sunt enim uenenati et ea dem morfu nocumenta inferunt quæ Mygalæ. † Quinetiam urina eorum eodem quo uulnus modo conspersos afficit. Quapropter à Felibus non nisi maxima fame appetuntur.

† Gesnerus in Quadrupedum historia, Murem araneum esse ostendit, qui Germanicè *Spizmauß* uel *Mügger* appellatur.

DE MVRIBVS. CAP. 74.

Præter Araneos mures, sunt etiam marini, aquatici, & in agris nati mures. Hoc ue rò capite de urbanis siue domesticis muribus sermo habetur, qui ab omnibus cognos cuntur.

DE OMNI LACTE. CAP. 75.

Notum est omnibus Lac, cuius facultates secundum animalium differentias ua riant. Constat autem omne lac caseo, sero, & Butyro.

SERVM LACTIS. CAP. 76.

SCHISTVM LAC: ET RECENS. CAP. 77.

LAC MVLIEBRE. CAP. 78.

DE CASEO OMNI. CAP. 79.

Multæ sunt Casei secundum lactis qualitatem differentię & facultates. Differunt etiam

etiam eiusdem animalis lacte formati pascuorum diuersitate:

DE HIPPACE. CAP. 80.

ἵππας, hoc est, Hippacē ipso nomine originem suam proficitur. Est autem Equi ex lacte confectus caseus, Scytharum inuento, ut Hypocrates scribit. Quidam Hippacem equinum coagululum esse dicunt: sed id hoc loco non iuli Dioscorides, nullius enim animalis coagululum ad cibos & alimenta expetitur, substantia tamē coagululum a caseo nihil differt.

DE BUTYRO, EIVSQVE FVLGINE. CAP. 81.

Notum omnibus Butyrum est: quod quamuis à bobus nomen habeat, quoniam ex bubulo lacte conficiatur præcipue, non minus tamen ex ouillo quoque & caprino, eo quo rustici nouerunt modo paratur. Quapropter nō est quod Galenus Dioscoridem miretur, ex ouillo caprinoque lacte Butyrum fieri dicentem. Fuligo etiam ex accenso Butyro colligitur, oculorum medicinae utilis. Nouimus mulieres quæ etiam e suo lacte caseum & Butyrum fecerunt: eratque Butyrum hoc admodum flauum & liquidum.

DE LANIS. CAP. 82. 83.

Lanæ succidæ neque crudæ, neque ustæ in nostris pharmacopoliis usum habent, quamuis multas in medicina vires habeant.

DE OESYPO. CAP. 84.

Earum tamen sordida pinguedo adhuc præparatur, quam Græci οἶσυνον uocant. Hodie uerò corrupto uocabulo Ysopus humidus appellatur, ut ab Hysopo distinctuatur. Hysopum enim herbam hodie Ysopum siccam nominant.

DE QVORVNDAM ANIMALIVM COAGVLO. CAP. 85.

Concretum in lactentium quorundam pullorum uentriculis lac, coagulū est, a coagendo seu cogendo Latinis dictum: quod Græci πύρρον, Germani pariter Latinis a cogendo seu concresecendo Lipp & Xenne uocant. Videtur autem obscurus esse con-
textus Dioscoridis, animalia a quibus fumentum coagulū est, enumerantis. Recenset enim Leporem, Equum, Hædum, Agnum, Hinnulū, Dorcadem, Platycerota, Dorcum, Ceruum, Vitulum, Bubalum, & Phocam. Vnde legentes facile inducuntur, ut credant omnia quæ enumerat suum peculiare genus habere, sed hæc opinio absurda admodum est: nam quamuis Lepus, Equus, Hædus, Agnus, Hinnulus, Vitulus, Bubalus & Phoca unumquodque sui sint generis animalia, reliqua tamen non ita distinguuntur. Non enim ullum est animal Neβρ, hoc est, hinnulus. Neque aliter a Dorco quam sexu differt. Itaque per hinnulū, Dorcadem, Platycerota, Dorcum & Ceruum, quamuis quinque sint nomina, tria tamen animalium genera tantum intelligenda sunt. Neβρ enim, hoc est, Hinnuli generalis est appellatio, & ad Dorcadem, Platycerota, Dorcum et Ceruum refertur. Sūt enim Græcis Neβρ, Latinis Hinnuli, pulli animalium omnium quibus ramosa cornua sunt, quales sunt cerui, Platycerotes, Damæ & capreæ, adde etiam Alces. Quare coagulū intelligendum est Hinnuli Dorcadis et capreæ foemelle. Idcirco coniunctio quæ sequitur uocabulum Neβρ, superflua esse in contextu uerborum non immerito putatur. Præterierunt hæc silentio in suis commentariis Barbarus & Marcellus, nobis uerò digna uisa sunt ut explicarentur. Porro animalia hæc partim omnibus nota sunt, ueluti Lepus, Equus, Hædus, Agnus, Caprea foemina, Caprea mas, Ceruus & Vitulus. Platyceros uero, Bubalus & Phoca non perinde cognoscuntur. Itaque opere præcium, nos etiam hac parte facturos arbitramur, si nostram de ijs sententiam attulerimus. Platyr = Platyceros.
ceros ceruorum genus est, media inter Capreas et Ceruos figura, magnitudine ceruo nonnunquam æqualis, huic cornua sunt ueluti in palmas dilatata, e quibus ceu digiti exeunt, unde & nomen animalis apud Græcos: eadem non ita tuberibus exasperantur, neque fusca sunt ut ceruorum, sed lenia & candida. Germani unum Platycerotis genus ein Dammhirs appellat, alterum ein Xene/ qui in Suecia boum & ceruorum modo iuncti magna celeritate ingredienti, currus, rhedas, trahas & esse ne.
F

Bubalus.
Sed fallitur
Cordus, ali
us enim est
ueterum
Bubalus.
Phoca.

da trahunt, præsertim hyeme, cum mare quo Codanus sinus ad Septentrionem desinit gelu constiterit, tum enim recta negotiatores per glaciem hinc inde iter facere consueuerunt. Bubalus, seu ut Græci dicunt *Βεβαλῖς*, nostratibus bobus non dissimile animal est, labro superiori & naribus aliquantulum resupinis: pilo uestitur in cinericio liuido. Germani corrupto Latino uocabulo eū *Büffel* appellant. Tradit Plinius etiam Vris ab imperito uulgo Bubalorum nomen imponi, sed Vri diuersum à Bubalis genus habent, omnibus nostris qui ad Septentrionem habitationem notum, & aliarum ferarum modo in syluis uagantur. Bubali uerò aliunde ad nos mittuntur. *Φόκα* marinum est & quadrupes animal, quod Latini pariter Græcis Phocam & Vitulum marinum, Germani *Wichtal*, Sueci *Stelen* appellant. Frequens in nostri maris insulis & Noruegiæ & Sueciæ scopulosis littoribus. Est autem amphibium animal, in terra mariq; uiuens. Catulorum Phocæ pelles ad uestes & puluina nostra expetuntur. Pili hic teneri breues atq; aurei coloris & fulgoris.

DE ADIPE. CAP. 86.

† Facillime.

Adipis, seu ut Græci uocant *σῆος* uocabulo, quorumcunque animalium pinguedinem in genere intelligunt, siue dura & concreta, siue liquida & fluida fuerit. Ita hac uoce Dioscorides hoc loco utitur & Galenus libro primo de facultatibus simplicium medicamentorum. Differunt tamen, si quis proprie loqui uelit adipem tum apud Græcos, tum apud Latinos, suis nominibus distincte: qui enim solidior existit, et difficile liquefit, & liquefactus statim concreuit, Græcis proprie *σῆος*, Latinis seum, Germanis *Vnschlitz* & *Engel* & *Tolch* uocatur, qualis est bouum, Hircorum, Caprarum. Ouium, Ceruorum & similibus a lepis. Qui uero difficile ad ignem liquefit, & difficillime rursum densatur, aut fluidus permanet, Græcis *πυελῖς*, Latinis pinguedo, Germanis *Fet* & *Schmalz*, hoc est, pinguedo & liquamen nominatur ut est Vrsorum, Melium, Canum, Gallinaceorum & eiusmodi animalium quæ natura calidiora existunt. Porro eam differentiam ex nostro arbitrio non ponimus, sed Galeni sententiam sequimur, qui undecimo libro de simplicium medicamentorum facultate, ad hunc modum pinguedinem à Seuo distinguit. Quanquam interpres pro Seuo speciei nomine, Adipem generis uocabulum reddiderit, sed improprie.

CAP. 87, ET SEQUENTIA CAPITA SEPTEM, DE VARIIS ADIPIBUS, eorumq; uiribus, curatione & apparatu agunt.

DE MEDULLIS ANIMALIVM. CAP. 95.

Sunt Græcis duo uocabula quibus medullam significant, nempe *ἐντερῖον*, & *μυελῖς*: sed quæ inter se differant. Illo enim arborum medulla, & facta in fructibus quibusdam semina indicantur: hoc uerò quæ in spina & ossibus animalium continetur medulla, quam Germani *Mark* appellant.

DE OMNI FELLE. CAP. 96.

Notus omnibus amarissimus est humor, folliculo quodam hepatis adnato inclusus, qui Græcis *χολῆ*, Latinis Fel, Germanis *Gall* uocatur.

DE SANGVINE ANIMALIVM. CAP. 97.

Præter Hircinum sanguinem nullum in pharmacopoliis ad medicinae usum, hoc tempore in Germania reponi comperimus.

DE ANIMALIVM FIMO. CAP. 98.

Crocodili
terrestris
fimus.
Ciconiarū
fimus, cerda
duplex.

Non opus est animalium excrementa in pharmacopoliis seruari, cum semper & ubiq; cuiuscunq; animalis (quorum hic fit mentio) si necessitas requirat, fimum habere liceat, excepto Crocodili terrestris: quæ si eo ad extergendas & tingendas genas mulieres carere noluerint, ex Aegypto petant. Non prætereundum silentio arbitramur etiam uulgo agrestes homines Ciconiarum fimum contra comitiales potu assumere. Murescerda autem priuatim dictum est Latinis Murum fimus. Eius duæ apud nos differentię & uulgari-

vulgaribus, & omnibus cognitis Muribus alterum: & ē singulari muris genere alterum admodum odoratum & Moschi æmulum, quod in montanis locis colligentes, rustice mulieres uestibus suis Moschi uice, odoris gratia, interponunt. Idem terē odor ip̄is muribus est, ob id eos nostri *Bijam meuse*, hoc est, Moschatos mures appellant. Porro Crocodilifimi, quod Crocodileam Plinius uocat, etiā Ouidius memi- *Crocodi*
niq̄ de medicamine faciei, cum dicit nigrior ad Pharii confuge piscis opem, Phari- *ca*
nim, hoc est, Aegyptii piscis nomine Crocodilū intelligit, quamuis Crocodilea non ē pisce Crocodilo, id est, fluuiatili, sed terrestri sumatur, qui Sineus & Scincus uoca-
tur: de quo supra dictum est.

DE VRINIS. CAP. 99. 100.

Notæ uulgo omnibus Vrinæ sunt, de quibus hoc capite scribit Dioscorides. Au-
ri Gluten quomodo ex Vrina & Cyprio ære fiat, infra libro quinto inter metallica
medicamenta indicabit. Lyncis uerō urina quid sit, & an sit in rerum natura, multis *Lyncis urina*
sæculis dubitatum est: scribunt enim Lyncem proiectam urinam terra obtegere, tan- *na*
quam hominibus tam salutare medicamentum inuidentem, quæ deinde in lapidem
Lyncurium dictum indureseat, sed fabula tantum est, quapropter bene Dioscori-
des quoq̄ illam damnat: & recte inquit idem esse Lyncurium cum Electro. Quod ex
Plinio etiā discere possumus libro octauo, cap. xxxviii, in hunc modum scribente:
Lyncum humor ita redditus, ubi gignuntur, glaciatur, arefcitūe, in gemmas carbun-
culis similes, & igneo colore fulgentes, Lyncurium uocatas, atq̄ ob id succino à ple-
risq̄ ita generari prodito. Quæ enim alii de Lyncurio scripserant, alii de succino pro-
didere, nec immerito, cum nullum inter ea discrimen sit, ut alibi etiā Plinius refert
lib. xxxvii, cap. iii. post Succini historiam his uerbis. De Lyncurio proxime dici co-
git authorum pertinacia: quippe etiā si nō electrum id esset, Lyncuriū tamen gem-
mam esse contendunt: fieri autem ex urina quidem Lyncis, sed egestam terra, proti-
nus bestia operiente eam, quoniam inuideat hominū uisui: esse autem qualē in igneis
succinis colorem, scalpīq̄. Nec folia tantum aut stramenta ad se rapere, sed æris etiam
ac ferri laminas: quod Diocles quidem & Theophrastus credidit: ego falsum id to-
tum arbitror, nec uisam in æro nostro gemmam ullam ea appellatione. Quod au-
tem dicit falsum id totum esse, non de succino intelligendum, sed de Lyncurio, quate-
nus gemmam esse contendunt. Sed & ex hac Lyncurii historia palām sit idem id esse
cum iuceo, quia quæ Lyncurio tribuuntur, alii de succino prodidere. Quin & illud
hanc sententiam confirmat, quod tradunt Lyncurium non tantum folia & stramen-
ta: sed & æris & ferri laminas ad se rapere. Si enim id quod ista ad se rapit Lyncu-
rium uocatur, nihil in rerum natura reperitur quod Lyncurium esse possit, præter
succinum. Id enim non tantum folia, paleas, stramenta, & id genus alia, nec æris &
ferri solum laminas, sed et auri, argenti & cuiuscunque metalli, uti esse experti sumus:
Nihil enim unquam reperire licuit quod non attraheret. Nam quod solos Ocimi sur-
tulos ab eo non rapī scribunt auctores, falsum comperimus. Idem Plinius libro eo-
dem dicit, Demonstratus succinum Lyncurium uocasse; fierique ex urina Lyn-
cum bestiarum: ē maribus, fuluum & igneum: ē sceminis, languidiū & candidum.
Quod testimonium prorsus confirmat, quod hoc loco obtinere conamur: ij enim
colores succino sunt, quos Demonstratus Lyncurio tribuit, quod idem esse cum suc-
cino eō manifestius est, quod ipse Demonstratus, ut Plinius refert, Succinum Lyn-
curium uocauerit. Porro cum nihil à succino Lyncurium differat, fabuloso no-
mine in omnibus officinis Lyncis lapides, falsō dicti, ostenduntur, habitu, figura & *Lyncuria*
materia diuersi: alter enim pallida est gleba, & nonnunquam fusca, candidis macu- *pharmacopolarum*
lis (lapidis calaminaris & fornacariæ cadmitæ modo) distincta, terra durior, & lapi- *falsa*
de mollior: quæ si historię conferatur, non multum à Phrygio lapide distabit. Alter *Phrygius*
lapis est teres, oblongus in turbinem desinens, colore alibi ferrugineus, alibi fuscus, *lapis*
alibi succini modō fuluus & pellucidus. Gigni hos in Pomerania & Prussia: fusciorē
uerō & ferrugineum in Saxonia, Germaniæ regionibus, nouimus. Nam & ipsi eos
obiter in itinere inuenimus, & industria effossos collegimus. Germani hos Alpe- *Alpe*
scos uocant, quasi Incubi sagittam, creduntur enim incubo aduersari, nō quidem ho- *scos*
inilo

Dactylos
Idci.

minum sed equorum, & iumentorum. Quidam etiam Donnerkeile uocant, hoc est, tonitruu cuneos Vulgo enim de cælo cum fulmine cadere creduntur. Plinius autem hos lapides Idæos Dactylos appellasse nobis uidetur. Porro ista de Lyncurio dixisse sufficiat. At cum de succini rei omnibus notissima materia & origine uariet, & diuersa ceu data opera scribant authores, uisum est nobis peculiarem de eo commentarium subiungere.

DE SUCCINO.

† Glesin.

Succinum, quod Græci ἑλεκτρον & fabuloso nomine λυγκέσιον, Arabes Karabe & Kakabre, Galli Ambram seu Ambra citrinam: Germani ueteres Glessum / Recentiores Agtstein & Bernstein / Sudanii Gentar appellant: inter præcipua numeratur quæ Deus ad hominum usum cōdidit, medicinæ pariter & luxui multisq; aliis usibus materiam præbens: quamuis nostra ætate magis tuendæ sanitati quàm luxuriæ inferuit. Nostri succino à proprietatibus quas habet nomina indidere. Siquidem ueteres Germani Glessum id appellabant, quod si interpretæris uitreum sonat: quoniam uitri instar lucem transmittat. Vitrum enim Glas / & uitreum † Glesin dicimus. Agtstein autem, id est, Gagatem lapidem id uocamus: quoniam à Gagat nigro, materia, uisibus, & aliis proprietatibus nihil differat. Bernstein uerò, hoc est, ardens lapis nominatur, quoniam accensum ardeat. Est autem res omnibus cognita & paratu facilis, præsertim careum & pellucidum, quod Romani à uini colore Falernum cognominant. Candidum uerò, cui olim nulla fuit authoritas, quoniam parcius gignitur, nunc auri præcium æquat. Vera sunt quæ Plinius libro naturalis historie trigelimo septimo, capite tertio de succino prodidit: excepto eo, quod Pinei generis arborum resinam esse credat, ut paulo post ostendemus. Nam quod ad originem, hoc est, materiam & generationem eius attinet, nullus unquam authorum uera tradidit. Ideo rem iucundam maximeq; necessariam & cognitu dignissimam prodituros nos arbitramur, si de natalibus, causis & origine eius nostram quoque sententiam protulerimus: de qua cum multis doctis, præsertim Georgio Agricola Medico, naturalium rerum omnium sagacissimo & prudentissimo indagatore, multos iam annos contulimus, eamque longa deliberatione utrinque ita perpendimus, ne quidquam de origine eius temere pronunciarem. Aediturus est prope diem Georgius Agricola inter alia quæ de ortu & materia fossilium rerum conscripsit, etiam suum de succino iudicium, cui nos hoc commentario subscribimus: Existimamus autem nobis hominibus Germanis succinum in nostro orbe gentium quotidie atrectantibus, eiusque naturam quotidiano usu & experientia cognoscentibus, potius alias gentes fidem habituras, quàm Græcis: qui relicta Philosophica in consideratione eius methodo, ad figmenta absurdissima & aniles & plerumque pueriles fabulas sunt conuersi: rem longepulcherrimam, cuius cognitionem ingenio assequi desperabant, ludibriis & leuibus figmentis conspurcantes. Quamquam in re non tam hominibus imposuerunt, quam suam in confingendis nugis leuitatem, & electri ignorantiam prodiderunt: quamuis Grai ingenium, quamuis Grai ore rotundo Musa loqui dederit. Etsi autem palam sit, ubi reperiatur succinum, tamē quia et loca & natales perspecta habere ad rei cognitionē non parum faciat, decreuimus hoc de electro commentario, primum indicare ubi legatur, & ad quæ littora plurimum, & quomodo feratur: deinde ostendemus non esse succum, neq; Gummi, neq; resinam, quomodocunq; eas appellent, arborum: postremo materiam eius, & quid sit, explicabimus: Et hæc quidem ea qua licebit breuitate, ne si longius de eo disseruerimus, commentarius hic finem suum modumq; excedat: Codanus sinus appellatur Plinio immanissimus, à seuo immenso monte, nec Riphæis iugis minore, qui ad Cimbrorum usque promontorium excurrens, refertus est insulis, quarum clarissima sit Scandinauia, incomptæ olim magnitudinis, nunc uerò classibus nostris negotiatoribus & militibus cognita & perlustrata tota: qui non insulam, sed peninsulam pluribus Isthmis coherentem affirmant. In eo sinu inter Cimbricam Chersonesum & Scandinauiam sparsæ sunt insulæ: Burchana, Austrauia, Actauia, olim uocatæ: ad quas fluctibus pelli electrum Romanæ olim

olim classes deprehenderunt. Ideoq; eam quam Germani Austrasiam uocabant, Romani Glesariam, hoc est, Electridē dixerūt. Quinetiam preter hanc plures alię Glesarię nominatę sunt. Vniuersum autem mare quod Codanus sinus complectitur, Succinum habet, quod fluctibus nunc retro ad Scandinauia, Noruegię, Suecię & Gothię littora agit: nunc ad insulas, ut ipsi etiam deprehendimus: nam & nos quoque illud in † Burrhanę, Austrasię, & Scandinauia littoribus inuenimus. Nunc ad nostra littora, uidelicet Cimbrica Chersonesi, ducatus Mechelburgiaci, Pomeranię, Prusiię, Samelandię & Liuonię. Sed quamuis toto hoc nostro maritimo tractu non raro legatur succinum, exiguum tamen id est, in paruas micę concretum. Plurimum uerō, & maximis glebis constans, ad Samelandiam expellitur; quę Prusiię uicina est regio, & Prusiię Duci patet: ad eam tanta copia tempestatibus fertur, ut toti terrarum orbi satis facere possit, quantumuis multis usibus expetitur. Atqui non ad totum Samelandię littus tanta uis Electri expellitur, sed ad eum tractum tantum, quem Germani *das Ghanawische* uocant, non longe a pago Sudauis & Samelandis Kraxte pelle dicto, quod retinctum significat. Nudi enim homines retia uenienti Succino prætendentes, sapius fluctibus retincti obruuntur, unde Pago nomen patrialingua fecerunt. Locus autem quo tanta eius copia colligitur, patet tantum decem milia passuum, hoc est, duo Germanicæ miliaria. Habent eius piscationis gnari sua signa & indicia, quibus uenturi Electri copiam æstimant. Sunt alię quędam diuersi generis, sed maximę quędam cordis exigui imaginem referentes, & uellicarum modo inflatę: quę si copiosę ad littus ferantur, plurimum succini aduentare certum, his enim inuolutum tanquam retibus capitur. Cum uerō parcius hæc algę littus appulerint, minus succini in se quitur. Fluctibus deinde ereptum, Dantiscum uehitur: quę urbs præterquā quod totius Prusiię caput sit, etiam celeberrimum est emporium. Vbi primum certis uenditur negociatoribus, ex pacto: præcium pro certa mensurā, secundum glebarum magnitudinem; Principi numerantibus: Rude adhuc ut colligitur, asperum scabrumq; est tota superficie, nec quidquam attrahit, quantumuis calefiat: leuigatum uerō & politum, primum rapere incipit, qui ex attritu calefacto admouentur furculos. Nam alia quācunque ratione præter confricationem incalefscens; perinde ut rude, rapere nequit, quas proprietates neminem antea prodidisse scimus. Nos autem id ideo affirmamus, quoniam sapius eius rei periculum fecimus. Porro longum foret, omnia statuta legesq; succini gratia latas enumerare, quia alii ex nostris hæc attigerunt. Nos autem quę antea tradita sunt relinquentes quod illi præterea uerunt indicabimus. Nam neque hoc referre necessarium existimamus, quot habeat succinum colore differentias, & quantam utilitatem hominibus adferat; non in medicina tantum, in qua magnum usum habet: uerum etiam in mechanicis artibus, in quibus multo maiorem. Nunc autem antequam quid sit explicemus, quid non sit ostendendum duximus: aliis succum, aliis Gummi; aliis Resinam, aliis terram, aliis lapidem esse contendentibus. Nam hæc opinioniones multa iam sæcula hominum mentes detinent. Sed lecturos istarum opinionum confutationem prius nouisse oportet; succi, gummi, resinę, terrę, & lapidum, differentiam, materiam, qualitatem, & alias quas habent proprietates: ita facilius dicta intelligent & diiudicabunt. Succum autem cuiuscunque arboris aut plantę non esse succinum, sed neque urinam alicuius animalis, succi & urinę substantiā & qualitates ostendunt. Constat enim utrumque aqueo humore: qui etsi solis aut ignis calore densetur, aquę tamen qualicunque infusus diluitur, ideoq; in mare delapsa quamprimum dissoluerentur. Succino uero contraria est natura, nam liquidum in mare primum influit, mox densatur. At hic locum non habet quod dicitur, salem adstringere & densare succos, quod nemo concedet cui salis natura perspecta est. Sal enim arido densandi facultas, sed non tantā ut liquidum succum denset: atque ea densandi uis nequaquam est propter adstringendi qualitatem, sed propter imbibendi aqueum uel similem humorem potentiam. Salis enim propriissima natura est facillime aquam, uinum, uel tale quippiam imbibere, & in tali quopiam humore dissolui. Quapropter quod conspersas carnes & caseos densat; & solidio-

†
Burrhanę:Succinum
non esse suc-
cum aut uris
nam.

res reddit, per accidens fit, non propria aut adstringendi facultate, sed quia carnes & casei recentes, aquoso succo turgentes, succum suum sali combibendum dimittunt, quo fit ut hæc deinde sicca duraque & ideo densiora euadant. Succus uero aliquid cum nihil habeant terrenæ consistentiæ, qualem carnes & casei, sed toti aqueo humore consent, sale humorem quem appetit imbibente minime densantur, sed sui similes permanent, si serena sit, nec calida aeris constituto: si uero turbida & humida, etiam liquidiores euadunt, sale humidum aerem imbibente & succo cui mixtus est communicante: quod manifeste omnes, etiam densati coctura aut sole, ostendunt succi, si sal admisceatur. Continuo enim humescunt & disfluunt, maxime humida & frigida aeris constitutione. Ergo si aridus sal succos etiam spissos liquidiores reddit, quanto magis liquidus sal, ceu mare est, liquidos succos dissoluit & penitus dissipat. Si etiam densatus succus esset succinum, aquæ incotum dissolueretur, ceu Aloë uulgaris, Hypocistis & eiusmodi: sed etiam si quis integro æuo in aqua aut uino decoquat, nihil penitus tamen eliquari potest. Adipi uero aut Oleo incotum dissoluitur, quod alienissimum est à succis qui aquei sunt. Est itaque succino pinguis substantia & à succis diuersissima.

Quod non
sit Gummi.

Quod autem etiam Gummi non sit, ostendunt argumenta quæ iam de succis attulimus. Nam hæc quoque, cuiuscunque sint generis, in quouis aquoso humore dissoluantur, in Oleo uero minime: eadem, perinde ut densati succi, turbida & humida aeris temperie humescunt & disfluunt, nec sine ratione, cum uiscoli & concreti calore succi existant. Quidam enim siccitate densatur, humido resolui potest.

Quod non
sit resina.

Qui uero Resinam esse contendunt, propius ad materiæ similitudinem & naturam eius accedunt. Quemadmodum enim Resinæ pingues sunt, & accensæ flagrant, oleo quoque incotæ dissoluantur omnes, ita etiam succinum flamma accensum ardet, & in Oleo si coquatur resoluitur, & accensum flagrat.

Resinam tamen non esse, statim forma glebarum ostendit. Resinæ enim partim paulatim distillant, & in paruas micas guttasque concrescunt, ut Lentisci, Juniperi proceræ, quam Sandaracam Arabes uocant: thûs masculum, & quod Orobias ab erui figura & magnitudine uocatur. Partim ex pluribus guttis longo temporis intervallo collectis in massas scabras, porosæ, & cauernas concrescunt, ut Pini, Abietis, Piceæ, Piceastris & eiusmodi arborum: quamuis & hæc frequenter in paruas micas densentur. Succino uero diuersus est à resina habitus: neque enim in guttas oblongas densatur, quæ ex arbore se pependisse indicarent, neque in scabra, cauernosaque, & guttis compacta fragmenta coalescit, sed solidas glebas. Glebarum etiam magnitudo resinam esse negat: siquidem Plinius Romam allatam scribit tredecim librarum pondere, per libræ duodecim uncias intelligens. Nos uero scimus multo maiores interdum inueniri: & nonnunquam etiam in continente ultra uiginti milia passuum à littore aratris excitari: & in fundamentis ædificiorum effodi, quibus undecim, duodecim & tredecim est unciarum pondus. Itaque maximæ glebæ pondus nostra memoria inuentæ librarum fuit septemdecim & unciarum quatuor. Hæc autem grandes glebæ poculis splendidioribus à magnatibus apud nos expetuntur, quemadmodum olim apud Romanos ex Oriente Murrhinum: quod & ipsum sine dubio ad Succini genus referri debet, ut Georgius Agricola in suis libris de rebus metallicis indicabit. Puerile autem est credere, in tantas glebas concrescere resinam aliquam: ac multo puerilius, credere tantum ex arboribus defluere posse resinam, ut maria & lit-

Murrhinum,
† Georg.
Agricola in
libris de mor-
te Val. Cor-
di editus
Murrhinum,
lapidæ fa-
cit, qui ex
Onyx Plin-
io dicitur:
tur: et Chal-
cedonium
uulgè dictum
interpretatur.

tora & terram in continente impleat. Reclamat etiam experientia, nullæ enim prorsus in nostro littore sunt Pinei generis aut resiniferæ arbores, à Cimbrorum extremo promontorio usque ad Scandinauicæ Isthmum, quo Asiæ maiori cohæret, hoc est, toto illo immani sinu Codano, nullæ enim temere in littore arbores, præter Alnos & Corylos, uisuntur. Oderunt etiam natura resinifera omnes salisum, aut mari irriguū, solum. Simili modo neque in Noruegiæ, neque Scandinauicæ minoris, neque Sueciæ littoribus ullo uisitur resinifera aut Pinei generis arbor, quatenus nos eam oram lustrauius, & quatenus militibus & negociatoribus nostris cognita est, qui quotidie totius legunt Scandinauicæ littora. In montibus uero procul à mari magnæ sunt Tædarum, Abietum & Piceastrorum syluæ. Sed ex his impossibile est

est

est ad mare delabi resinam. Præterea si in inuitis cautibus starent hæc arbores, ut alii qui ueterum prodidere, in terram & rupes delaberetur resina. Et si maximè ex rupibus æstu raperetur, ut Plinius credidit, sordidum totum esset, calculis, arenis, foliis & aliis rebus mixtum, sed rarissimè reperitur quod tale quippiam cõplectatur. At neque hoc rationi consentaneum est, ex arboribus è præcipitiis in mare procumbentibus de stillare: tumenim paulatim & guttatim destillaret, & in paruas tantum guttas densaretur: sed impossibile est, tot in præcipitiis stare arbores, ut tantum resina fundant, Adde si hoc modo distillaret, neque ranas, neque lacertas, neque formicas, muscas, culices, aut quidquam tale complecteretur. Mirum etiam esset si resina sit, non inueniri in eo Pinei generis folia, cum in aliis resinis sua folia frequenter deprehendantur. Esset etiã præternaturam eo loco resinam in tantam soliditatem densari, cum quæuis aliæ resinæ siue frigida siue calida aqua densatæ, maximè falsa, aridæ friabilesque euadunt, ac sponte dissiliant. Quod si olfactum consulas, exactè nullum resinæ odorem percipies, sed medium quendam inter Bitumen & Ambram, quæ res in terra gignuntur. Quod autè paleas et alia similia attrahit, magnū est argumentū, multum id à resina differre. Nulla enim id præstat resina. Differunt etiã uiribus resinæ, & succinū. Nam hoc præter alia, quibus ab illis discrepat, etiã comitiales suffitu deprehendit, & eos collapsos excitat, quod in nulla unquam deprehensum est resina. Facit etiam ad nostrum argumentum coloris diuersitas: nam si certæ alicuius arboris resina esset, eundem semper colorem haberet, ut Terebinthi, Laricis, Lentisci, Abietis, Pini, & alia: uero resina uero, quæ semper sui sunt similes. Succino uero nunc Sero similis, nunc cereus, nunc fuluus, nunc turbidus, nunc omnino pellucidus, nunc niueus, nunc ex quibusdã corū aut simul omnibus mixtus, & ceu conuolutus, nunc omnino niger est color. Nam Gagates ille lapis paleas attrahens, nihil est aliud quam nigrum succinum: quare eodem eum Germani uocabulo, quo aliud succinum, appellant, adiecto coloris discrimine. Necessè igitur est, rem diuersissimam à resina esse. Quapropter non possum non Græcorum uanum commentum carpere, qui etiam certa nomina arboribus succinum ferentibus indidere, eas alias Electrides, alias Aphitacoras nominantium, quo uocabulo Indis prædulcis suauitas significetur. Omitto reliquas fabulas, quibus ipsi suā uanitatē & inconstantia palam fecerint. Qui autè resinam non esse cõcedunt, lapidē esse contendunt, quoniã uulgò Germanis lapidis nomine ueneat: sed nihil in eo est quod eū lapide cõmune habeat. Lapidēs enim omnes terreni sunt, nec quicquā in igne amittunt, nisi alterius cuiusdã rei participes sint: neque acceduntur, neque in pinguedine aliqua dissoluntur, aut igne in sublime feruntur, neque leues sunt, ut aquæ innatent: quæ omnia Succino sunt propria: quod usque adeo tenuitate à terrena lapidum materia distat, ut certa ratione totum in uaporem & liquidissimum oleum dissolui queat, quod nemo ante nos inuenit aut tentauit: uariis enim ingressi uis sumus, ut naturam, originem, & materiam eius inuestigaremus. Præter eos qui lapidem esse credunt, sunt & qui terram esse dicant: quod ne per somnium quidem alicui in mentem potuisse uenire sperassemus. Quoniam uero hæc opinio his annis à multis est accepta, iisdem est confutanda argumentis, quibus lapidem non esse probauimus: quamuis id paucis uerbis egerimus, cum non existimemus sanæ mentis & iudicii homines eo erroris delabi posse, ut lapidem esse credant. Decessit hoc anno, cum hæc conderemus, admodum confectus ætate Gregorius Dunckerus, uir haud uulgari experientia præditus: qui multa etiam in Succino obseruauit, quæ nostrum de eo iudicium confirmant: tamen in eum errorem incidit, ut crederet Succinum ueteribus Samiam terram fuisse dictum, regionem nominibus deceptus: nam hæc Germani ora, qua Effluui habitant, hodie Sameland nostris hoc est Samia regio uocatur, perinde ut Samus Insula in Aegæo mari sita. Nihil enim commune succinum cum figulina creta habet, qualis est Samia terra, ex qua Samia uasa fiunt. Nam ut alia prætereamus argumenta, Argilla tenax est Samia terra, ex qua factæ ollæ, igne in lapidis duriciem coquantur, nulla sui amissa parte, ut alia quæuis figulina terra: Succinum uero ignis impatientissimum existit: flamma enim accensum eo usque flagrat, donec totum in fuliginem abeat: prunis autem impositum æque ut flamma accensum consumitur, siquidem totum in uaporem resoluitur.

Quod non
sit lapis.

Quod non
sit terra.

Porro hæcenus eorū cōfutauius opiniones, qui Succinū, aut succum, aut Gummi, aut Resinam, aut terram, aut lapidem esse tradiderunt; quamvis plurima quæ ad rem facerent reliquerimus; maxime quod ad diluendam scriptorū authoritatem pertinet. Nos uero minime nuda authoritate, sed rationibus & argumentis rem tractandam esse censuimus. Nam quod Solinus scribit, Germanico Cæsare omnes Germaniæ oras scrutante, compertam esse arborem Pinei generis, cuius medulla autumnī tempore succino lachrymet, falsum penitus est, ut ea quæ antea diximus testantur: quem admodum & hoc quod tradit. Germanicum Cæsarem omnes Germaniæ oras scrutatum esse. Quæ Solinus de Succino scripsit è Plinio excerptis, quibus suum addit commentum. Restat igitur nunc, ut nos tam de materia & origine eius sententiam rerum naturæ studiosis communicemus, qui semper credidimus, succinum liquorem esse è terra in mare fluentem, arcanas ac non dum compertas ob causas paulatim in eā quam præferet soliditatem durefcentem, quod Georgius Agricola etiam sentit & Gregorius Dunckerus, cuius modo mentionem fecimus, omnino affirmat, natione Samelandus, qui in eo littore, ad quod maxime expellitur, ultra quinquaginta tres annos uixit, maximaq; cura tota uita sua eo incubuit, ut originem & materiam eius perdisceret. Nam hic eos quoq; reprehendit, qui arborum lachrymam esse prodiderunt, clarisq; uerbis dicit, liquidum primo esse liquorem è terra in mare fluentem. Quod tanquam certissimum omnibus est amplectendum. Ad stipulantur nostræ sententiæ etiam ueterum nonnulli ceu Nicias, Philemon, Aslarubas & Mnesias, quos Plinius citat. Nicias enim solis radiorum succum esse succinum tradidit, quos circa occasum uehementiores in terram actos credidit, pinguem sudorem in ea parte Oceani relinquere, qui deinde in Germanorum littora euceretur, haud absurda opinione. Non quod hic succus ipsi solaribus radiis nihil præter qualitatem existentibus insit, sed quod radiorum feruore, pinguis ille terræ sudor foras eliceretur. Quod plerisq; in locis apud nos estatis calore, & ueris, autumniq; tempore in liquido bitumine deprehendimus: cuius speciem succinum quoq; esse diximus. Bitumen enim hoc in terræ poris latitans, paulatim foras sole terram calefaciente, & pinguedinem eius eliquante in lacus, puteos & riuulos emanat: hyeme uero præclusis terræ meatibus & densata pinguedine nihil prorsus emanat. Philemon fossile esse & in Scythia erui prodidit, canididi, cerei, & fului coloris: proculdubio comperta scribens. Nam in Parthia quoq; & Germania Murrhina, quæ absq; dubio succini genus sunt è terra effodiuntur, quæ nullus unquam resinam credidit. Quare cum fossile sit succinum, quæ est amentia resinā id esse contendere, cum apud nos quoq; sapissime grandes glebæ inter arandum excitentur, & è puteorum & ædificiorum fundamentis eruantur, multis à littore passuum millibus. Nos tamen eas ibi minime natas, sed in terra, mari ut plerisq; in locis contigit, longius à continente recedente, relictas iudicamus, quamuis pleriq; ibi gentitas credant, in quorum numero etiam fuit Gregorius Dunckerus. Aslarubas, qui Plinio scribente adhuc uixit, apertius rem prodidit, tradens: iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephissida, quem Mauri electrum uocent, hunc sole excalefactum è limo dare electrum fluitans. Aslarubæ subscribit Mnesias, locū quendā Aphricæ Sicyonē uocans, & Cratim amnem in Oceanum affluentem è lacu, ibi eadem ratione nasci quæ in Cephisside lacu Aslarubas tradidit. Nos utrumq; uerissimè scripsisse credimus, non uanis argumentis inducitur: primum quidem, quoniam apud nos eodē modo sole excalefactæ lacunæ & putei, è limo emittunt Bitumen aque innatans. Deinde quoniam certo comperimus etiam in Aphrica reperiri succinum: idē ea parte qua Canarias spectat insulas. Nam eam Aphricæ oram Atlanticum mare alluit. Misit ad nos ex Antitierpia Aphricani succini unam atq; alteram glebam Gruningus natione Frisius, (qui ea loca lustrauit, & ipse id in ripa fluminis cuiusdam ibidē legit.) Nostrati adeo similem ut dignosci nequeat, quas inter cætera quæ chara nobis sunt eo libentius reposuimus, quoniam & Mnesiæ & Aslarubæ fidem & authoritatem firmam nobis faciunt. Quare immeritò Plinius eorum tradita aliorum Græcorum commentis adnumerasse uidetur. Gigni autem in terra Aphrica num succinum quoq; nec esse arborū resinam, uel inde perspicuum est; quoniam nostrati simillimum colore, substantia, & qualitatibus cum sit, eandem quoq; originis causam habere necesse est. Si igitur Pi-

Quod sit
liquor è
terra in ma-
re fluens.

Succinum
etiam in
Aphrica.

cei aut

cei aut Pinci generis arborum resina esset, quales arbores in Septentrione uisuntur, necesse esset etiam in ea Africæ ora easdem nasci arbores, quæ similem & eiusdæ species resinam lachrymarentur. Cum uero experientia constet, nullas ibi resiniferis similes provenire arbores: non male raciocinamur, id resinam minimè esse. Quæ enim ibi proueniunt arbores, nostratibus dissimilimæ sunt, ut referunt qui ea loca inspexerunt. Præcipue autem abundant Sandali, Prasili, Guaiaci, & eæ quæ sanguinem draconis dictam lachrymam fundunt: multæq; aliæ nostris, quia nondum usus alicuius gratia expetuntur, incognitæ.

Et si autem Gregorius Dunckerus quoq; deprehenderit, è terra fluentem liquorem esse, non tamen explicat, cuius generis cuiusue substantiæ aut naturæ sit hic liquor, quod nobis est nunc dicendum. Liqueores omnes seu fontes qui è terra ac montibus fluunt, ad duo præcipue referuntur genera: aut enim aquei sunt, aut olei modo pingues. Aquei autem multum differunt secundum terræ per quas fluunt diuersas qualitates, hinc alibi dulces, alibi nitrosi, alibi falsi, alibi Chalcantho infecti sentiuntur; ad nullum autem horum referri potest Succinum: quare necesse est ad alterum liquoris genus id pertinere, quod pingue existit, & olei æmulum. Liquor autem hic pinguis suum apud authores nomen habet, nempe Bituminis, cuius species, solidum & liquidum, quæ & ipsæ in plures differentias diuiduntur. Esse autem Bituminis genus Succinum eius materia, colores, odor, medica uis, & ignis rapacitas, manifestè conuincunt. Substantiam enim si consideres, deprehendes pinguem, flammam facile cõcipientem, æque ut Bitumen. Atqui antea à nobis dictum est pingue

Quod sit
species Bitu-
minis.

terre liquor è Bitumen esse, talè autem consistentiã Succinũ habet. Quamuis præter Bitumen etiã aliud quippiã in terra genitum pingue sit, uidelicet Sulphur. Sed ad hoc referri nõ debet, quoniã metallicum est medicamentum pluribus à succi nõ differens. Co-

Consistentia.

lores etiam totidè succino, quot Bitumini: est enim nigrum quoddam, Gagates & Thracius lapis dictum, ut uulgare Bitumen: est fuscum in purpura, ut Iudæicum Bitumen. Est fulsum & perspicuum quoddam, ut Naphtha fulua, quæ liquidissimum est Bitumen.

Color.

Et candidum quoddam, ut candida Naphtha. Si autem olfactum consulas, manifestè Bituminis qualitatem odore percipies. Quod uero siuuius oleat alio Bitumine, puritati substantiæ referendum est, quia tantum à uulgari differt. Vires etiam originem & ma-

Odor.

Vires.

teriam eius prodant. Nam ulcera glutinat, mollit, suffitu, olfactuq; uulnæ strangulatione correptis mulieribus succurrit. Comitiales prunis impositum deprehendit, & deprehensos rursum restituit. Menses cit, uenenis aduersatur. Concretum in thorace sanguinem discutit & resoluit: dysenteria laborantibus succurrit. Tussis & à capite in subiectas partes defillationes suffitu sistit: dentium dolores mulcet. Omnes denique facultates nostri in succino celebrant, quas ueteres Bituminis speciebus adscripserunt; præterq; has aliæ etiam succino tribuuntur, quas consulto præterimus, quoniam eas ueteres non nominatim recensuerunt, sed in genere indicauerunt. Quod enim factos calculos excernit, & Ictericis medetur, Succinum, ex incidendi, extenuandi, abstergendi, aperiendi, & discutiendi facultatibus procedit: quas Bitumini authores assignant. Quinetiam quotidianus eius in re domestica & mechanicis artibus usus, Bituminis genus esse testantur. Hoc enim statuo clauorum capita, ac alia ferramenta, in nigrum colorem tingebantur, in quem usum multi nostrorum ubi abundat Succinum recipiunt. Expetuntur etiam lucernarum luminibus, ut Bitumen,amenta eius. Præterea rapax admodum est ignium, ut Bitumen. Et certum eius genus, ut Callistratus Plinio citante prodidit, Chrysolectrum uocatum, quod sit rapacissimum ignium, & si iuxta fuerit celerrime exardescens. Quod de nulla unquam alia re authores tradiderunt, quam Naphtha, quæ Bitumen est liquidissimum: in hunc enim modum de Naphtha Dioscorides quoq; scriptum reliquit: *ἀνάμνητον ἄρπάζει τὸν πυρὸς ὥστε ἐκ διασπασθεῖς ἀγνὸς λαμβάνει*, hoc est, uim habet rapacè ignis: adeo etiã ut ex intervallo rapiat illum: idcirco cū Callistratus id succino tribuat, quod Naphthæ sit proprium, quis alii quàm Bituminis generi adscribat? Accedit postremò natalis uicinitas, ubicunq; enim Succinum, ibidè etiã Bitumen gignitur, ut in Perside, Parthia, Carmania, Aegypto, Mauritania, & nostro Septentrione. Omnium autè argumentorum, quæ iam adduximus, firmissimum est quod interdum molle adhuc & flexile inueniatur; interdum omnino liquidum in superficie solum tenui crusta uestitum. Inuenta est ante paucos annos in Prussiae

littore

littore oblonga gleba furcæ figura, cuius alterum cornu mollis cere inftar flexile fuit. Quin & ipsi Lipſiæ apud auunculum noſtrum Ioannem Rallam Pharmacopolam in Succino è Pruffia recenter allato, ſeptimo hinc anno, inuenimus glebam, in qua con- cluſa, ut in ouo ueteraſcenti, humidus adhuc fluctuabat liquor. Duſti itaq; rei antea non comperta nouitate glebam confringimus, tenui cruſta lepidiſſimum & prorſus li- quidum humorem continentem; deprehendimus autem cruſtam Succino uulgar ſi- milem, liquorem uerò Naphthæ fuluæ, id eſt Petroleo ſimilem, paulò tamen craſſio- rem, odore ſuccinum prunis impoſitum omnino referentem, & nihil minus quàm re- ſinæ alicuius habitum præferentem. Cogitantibus igitur nobis per quam reſolutio- nem partes quibus conſtat ſuccinum ab inuicem diſcretæ palam fieri poſſent; tandem hoc anno artè inuenimus qua id fieri poſſet: deprehendimus igitur in hac arte in par- tes & elementa ſua reſolutum magna ex parte in Bitumen tranſire, uero Iudaico Bitu- mini adeò ſimile, ut neq; colore, neq; pondere, neq; ſubſtantia, neq; odore, nec qua- cunq; alia nota ab eo diſtingui poſſit. Quin & ipsi nos iſta dignoſcere haud poſſe- mus, i niſi Iudaici Aſphalti glebulis miſceretur: ut autem alia omittamus, etiam con- fractum, ceu alatū & pennarum fibras Iudaici modo oſtendit. Quapropter cum ſubſtantia ſimilitudo, colores, odoris qualitas, uirium proportio, ignis rapacitas, na- talium uicinitas, quotidianus uſus, & manibus noſtris atrectata, ſenſibusq; diu dica- ta materia, & ſingulari arte deprehenſum in eo Bitumen, Succinum Bitumini cogna- tum eſſe teſtentur, nec ulla ſit nota quæ repugnet; clarum tandem & perſpicuum eſt, neq; reſinam, neq; gummi, neq; arborum ſuccum, neque urinam, neque lapidem, ne- que terram eſſe: ſed puriſſimum, leuiſſimum, optimum, & ſui generis Bitumen. Quemadmodum & Ambra & Camphora, quod huius loci non eſt multis argumen- tis demonſtrandum. Porro qua ratione lacertas, ranas, culices, muſcæ, & alia inſecta quæ in eo tranſlucent, atq; metallica etiam medicamenta quædam, ceu aluminis, chal- canthiq; uenas, quas ipsi in eo deprehendimus, inuoluat & complectatur, hoc com- mentario præterimus: quemadmodum & hoc, an in ipſo maris uado, aut littore, an utroq; loco eius ſint fontes.

DE MELLE. CAP. 101. 102. 103.

Mellis uocabulo & propria eius ſignificatione dulciſſimum illum liquorem intel- ligimus, quem apes ex arborum, fruticum & herbarū floribus colligunt: & cera com- poſitis fauis reponunt, omnibus cognitum, & medicinæ & hominum etiam in ſani- tate uſui expetitum: cuius multæ ſunt differentiæ, ſecundum ſlorum, è quibus colligi- tur qualitates uariantes. Omnium autem odoratiſſimum, & maximè aromaticū eſt, quod eſt Thymo, Thymbra, Satureia, Serpillo, & id genus herbæ collectum fuerit: ideoq; primam bonitatis notam Attico & Hyblæo authores adſcripſerunt. In Ger- mania uulgaſtiſſimum eſt, quod ex Ericæ fugitur floribus, granulofum, guſtu nò adeò iucundum, ideoq; non multiſaciendum, in medicina ſaltem, è Luneburgenſis ducatus Ericetis allatum. Quod uerò Saxones Krudehoniq; alii Tſurcktrawen homig appellant, id eſt, aromaticum & uirgineum mel, nò multum ab Attico differt. Suauis- ſimum uerò eſt cum guſtu tum olfactu, è Pruffia, Liuania, & Lithuania allatū, quod ſerè è ſolis Tiliæ floribus apes colligunt. Eſt autem hoc quoq; ut iam dictum eſt, a- romaticum, ſolidum & denſum, ſed multò candidius. Sardinium uerò mel, cuius Dio ſcorides meminit, ad nos non perferitur, id amarum eſt: quoniam Abſynthio ſcater. In ſiſa, à qua nomen habet. Sentiant etiam apud nos quidam tractus Abſynthio abun- dantes hoc uiciū, maximè in Hungaria. Ponticum poſtremo uenenatum cum ſit, ueſcentes interimat, aut ad inſaniam adigit. Colligitur id è Nerii & Aegoletiri flo- ribus, natura uenenoſis, & certis temporum conſtitutionibus maius uirus contrahen- tibus. Tale autem eſt proprie uocatum mel, quod ſit apibus ſlorum ſuccum ſorben- tibus. Sunt & alia quoque duæ inſignes mellis ſpecies Αἰθουλί & Σάκχαρον, non ab apibus collectæ, ſed quarum altera ex aëre deſcendit, altera uerò in harundinibus quibusdam Indiæ atque ſœlicis Arabiæ concreſcit, de quibus iam dicturi ſumus. Porro mellis uocabulū tranſfertur etiā ad fructuum quorundam, tam dulces quam medicos ſuccos, cocturā in mellis ſpiſſitudinem denſatos, ut eſt mel paſſulatum, mel palmu-

palmularum, mel Anacardinum, &c. Non quod proprie mella sint, sed quia substantiæ similitudine, consistentia, & dulcedine, proximè ad mellis naturam accedant. Ex his Anacardinum sola consistentia mel æmulatur, sapore uerò plurimum differt.

DE SACCHARO. CAP. 104.

*Sal Indus, idem Saccharo. Sed olim non poterant succum exprimere, & lachrymam tantum usurpabant.

Σάκχαρον siue Σάκχα, quod Arabes Zachar & Zuchar, alii Salē Indum, Mel Calaminū & Mel Canne appellant: mel est in Arabiæ felicis & Indiæ harundinibus quibuscumque in grumos & micæ cōcresecens. Cuius duæ sunt præcipuæ differentiæ. Alterū enim sponte sua in harundinibus istis concresecit, de quo hic Dioscorides agit. Alterū earundē harundinum expressio & igne densato fit succo: illud hodie rarissimè affertur, ideoq; medicis in nullo est usu: hoc uerò in tanta copia aduehitur, ut nemo esse possit qui rem non cognoscat. Nihil enim differt nostrum Zacharum à Zacharo antiquiorum, præterquam quod nostrum igne artificiali densatur: illud uerò sole natura succum efficiente & elicitum densante. Itaq; nos non pudet cum Gentile, Herculario, Nicolao Castellano, & Vincentio Caprili pronunciare, idem esse nostrum Zacharum cum antiquorum Zachar, sola autem efficiente causa ab eo differre. Quantūvis Manardus repugnet, ut abiq; ulla controuersia in omni disciplinarum genere doctissimus & exercitatissimus, rerumq; insuper cognitione haud uulgari insignis, sitatur. qui pluribus locis epistolarum suarū obtinere contendit, Zachar antiquorum à nostro Zacharo, materia efficiente, forma, fine & uiribus differre, & prorsus rem diuersam esse, haud contemnendis rationibus & argumentis inductus, quibus non paucos traxit in suam sententiam. Nos uerò cōtrarium semper credidimus, & adhuc adfirmamus. Quare si quid rei certo cognoscendæ gratia dicturi sumus, id ueritatis amor, nulla erga uirum doctissimum & uitam iam defunctum similitas, dicere nos compellet: ex animo enim semper complexi sumus eius scripta, plena reconditæ eruditionis, & maximæ utilitatis, ut ob id solum charus nobis esse debeat Manardus: nisi multo charior nobis redderet obsequia, candor, & amicitia quibus parentem nostrum familiariter prosecutus est, cum quondam Ferrariæ medicinam profitemem ipsum atque Nicolaum Leonicensem præceptores haberet. Ostensuri igitur nostrum Zacharū ex eadem fieri Cannam, qua ueterum Zachar colligebatur, atq; idē prorsus cum hoc esse, quod materiam, consistentiam, qualitates & facultates attinet: opera precium duximus hoc uti ordine, ut primum argumenta, quibus nititur in confirmanda sua opinione Manardus, enumeremus, deinde ea cōuincamus. Ultimo uerò ut nostram sententiam firmioribus argumētis defendamus. Argumentis autem eius hinc inde ex epistolis medicinalibus in unum collectis, positionum disputandarum modo numeros adscribemus, ut legentes clarius uideant contra quod quoquo loco disputemus. Sunt autem quæ sequuntur.

I.

Zacharum uulgare non modò Galeno, sed & omnibus medicis eo uetustioribus, Argumēta Manardi numero
id nonnullis qui per multos annos eum secuti sunt, penitus fuit incognitum: quoniam
id silentio præterierunt.

II.

Nonnulli ne nominis quidem mentionem habent:

III.

Alii nomināt quidē, nō tamen uulgare hoc intelligunt, quod plantæ succus est, sed melleum rotē supra harundinis folia conglobatū, à Manna uocata parum differentē.

IIII.

Vtrumq; enim (hoc est) Manna & antiquorū Zacharum sub roscido, seu (quod idem est) aëreo melle tanquam genere continetur.

V.

Nam Zacharum non est cannæ succus: sed Indus & melleus ros, in harundinibus concretus, ut Galenus etiam putauit.

VI.

In hoc tamen Manna à Zacharo differt: quod Manna super alias plantas & petras cadit: Zacharum uerò super harundines in India & felici Arabia,

Zacha.

Zachariautem ueterum & nostri uulgaris differentia est, quod ueterum Saccharum supra ueræ harundinis folia in India, foelici Arabia, & monte Libano concrefcit: Nostrum uerò in plantæ cuiusdam pulpa latitet.

Differunt etiam, quod nostrum priusquam coquatur, colore potius sit nigricans & subrufum, quam candidum. Nec dentibus fragile, sed per succum, non per dentium attritionem, deglutendum.

Differunt quoque causa efficiente: siquidē nostri efficiens est, primum forma, uisq; plantæ suæ ex qua premitur; secundum artifex calore ignis cōcoquens & defæcans: Veterum uerò Zachari noctis primo frigus adglutinas: dehinc superueniens solis calor obdurans.

Differunt præterea, quod antiquo Zacharo materia eadem sit quæ melli, hoc est, (ut ipse dicit) Ros: nouo uero seu nostro, plantæ cuiusdam succus.

Differunt postremo etiam forma, Antiquum enim, salis: nouum, inspissati liquoris formam habet.

Quin etiam succus è cannis expressus, hoc est, nostrum Zucharum, nullum cum antiquo Zacharo, præter dulcedinis confortium habet.

Non tamen penitus Galeno incognitus fuit Succus Indicæ harundinis radicibus pressus, cuius Varro meminit, si ad memoriam reuocauerimus, id quod quarto libro de simplicibus medicamentis scriptis mandauit: radices scilicet, calamorum, præcipue Aegypti, dulces esse.

Neque tamen Galenus, neque Varro, neque Solinus, (qui harum quoque cannarum mentionem facit,) succum per earum pressionem elicatum, Sacchar uocauerunt, aut esse scripserunt.

Differunt quoque cannæ utriusque Sacchari: nam cannæ in quibus Saccharum antiquorum concrefcit, ueræ sunt harundines, leues, duræ & intus uacuae: cannæ uerò ex quibus nostrum Saccharum exprimitur, ueræ cannæ non sunt, quoniam exteriore tantum specie harundinibus similes sunt, intus uerò minime cauæ, sed pulposæ, graues, molles, & succi plenæ, atque Milio potius Indico (quod Melicam uocant) quam harundini similes.

Secundum Auicennam Zucharum Alhufar (quod est Manna cadens super plantam Alhufar) idem est cum antiquorum Saccharo: easdem enim uires ei Auicenna tribuit, quas ueteres suo Saccharo adscripserunt.

Eadem igitur est materia Mellis apum, Mannæ, & Sacchari antiquorum, etiam secundum Auicennam.

Veteribus etiam qui Mellis speciem Zacharum esse tradiderunt, Alexander Aphrodisæus secundo problematum suorum libro in hæc uerba subscribit. Quod Zachar Indî appellant, mellis coagulum est, solecogente, conuertenteque ad mellis dulcedinem, quod idem etiam in monte Libano fieri certum est. Fit Sacchar id proximum salis glebulis, candidum, fragile, &c.

Serapion etiam annos sexcentos Galenum sequutus sit, dum quatuor aut quinque Zachari genera enumerat, uulgare hoc penitus præterit.

Vincentius Caprilis de materia Sacchari aliquid tangens, narrat potius quam probet ex

betex eadem materia (hoc est harundine concisa) utrumque constare, uidelicet antequam
rum Saccharum & nostrum Zucharum.

XXI.

Repugnat etiam Vincentius Capriliis omnibus antiquis medicis quod dicit: Licet inter mella à Dioscoride, Plinio & aliis antiquum Zacharum enumeretur, non ideo tamen hoc factum, quod eiusdem materie putauerint, sed quia consueuerunt cognata congeneribus adiungere.

XXII.

Consueuit quidem Dioscorides diuersarum rerum capita, ob quandam uel naturæ uel figuræ uel alterius rei similitudinem, inuicem copulare, ut toto eius libri progressu uideri potest: sed uno eodemque capite de diuersis toto genere rebus nunquam eum uidebis tractantem.

XXIII.

Quum igitur uno capite, libri uidelicet secundi lxxiiij. cui titulus unicus est, de melle, cum tribus mellis generibus de Saccharo scribat, clarum est quod mellis speciem putauit, quod ipse etiam modus loquendi, uerbaque aperte monstrant.

XXIIII.

Postquam enim egit de melle Heraclio, subdit: uocatur & quoddam Saccharum, quod mellis genus est in India scilicet Arabia concreti.

Prima autem positio Manardi eatenus tantum locum habet, quatenus factitium (hoc est) expresso cannarum succo coctum Saccharum intelligit, quo omnes utuntur. Ea enim exprimendi ratio antiquis medicis incognita fuit: Varroni uero, Statio atque aliis probe nota. Antea enim lectorem monuimus, duplex esse Zacharum, alterum sponte in harundinibus concrefcens, sole cannarum succum elicente, & in salis spissitudinem densante. Alterum uero, quod postea cepit ex iisdem harundinibus exprimi, & igne densari, humana industria naturæ uestigia sequente. Quemadmodum enim natiui Sacchari efficiens est solis calor: ita factitii, hoc est, nostri Zachari efficiens est ignis. Materia uero utriusque eadem existit, uidelicet cannarum istarum dulcis succus, in natiuo paulatim inuento circa oculos meatu erumpens, tum per se, quia turget: tum etiam solis attrahente facultate elicitus. In factitio uero Cylindri ab aqua obiter uersati, ut in quibusdam locis fieri comperimus, aut alia quapiam uiolentia expressus. Cum itaque & solis & ignis calori idem sit in densando affectus, utrumque eandem naturam materiam, eandem efficere necesse est: à sole uero elaboratam suauiore & tenuiore euadere, quam quæ ab igne facta fuerit, omnibus puto notum esse. Concedimus igitur Manardo nostro, factitium Zacharum Galeno, eoque uetustioribus medicis, incognitum: natiuum uero quod sola efficiente causa ab eo differt probe notum fuisse. Sed circa hanc positionem non uersatur summa disputationis. Nam præter id quod dicit Manardus noster, uulgare Saccharum Galeno, eoque uetustioribus medicis ignotum fuisse, totis uiribus obtinere conatur, res penitus diuersas, (non tantum efficiente, sed & materia, forma, sine & uiribus) esse: quam opinionem à ueritate maxime alienam esse sigillatim in sequentibus positionibus conuincemus, ea tamen modestia & temperantia id fiet, ut nemo bonus & ueritatis amans calumniari possit, nos tanti uiri auctoritatem, famam, ac fidem incessere: quem nos impensius semper amauimus, quam quicquam alii qui honorificentissimam eius in scriptis suis mentionem faciunt. Quod autem in hac prima positione dictum à nobis est, eandem esse materiam antiqui Sacchari & uulgaris, & utrumque ex earundem harundinum succo fieri, postea suo loco ostendemus.

Secundum argumentum neque Manardi opinionem firmat, neque nostram destruit. Etiam si enim nonnulli ne nominis quidem meminissent, non tamen inde constat diuersum penitus esse ab antiquo Saccharo nostrum uulgare. Quod uero in tertia dicit quosdam nominare quidem Saccharum, non tamen uulgare hoc intelligere: at Saccharum hoc natiuum, melleum esse rorem, à Manardo uocata, parum differentem: certissimis inditiis moti, pernegamus. Nullus enim unquam ueterum eius rei suspicionem nobis in scriptis suis reliquit. Sed solus Manardus noster Alexandri Aphrodisei diuersas res quodam loco confundentis, erronea opinione deceptus & seductus, id longis scriptis adstruere conatus est: Quod autem Alexandri Aphrodisei Saccharum cum Manna confundentis opinio falsa sit, & quod

*Refutatio
argumenti
primi Manardi.*

Sacchar antiquū nō sit ros melleus, in hac tertia positione simul declarabimus, sumptis argumentis à materia, & consistentia, forma, sapore, quantitate & aliis quibusdā differentiis, utriusq; uidelicet Sacchari & Mannæ. E quibus si aliquot non comprobata certis rationibus reliquerimus, ea omnia repetemus, cum quid sit Saccharum antiquorū in calce huius commentarii dicturi sumus. Dicimus igitur Sacchari antiquorum materiam succum esse suæ cannæ, & non melleum rorem, quod postea experientia confirmabimus. Consistentia autem Sacchari solida est, dura, & licca, quemadmodum sal fossilis, ideoq; similiter dentibus contritum crepitat, & corruptioni non est obnoxium, si in sicco seruetur loco. Mellei uerò roris iam densati, laxior, friabilior, humidiorq; est consistentia: quare neque inter dentes crepat, neq; uetustatem ferre potest: sed citò bonitatem amittit, & tandem putrescit, amissis colore, saporis gratia, & uiribus, & ascitis alienis quam tumuis diligenter reponatur, qualitatibus, nigro colore, & acoro & acrimonia. Rorem autē melleum non esse Saccharum, ipsa etiā forma indicat: Melleo enim rorū cum in micis concreuit, forma est rotunda, & globosa, quemodmodū singulis roris & aquæ guttis: ut omnes quibus ueram Mannā uidere licet, deprehendent. Saccharū uerò nunc oblongam, nunc globosam, nunc Mannæ si gurā habet, ceu Mastiche, Thuris micæ, & aliæ quædam plantarū densatæ lachrymæ, ut manifeste appareat harundines id lachrymasse, & nō à cælo descendente melleum rorē excepisse. Sapor etiā Saccharo non est idem qui melleo densato rori, hoc est, Mannæ. Saccharū enim syncerū admodū, & minime mixtū saporē præferet, & totū in ore salua dilutum liquefit. Mannæ contra non syncerus, sed mixtus est, ueluti si quis melle' exceptam Similaginem guster, ut etiā sacra scriptura testatur, nec ita facile liquefit, sed inter dentes lentescit, Sed obiciet fortasse nobis quispiam: etsi Tutrumq; materia melleus est ros: saporem tamen, consistentiam & formam utriusq; diuersas accidere posse, ijs ipsius Manardi uerba obiciemus. Saccharū ab alia Manna eo tantū differre dicentis, quod illud supra harundines cadat, hæc uerò super alias quascunq; plantas & petras: quæ Manardi uerba si uera sunt, necesse est neq; materia, neq; forma, neq; magnitudine, neq; sapore, neq; aliqua alia qualitate ista inter se differre, præterquam rerum supra quas se demittunt diuersitate. Sed illud discrimen nullus unquam inter Saccharū & Mannam posuit præter Manardum, cui (etiā si nihil nobis esset quod responderemus) in hac fide minime habituri essemus, cum ipse huius causæ sit actor, & ad causæ suæ defensionem solus id dicat quidem, sed non probet. Magnitudo præterea apertè indicat Saccharum nullum rorem esse posse. Si quidem omnis ros paruis decidit guttis: & si melleus sit, in paruas concreuit micæ: Saccharum uerò in multo maiorem quàm ros aliquis micas concreuit: ut etiā non raro maximæ auellanae magnitudinem æquet. Forsitan hic quoque obrudetur nobis in Manna frequentes esse micas, Fabarum & auellanae quantitate. Responderemus nobis certo constare Mannam in tantas micas concretam non natiuam, sed dolo impostorum confectam esse. Nam uera Manna exiguis constat granis. Micarum quoque Sacchari paucitas declarat, id rorem non esse aut fuisse. Ros enim cum decidit, numerosis densisq; guttis decidit, omnia latè obtegens & conspergens, instar pruinæ, ut etiā sacrae literæ testantur. Sacchar uerò si melleus esset ros, non tantum in harundines caderet, sed in alias quoque uicinas arbores, frutices, herbas & gramen. Cum igitur nullus authorum id testetur, neq; experientia comprobet, sed in solis harundinibus inueniatur concretum, ros esse non potest. Cur enim hic in harundines tantum caderet præteritis totaliarum plantarum generibus, maiore spacio facilius hunc excepturis. Sed dicit Manardus noster aptiora esse harundinis folia ad tolerandum maiora Sacchari frustra. Atqui si robur foliorum harundinis causa est, utin hæc decidat hic melleus ros, quæso respondeat cur non in plures alias arbores & herbas se demittat, quarum folia & robore & latitudine multo maiora esse cōstat quam harundinis. Nos uero in uniuersum non concedimus Saccharum in folijs harundinū inueniri. Nemo enim id unquam prodidit præter Manardum, qui hoc exhibitō absq; ulla probatione dicit. Inuenitur enim (quod experientia sensibus nostris exploratū habemus) Saccharū nō in folijs, sed in ipsis culmis, qua oculi & germina è geniculis prodeunt concretū. Si autē ros esset, non ab erectorum culmorū superficie ad la-

Intrinsq;

ad latus uergente exciperetur, sed foliorum latitudine cœlo expansa, si modo ea re-
panda essent. Quoniam uerò maxima eorum pars (ne dicam omnia) recta mucrone
suo in altū attollitur, ueluti in nostris paludibus Tiphæ & Caricis folia, minime apta
sunt cœlo decidentem melleum rorem excipere: nisi quis ea mucrone suo, hunc inter-
ripere causetur, quod planè absurdum est. Sed hîc quoq; obicitur nobis, Manardū
de uera harundine loqui, cuius panda sint folia: nos uerò de Canna Zucharî nostrî,
quæ plurimum inuicem differant. At nos paulò post demonstrabimus non differe
Cannas nostrum Saccharum fundentes, à Saccharum antiquum ferentibus harundi-
nibus. Rorem postremo non esse Saccharum cōcretionis & resolutionis causa (quam
Phylica nos docet) clarè ostendit. Melleus enim ros omnis diurno calore in pingue
liquorem excoctus, nocturno frigore in micæ densatur & concreuit. Notum autem
calore rursus dissolui quicquid frigore concreuerit: utrumq; hoc melleo accidit ro-
ri, ut etiam ex sacris literis dicere possumus, quæ manifestè testantur rorem illū mel-
leum, ubi sol incaluerit, liquefieri. Si igitur eadem materia constaret Saccharū & mel-
leus ros, & eadem ex causa concreuerent, necesse esset Saccharum similiter sole incale-
scente aut alio calore quopiam sicco dissolui. Sed hoc non tantum non dissoluitur, sed
durius solis calore euadit. Quod autē Saccharū efficit & densat, melleū rorē dissoluit
& destruit. Quapropter Saccharū nihil minus est quam melleus ros cœlo in harundi-
nes delapsus. Quod autē scribit Manardus parum à Manna differre Saccharū, nemi-
nem persuasit, cui hæc quæ modo diximus, probè intellecta fuerint. In quarta au-
tem positione, non opus est refellere quod tradit tam Saccharum antiquorum, quam
Mannam sub rosido seu quod idē est aëreo melle tanquam genere contineri: liqui-
dem iam ostendimus Zacharum non esse rorem. Porro si Saccharum rosçidis mellis
species non est, nemo illud sub hoc eui genere contineri affirmabit. Quod autem
in quinta dicit Zucharum non esse Cannæ succum, postea falsum esse ostendimus,
cum quid reuera sit Saccharum dicendum uenit. Rorem uerò non esse iam ostensum
est. Omnium autem maxime inuitilegimus, Manardum affirmare etiam Galenū pu-
tasse Saccharum melleum esse rorem: cum tamen nusquam hoc uel minimo iudicio
prodiderit. Si enim Saccharum melleum rorem esse putasset, proculdubio de alimen-
torum facultatibus libro tertio eius mentionem fecisset, ubi satis prolixè de rosido
melle differit, Saccharum omnino præteriens: libro uerò septimo de simplicium me-
dicamentorū facultatibus in mellis capite seorsim de Saccharo, tanquam re diuersa à
rosido melle agit his uerbis: καὶ τὸ ζάχαρ δὲ καλὸν μύρον, ὁπερ εἶναι ἴσται τε καὶ οἱ φιλόσοφοι
Ἵπποκράτης κομίσεται, περιτρίβεται μὲν, ὥς πασι, καλὰ μοῖς: εἰ δὲ τὴν καὶ αὐτὸ μέλιτι εἶδος,
quorum sensus est. Et Sacchar uocatum, quod ex India & felici Arabia affertur, ad-
densatur ut aiunt circumfusum harundinibus: est autem & hoc mellis species. Qui-
bus uerbis nō innuit Galenus, rorem esse de cœlo cadentem supra harundines: sed
quomodo rorē putare potuit, rem, cuius origo eum latuit: Dum enim dicit (ut aiunt)
dubitat an addensetur in harundinibus Saccharū. Sed quod maximè urget, est quod
Galenus dicat mellis esse speciem. Nam ita argumentatur Manardus: Mellis materia
est ros: Saccharū est mel: Ergo Sacchari quoq; materia ros est. Per mel autē in maiore
positū mel apum intelligit. Verum ad hoc respondemus, nō ualere argumentationē
à specie ad speciem. Sed nondum cōstat, mellis ab apibus collecti materiā rorē esse. Et si
Plinius id affirmare uideatur, & Galenus cōgenerem rori mellis materiā credat, de
quare post dictū sumus. Eito autē, quod mellis generali uocabulo hæc mellis species
cōtinentur, Mel apū, Mel rosçidū & Saccharum, non tamen necesse est omnes eiusdē
generis species ex eadē fieri materiā. Exempli gratia: si quis Diphryges metallicū me-
dicamentū sibi proponat, quod tanquam genus tres habet species, sed materia pluri-
mū differentes. Primæ enim materia lutū quoddā est: secundæ Pyritis lapidis secu-
lenta & terrestris substantia: tertiæ ipse Pyrites lapis. Sed non solum singulæ eiusdē
generis species diuersa nonnunquam materia constant. Apū enim examina non solū
nasci constat ex lulorū in salice, Populo, Alno, Corylis nascentiū luteo succo soq; pol-
line in fauis repolito, uerum etiam è strangulato & putrefacto uitulo, ut Vergilius
quoq; scriptū reliquit. Quare nō est mirum aliam esse materiā Mellis apū, & aliā
Sacchari: quod tamen nō propriè, sed æqui uoce mel uocatur, quoniam instar apum

mellis dulce sit, quemadmodum Vrtica piscis, non quod herbe Vrticę similitudinē
 6 habeat, aut eadem materia constet, sed quia Vrticę modo tactam cutem urat. Mannam uerō in hoc tantum à Zacharo differre, quod illa super alias plantas & petras cadat: hoc uerō super harundines, ut in sexta dicit, antea quoque negauimus. Sed præterquam quod Manardo in hac credendum non sit, quoniā primus & solus id dicat ad suę opinionis defensionem, multa sunt quę ostendunt, alias eorū differentias. Videlicet, utriusq; materia, consistentia efficiens, forma, sapor, quantitas, concretionis causę & alia de quibus supra diximus, cum ostenderemus Sacchari materiam nō
 7 esse melleum rorem. Saccharū uerō antiquorum à nostro distinguens in septima, perinde nobis non satis facit: præsertim quod dicit, id supra uerę harundinis folia concrecere. Sed cum tot sint harundinum species, quę singulę uerę sunt harundines, miror ualde quamnam ueram ipse intelligat. Veteres simpliciter harundinem esse dixerunt, & non speciem indicauerunt, in qua Sacchar gignitur. Multo autem magis miror quod dicit etiam in monte Libano, Sacchar supra harundinum folia concrecere, cum tamen nullus prodiderit unquam, ex eo monte Saccharum petiitū, nedum in harundinibus cōcretum, quibus natura est montes euitare, & in planis, a quosis & palustribus locis nasci. Sed decepit Manardum Aphrodiseus, Saccharum cum roscido melle confundens. Roscidum enim mel, hoc est Mannam, crebrō in Libanū montem delabi etiam Galenus testatur, quod multum à Saccharo distare antea indicauimus:
 8 Octaua positione in Manardo nostrum Saccharum ab antiquorum distinguente, æquū iudicē desyderamus. Debebat enim ambas res iam perfectas & formā suā adeptas, inuicē conferre, & non crūdum succū & rudem materiā nostri Sacchari antiquorū Saccharo cōferre. Postquam enim & nostrū formā suam acquisiuit, perinde candidū dentibusq; salis modo fragile euadit: ut non opus sit per succū, sed etiam cum dentiū molestia attritū, deglutire. Differentiam utriusq; Sacchari per efficientē causam ponens, impegit uehementer Manardus, quod dicit, uetus Saccharum primo nocturno frigore ad glutinari, dehinc superuenienti solis calore obdurari. Quod quā uerum sit ipse melleus ros sole incalescēte tactus docet: nocturno frigore enim concretus superueniente solis calore rursum dissoluitur, & diffuens perit, ut omnes nouerunt, qui matutino tempore serenis æstatis diebus in syluas prodeunt. Testantur etiam sacrę literę, sole tactam Mannam, quę idem est quod melleus ros, liquefieri. Quare absurdum admodum est, inderem aliquam indurari, qua emolliatur & destruat. Sole autem non indurari constat, quoniam Isrælitę eam mane antequam sol accederet colligere, & in umbram referre cōgebantur, alioquin delapsum succum & minimè rem induratum inuenturi. Porro contraria causa Mannam seu melleum rorem efficit: ascendentes enim ē terra dulces halitus in aërem eleuati à terreno purgantur, atque serenis diebus calore solis in dulciorem succum excocti sequenti noctis frigore concreti, ante diluculum alterius, roris aut pruinę instar decidunt: ut Galenus etiam ipse indicat libro tertio de alimentorum facultatibus in capite mellis, ubi aerei quoque mellis meminit, dicens: peritis naturę interpretibus uisum esse, halitus ē terra atq; aquis prodeunt, solis calore exactē attenuatos accoctos, à frigore sequentis noctis in unum cogi ac densari. Debuisset ergo Manardus altius reinaturam & efficientem causam considerare. Differentiam autem inter antiquum & nostrum Saccharum à materia sumptum ponens, ideo suam non probare posse sententiam nobis uidetur, quoniam argumentum sumit à re, cuius origo authoribus exactē non constat. Dicit enim, antiquo Saccharo eandem esse materiā quę sit melli. Mellis autem materiā rorem esse contendit. Sed nos contrā probauimus, Sacchari materiā non esse rorem. Formam nostrum Saccharum ab antiquo distinguens, se digna haudquaquam scribit: quis enim unquam uidit densatum aut sole aut igne succum, aut liquorem aliquem cuiuscunque plantę, forma nostro Saccharo similem? Omnes enim succi & liquores cum igne, ut Saccharum uulgare densantur, spissi, glutinosi, lenti, tenaces, minimè friabiles, ad contundendum contumacissimi & nigriores euadunt, ceu succi Glycyrrhizę, Gentianę, Centaurii, utriusq; Lycii, Hypocistidis, & quotquot alii igne densantur: Saccharum autem in omnibus his densatis succis

succis aduersatur: friabile enim, confusu facile, & candidum est. Præterea aspectu, candore, splendore, & crepitu ipso inter dentes adeo Sali est simile, ut non possit esse similius; de bono autem loquimur, quale est è Canariis Insulis aduectum, & quodcunque aliud à sine nomen habet: & non de sœculento, impuro, & industria ab impostoribus adiecta spuma sua adulterato: res enim ad perfectionem perductæ & formam suam iam adeptæ, inuicem conferri debent. Addit succum è cannis expressum, hoc est, nostrum Saccharum, nullum cum antiquo præter dulcedinis consortium habere, quod tam infirmum est argumentum ut seipsum dissoluat. Si enim dulcedine consortium habent, necesse est etiam temperamento & uiribus non discrepare. Ex sapore enim maxime rerum temperamenta & facultates iudicare, Galenus nos docuit. Quare si uiribus perinde ut dulcedine sibi hæc respondent, non dulce dine tantum consortium habent. At nos addimus etiam materiæ consortium habere. Vtrumque enim succus eiusdem est plantæ, ut postea indicabimus. Quod uero credit Manardus Galeno nostræ Saccharæ cannæ succum nõ penitus incognitum fuisse dicenti, calamorum, præsertim Aegypti, radices dulces esse, libro quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, à ueritate est alienum. Minime enim sermo illi est de Cannis Saccharum ferentibus, summa propemodum dulcedine, ut mel, præditis: sed de uulgaribus harundinibus atque certo eorum genere dulciore, & de aliis quibusdam rebus aqueam dulcedinem (dum uirides sunt) præferentibus, inter quas etiam Gramen est, & plerarumque arborum germina. Quod autem per dulces Aegypti harundines, non intelligat Cannas Sacchari, perspicuum sit Theophrastum (ex quo hoc de Aegypti harundinibus sumpsit Galenus) legentibus libro sexto de causis plantarum, cap. xvi. ubi causam indicat, quare nonnullis herbis dulces sint radices, reliquæ uerò earum partes, quæ supra terram attolluntur, insipidæ existant, his uerbis: ἡ πάλιν διὰ φύσιν τὰ τῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τῆς ἕρως, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τὰ καλαμῶν. ἔφαρ' γὰρ τὰ ἰππῶν· τὰ κίττω δὲ, ἐν γὰρ κίττω. Quorum sensus est: Aut econtra propter siccitatem eorum quæ sunt superiora: quemadmodum gramen & simpliciter omnia harundinacea: sicce enim sunt horum partes superiores, inferiores uerò humidæ. Hæc autem Theophrastus de uulgaribus harundinibus in Europa cognitis scribit: atque iis etiam quæ harundinibus non sunt dissimilia, aut foliis, aut geniculatis culmis, aut utrisque, ut Sisyrinchium, Gladiolus palustris, &c. per inferiora autem earum herbarum Theophrastus intelligit radices, quæ dulces sunt. Per superiora uerò culmos & folia. Hunc autem locum ideo ex Theophrasto exscripsimus, ut sequentia de Aegypcia harundine facilius intelligantur, de qua in hunc modum scribit, διὸ καὶ ὅπου πλείων ἐν τροφίᾳ, καὶ τὰ αὐτῶν φύσιν ἔχον, ὁ δὲ ἄλλος: καὶ ὅτι αὐτῶν αὐτῶν τὸ καλὰ μὲν τὸ πρὸς τοῖς ἑλκυσιν, ἔχει μὲν γὰρ τινὰ γλυκύτητα, ἀλλ' οὐκ ὡς τῶν ἄλλων, ἀλλ' ὡς τῶν βαρυπλάτων. ἰκάνει δὲ ὅτι ἐν τροφίᾳ ἀπαλὸς γ' ὡς πλείων δὲ καὶ γλυκύς. ἔχουσιν δὲ καὶ ἰσχυρὰ τὴν γλυκύτητα, μίχρως δ' αὖτ' ἐφαρ' ὁ δὲ σιν: αὐτὰ ἐφαρ' ὁ δὲ σιν, quod est: Propterea etiam ubi plus est boni alimenti, etiam superiora eorum quæ natura siccata sunt, eorum apta sunt: quemadmodum in Aegypto harundinis, eius uidelicet quæ est in paludibus: habet enim quandam dulcedinem, etiā alioqui summitas, sed per exiguam, omnium: hæc autē propter alimenti bonitatem & copiam, tenera præ ceteris est, ac dulcis: habent autē & radices eam dulcedinem usquequo exiccentur, resiccatæ uerò minime. Quibus uerbis Theophrastus docet, Aegyptiam illam harundinem natura siccam & inspidam esse, quod ad folia & calamos attinet: quoniam uerò in paludibus nascatur, alimenti bonitate fit, ut parte sua superiori, tenera & dulcis euadat. Nili enim aqua natura dulcis est: quo fit ut plurimarum herbarum in paludibus eius & circa nascentium radices edendo sint & dulces. Itaque si eadē harundo extra paludes proueniret, dulcedinem illam in summitate nõ haberet. Sed ut ut res se habeat, constat hanc Aegyptiam harundinem non esse eandem cum Sacchari canna, quoniā illa per accidens propter alimenti dulcedinem dulcis euadit: hæc uerò natura talis est: illam Theophrastus dicit aliquam habere dulcedinem, hoc est, non magnam nec insignem: hæc uerò maximam & cum melle certantem: illa minime tota dulcis est & breuius admodum parte in summitate qua tenera adhuc est, & humida: hæc per totum calami diffusam dulcedinem habet: illius radices eò usque dulces manent, donec humide sunt, exiccatæ uerò dulcedinem amittunt: canne uerò Saccharicum radices tum ca-

Ita etiam exiccatæ dulcedinem suam seruant. Quapropter nobis non persuadebit Manardus, Theophrastum aut Galenum per Aegyptias harundines Saccharicannas intellexisse. Quod uerò neque Solinus, neque Galenus, neque Varro succum cannarum Saccharum uocauerint, aut esse scripserint, nihil impedit quo minus eadem cannæ tam factitium quam natium Saccharum fundant. Illud etiam ex libito dicit, nulla neque autoritate, neque experientia fultus, quod scribit harundines, in quibus antiquum Saccharum concresecat, ueras esse harundines, duras, leues, & intus uacuas. Putat enim Manardus ueras esse eas harundines tantum, quæ apud nos in Europa nascuntur & concuæ sunt. Sed meminisse debebat Manardus etiam inter uulgares Europæ harundines (quas ille tantum ueras esse credit) certum genus, quod non cauum sit, sed solidum densumque: qualis quæ uasæ Græcis à soliditate, & Latinis Sagittalis uocatur. Authores autem simpliciter & indefinite tradiderunt in harundinibus Indiæ & foelicis Arabiæ Saccharum concrescere: nec dixerit nostras aut uulgares esse harundines, sed Indicas, etiam Varone scribente:

Harundo
sagittalis.

*Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
illius è lentis premitur radicibus humor:
Dulcia cui nequeunt succo contendere mella.*

Porro Theophrastus ubi res in India nascentes enumerat, scribit nullam omnino arborem, nullum fruticem, nullam herbam in India comperiri similem his quæ in Græcia proueniant, paucis exceptis, quod Alexandri, res in India gerentis comites, reuersi retulerunt. Quapropter haud mirum alicui uideri debet, Indicas etiam harundines non per omnia in Europa natas similes esse. Habet tamen India eadem arborum, frumentorum & leguminum genera, quæ apud nos proueniunt, ut tradunt authores: fert enim Nucem, Ficum, Vitem, Oleam, Castaneam, Palmam, Triticum, Hordeum, Milium, Fabam, Lentem, Lupinum, Smilaces satiuos, & alia pleraque quæ ad nostrarum plantarum genera referuntur, sed specie & magnitudine à nostris differunt. Minimè igitur absurdum est harundines quoque Indiæ à nostris differre, quamuis Cannæ Sacchari, tantum succi dulcedine, crassitudine & crebrioribus geniculis à Nasto uocata in Europa harundine dissent.

† Lib. 16.
cap. 35.

Plinius † certè adeo non dubitauit diuersas esse à nostra ubi Indiæ harundines, ut etiam prodiderit singula eius internodia, alueo nauigabili ternos etiam homines ferre: aliam eis naturam quam nostris & arboream amplitudinem tribuens; at ne fabulam scripisse uideatur, addit: quales uulgò in templis uidemus. Res enim peregrinas uisui raras & insolitæ magnitudinis publicis locis reponi solent: quemadmodum apud nos quoque uidere est in templis Indiæ testudinis immanes testas, ac horrendæ uastitatis Balcanarum ossa. Ratiocinatur etiam in hunc modum Manardus:

Zuccharum
alhusar.

Zuccharum Alhusar est Manna cadens supra plantam Alhusar, cui easdem uires Auicenna tribuit, quas Græci suo Saccharo. Ergo idem est cum Zuchara Alhusar Græcorum Saccharum: ex quibus adhuc colligit Saccharum melleum esse rorem. Sed miramur uehementer ipsum suffragia ab Auicenna petere, quem usque adeo detestatur, & cuius nullam facit autoritatem, nec si qua sit admissurum se protestatur, nisi id in gratiam amici faciat. Nos uerò haud temere Auicennam hoc dicentem reuicimus, etiam si contra nostram sententiam scribere uideri possit. Ideo autem hoc Manardi

Hahoscer.

argumentum reuicimus, quoniam per Hahoscer, quod idem est cum Alhusar Auicennæ, non eandem omnes plantam intelligunt, aliis rectam & proceram quamdam plantam, aliis certam Tithymali speciem sic uocantibus. Præterea non conueniunt inter se in definiendo Zucharo Alhusar authores. Auicenna enim dicit id Mannam esse, quæ cadat supra plantam Alhusar. Serapio contra autoritatem Abrionisæ, scribit Zucharam Hahoscer egredi ex oculis ramorum suæ plantæ, & à locis foliorum eius, hoc est, quæ folia à planta sua & oculis epascuntur. Quare cum ille Mannam esse dicat, hic uerò lachrymam ex Hahoscer emanantem, nondum composita controuersia nullum suggerit Manardo argumentum. Nos tamen credimus Hahoscer plantam esse, cannæ Sacchari non dissimilem: quæ præinde ut Sacchari canna Saccharum ab oculis emittat, sed sui generis & minus dulce, quam uerum Saccharum, atque adstrictione & amaritudine etiam ab eo differens.

rens.

rens: Si autem contingit etiam Mannam supra Hahoscer cadere, poterit hæc Manna Alhufar uocari, ut etiam Auicennæ salua maneat fides & auctoritas. Quod uero eadem sit materia Mellis apum, Mannæ, & Sacchari antiquorum, haud quamquam concedendum putamus. Diuersa autem à Manna esse Saccharum antiquorum materia, antea ostendimus. At hoc loco demonstrabimus aliam à melle apum materiam habere, atque adeo etiam ipsum apum mel non esse rorem, sed plantarum succum. Saccharum è singularis & cuiusdam certæ harundinis oculis instar Gummi & lachrymæ alicuius erumpit. Mel apum uero non in una aut certa, sed omnis generis plantis gignitur, tam arboribus quam fruticibus & herbis. Saccharum in sole positum diutius euadit, Mel apum solis calore liquefit & diffusit. Saccharum cum ad formam suam peruenerit, salis modo in minutissimum puluerem redigi potest. Mel apum in puluerem haud quamquam tundi potest. Præterea sol in unam eademque materiam unam & eandem imprimit operationem: Clarum autem est solem aliam in mellis apum, aliam in Sacchari materia operationem exercere. Illud enim in liquidum coquit succum: hoc uero in durum, solidum, crepituque dum confringitur, aut dentibus conficitur, dissilientem, uelutisalem, conuertit. Quare si eadem esset materia Mellis quæ Saccharo, alterum alteri simile esset, & utrumque aut liquidum aut durum euaderet. Nam ubi omnes aut præcipuæ causæ sunt eadem, idem etiam effectus sequitur. Propterea unum idemque cum sit & mellis & Zachari efficiens, solis uidelicet calor, eadem etiam consistentia & Mellis & Zachari esset, si eadem materia constarent. Iam uero quia alia Mellis, alia Zachari est consistentia, etiam natura materiam horum inuicem differre necesse est. Postremo si utriusque materiam rorem ueteres esse credidissent, haud quamquam Mannam, *Δροσμελι*, id est, mel roscidum uocassent. Nam dum Mannam uocant roscidum mel, ad differentiam mellis apum, sumunt apum mel rore non consistere ut Mannam; (nunc ad alteram propositi partem uenimus, ostensuri mellis apum materiam.) Rationes uero & argumenta, quibus id demonstrant, non afferunt, quod enim Plinius ea de re scribit libro undecimo, nulli Philosopho altius mellis naturam perferutanti satisfacit. Quod autem diuersa sit mellis apum materia à rore, multæ mellis & apum proprietates palam ostendunt. Mel enim semper quocunque ueris & æstatis tempore in floribus reperitur. Mellei autem rores non semper, sed rarissime apud nos decidunt. Mel tam noctu quam interdiu in floribus reperitur. Melleus ros tempore tantum matutino. Mellis circa Meridiem plurimum in floribus deprehenditur: Melleus ros incalecente sole statim perit: Mel dum in floribus continetur semper est liquidum: Ros melleus concretus est. Mel apum in floribus continetur: Ros melleus super folia plantarum decedit: Mel uetustatem non tantum per se ferre longam potest, uerum etiam omnia alia quæ hoc excipiuntur in multos annos conseruare, quod Theriaca, Mithridatium, & alia huiusmodi confectiones clare ostendunt. Ros uero melleus, hoc est, Manna, ne solus quidem incorruptus unum atque alterum annum durare potest, nedum alias res à corruptione tueri. Itaque in fauis etiā, aut fauis expressum mel, breui corrumpetur, si melleus ros apum mellei materiam præberet. Præterea in Septentrione apud nos maxima mellis est copia, ut in Lithuania, Liouonia, et uicinis regionibus, in quibus tam rarissimi mellei rores conspiciuntur. Porro si rores est mellis materia, querimus qui fiat, quod hic in flores tantum decadat. Cælo enim delatus in ea potius se demitteret quæ lata & expansa sunt, uelut folia plantarum, & minime in tantillos flores: quoniam uero mel non in foliis plantarum sed floribus reperiatur, atque non totis, sed absconditis eorum anfractibus & posteriori tantum parte atque recessu, haud uerisimile est mellis materiam rore constare, quomodo enim his præteritis latissimis etiam foliis, in florum ultima penetralia tanquam furtim irrepens atque ex industria in latebris se abscondum recipere potest? Postremo constat omnibus, qui usque ad extremam senectutem apum naturam scrutati sunt rusticis, apes ipsas mellificaturas, tantum è floribus collectum liquorem in fauis reponere. Rores uero melleos cum decidunt, haud quamquam ad fauos reuehunt; quod ipsi quoque uerum esse deprehendimus. Præ-

Quod ros
neq; Sac-
chari mate-
ria sit, ut
predictum
est: neq;
Mellis ut
dicitur.

T
quo item
pore,

terea mellito rore delapso ad hunc frequentes quidem conuolant apes, minime ut eū in aluearia reuehant, sed tanquam ad cibum & pastum: quo adeo se replent, ut prorsus inertes et iguauę reddantur, multę emoriantur. Itaq; rustici dicere solent, mellitos rores bonū quidem pastum apibus prebere, sed ad mellificationē minime cōducere. Interim enim dum roris suauitate allectę cibi auidę detinētur, nihil ad aluearia conuehunt. Quapropter nemo nobis persuadebit, rorē, mellis apum materiā esse. Cū uerō res ipsa constet, necesse est alicunde materiā & originem trahere. Nos quidem credimus, haud absurdis rationibus moti, Mel quod apes colligunt, nihil aliud esse quā dulcissimum cuiuscunq; plantę succum, a sole ad extremas eorum partes (quales, flores sunt) elicatum & perfecte excolatum & excoctum, dum per tantum spaciū ad flores trahitur. Itaq; cum tempestiuos imbres serena cōstitutio sequitur, plurimum mellis gignitur, imbre succum & materiā plantis præbente, sole uerō in dulcem liquorem excoquente. Nonnunquam uerō cum melli gignendo aptissimus fuerit annus, mel non tantum in floribus latitat, uerumetiam ē furculorum dependentium apicibus, oculis & nodis destillat, ut aliquoties in Malo & Quercu obseruauimus: & ut certō sciremus an hoc mel in ipsis gigneretur furculis, uel an ros esset mel-leus furculis exceptus, mel ab iisdem furculis pluribus diebus abstergentes, singulis diebus inuenimus renascenti melle eosdem furculos madefactos, etiam cum nulli caderent mellei rores. Postremo rursum abstergos furculos incidimus, et intra corticem lignumq; eundem liquorem deprehendimus. Nihil autem ab alio melle florum do-liolis & calicibus contento distabat hic liquor. Quapropter non est, quod credamus mel, quod apes conuehant, rori cognatum esse, aut ex rore materiā sumere. Sed longius quā locus postulabat hac de re diximus. Quoniam uerō nōnihil ad rei cognitionem hæc facerent, & Manardi argumentum diluerent, celare ea legētes nolui-mus. Alexandri uerō Aphrodisei autoritas haudquaquam confirmare potest opinionem Manardi, contententis, Saccharum rore constare, siquidem mancum, mutilum & confusum chaos, eius est exemplar, & prorsus sui dissimile, tum quod or-dinem, tum sententias attinet. Tres enim Alexandri huius problemata interpretati sunt, uidelicet Georgius Valla, Theodorus Gaza, & Angelus Politianus, sed singu-li diuersum nacti sunt exemplar. In duobus quidē eorum, a Georgio Valla et Ange-lo Politiano uersis, prorsus non leguntur hæc sequentia uerba a Manardo & Fuch-sio in subsidium uocata. Quod Sacchar Indi appellant mellis coagulum est, sole co-gente rores, conuertentesq; ad mellis dulcedinem, quod idem monte etiam Libano fie-ricertum est. Fit Sacchar id proximum salis glebulis, candidum, friabile. Solus autē Theodorus hæc in suo exemplari inuenit. Sed non pertinere ad id problema hæc uer-ba, manifestē testatur problematis argumentum quod querit. Cur mel commende-tur quod acius sentiat: & cur amarius, incalescens reddatur: ad cuius questionis so-lutionem nihil prorsus facit meminisse Sacchari & *albanorii mellis, uiresq; eorum recensuisse. Adiecitium igitur est quidquid ultra questionem eiusq; solutionem pro-blemati adscriptū est. Quin & ipse Theodorus eorū uerborū quibus Manardus niti-tur interpres, palām indicat in præfatione ad Nicolaum, qui tum summum pontifi-cem agebat, hoc opus non esse Alexandri Aphrodisei, sed alicuius multo recentioris. Quapropter cum minime constet, ad quem authorem hæc problemata referri de-beant, & cum exemplaria uariant plurimum, ut prorsus sibi dissimilia sint, quis credet notha hæc Alexandri uerba Manardi opinionem confirmare posse? Serapionem uero quatuor aut quinq; Zachari genera enumerantem, uulgarē hoc penitus præte-riisse nemo concedet, qui nouerit quid sit Zacharum Tabarzēt, ita enim appellant fa-citium aliquoties despumatum, donec purissimum, solidissimum & candidissimum e-uadat. Porro Vincentius Caprilis haudquaquam Plinio & aliis antiquis repugnat, Sacchari antiqui & uulgaris eandem esse materiā dicens: & ueteres non ideo Sac-chari in mellis capite meminisse, quoniam eadem hæc materia constare crediderunt, sed quia cognata congeneribus adiungere consueuerunt, hoc enim Vincentii Capri-lis iudicium nobis admodum placet. Quemadmodum enim nullus ē ueteribus di-xit Saccharum rorem esse, ita etiam nullus eorum eandem materiā utriusq; Saccha-ri esse negare potuit, quoniam natiui tantum meminerunt. Vulgaris uerō faciendī ra-tionem

Alexandri
Aphrodisei
problemata
64.

tionem ignorauerunt. Quod uero Dioscorides uno eodemque capite nunquam agat de diuersis toto genere rebus, ut Manardus causatur, palam falsum deprehendunt, qui apud eum auctor caput Brassicę, Sisymbrii, syluestris Cymini, Libanotidis, Lonchitidis, Cannalis, Polygoni, Symphyti, Tribuli, Graminis, Tragii, & Aconiti, legent & intelligunt. Quid enim simile cum alia quauis Brassica, marina Brassica habet, quam Solanellam uocant, seu florem, semina, radices uiticulas, folia spectes: aut sapore confideres: herba enim est lacte manas et toto genere a Brassica differens, nullumque preter nominis consortium cum ea habet, preterquam quod nonnunquam in cibos recipiatur ut medicamentum potius quam alimentum. Ad eundem modum alterum Sisymbrium Cardamine cognominatum, toto genere a primo uero Sisymbrio dissidet: cui solo natali idem est, figura uero & qualitatibus diuersissima, quid enim quæso Nasturcium cum menta commune habet? Multo magis etiam a syluestri Cymino differt alterum syluestre Cyminum, quod Cornuetam Galli uocant. Quippe uere Nigellę species cum sit, semenque suum in Corniculis contineat, quam similitudinem cum Cymino umbellifera herba habere potest? Quid etiam ultimam Libanotidem, cuius Theophrastus meminit, uera & umbellifera Libanotidi cognatam facit: Nihil proferat certe quod ad figuram uiresque attinet: est enim e lactuce genere, nec quidquam habet, quo umbelliferas plantas imitetur. Idem multo magis apparet in Lonchitide, cuius altera species longo assurgit caule altera eo prorsus caret, illa folia Porri, hæc uero Polypodii habet: quibus haud potest magis dissimilis esse figura. Cannabis syluestris quoque quoniam Altheę similis est, nihil prorsus cum cannabe commune habet, preter corticis lentorem Polygonon quoque mas a femina Polygono usque adeo figura differt, ut non possit magis differre. Idem Symphyto accidit: cuius altera species Serpylli folio Origanii, altera uero Buglosse potius similitudinem refert. Tribulus quoque terrestris solo fructus aculeo palustre emulatur, reliquis notis prorsus dissidet. Idem in Gramine uidere est: siquidem aliud quoduis longo, angusto, acuminatoque constat folio ceu harundines: Parnasium uero hederaceorum figuram habet. Pari modo toto celo differunt Tragium Creticum, & alibi natum: illud enim, ut alia omittimus, Lentisces, hoc uero Scolopendrii foliis constat: utriusque uero nominis causam prebuit Hirco similis odor. Postremo manifeste etiam Aconiti species id ostendunt. Pardaliaches siquidem Cucumeris: Lycoctonon: Platani folia refert, illud longa, tenue, & geniculata constat radice: hoc uero longe diffusum. Illud breuem, singularem, & in nullis ramulos aut adnata diuisum proferat caulem, hoc uero multipliciter ramosumque. Quapropter cum pleraque iisdem capitibus toto genere diuersa a Dioscoride describantur, nullius est momenti quod contra Vincentium Caprilem pretendit argumentum Manardus noster. Quemadmodum igitur iam enumeratę herbe, quauis aliis, cum quibus idem nomen habent figura & reliquis accidentibus, dissimilime sint, nomen tamen ideo earum adepta sunt, quoniam aut uiribus, aut natalibus, aut odore, aut alia quadam singulari natura illis respondeant. Ita etiam Saccharum, quoniam non tantum dulcedine, uerum etiam uiribus mellis cognatum sit, multo aptius mellis nomen sortitum est. Itaque quod Dioscorides post alias mellis species etiam Saccharum recenseat, minime probat eadem materia & mel & Saccharum constare. Hactenus Manardi argumenta diluimus, cuius uestigia etiam Leonhardus Fuchsius ingreissus est, pariter ut Manardus contendens, non tantum efficiente, forma et uiribus, uerum etiam materia differre nostrum uulgare ab antiquorum Saccharo: nostrique Cannas Sacchari non esse eas harundines, in quibus ueterum Saccharum concreuit. Sed quia eadem illi sunt quæ Manardo argumenta, iisdem etiam rationibus quas antea attulimus dissoluenda præterimus. Restat autem Leonhardus Fuchsius, ut probemus ex eadem fieri harundine & ueterum & nostrum Saccharum, quæ quidem in remanere per longas ambages ingrediemur: cum ante ulterius quam commentarii magnitudo postulet, sermonem protrahere coacti fuimus. Sed omisissis pluribus quæ ad confirmandam nostram sententiam facerent, statim quid res sit dicemus. Pronunciamus igitur eandem Cannas & ueterum & nostrum Saccharum gignere: illud quidem natura ceu lachrymam aliquam expellere, hoc uero industria humana ac uio lentia pressas fundere. Quod palam sit Auicennę caput de Saccharo legentibus, utrumque enumerantis, Tabarzet uidelicet et quod ueluti Gummi ab harundine assumitur. Per

Tabarzet

Sepe eodē
communi
nomine a
pud Diosco
ridem res
toto genere
diuerſas nū
cupari: dū
modo leuis
aliqua simi
litudo eis
contigerit.

↑
Querendū
hoc an uerē
dicatur.

Saccharum
Dioscoridē
mellis no
mine uocat
se: non quod
substantia
ei cognatū
sed dulcedi
ne et uiri
bus.

Leonhardus
Fuchsius.
Probat Sac
charum uet
erum et
nostrum, ex
eadem har
undine esse.

Tabarzet enim intelligitur ē Cannis expressum prorsus depuratum & candidissimum: per hoc uero quod ueluti Gummi ab harundine assumitur natium, cuius ueteres meminerunt. Interim enim dum scribit assumptum sicut Gummi, indicat alterum uidelicet Tabarzet non esse Gummi seu lachrymam, sed succum eiusdem Cannæ, in qua natium cōcrescit, quod manifeste declarat uerborum contextus, series et ordo. Sed non multifacienda fortasse quibusdam innato odio aduersus Arabes medicos exacerbatis, Auicennæ authoritas uidebitur, quibus ipsam experientiam omnes controuersias conciliantem, & ueritatem certissimè indicantem, opponemus. Accepimus autem à plerisque qui Canarias uocatas insulas aliasque regiones perlustrarunt, etiam Ideotis in nullius gratiam dicere paratis, ē Sacchari Cannis erumpereliquorem, qui solis calore sponte in Saccharum conuertatur, interdum pellucidum ut candum factitium uocatum Saccharum: interdum uerò candicans, & non pellucidum, sed uulgo negligi, quoniam nō magna eius copia proueniat, quod quidem nos ex relatione aliorum accepimus, ante aliquot annos, sed altero hinc anno cum missam ex Antuerpia Cannæ Sacchari partem accepissemus, certissime cōperimus, uera naturam, qui id quod iam diximus, retulerant. In oculis enim Cannæ atque ea parte qua folia genicula amplectuntur, concretas Sacchari micas pisi magnitudine deprehendimus, itaque haud uulgarī gaudio affecti, hanc Cannæ partem ad alia, quæ chara nobis sunt, reposuimus. Quapropter quia oculis nostris id conspeximus, manibusque palpauius, certò affirmamus eandem esse materiam & nostri & ueterum Sacchari, & solo efficiente differre. Vulgare enim igne & industria humana, ueterum uerò natura & solis calore excoctum perficitur. Porro hæc de Sacchari, Mannæ, & Mellis materia dixisse sufficiat.

DE CERA. CAP. 105.

† In aqua. Cera est apum simplex fauus, in cellulas digestus, quæ ex colato omni melle, in qua per se liquata in orbes funditur, omnibus nota, Medicinæ & rei domesticæ ad multa utilis. Sequitur autem Cera mellis sui naturam, unde aliud Sardoæ, aliud Ponticæ, aliud uulgarī est temperamentum. Candida autem Cera, quam Plinius puniceam, nonnulli Tyrrhenam uocant, qua ratione fiat, Dioscorides docet: fit autem plurima Venetiis, unde ad nos affertur.

* Cera alba, alia facticia est: alia naturalis, quam apes nouelle conficiunt, Juncfrawen wachs.

DE PROPOLIS. CAP. 106.

Fuit quondam magnus Propoleos in medicina usus: nunc uero omnibus incognita est. Arabes Mum uocant. Sed male eorum interpretes per eam sordes alueorum intelligunt, multum enim ab his differt. Sordes enim in fundo reperiuntur, suntque derafa apum pedibus à fauis ramenta. Propolis uerò nihil est quam Betulæ & populi lachryma ab apibus collecta, ut aluearium conuernosas partes exæquent, & foramina contra frigus obturent. Germani Bet & Stopwachs† uocant. Est autē insigne medicamentum, in omnibus alucaribus repertum facile, odore styracis. In quo non uulgare officium apes nobis præstare natura uoluit, quia enim tenuem harum arborum lachrymam difficillimum fuit hominibus propter paucitatem colligere, illarum industria res utilissima nobis constat. Efficacior uerò Cretica & Pisidica est Propolis, cuius maiorem partem apes ex styracis lachryma & ladani pinguedine colligunt.

DE TRITICO. CAP. 107.

Ordo Dioscoridis. Frumentacea quæque. Enumeratis animalibus, eorumque partibus, & uictui & medicinæ utilibus, ad ea quæ frumentacea dicuntur sermonem uertit Dioscorides. Sunt autem frumentacea, quæcumque geniculato culmo & harundinaceis constant foliis, semenque panificio & pultibus aptum in spicis aut iubis producant, ceu Triticum, Hordeum, Milium, Panicum, & quotquot his similia existunt. In tanto autem frumentorum numero, nomenque accipite significatione, authorumque in ijs indicandis ac nominandis instantia, difficillimum est omnia hæc suis nominibus proprie appellare. Quare cum omnes ueteres authores & ipse etiam Galenus nihil certi nobis reliquerint, arbitramur nos quoque ueniam mereri si in appellandis omnibus defecerimus: præcipua tantum quorum frequens per Europam usus est suis appellationibus ostensuri.

Princi-

principem autem locum inter omnia Europæ frumenta triticum tenet, quod procul dubio est quod Germani *Wetjen* / Græci *τροπὸν* uocant, Galli frumentum, generis uocabulum speciei tribuentes: quanquam plerique etiam far, frumentum appellant. Sunt autem Tritici species, Robus & Siligo. Robus uocatur densius, solidius, et ponderosius. Siligo rarius, & leuius pondere: sed candidius Triticum. Est & alia Tritici distinctio: semestris, et trimestris: illud ante hyemē, hoc uero initio Veris seritur, quare alterum *Winterweizen* / id est, hyemale Triticum: alterum *Sommerweizen* / id est, æstiuum Triticum Germani uocant. An uero idem sit Robus cum semestri, neque negare, neque affirmare ausumus. Credimus tamen haud sine causa non differre Robum à semestri, nam à semestri non distinguunt id authores, neque Columella cum species Tritici recenset, semestris meminit, sed Robi, quasi idem cum eo crediderit & ipse. Quemadmodum quoque Robus Siligini præfertur pondere & magnitudine, ita etiam Semestre Trimestri, quod & Sitonium dicitur, & Siliginis species existit. †

Robus.
Siligo.

†
Similago
hic est species
farinae
ex tritico.

DE HORDEO. CAP. 108.

Hordeum, absque ulla controuersia, est quod Germani *Gerst* / Græci *κριθὴν* uocant, eius species apud Columellam sunt; Hexastichum, Galaticum nonnullis uocatum. Est autem Hexastichum quod hodie uocant Hordeum sine tunica: quoniam in folliculis nudum gerit granum, figura & colore tritico non dissimile, seni sunt spicis seminum ordines, seu uersus, unde & nomen apud Græcos inuenit, Germani *Welche* & *Römische Gerste* / hoc est, Italicum & Romanum Hordeum uocant, quoniam ex Italia primum ad nos allatum est. Distichum Hexasticho, quod ad granum attinet, non dissimile existit: sed binis tantum uersibus semina spicam constituunt, quod nomine etiam præfertur, quod autem uersuum numero decessit, culmorum multitudo restituit: qui frequenter uiceni, triceni, quadragenarii singulis granis exeunt. Nos etiam plures quam sexagenos uno semine emissos uidimus. Germani *Fasel gerste* / hoc est, sæcundum Hordeum uocant. Vtrumque apud nos Vere seritur, & non ante hyemem. Preter hæc duo Hordei genera, adhuc quatuor in Germania rustici nouerunt. Primum candido, ponderoso, omniumque maximo grano constat, *Hessli Andach* dictum. Secundum hoc paulo minus granum fert, & pauciores uersus, atque semestre existit: ideoque nostris *Winter gerste* / hoc est, Hyemale hordeum nominatur. Tertium Vere seritur, æstate perficitur: quapropter Germani *Sommergerste* / hoc est, æstiuum Hordeum id appellant. Quartum proprie Trimestre dici potest: quoniam præcox est, & tertio mensæ maturescit. Germani hoc *kleine Gersten* / & *Feyergerste* (seu, ut Saxones dicunt, *Tritgerste*) hoc est, paruum & temporale Hordeum appellant. Seritur ætatis initio, tertio die ante & post Pentecosten.

HAEC HACTENUS EX SECUNDA, EMENDATA ET AVCTA AVTHORIS Editione. Quæ uero deinceps sequuntur, quoniam ab authore (opinor) morte præuento, perfici non potuerunt, ex prima editione, quæ Francofordiæ olim publicata est (cum Gualtheri Rinijs Dioscoride) continuauimus: ita ut ea quoque emendatiora & magis illustrata demus, cum aliis, tum ex breuissimis quibusdam ipsius CORDI postremis in quing. Dioscoridis libros Annotationibus, quas manu scriptas accepimus.

Zythum ET CVRMI. CAP. 109. 110.

Zythum & Cumi ueteres appellabant ex frugibus facta pocula, qualia illa multa sunt ceruissæ genera in Germania.

ZEA. CAP. 111.

Zeæ Latinis Zea, Germanis *Düffel* uocatur.

* Zea simplex, *Einkorn* / Zea dicocum, *Zweikorn*.

CRIMNVS. CAP. 112.

Crimnus crassior farina Tritici & Zeæ est, quamuis etiam ex aliis frumentaceis fiat. Vnde plus postea conficitur, * (ueteres polton & poltarian uocant.) Germani *Gueß* uocant.

OLYRA. CAP. 113.

Olyra, ni fallor, uulgare illud est frumentum, quod Germani *Kocke* / siue *Koggē* uocant.

cant. Hoc si non fuerit apud ueteres, Olyram non habemus, & quid *Rocken* sit, ignoramus:

ATERA. CAP. 114.

Athera est ex tenuissima farina liquidior facta pultrícula, quã Germani cín *Sausf-* fen uocant:

TRAGVS. CAP. 115.

* *Samela* *fern,* Tragus quale sit frumentum, & quo nomine appelletur, non cuius cognitum esse puto.

Avena. CAP. 116.

Auena duas habet differentias. Vna enim frumentum est, quod *Habern* Germanis dicitur. Altera ab hoc ipso autore in quarto lib. Græcè *βρώμη* appellatur, quæ à fruge differt, & à Vergil. Sterilis auena uocatur.

ORYZA. CAP. 117.

Oryza frumenti genus est, quod à recentioribus *Rizū*, & Germanis *Reis* uocatur: in plaustribus & uliginosis locis nasci *ὀρύζα* Dioscorides ait. Nostra uerò *Oryza* ex India in alias terras translata est, & in multis locis Europæ feritur. Quare necesse est aliam quoque *Oryzæ* speciem inueniri, quæ etiam in Europa sponte nascatur. Nam Dioscorides simpliciter palustribus locis eam nasci ait, nec adiecit peregrinæ alicuius regionis nomen. Porro inuenitur apud nos in palustribus & uliginosis locis frumentum, quod *Schwaden* uocamus. Hoc proculdubio illius species est. Habet enim folia, culmos, spicam, & semen omnino maiori *Oryzæ* similia, semen tamen quamuis eandem proportionem, saporem & usum habeat, minus est. Sed hoc nihil impedit, quo minus *Oryzæ* sit species. Hi autem uehementer errant, qui *Schwaden* *Sesamum* esse putant. Quid autem *Sesamum* sit, statim sequetur.

HALICA VEL ALICA. CAP. 118.

Chondrum Græci Latinorum Alicam uocant. Veteres duas res hoc uocabulo intelligunt, nempe ex *Zea*, quæ *Diazeas* uocatur, certo modo factam farinam, & peculiare frumenti genus, quod Latini *Far*, siue *Adoreum* uocant. Sed quale hoc sit, nõ dum planè compertum habemus.

MILIVM. CAP. 119.

Conchro Latinum Milium, Germani *Nirs* uocant: notum est frumenti genus, harundineis foliis, & in harundinea iuba semen ferens.

PANICVM. CAP. 120.

Ελυμή και μιλύνη, Græcis, Latinis Panicum uocatur. Panicum ab omnibus autoribus Milio simile esse dicitur. Quare in maximo errore uersantur hi, qui Panicum illud frumenti genus esse putant, quod Germani *Neyden* uocant: appellat. Verum cum *Neyden* hederacea folia, & minime harundineum caulem habeat: Panicum uerò harundineo culmo & folio constare describatur, Panicum nequaquam *Neyden* esse poterit. Sed nõ opus est multis argumentis. Propterea quid reuera Panicum sit, indicabo. Verum itaque Panicum milio simile est, frumentum, quod Itali adhuc *Panigo*, & Germani *Fuchsichwanz* uocant: aliqui *Pfenich*, alii *Fench*.

SESAMVM. CAP. 121.

Sesamum à multis esse *Schwaden* creditur, quod in *Oryza* negauimus: & hoc loco multis certissimis argumentis id ipsum demonstrari posset, nisi breuitati consuleremus: propterea unum tantum afferam. Scribunt autores Sesamum semen suum in uasculis papaueris modo continere, *Schwaden* uerò in spica siue iuba *Milicea* suum semen fert. Ergo *Schwaden* nequaquam Sesamum esse potest. Miror autem uehementer, quo argumento moti sint, ut illi opinioni tam firmiter adhæreant, cum adhuc uerum Sesamum ex *Aegypto* ad nos copiose afferatur, una cum oleo ex semine

semine expresso. Nam peregrinum nobis Sesamum est. Schwaden uero sponte apud nos prouenit. Porro sunt qui sesaminos flores, quos Itali Sesaminos pronuntiant, à Sesamino semine non distinguere ualeant, ob eam causam quam in lasmino unguento indicauimus.

* Leindorter quidam interpretatur.

† Vbi hoc scribatur, iam non occurrit.

LOLIUM. CAP. 122.

Ἀλφὰς Græci, Latini Lolium unumquodque degenerans frumentum appellant: quod cum in Hordeo nascitur, Tualch à nobis, propter insaniam quam facit, dicitur. In Olyra uero Trepe / alias Treft Doip, Est & alia herba parua & quinque folia roseæ similem habens florem, eumque rubentem, & nigrum in uasculo semen, quod nos Raden uocamus. Hoc etiam à quibusdam Lolium esse creditur. Cum uero auctores Lolio spicam tribuant, Raden uero uasculum habeat, nihil affirmo. Hi autem magnopere errarunt, qui Raden Nigellam esse crediderunt.

AMYLUM. CAP. 123.

Nota omnibus res est Amylum, sic dicta, quod sine mola conficiatur. In pharmacopoliis, una mutata litera, Amidum uocatur. In Germania uero Sterck et Kuassitch.

FOENUGRÆCVM. CAP. 124.

Fœnugræcum leguminis genus est, quod Græci τῦλλυς, Germani Zigenhorn / Bickshorn & Sibengezeire uocant. Sunt tamen qui posterius hoc uocabulum ad lotum satiuam etiam referant. Zigenhorn uero genuinum Fœnugræci nomen est. Nam sic Germani Græcorum Aegoceron interpretantur. Semen autem Fœnugræci eodem nomine in pharmacopoliis habetur.

LINUM. CAP. 125.

Velcebantur ceteres Lini etiam ut Fœnugræci semine. Propterea leguminibus coniunguntur. Est autem Linum omnibus nota herba, quam Germani Flachß uocant. Semen uero solum Lein.

CICER. CAP. 126.

Ἐπίβροτο Græcis, Cicer Latinis, Germanis Kichern hoc legumen uocatur. Colorem habet triplicem differentiam. Est enim quoddam genus rufum habens semen, & quoddam candidum, quod columbinum dicitur. Et tertium genus nigrum semen habet, quod priuatim arsetinum nominatur, quoniam arietino capite semen eius simile sit.

* Sifer / Candida semina in Austria.

FABA, LEGVMEN. CAP. 127.

Cyamum Græci, Latini Fabam uocant, Germani Bonen / de quo non opus est dubitare, cum omnes ab autoribus Fabæ adscriptæ notæ huic legumini conueniant, quod nos Bonen uocamus. Differunt Fabæ secundum colorem & magnitudinem.

* Non esse nostram Fabam hanc, ex Aeginetæ lib. 6. cap. 24. & ex Galeni capite de Aphace patet.

FABA AEGYPTIA. CAP. 128.

Aegyptia Faba in inundatis Nilo campis nascitur, cuius radicem Aegyptii Colocasiam uocant, solo semine hæc nostrati Fabæ similis est. Quod enim ad ceteras eius partes attinet, omnino dissimilis esse cernitur. Nobis autem hæc est incognita.

LENS. CAP. 129.

Ὠρεός Latinis Lens, Germanis Linsen appellatur. Est autem Lens duplicis differentiae. Quæ iam enim legumen est, de qua hoc loco agitur. Altera stagnantiis bus undis innatat, de qua infra sermonem habebimus.

PHASELVS. CAP. 130.

Distinxerunt Phaselum à Phasiolo, qui post Dioscoridem scripserunt, ita ut Phaselus sit legumen simpliciter nunc uocatum ab Italis Phasiolus, Phasiolus uero idem cum Dolicho. Sed istam differentiam nullus author adhuc, neq; ipse Dioscorides obseruauit. Nam hic Phaseolum uocat id legumen, quod adhuc Itali Phasiolum uocant. Quapropter cum uideam à multis diuersas has herbas confundi, distinguam eas, & notas quibus ab inuicem dignosci possint, ostendam. Sunt enim ambæ legumina, magnam in foliis, floribus, siliquis & seminibus affinitatem habentia. Hic Phaseolus igitur quem Dioscorides hoc loco recenset, & ab aliquibus etiam distinctionis gratia Phaselus, seu ut Itali dicunt, Phasiolus uocatur, legumen est, absq; adminiculo seu pedamento per se subsistens, folia habet in uno pediculo tria, hederacea, mollia, quarum spina ex interiore parte candicat. Flores profert candidos, & post hos in siliquis teretibus candida & oblonga semina, media inter fabas uulgares & pisas forma & magnitudine, quibus nigrum quiddam eo loco, quo siliquis annectuntur, insit. Hic est Phaseolus, siue Phaselus ut quidam dicunt, de quo hoc loco scribit Dioscorides.

Altera uero eius species est huic forma foliorum similis. Circunuoluitur hæc arbutis & hastis, fiuntq; ex ea coronæ æstate, longiores hæc quam prædictus Phasiolus siliquas fert. Propterea ab aliquibus Dolichus appellatur, & fructus eius Lobis, quoniam insignes sunt siliquæ in quibus figura Phaseli semina nascuntur, non tantum candido colore. Nam inueniuntur nigro, croceo, rufosq; colore, & mixtus etiam pluribus coloribus simul. Hic Phasiolus Smilax leuis et satiuæ etiâ appellatur. Quoniam uero hæc duæ Phaseolorum species inuicem similes sunt, nomen etiam commune habent. Cum uero propriè loqui uolumus, legumen illud prius descriptum, Phaselum siue Phasiolum uocamus: postremo uero descriptum Dolichum, Smilacem leuem siue satiuam, & Siliquas eius Lobas. Porro utrunque Germaniæ peregrinum fuit legumen, & Phaseolus, siue Phaselus, qui absq; adminiculo erigitur, à paucis in Germania pharmacopolis & herbarum studiosis feritur. Dolichus uero à plurimis non tantum ciuibus, uerum etiam rusticis umbræ & ostentationis causa: De Dolicho autem statim post sequetur proprium caput.

OROBVS SEV ERVVM. CAP. 131.

Orobon Græci, Romani Erium appellant. Peregrinum hoc Germaniæ hactenus legumen fuit, quamuis omnes Orobum uocet eam leguminis speciem, quæ Germanis Wicken appellatur, sed errore seducti. Nam Wicken est Latinorum Vicia, & Græcorum Aphace, seu Βικία, unde Germanica uox deducta est: Veruntamen Erium nunc à quibusdam in Germania feritur.

LVPINVS. CAP. 132.

Latini *ῥαπὺν* Lupinum, Germani Feiqbonen & Wolffschoten uocant. Notus omnibus pharmacopolis eodem nomine Lupinus est.

LVPINVS SYLVESTRIS. CAP. 133.

SATIVA RAPA: CAP. 134. 135.

ῥαπὺν, siue *ῥαπὺν*, Latini Rapum, Germani Rüben/ appellant. Notæ omnibus cum herbaradices eius sunt, quibus uescimur. Duplicem habet Rapum differentiam. Sunt enim satiuæ quædam, de quibus hoc capite scribitur: & sponte in aruis prouenientia quædam. Videndum tamen est, ne Raphanum agrestem, cum syluestri Rapo confundamus. Sunt enim ualde similes inuicem herbæ, sed Rapum fruticosius est, & multas alas ramulosq; ad latera spargit, in quibus sunt lutei flores: nascitur pinguibus aruis. Raphanus uero syluestris pallidiores habet flores, & paruas radices, Rapum uero pollicem crassas.

* Rapum agreste, Wilde Rüben. De Raphano agresti, paulò post leges.

Rapum agreste.
Raphanus agrestis.

NAPVS. CAP. 136.

Napi rapis congeneres sunt, densiores tamen, acriores, & minores. Inueniuntur etiam luteo & croceo colore Napi in Bordueldiano Brunsvicensis ducatus agro, quibus præcipua laus & autoritas attribuitur. Græci hunc Napum *Βενιάδα* uocant, Itali Nauoni, Germani *Napen* uel *Nopen* & *Stickel Rüben*; Saxones uero Brunsvicenses suos Napos *Bordfeldische Rüben* appellant, ab oppidulo *Bordfeld*, ubi nascuntur.

RAPHANVS. CAP. 137. 138.

Raphanum Latini radicem, aliqui etiam radiculam, Germani *Rettrich* uocant, siue *Rübe Rettrich*. Est & alia herba, quæ à Latinis *Lanaria radícula*, siue simpliciter etiam *radícula* dicitur, à Græcis *Struthion*, sed diuersa à *Raphano*. Quare uidentum est, ne alteram pro altera accipiamus. Raphani autem duæ sunt species. Vna se-ritur, & in Turingia cubitali longitudine & crassitudine, quæ utraque manu amplecti nequeat, prouenit. Quare non ineptè Plinius scriptum reliquit, Raphanum in Germania infantium magnitudine nasci. Altera uero sponte in aruis prouenit, quam Germani *Heyderettrich*, id est, syluestrem Raphanum uocant, Latini *Armoraciam*. Recentiore[†] Raphano etiam adscripserunt acrem istam radicem, quam nos *Mettrich* appellamus, & cauitur, ubi prædicto Raphano uti debebant: sed inalè. Non enim habent aliquem ex ueteribus autorem, qui *Mettrich* / Raphani speciem esse innuat. Quid tamen *Mettrich* sit, paulo post audiemus.

†
Vide etiam
superius in
Rapo.

SISER. CAP. 139.

Σίσυρος Latini *Siser* uocant. Serebatur hæc herba olim in Germania cibi causa, & optimè in hac frigida regione proueniebat, qua causa eam quotannis à Germanis flagrant Tiberius Cæsar, ut inquit Plinius. Hodie uero quid sit *Siser*, ignoratur. Brunellius tamen in tertio Herbarii sui Tomo scribit, quod *Siser* sit illud olus, quod Germani *Buten* uel *Birele* / *Birele* uocant: cui omnino subscribo. Helli uocant *Älter gemöten*, alii *Brizelmöten*. Estq; omnium radicum, quæ uescendo sunt, saluberrima *Siseris* radix.

* Sapore *Pastinacæ*, Venèrem stimulat.

RUMEX, SEV LAPATHVM. CAP. 140.

ῤαῖμα, Latinis *Rumex*, Germanis *Ampffer* dicitur. Herba est quinque sub se habens species, quapropter prædicta trium gentium uocabula in genere omnibus speciebus communia sunt. Quidam *Rumex* satius est, hunc nos *Gartenampffer* uocamus. Agrestis etiam quidam est, qui à pharmacopolis *Lapathum* nunc dicitur, à Germanis *Masenampffer* / *Gassenwurz* / & *Butterampffer* / *Butterlatich* / quoniam rustici *Butyrum* eius foliis inuolutum in urbes uenale ferant. Non desunt etiam qui *Buglossum* eam uocent, *Myssenorum* & *Vuittenbergensium* Saxonum Germanico uocabulo decepti. Tertia species *ῤφυλάμα* Græcis, Latinis *Rumex acutus*, uel, ut nunc, *Lapatium acutum*, Germanis *Spizampffer* dicitur. Nascitur humentibus, syluestri similis, nisi angustiora & acutiora folia haberet. Quarta *ῤσάλε* Græcis, Latinis *Acetosa*, Germanis *Saurampffer* uocatur. Quinta omnium maxima est. Nascitur auiosis & palustribus locis, unde à Græcis *ἰππολάμα*, siue *ἰππολάμα*, & Germanis eadè significatione *Nossampffer* & *Wasserampffer* nominatur. Hæc sunt *Lapathi* genera ab antiquis descripta. Est & sextum, acetosæ forma & sapore simile, multo tamen minus, in agris nascens.

CAP. 141

LAPSANA. CAP. 142.

Lapsana agreste olus est ex *Brassicæ* genere, Germanis *Reinföl* appellatum. Hoc se apud *Dyrhachium* iustitiae milites Cæsari in triumpho exprobrauerunt, ut apud Plinium & Suetonium esse uidetur.

BLITVM. CAP. 143.

Bliton iners & insipidum olus est. Quo autem nomine iam appelletur, superius

H ij

cum est inquirere, cum nullas habeat medicas vires.

* Quidam Meyer interpretantur, & rectè alij Güter & einrich / quæ potius Atriplex quædam sylvestris est.

MALVA. CAP. 144.

Græcorum Malache, Latinis Malua, & Pappeln Germanis appellatur: Vna eius species in hortis feritur, quæ à nobis Römische Pappeln uocatur, sinuosa crispitudine per ambitum foliorum insignis. De hac & sylvestri uulgaris hoc capite agitur: Sunt enim & aliæ sylvestres Maluæ, ceu Althea & Alcea, de quibus infra sermo erit.

ATRIPLEX. CAP. 145.

Ατράφις Græcis, Atriplex Latinis, Melde Germanis hoc olus uocatur. Duplicem habet differentiam. Est enim sylvestris & satiuæ. Satiuæ rursus duplex, est enim uiridi & ruffo folio: Sylvestris plures habet discriminum notas. Hæc quod in stercore rariis nascatur, Mistmelde appellatur.

BRASSICA. CAP. 146.

Κράμβη Latinis Brassica olim dicebatur, nunc uero Caulis, unde Germani suum Kål desumpserunt, aliqui per excellentiam uocant Kraut. Multæ sunt Brassicæ species: Est enim uulgaris quædam, quæ simpliciter caulis, & Germanis Blaßkål nominatur. Est & crispa quædam, omnibus etiam nota: utriusq; folia ad purpuram colore inclinant. Est etiam alba Brassica, quæ in capita concreuit, unde capitata & sessilis uocatur, à Germanis uero Cappekraut / quod nomen ab Italico ad nos uenit. Illi enim capitum sessilem hancherbam nominant. Habent huius capita in quibusdam regionibus, ut Bohemia, ruffum colorem. † Est & marina Brassica, quæ hodie Soldanella in pharmacopoliis appellatur. Porro sylvestris Brassicæ plures sunt differentie:

† CAP. 147. De Brassica sylvestri nihil dicit.

BETA. CAP. 149.

Τέντλον Græci, Betam Romani, Beyßkål / Römischeßkål / Komgras, & Mangolt, Germani hoc olus nominant. Duplicem habet colore differentiam. Est enim nigricantibus in purpura foliis quædam è ruffa radice. Hæc nigra Latinis dicitur, Germanis Rotmangolt / siue Roterßben. radices enim rapis magnitudine & forma similes sunt. Candida huic omnino similis est, sed colore differt, quem folia eius in candido uiridem habent, (aliqui Siclam uocant.) Nigræ Betæ radices arte incrementum sumere coguntur, quæ condiuntur & assatis carnibus apponuntur. Candidæ uero Betæ radices minime curantur.

PORTULACA. CAP. 150.

Ανθεράκη Græcis Portulaca uocatur, Germanis Portzel. Notum est acetarium hoc olus. Est & sylvestris Portulaca, in asperis littoribus nascens: de qua alibi agemus.

ASPARAGVS. CAP. 151.

Asparagus pharmacopoliis Sparagus, Germanis Spargen appellatur. Foeniculum foliis simile olus est, cuius radices & semina in pharmacopoliis seruantur. Dicuntur etiam Asparagi omnium olerum, tam syluestrium quam satiuorum, primo uere tenelli & recentes caules, quales in Rapo & Bryonia uidemus.

* Satius omnis fuit sylvestris. Est autem sylvestris alius simpliciter dictus, alius Corrua uel Corrudago.

PLANTAGO. CAP. 152.

Αρνόγλωσσον Latini Plantaginem, Germani Wegbreyt uocant. Tres habet hæc herba differentias. Est enim latifolia quædam, & angustis oblongisq; foliis quædam, tertia latifoliæ similia habet folia, multo tamen minora, & leniter hirsuta.

SIVM. CAP. 153.

Sium ex Apii genere olus est, quod Germani Klein Wassermerck uocant, quoniam Palus

Paludapio simile sit, sed minus. Nascitur glareosis & perennibus riuulis, ut Plinius etiam obseruauit.

* Wasser Eppich. Romæ utuntur in acetarijs, & ranellam uocant.

SISYMBRIUM. CAP. 155.

Primum Sisymbrium Mentę species est, quam Germani *Fischmünz* uocant. Est quę hæc duplicis differentię. Vna enim nigricantem habet caulem, & ubiq; in aquis nascitur, *Bachmünz* Germanis appellata. Altera hirsutioribus est folijs, nec tantum iuxta riuos, uerum etiā in siccis prouenit (in mōtibus odoratioꝝ) Hęc Balsamita à pharmacopolis nominatur. Confunduntur tamen ab imperitis hæc duę *Sisymbrii* species.

Alterum uerò Sisymbrium solo nomine priori simile. Nam Nasturtii potius quā illius species est. Quapropter etiā à Græcis *Καρδαμύνη*, Nasturtiaria, & à Germanis *Bruin treß* uocatur. Notum est & salubre olus, quo Helli frequenter uelcuntur. Recentiores hoc aquaticum Nasturtium, maximo errore Senecionem uocant, ut in Senecionis cap. audiemus.

Batis. CAP. 157.

Κρίδμυον, Latini Batin dicunt. Marinum est olus, quod etiam in hortis ferebatur. Nomen tantum in pharmacopoliis nostris habetur. Res enim quę hodie sic apud nos uocatur à pharmacopolis, diuersa penitus à Bati est.

CORONOPVS. CAP. 158.

Pro Coronopode malè hæcenus ranunculi quadam specie usi sumus: Nunc autem uera Coronopus à quibusdam feritur. Est enim acetarium olus, folia habens pedibus & unguibus cornicis similia, & hodie ab Italis herba Stella uocatur. Quidam etiam Cornucerinum appellant, à foliorum figura.

SONCHVS. CAP. 159.

Sonchum Latini Cicerbitam & Lactucellam, Germani *Sewmelcke*, & *Häsenöl* appellant. Ex Intybi genere hæc herba est.

* Tertius ubiq; nascitur in agris.

INTYBUS. CAP. 160.

Serin Latini Intybum uocant, Multiplex Intybi genus est, hoc tamen capite duo satia, & unum syluestre describit. Satium Intybum ab Italis adhuc Endiuia satia appellatur, estq; per omnia syluestri simile, tenerius tamen & latioribus folijs. Syluestre, quod Cichorium & Picris ob amaritudinem uocatur, & Amarago à Gaza in Theophrasto interpretatur, in pharmacopoliis Cichorea, & à nobis *Windelcuss* / *Wegwart* & *Sonnenwirbel* nominatur. Flores habet coeruleos, qui ferè semper solem uersus inclinantur: Vnde etiam à quibusdam Solsequium, siue Heliotropium appellantur: quamuis Heliotropium diuersa sit ab Intybo siue Cichorio, & sui generis herba.

* Intybum uerum aliqui Endiuia Romanam uocant.

CHONDRILLA. CAP. 161.

Χονδρίλλα quoq; intybacea est herba, habetq; duas species: quarum prima Cichorio est similis, multò tamen tenerior & minor, florem interdum coeruleum, interdum etiam candidum ferens. Germani *Klein Sonnenwirbel* uocant: nascitur in uicinis, quę solidum & gipsofum habent solum, quales sunt in Ienenis collibus. Aliqua Chondrilla in pinguibus & lutosis agris, præsertim in hor deacea segete nascitur. Luteum habet florem, & à Germanis *Sewdistel* uocatur: quod nomen ferè omnibus etiam intybi speciebus commune est.

CUCURBITA. CAP. 162.

Cucurbita, *Κοκύνδα* Græcis, Germanis *Kürbis* appellatur, cuius duę sunt potiores differentię. Vna longos fert fructus, altera latus et sessiles: semine eius Medici utuntur.

CUCUMER SATIIVS. CAP. 163.

Σίκυς, siue Cucumis satiuus, à Germanis Gurken appellatur; quod nomen ab anguria deductum est. Sic enim Itali quendam Cucumeris speciem uocant. Semina eius in pharmacopoliis eodem nomine habentur.

*Huius species sunt Pepones & Melones.

PEPO, PEPONES QUIDAM MYSCATELLINI VOCANTVR. CAP. 164.

LACTUCA CAP. 165.

Lactuca, quæ Græcis ὀγδῶς appellatur, duplicem habet differentiam. Est enim satiuua altera, & agrestis altera. Satiua à Germanis Lattich / Weichering / Salat & Schmalzkrout appellatur, præsertim in Hestia, ubi illa in acetariis cum eliquato butyro, quod pro oleo affundunt, uescuntur homines; unde & Schmalzkrout dicta est.

*Species eius sunt, tenuifolia, crispâ, capitata.

CAP. 166. Agrestis uerò Lactuca ea est, quam Itali Serriolam, uel (ut quidam durius pronunciant) Scarriolam, quoniam dorsum folii serræ modo asperum sit, uocant. Quidam etiam hanc ipsam Endiuia appellat: nam in hisce regionibus hac herba prointybo utuntur Medici & pharmacopolæ. Germani hanc ipsam Gensdistel / siue Gensbait appellat, quod spinosum folii dorsum anserinis dentibus simile sit. Porro nemo offendatur, quod hanc Endiuia Lactucam agrestem appellem. Nam omnes intybi species ad Lactucæ genus referri debent.

GINGIDIVM. CAP. 167.

Gingidion, Syriacum est olus: nuper etiam ad nos ex Syria allatum, per omnia de scriptioni respondens. Quidam Carui de Syria uocant. Porro eò ignorantie quidam peruenerunt, ut Senecionem, qui nobis Creutzkrout appellatur, Cerefolium etiam nominent.

*Aliqui Cerefolium pro Gingidio habuerunt.

SCANDIX. CAP. 168.

Scandix etiam agresti Pastinacæ simile olus est, sponte in pinguibus aruis proueniens. Candidos & paruos in exiguis umbellis flosculos habet, ex quibus singuli, & ceu acus longi apices sursum enascuntur. Quapropter à Latinis etiam acicula, & à Germanis Ladel mörren uocatur.

CAUCALIS. CAP. 169.

Caucalis Dauco similis herba est, non tamen cuius Dauco (sunt enim plures eius species) sed illi tantum, qui in Germania Pimpinella uocatur. Hirsutioribus tamen constat caule & foliis, Germani Rauch Bibenellen uocant. Nam uulgò dicta Germanis Pimpinella, est ueterum Daucus.

*Nobis non uidetur.

ERVCA. CAP. 170.

Ἐρύκω, Latini Erucam, Germani Weissen Senff uocant, quoniam simile per omnia sinapi sit, præterquam semine, quod sinapi nigricans est, Erucæ uerò candidans.

*Errat Cordus: nam quod Sinapi album Germani uocant, omnino Sinapis species est. Eruca uerò nomine Italico nobis noscitur, Rocfelen.

OCIMVM. CAP. 171.

Ὀκίμω, Latini Ocimum, recentiores Basilicon uocant: Germani posterius nomen cum Latinis commune habent. Est autem Ocimum duplicis differentie, quoddam enim altius adolescit, & maioribus nigrioribusque constat foliis. Quoddam etiam præ-

am prædicto minus, ramosius, & minoribus foliis inuenitur, & Caryophyllos odore imitatur, unde Ocimum Caryophyllatum hoc appellare cōsueuerunt Latini & Pharnacopolæ, Germani uerò *Wanib* Basilicon.

*Recentiores & Arabes faciunt Ocimum quoddam simpliciter dictum, aliud Nabathi, & tertium Citratum: quæ tria nobis cognita sunt. quartum addunt Caryophyllatum.

OROBANCHE. CAP. 172.

Orobanchen Theodorus Gaza apud Theophrastum Eruangam interpretatus est. Nomen inuenit ex eo, quod Eruum strangulet; pinguis est, & sine foliis herba. Germanis *Sommerwurz* appellata.

*Diuerfa ab hac est Theophrasti Orobranche.

HIRCI BARBA. CAP. 173.

Ἡρκαωδάρωα, Latini Hirci barbam, Germani *Bocksbart* appellant. Nasctur campestribus locis, nonnunquam etiam pratis & aggeribus, pingui solo congestis.

ORNITHOGALVM. CAP. 174.

ορνιθόγαλον, Germani *Klein Erdnuß* appellant. Porro duæ sunt in agris nascentes herbae, quas Germani hoc nomine indicant. Vna candidum habet, aut luteum, qualem hoc capite Dioscorides describit, florem. Altera purpureum, quæ an ab hoc authore descripta sit, ignoro:

**Bickelfern*. Vide mox in Tuberibus.

TVBERA. CAP. 175.

Tubera radices rotundæ sine germine sunt, quæ fungis similiter in terra nascuntur. Græci *ὄδρα* uocant. An etiam in Germania proueniant, nondum comperi. In Italia copiosè proueniunt, ubi etiam Tartosse uocantur. Sunt & tubera, quæ *ἀγάχουδρα*, ab Araco legumine dicantur: de quibus huius instituti non est dicere.

*Tubera, quidam *Ἐρδνυß* interpretantur: alij Cerui boletos sic uocant, Arachidna Theophrasti quidam *Ἐρδνυß* interpretantur. Cordus supra Ornithogalon *Flein Erdnuß* appellauit.

HORTENSIS SMILAX. CAP. 176.

Smilax hortenſis, siue lenis, quem Dolichum etiam Græci appellant, nonnulli etiam Phasiolum, Germani *Windbönen* / *Welsche bönen* / & *Sprenckelbönen* uocant: De hoc legumine in Phaseoli capite etiam disseruimus:

**Tractische oder Kömische bönen*, Semper contra Solem uoluitur.

MEDICA. CAP. 177.

Medica à Media nomen habet. Nam ex ea regione per bella Persarum in Græciā allata est, unde postea in Italiam translata, ad iumentorum pabulum serebatur. Propterea nemo speret eā sponte in Germania prouenire, ut ii faciunt, qui se omnes plantas, quas Dioscorides describit, nouisse & indicare posse, uana quadam iactantia & persuasione gloriantur. In Italia autem adhuc à quibusdam seritur. Vidi ego herbam hanc à Georgio Agricola ex Italia allatam.

APHACE. CAP. 178.

Aphace uitia est, quæ sponte in aruis nascitur, quam Germani *Feldtwicken* appellant. Theophrastus intybaei generis herbam Aphacen nominat, quæ diuerſa est ab hac nostra Aphace. **Dogelwicken*.

PORRVM. CAP. 179.

Notum omnibus Porrum est, quod Græci *ραπρον*, Germani *Lauch* uocant. Porro sub eodem genere hæc omnia continentur: Allium, Vlpicum, Scorodoprasum, Ampeloprasum, Porrum, Ophioscorodon, Ceba, Gethyum & similia.

*Porrum aliud est capitatum: aliud sectium, & *Schnittlauch*.

AMPELOPRASVM. CAP. 180.

Nascitur sponte etiam in aruis & uineis, teretibus foliis Porrum, quod Græci *Ampeloprason*, Germani *Wilden lauch* appellant.

CEPA. CAP. 181.

κρόμμυον, Latini Cepam, Germani *Zwibel* & *Zippeln* nominant: Notæ omnibus cum germine suo radices sunt.

**Cepe alie sunt candidæ, alie ruffe.* Item *alie Gordie, utrinq; acuminatæ. Scißiles, Fleißlauch.* *Aſcalonia, Aſchlauch.*

ALLIVM. CAP. 182.

Σκόδιον, Latini Allium, Germani *Knoblauch* appellant. Est etiam syluestre Allium Ophioscorodon appellatum, lata habens folia, ut Liliū conuallium. Hoc Germani *Kampen* / siue *Kempfen* / & *Kamferen* nominant. Est q̄ inuisum pastoribus, quoniam lac Allii odorem acquirit, si eo uestantur pecora. Vrsinum Plinio.

SCORODOPRASVM. CAP. 183.

Σκοροδόπρασον syluestri Allii genus est, mediūq; inter Allium & latifolium porrū figuram & temperamentum habet. Vnde ab utroque nomen inuenit, Germani *Feldknoblauch* / siue *Wildentknoblauch* appellant. Hactenus hac herba eiusq; semine pro scordio usi sunt Pharmacopole, & adhuc magno errore utuntur. Nō enim est syluestre siue agreste allium scordium, sed proprii generis herba, ut suo loco indicabimus.

SINAPI HORTENSE. CAP. 184.

Σινάρι, Latini Sinapi, Germani *Senff* appellant. Nota omnibus cum semine suo herba est. **Satium à syluestri cultura folium differt.*

NASTURTIVM. CAP. 185.

Κάρδαμον, Latini Nasturtium, Germani *Kressen* / & *Gartentkressen* uocant. Hoc capite de satiuo Nasturtio agitur.

**Est q̄ syluestre quoddam, Cynocardamon, Runderkresse.*

THLASPI CAP. 186.

Thlaspi minus, Germani *Dascheltkressen* uocant, uel *groß Deschenkraut* & *Wegkresse*. Differt tamen à Bursa pastoris, quæ *klein Dascheltkraut* nominatur. Maius uerò Thlaspi sine dubio ea est herba, quam nos *Merrettich* appellamus. & Arabes Nasturtium album, à candore radice. Grandibus hoc radicibus & magnifolium describitur. Vergilius autem Marcellus in hoc capite non bene in comparatiuo gradu interpretatus: maiore radice, & latioribus foliis. Ita enim intelligeretur maius Thlaspi minori secundum proportionem maius esse. Sed Dioscorides hoc non uult, neq; uerba eius hoc indicant. Nam in Græco nulla comparatio legitur, sed simpliciter *πλατύφυλλον, καὶ μεγαλύτερον*.

ARABA. CAP. 187.

Quædam exemplaria Arabam, alia Drabam, quædam etiam Arabida appellant. Est autem Nasturtii genus, quod Arabes orientale uocant, hodie ignotum: quamuis Ruellius id cognouisse uideatur. Verum non temere à Ruellio crediderim, cum plantas ad historias ui torquere soleat. Cæterum non male ait Virgilius Marcellus, nullam esse apud alios authores herbam hoc nomine. Plinius tamen eius mentionem facit sub nomine Dryophoni:

IRIO CAP. 188.

Εγρίσιμον, Latini Irionem, Germani *Schnödsenf* / aliàs *Schuffsensf* / *Steinsensf* appellant. Theophrastus alterius Erysimi genus inter frumentacea recenset, quod diuersum est ab hoc. Imperit Irionem, quia Dioscoride hoc loco describitur, sceminam Verbenam etiam uocant, uerum magno errore. Nam Irio sinapi cognata herba est, propterea hic inter acrimoniā habentia describitur. Verbenaca autem nihil cum sinapi neq; Irione commune habet.

PIPER. CAP. 189.

Piper nouerunt omnes. Habet autem triplicem differentiam. Est enim longum, rotundum seu nigrum, & albū. Longum nigro & candido omnino dissimile existit, cum hæc duo parua & rotunda sint grana. Illud uerò oblongum & betularum grossulis simile. An uerò ueteres rectè de eius planta, & quomodo nascatur, scriperint, non est huius loci disputare.

Zingiber quod hodie Zinziber nominant Latini, Germani Jngber. Diuersa à pipere plantæ radix est. Cur autem non potius in censu aromatum descriptum sit Piper & Zingiber, in præfatione huius libri indicauimus.

Hydropiper parens meus in suo Botanologico ait esse mordacẽ Perficariam, quæ à Germanis Wajserpfeffer & Schmerzen appellatur, cui sententiæ Musa non aduersatur. Ruellius uerò eam negat esse ueram, quoniam nigram maculam Perficaria in foliis habeat, qualem authores Hydropiperis foliis inesse non dicant. Ait etiam Perficariam exiccatis paludibus emergere, Hydropiper uerò in lacustrium marginibus adolescere. Addit præterea, Hydropiper mentæ foliis describi, sed Perficariam Perlici folia habere. Antequàm tamen Perficariam Hydropiper esse neget, indicat Hydropiper eam esse herbam, quæ Eupatorium appellata est hæcenus falsò. Cùm igitur antea admonuerim, cautos esse Ruellianos lectores oportere, propterea quòd non raro inuitas plantas ad historias & descriptiones detorquere soleat, suadeo etiam hoc loco, ne illi continuo fides habeatur, uiro aliàs insigniter docto, & qui nò ex industria malè iudicet, sed qui, cùm homo sit, præter opinionem in errores aliquando præcipitetur. Necessè est igitur aut parentem meum, aut Ruellium perperam iudicallè. Quapropter utriusq; iudiciũ discutiendũ, & cum Hydropiperis historia conferendũ erit.

Principio igitur Ruellius negat Perficariam Hydropiper esse, quoniã Perficaria purpurei coloris maculam in foliis habeat, quam si Hydropiper haberet, in descriptione authores non omisissent. Ad hoc argumentum breuiter respondeo: Duplex genus esse Perficariæ. Vna quæ maiora nigrioraq; habet folia, purpureis maculis distincta, quæ nullam omnino acrimoniam in gustu habet. Altera uerò huic similis, candidioribus & minoribus tantum foliis, quibus nullæ insunt purpurei coloris maculæ: hanc dixit parens meus Hydropiper esse, non illam. Quare nullam uim hoc argumentũ habet. Diliendum igitur nunc erit illud, quo infert dissimiles etiam habere nates Hydropiper & Perficariã, quoniã hæc exiccatis paludibus, quod Hydropiper nò faciat, emergat. Illud uerò in lacustrium marginibus adolescat, ut historia & descriptio clarè ostendit. Ego uerò Perficariã nò tantum in exiccatis paludibus nasci uidĩ, ue rumetiã iuxta leniter fluentes aquas, idq; sæpissimè: nec ego tantũ uiderunt etiã plures alii quibus monstrabam, ne fortasse commentum me dicere quidam existiment. Et econtrã, illam herbam quam Ruellius Hydropiper esse existimat, in palustribus exiccatis non semel nasci uidĩ. Et quamuis Perficaria exiccatis tantum paludibus nasceretur, minimè tamen hoc solo argumento negare aliquis posset, eam Hydropiper esse, cum nò omnino siccatis nascatur, sed semper sublit aqua. Nec Dioscorides illi tribuit, quod tantum circa leniter fluentes undas proueniãt, & non in aliis aquosis. Propterea enim à Græcis Hydropiper appellatur, quod aquosis locis emergat, siue sine palustres, siue leniter fluentibus undis uicini. Præcipue tamen & plerumq; huiusmodi natalibus, quales Dioscorides recenset, Hydropiper nasci scribitur: quam notam in mordaci quoq; Perficaria non solus neq; semel obseruauĩ. Quapropter neq; hoc argumentũ negare potest Ruellius, quod Perficaria mordax Hydropiper sit. Propere mus igitur ad illud quo ait, Hydropiper Mentæ foliis ab authoribus describi, Perficariam uerò Perlici foliis cõstare. Ad hoc respondemus, nullam similitudinẽ tam perfectam esse, quæ non habeat aliquam dissimilitudinẽ. Igitur quamuis Perficariæ folia longiora sint, quàm Mentæ, non tamen continuo sequitur, eam Hydropiper nò esse. Nam nò raro magnitudo pro longitudine tantum, & econtra accipitur. Si igitur tamen stricte hanc notam Ruellius intelligit, illius falsò uocatũ Eupatoriũ multo minus habet folia, Mentæ similia: nam & ipsa etiam nò proportionaliter maiora sunt, quàm Mentæ folia, sed similiter ut Perficaria longiora & nigriora quàm Mentæ folia, cum Hydropiperi candidiora quam mentæ adscribantur. Igitur neq; hoc argumentũ parentis mei sententiã confutabit. Cum uerò adhuc constet, Hydropiper Perficariam mordacẽ esse, necessariò sequitur, Ruelliũ à ueritate aberrare, quod falsò uocatũ Eupatoriũ Hydropiper esse iudicauerit. Hoc itaq; probare nunc incipiẽmus. Principio igitur uidendũ est, quale nã falsò uocatũ Eupatoriũ intelligat. Tres enim sunt plantæ, quibus

quibus falsò id nomen inditum est. Vna scilicet quam Mesue describit: altera quæ dodrantali altitudine inter arbuta nascitur, Μῆτε foliis, & Lupuli odore, Harū nullam intelligere Ruellium certum est, quoniam utraq; siccis nascitur locis. quam uerò ille Eupatorii nomine indicat, circa aquas nascitur, estq; omnino ea, quam nostrates etiam Pharmacopolæ Eupatoriū uocant, Germani *Wasserpfeffer* ostent. Hoc an Hydro-piper sit, iam uidendum erit. De Hydro-pipere itaq; sic Dioscorides scribit: Nascitur plerumq; circa stantēs aquas, & leniter fluentes: quæ nota pulcherrimè conuenit. Nolo enim respondentes notas omittere, ut Ruellius in Persicaria fecit, cuius Piperis similem acrimoniā præterit. Quamuis igitur hæc unica nota per omnia conueniat, non tamen sequitur, quod hæc herba Hydro-piper sit. Plures enim plantæ in eodem natali proueniunt, tamen si cæteris notis Hydro-piperi minimè respondeat. Cū igitur sola hæc nota conueniat historiæ, fallere potest. Si uerò quæ nunc sequuntur, similiter conuenirent, ipse non inuitis pedibus in Ruellii sententiam currerem. Sequitur itaq; in Dioscoride: Caulē ex se mittit geniculatū solidū. Quas notas Ruellius malè falsò uocato Eupatorio tribuit. Non enim geniculatū habet caulem, Persicaria uerò mordax euidenter tumentibus geniculis intercepta est. Solidū etiā caulem eadē Persicaria qualitate habet. Eupatorii uerò falso sic appellati caulis non tam qualitate quam quantitate solidus. Procerus enim est, & magnū foliorū florumq; onus sustinet. Quapropter necesse est eum robur contra uentorum impetum habere. Persicariæ autem caulis quamuis paruus sit, non tamen paruam soliditatem adeptus est, atq; id qualitate, non quantitate seu magnitudine. Nam omnia quæ proceris constant caulibus, robusta etiā à diuina prouidentia facta sunt. Quæ nunc de foliorum forma & colore dicenda essent, paulò ante relata sunt. Quare ad saporem eorum conuertamus orationem, de quo sic Dioscorides scribit: *ἀκριά γὰρ τὸ γένος αἰσιν ὁ πῖπερις*, quod est: sapore acris, ut Piper. Eupatorium autē acrimoniā nullā habet alios saporē excellentem, sed tantū amaritudinem magnā. Propterea Ruellius etiā huius Eupatorii folia merā Piperis amaritudinem respere scribit. Differunt autem plurimū amarus & acris sapor, & Piper tantū acre, & minimè amarū est. Eupatorium uerò falsū sic uocatum, solā amaritudinem respicit. Ergo quilibet etiā manibus palpare potest, hoc loco Ruellium scribere, quod in rerum natura non inuenitur. Si igitur sapor non conuenit, à quo Hydro-piper appellata est hæc herba, iam planè iudicandum erit, Eupatorium, de quo hic agimus, Hydro-piper minimè esse. Ne tamen alias notas refugere uidear, pergam eas omnes membratim historiæ conferre: Sequitur autem in textu: *καρπὸν δὲ ἔχει ἀπὸ κλωναρίων μικρῶν ἐκφυρόμενον παρὰ τὰ φύλλα συνηγὴ καὶ βοτρυνώδης ὁμοίῳ καὶ αὐτὸς*: quod est, si de uerbo ad uerbum uertas: Semen uerò habet in ramulis paruīs enascens iuxta folia, continuum & racemosum, acre & ipsum. Ex quibus notis ne una quidem falso uocato Eupatorio conuenit. Nam hoc in summo tantū caulis uertice, non in ramulis iuxta folia latos potius corymbos, & umbellulis similes, quā racemos fert. Hydro-piperis uero caulis circa se alarum cavitates, & paruos ramulos habere debet, & non in summitate tantū, quod optimè mordax Persicariæ conuenit. Eupatorii etiā semen sensu deprehendi non potest, neq; aliā quam saporis acrimoniā habet, & demum in pappos resolutum auolat, propterea difficilimè colligi potest. Hydro-piperis uerò semen non minorem quā folia in gustu acrimoniā respicit. Propterea unā cum illis ad Medicinæ usum olim colligebatur, quæ omnia in Persicaria acris euidenter apparent. Constat igitur falso uocatum Eupatorium Hydro-piperis historiæ minimè conuenire, Persicariam uerò, quæ maculis purpureis caret, per omnia respondere: quamuis sola foliorum similitudo à longinquo petatur. Sed sine dubio ipse Dioscorides hanc foliorum comparisonem largo modo intelligi uoluit. Non tam diu in hac una herba immoratus fuisset, si Ruellius suum de Hydro-pipere iudicium tantopere non probauisset, & alios, qui hoc uerum esse inficiarentur, ueritatis cæcos non appellasset. Porro in Piperitide & Siliquastro iudicando, similiter errat Ruellius. Non enim est herba siue Mentha diuæ Mariæ. Verū hunc errorem huius loci nō est confutare, quoniam in Dioscoridis libros annotationes, & non in Ruellii errores reprehensiones scribimus. Plinius de Hydro-pipere nihil scripsit, de Piperitide autem siue Siliquastro, non pauca. Differt enim pluri-

munā Piperitide I y dropiper. Quapropter utranque plantam (ne ab aliquo confundi possint) suo nomine indicabo.

Hydropiper est, de qua iam disputauimus, Persicaria, cuius folia & racemosum semen acrem Piperis saporē habent. Piperitis uero sine dubio ea est herba, quæ in Italia & Germania fistilibus uasculis feritur, caule circa alas rubro, foliis laurinis, flore candido, & post hunc semine in oblongis uasculis ceu siliquis (unde Siliquastrū etiā appellatum est) albo & tenui. Itali eam Piper Hispanum uocāt, Germani Schocken preffer; id est, Siliquaceum Piper, ut sic interpretetur.

PTARMICA. CAP. 192.

Ptarmica à sternutamentis, quæ olfacta proritat, appellata est. Ruellius eam paruum illud ac syluestre Pyrethrum esse affirmat, quam herbam probè cognitā habeo; Cū uerò non unā tantū sit quæ reclamet nota, nolo quicquam in hac re affirmare,

RADICVLA, SIVE LANARIA HERBA. CAP. 193.

Longè diuersa est à Raphano, qui similiter radícula uocatur, ut antea etiā, cum de Raphano ageremus, indicauimus.

*Alia est quæ *Wasserwurcz* & *Ostrutium* uulgò dicitur. Aliqui Saponariam esse putant, *Knabenkraut*, *Seissenkraut*.

CYCLAMINVS. CAP. 194.

Cyclaminus rotundam habet radicem, & plerūq; latiusculam, quam Pharmacopolæ eodem adhuc nomine appellant; quamuis etiā ab aliquibus Panis porcinus nominetur, & à Germanis *Wortweiben*.

ALTERA CYCLAMINVS. CAP. 195.

Altera Cyclaminus in Pharmacopoliis non habetur. Qualis autem sit herba, & quo nomine iam appelletur, ignorare me fateor. Ruellius eā cognouisse uidetur. Verū illius decreta cum iudicio legenda esse, suprà monui.

*Cyclaminus altera, *Periclymenum*, & *Vitis syluestris*, uidetur una herba, tribus capitibus descripta: quæ & *Cappisilium* dicitur, *Speck liliem*.

DRACVNCVLVS MAIOR. CAP. 196.

Δρακοντρία, siue *Ισαγόγ*, Latinis Dracunculus & Serpentaria uocatur. Hanc magno errore Bistortam esse hactenus credidit tota serē Medicorum & Pharmacopolarum multitudo. Cū uerò Bistorta, quam nos *Wasserwurcz* appellamus, frigidū omnino habeat temperamentū, Dracunculus autem calidum uehementer, nullo modo Bistorta Dracunculus esse potest. Veruntamen Dracontia in Italia, Gallia, & Germaniæ locis quibusdam habetur Ari similitudine, cuius etiā species est, ut ueteres omnes tradiderunt.

*Dracunculus est genus ad Dracunculū maiorem, & minorem, *Aron* & *Arifaron*. Dracunculus maior, dicitur *Luph crispum*.

DRACVNCVLVS MINOR.

Minor Dracunculus, qualem hic Dioscorides describit, nescio an cognoscatur. Mihi enim hactenus eum uidere non licuit.

*Luph planum. Est & alia species quæ à Plinio describitur, *Wasser Aron*, quæ tot habet genicula, quibus ab alijs distinguitur, quot annos.

ARVM. CAP. 197.

Ἀρόγ, Latini Arum, in secunda declinatione uocant. Hodie usus inualuit, ut in terra Aron, aronis, flectamus. Est autē herba ubiq; pingui solo, in umbrosis & antiquis syluis nascens, quam Germani pariter Græcis, *Aron* / *Pfaffenpint* / & *Teufelskue* *Jugwer* uocant. Vulgares etiā Herbarii pedem Vituli, propter foliorum similitudinem, dicunt.

*Luph minus, hoc uti tuto possumus loco Luph. Cyrenaicum uescendo est. Aron in calidis regionibus mitius est: in frigidis, acrius: sicut & Iris.

ARISARVM. CAP. 198.

Arifaron ab Aro & Isaro, id est, Dracunculo nomen inuenit. Figura enim Aro, & temperamento Dracunculo simile describitur. Hodie incognita est herba. Dicitur etiā *Aris*, diminutiuā forma, quoniam Aro minor sit. **klein Aron*.

ASPHODELVS. CAP. 199.

Magnus in Asphodelo error commissus est haecenus. Vbiq̃ enim pro eo sylvestre Liliū, quod Hemerocallen Græci, & Germani Goldewurtz appellant, accipiunt Pharmacopolæ. Verus tamen Asphodelus in quibusdā Italiæ locis habetur. Suntq̃ radices eius Pæoniæ radicibus similes, ut auctores scribunt, & nos etiā uidimus. Hemerocallis uerò radix, quæ iam pro Asphodelo in usu est, Liliæ radicis, & minime Pæoniæ similitudinem habet.

BVLBVS QVI EDENDO EST. CAP. 200.

Βύλβος ἡ δώδυμος, quemadmodum olim omnibus cognitus fuit, ita hodie omnibus incognitus est.

BVLBVS VOMITORIVS. CAP. 201.

Qualis herba uomitorius sit Bulbus, hodie nō quiuis dixerit. In quarto libro Narcissus etiam hoc nomine appellatur.

SCILLA. CAP. 202.

Σκίλλα, Latinis Scilla, Pharmacopolis Squilla uocatur. Cepæ cognata est planta, cuius radices in frequenti sunt usu Medicis.

* Merzwibel. Nascitur locis siccis & salis

PANCRATIVM. CAP. 203.

Pancration minor Scilla est, quæ hodie raro ad medicinæ usum affertur: quantitate & uiribus maiori inferior.

CAPPARIS. CAP. 204.

Capparis spinosus frutex est, cuius saliti flores, nondum aperti propriè, et fructus, eodem nomine appellantur; & cum assatis carnibus mensæ apponuntur, Germani Kappern uocant.

* Flores alij magni, alij parui, tanquam duplicis generis, adferuntur.

LEPIDIVM. CAP. 205.

Lepidium, Iberis etiam uocatur, & falso à quibusdam diuersæ herbæ creduntur. Quapropter malè in fine primi libri caput de Iberide legitur. Est enim una eademq̃ herba, quæ tamen duas species habet. Maius Lepidium Laurino, sed maiore constat foliis, gustu acris. Hoc Arabibus Seitaragi, & Germanis Jngwertraut / Pfefferkraut / Römische Fresse / uocatur. Minus uerò Lepidium Gauchsblium / Waldfresse.

BATRACHIVM. CAP. 206.

Batrachium, Latini Ranunculū, Germani Fröschscheffer / Ranensüß / & Spiegelsblumen uocant. Plures eius sunt quàm Dioscorides descripsit species. Omnes tamen flammulæ appellatione hodie ueniunt, ob igneam in gustu acrimoniam sic dictæ. Est etiam frutex quidam, qui similiter à quibusdam flammula appellatur, qui ab his diuersus est.

* Ranunculo Sardoo excepto, reliqui omnes apud nos nascuntur.

ANEMONE. CAP. 207.

Anemone agresti Papaueri non dissimile est, hodie autem in nullo usu habetur.

* Teufelsaug.

ARGEMONE. CAP. 208.

Duplex est Argemone, sed utraq̃ etiam Papaueri agresti, siue Rhoæadi similis est. Neutra hodie cognoscitur, quamuis lenæ copiosissimè proueniat, ea qua à Dioscoride describitur figura. Nomen eius in Agrimoniam detortū est, qua appellatione uerum Eupatorium hodie indicatur: de quo errore in Eupatorio sermonem faciemus.

* De Argemone altera caput supposititium quidem est, reperitur tamen herba talis, qualis hic describitur. Wilde Garbe / Wilde Grewsing.

ANAGALLIS. CAP. 209.

Latini pariter Græcis Anagallidem uocant. Pharmacopolarum quidam Anagallum, Germani uerò Brundthcyl & Jochheyl / alias Gockheyl. Male quidam hanc & Auriculā muris cōfundunt, natura diuersas herbas. * Est & Anagallis aquatica, Pfungt.

HEDERA.

Hedera sine dubio est, muros, turres, & arbores scandens frutex seu arbor, quæ à Germanis *Ebbeh* uocatur. Quare sine rationibus & argumentis quidam nos Hedera neque nouisse, neque habere contendunt.

Chelidonium nomen inuenit quod circa hirundinum aduentum erumpat. Germanicè *Scheltraut* uocatur.

Minus Chelidonium eandem etiam ob causam nomen accepit, forma uerò priori dissimile est. Habet aurei splendoris flores, & in foliis purpureas maculas, quas Dioscorides non descripsit. Vergilius uerò diligenter in quarto Georg. depinxit, cum Amellum florem his carminibus indicat. (Est enim sine dubio eadem herba Chelidonium minus & Amellus.)

*Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello
Fecere Agricole, facili quærentibus herba.
Nancq; uno ingentem tollit de cespite sylvam
Aureus ipse, sed in folijs, quæ plurima circum
Funduntur, uiolæ subluet purpura nigra.
Sepe Deûni nexu ornatæ torquibus aræ,
Asper in ore sapor, tonsis in uallibus illum
Pastores, & curua legunt prope flumina Melle.*

* Erdgersten/Scharbockstrauch. Est autem Scharbock species morbi Gallici.

Othonna quid fuerit, neque ueteribus constitit, neque nobis. Hodie nomen cum re amissum est.

Quædam exemplaria duo capita de Muris auricula habent, quædam etiam unum tantum, nempe posterius, quo propriè uocata Muris auricula describitur: de hac etiã hoc loco agimus. Nam quæ prior capite describitur, Alfine est: & in quarto statim Hedxinem, in quibusdam exemplaribus hoc loco unum tantum de Muris auricula caput habentibus, sequitur. Vera itaq; Muris auricula Scolopendrio siue Polypodio similia habet folia, minora tamen, quæ singula murium auribus similia sunt, Germani quoque *Murshöhre* en uocant.

Est & alia quæ similiter ab omnibus Auricula muris uocatur, etiam Germanis quibusdam & Italis Pilosella, nostrisq; equitibus *Uigelstrauch*. Sed hæc minima quædam Intybi species est, quod ex floribus forma, colore & lacteo foliorum liquore facili colligimus.

Isatis fatiua copiosè in Turingia ad tingendas uestes seritur. Germani *Weydt* uocant, Latini Luteam & Glastum. In huius herbe caulis longitudine uariant exemplaria: quædam enim cubito eum altiores, quædam uerò duobus procereiores esse indicant. Prior tamen lectio mihi magis placet. Ea enim altitudine in pingui etiam solo Isatida nasci uidi.

* Species uidetur Brassicæ sylvestris.

Agrestis Isatis eandem cum fatiua formam habet, & ab illa nihil differt, præterquam quod non feratur. Germani eam *wilden Weydt* uocant. Nascitur in spisso & gipso solo.

Videtur corruptum esse hoc caput, & dubitatur an hoc loco legi debeat. Nam in quarto eandem herbam aliter describit: & aliter in capite Aizoi minoris, quod Telephium diuersum ab hoc esse, secundum hanc descriptionem, necesse est. Ego nullam hæcenus herbam uidere potui, quæ huic historiæ conueniret. Quapropter in minoris Aizoi annotatiunculam sermonem de Telephio reuicimus.

VALERII CORDI SI- **mesusij, in Pedacij Dioscoridis** *ANAZARBEI TERTIVM DE ME-* *dica materia Librum, Annotationes.*

AGARICVM. CAP. 1.



AGARICVS FVNGI GENVS EST, ARBORIBVS ADNASCENS; nomen suum in Pharmacopoliis adhuc retinet, & à Germanis, quoniam plerumq; in abiete nascatur, Dan-
nere: *D. v. m. n.* uocatur.

*Potius *Lec henschwamm* à Larice uocandus.

RHA PONTICVM. CAP. 2.

Habentur in Pharmacopoliis duæ radices, Quarum unam Rha barbarum, alteram Rha Ponticū uocant. Vetrū neutra est ea, quæ hîc à Dioscoride describitur. Nam Rha Ponticum, quod hodie sic uocant, huic historiæ minimè conuenire potest. Est enim ponderosa & succosa, nec aliquem Croci ex se colorem remittit. Rha Ponticū uerò, quod Dioscorides describit, fungosum & leue est, & Croci colorem manducatum remittit. Ergo quilibet uidere potest, nequaquam uerum esse Rha Ponticum, quod hodie eo nomine uenditur. Neq; enim in Ponto hoc nascitur, sed in Italia, unde ad nos adfertur. Quid autē sit ea radix, quæ hodie pro Rha Pontico in usu est, statim post audiemus. Nunc uerò quid Rha Ponticum reuera sit, indicandū puto. Omnes Arabes cum de suo Rha barbaro seu Rauedseni scribunt, Dioscoridis caput de Rha Pontico citant. Vnde necessariò sequitur, Dioscoridis Rha Ponticum, quod in Ponto nascitur, idem esse cum Rauedseni Arabum. Cum uerò Rauedseni ualde odoratū esse ipse sensus testetur, & Rha Ponticum sine odore, (hoc enim Græcis *ἄοσμος* significat) à Dioscoride describatur, necesse est diuersas radices esse, nostrum seu Arabum Rha barbarum, & Græcorum Rha Ponticum. Propterea antea à me dictum est, neutram radicem Dioscoridis esse Rha Ponticum, quod non simpliciter à quoquam intelligi debet. Nam Rha Ponticum, quod in Ponto nascitur, inodorum est: quod uerò in India prouenit, odoratum propter cæli & regionis calorem gignitur. Nam idē genus habent, & eandem formam, Rauedseni & Rha Ponticum Græcorum, odore tamen & uirium præstantia Indicū præcellit. Certum igitur est, nostrum Rha barbarum cum Dioscoridis Rha Pontico idem esse genere, & tantum differre natalis loci diuersitate. Propterea minimè errāt Arabes, quod Dioscoridis caput de Rha Pontico in recensendo suo Rauedseni adducant. Subscribo itaq; hoc meo de Rha barbaro iudicio Manardo, qui in Epistolarum lib. 6. Epistola 5. ad Leonicum scripta, idē quod ego de Rha barbaro iudicat.

Seritur hodie in plurimis Germaniæ locis herba quædam, quam uerum Rha barbarum esse credunt, quoniam luteum colorē radix eius habet: sed magno errore. Est enim nihil aliud, quàm Lapathi uel Rumicis species, quod quilibet ex radicis, caulis, foliorum, florum & seminum figura & uiribus iudicare potest. Nequaquam enim continuo Rha barbarum erit, etsi luteum colorem radix habeat. Nam uulgaris quorūque Rumex similem colorem in radice ostendit. Propterea superuacuum est, quod tanta cura eam herbam excolant.

GENTIANA. CAP. 3.

Gentiana à Germanis *Bitterwur* & *Enctian* uel *roter Enctian* appellatur. Notahoc nomine omnibus Pharmacopolis & Medicis radix est. Nascitur copiosissimè in Sueuiæ & Brisgoiæ montibus.

ARISTOLOCHIA. CAP. 4.

Tria sunt Aristolochiæ genera. Longa, rotunda, & altera longa, quæ Aristolochia clematidis uocatur. Hanc hodie simpliciter longam uocamus, cum tamen prior illa sic appellanda erat, quæ incognita nobis hactenus fuit. Iam uero ex Italia ad nos rursus affertur. Radicem habet dodrante non multo longiorem, ut etiam historia indicat. Quæ uero hodie longa à nobis appellatur, & ueteribus Aristolochia Clematidis, ab hac diuersa penitus est. Longissimam enim & uitis sarmento similem radicem habet, unde apud Græcos nomen inuenit. Germani eam Ofterlucce uocant; CAP. 4.

Rotunda Aristolochia radicem rotundam, instar globi, habet; nonnunquam etiam tuberibus inæqualem. Hac etiam caruimus hactenus, & male eius loco uili sumus ea radice, quam Germani Holwurze appellant, quæ nihil habet præter radicis rotunditatem, cur Aristolochia dici possit. Omnes enim Aristolochiæ hederaceo constant folio. Holwurze uero Rutæ & Fumio terræ folia similia habet. Omnes etiam Aristolochiæ eundem saporem & odorem habent. Holwurze autem ab Aristolochia utrumque diuersum. Porro male in omnibus Dioscoridis exemplaribus Clematidis Aristolochiæ folia, minoris Sedi, id est, Vermicularis foliis comparatur. Etenim cum longa & rotunda Aristolochia, hederaceis constet foliis, par est etiam tertiæ eius speciem eiusdem formæ folia habere, qualia etiam in ea nasci cernimus. Propterea corruptus est hic locus apud Dioscoridem, cum ait: *φύλλοις ὑποσπογγίλοις ἀεὶ ὡς μιν πρὸ τοῦ κόβοις*. & pro *ἀεὶ ὡς*, legendum est *ἀσπερ*. Sic proculdubio etiam Dioscorides scripsit, & ipsa re in natura indicat. *Μικρὸν* uero expungendum est. Ipse uerborum contextus uidetur à Dioscoridis stylo & loquendi forma in comparationibus plantarum abhorreere. Factum itaque est quorundam diligentia, ut omnes tres ueræ Aristolochiæ differentias habere possimus. Quid autem sit Holwurze, quam male rotundam Aristolochiam uocamus, in Fumi terræ capite indicabimus, ne quicquam relinquere uideamur.

DVLCIS RADIX. CAP. 7.

Glycyrrhizam Germani Süßholz & Süßwurze appellant: Eadem est cum Scythica, quæ comesta aliquot diebus sitim famemque tolerare Scythas posse, authores tradunt. Plantatur hæc in Germania etiam ad annonam & uescitgal. Plinius errauit, quod dicit sine dubio inter aculeatas esse Glycyrrhizam, foliisque eam echinatis describat, id est, aculeatis. Decepit Plinium duorum istorum uocabulorum similitudo, *γλυκὺς* & *ἐχίνος*. Nā facilis est ex uno in alterutrum lapsus. Dioscorides folia Glycyrrhizæ *γλυκὺς*, id est, Lentisco comparauit. Vidi autem ego Lentisci & Glycyrrhizæ folia: estque his mira in figura, positu & ordine similitudo. Quapropter monendi sunt Pliniani lectores, ne hoc loco Plinii potius auctoritatem, quam naturæ ueritatem, & oculatam fidem sequantur.

CENTAURIUM MAIUS. CAP. 8.

Inuenit olim utrumque Centaurium, & à se appellauit, Chiron Centaurus. Hodie uero quale sit hoc maius Centaurium, omnino incognitum fuit, & adhuc paucissimis, quid reuera sit, notum est. Porro si liuius historiæ quis conferat radicem istam grandem, quam hactenus improprie Rhaponticum uocarunt Pharmacopolæ, haud quam ire inficias potest, idem esse eam cum maiore Centaurio. Neque uero radix tantum descriptioni conuenit, conueniunt etiam caulis, folia, flores & semina. Quapropter non opus fuisse Antonium Musam hoc negare.

CENTAURIUM MINUS. CAP. 9.

Minus Centaurium ob amaritudinem Fel terræ etiam à Latinis appellatur: quam appellationem male ad maius Centaurium transtulit apud Theophrastum Gaza. Non enim amarum gustu percipitur, ut minus. Est autem minus Centaurium ea herba, quam Germani Tausentgülden- & Aurin uocant. Quidam etiam fibertraut: In Pharmacopoliis Centaurea appellatur.

*Cognata huic uidetur Gratiola, sed efficacior.

CHAMAELEON ALBUS. CAP. 10.

Chamaeleonem quidam eum Carduum esse dicunt, qui a nobis Viehdistel appellatur. Alii etiam Marianum Carduum ueluti lacteis maculis in foliis conspersum Chamaeleonem uocant. Sed neutra pars probabile quiddam asserit. Nam Chamaeleon duplicem habet differentiam. Est enim candidus & niger. Ille nullum omnino caulē habet: hic uero tantum do drantali lōgitudine. Sed Viehdistel & Martendistel proceros habet caules, qui interdum supra hominis proceritatem excrescunt. Neque hac tantum nota hi Cardui a Chamaeleonibus differunt, carent etiam odoris grauitate, propter quam niger Chamaeleon Ocimoides & Cinozolon uocatur. An autem apud nos etiam nascatur albus Chamaeleon, non facile quibus dixerit. In Italia uero prouenit, unde allatas radices uidi. Ixīa uenenum huius radicibus interdum & in quibusdā locis adnascitur, uisco quo aues capiuntur simile, unde & apud Græcos nomen inuenit. Appellatur etiam ipsa herba Ixine ab hoc uisco, ut apud Theophrastum & Plinium uidere est. Apud Plinium tamen lib. 21. cap. 16. male Helxine pro Ixine scriptum inuenitur.

*Carlina candida maior, quæ ex Gargano monte adfertur.

CHAMAELEON NIGER. CAP. 11.

Chamaeleonē nigrum uulgo ignoramus. Mihi tamen ea Cardui species uidetur esse, quæ a Germanis Eberwurtz appellatur: † historia enim omnes notæ conueniunt, & eosdem habet in curandis malignis ulceribus usus. Sed obiiceret quispiam, Nigri Chamaeleonis radicem uenenatam esse intra corpus sumptam, ut Galenus ait: radicem uero, quam nos Eberwurtz nominamus, egregiam uim contra pestem & omnia uenena habere. Nos autem respondemus: Non semper huius Chamaeleonis radicem uenenatā esse, neq; in omnibus locis, sed iis tantum, quibus uisco simile quiddam, quod Ixiam uocant, in radice producit, quod si non habeat, non est uenenata. Nam albi etiā Chamaeleonis radix si sine Ixiā sit, intra corpus contra uarios morbos sumitur. Cum uero adnatam Ixiā habuerit, uenenata redditur. Sciendum est illud etiam, in nigro Chamaeleone Ixiā interdum inueniri, ut Plinius lib. 22. cap. 18. circa finem ait, additq; omnium generum Chamaeleonis radices scorpionibus aduersari: Quare non sineratione nos quoq; nigri Chamaeleonis radice, quam Eberwurtz uocamus, contra pestem & uenena utimur. Porro accusare aliquis Plinium posset, quod nigri etiam Chamaeleonis genera uiscum ferre dixerit. Verum cum uiderim in ea radice, quam Eberwurtz uocamus, Ixiā nasci, Plinium uera dixisse, & Eberwurtz nigrum Chamaeleonem esse, probare possum. Itali nigrum hunc Chamaeleonem Carlinam uocant, *Carlina nigra.

CROCODILIVM. CAP. 12.

Crocodilum nigro Chamaeleoni simillimum est, & sæpe legentes fallit. Germani wild Eberwurtz uocant. In Pharmacopoliis hodie non habetur.

*Quidam Rhaponticum Germanicum interpretantur, nescio quam herbam sic appellantes.

LABRVM VENERIS. CAP. 13.

Labrum Veneris Græci Dipsacon, Pharmacopolæ Carduum fullonum, Germani Wollfsstrahl / Weber distel / & Weberkarten appellant. Notus est omnibus Carduus, cuius echinatis capitibus fullones pannum uellicant & exasperant. Duplicis autem est differentiae. Quædam enim sponte ubique prouenit, quædam etiam in agris feritur, qua fullones utuntur. Non desunt qui hanc Cardui speciem Virgam pastoris uocent.

SPINA ALBA. CAP. 14.

Spina alba, de qua hic agitur, ex Carduorum censu est, & ab Arabibus Bedeguar appellatur. Nondum tamen inter doctos conuenit, quo nomine a nobis appelletur: Quamuis Fuchsius Marianum carduum, cuius folia lacteis maculis distincta sunt, Spinam albam esse certò affirmet. Cum uero ueteres hanc albam Spinam simpliciter albo colore deferipserint, & non candidis maculis cōspersam, quales in Mariano Carduo uidemus, nihil affirmo.

ARABICA SPINA. CAP. 15.

De Arabica Spina, quam Arabes Suchaha uocant, non parua etiam inter doctos & Pharmacopolas contentio habetur, quam componere non est nostrum,

SCOLYMVS. CAP. 16.

Scolymus non est uulgaris ille & incultus Carduus, purpureū habens florem: sed *sauius* ille, quem ueteres Rei rusticae scriptores simpliciter Carduum uocant, Itali hodie & Galli Artecochum. Pulcher est Carduus, cuius fructu siue capite in cibis uestuntur. In Germania nuper etiam sericēpit, non tamen ad libidinis luxum, ut in Italia & Gallia. *Carduus Hispanicus.

POTERIVM. CAP. 17.

Poterion Cardui species est, quae hodie non cognoscitur: non, ut quidam putant, arbuscula illa, quae Germanis *Schlehen* dicitur appellatur. Dioscorides Poterion grande ne le fructū scribit. *Schlehen* dicitur uero frutex nō est, quoniā in iusta arboris magnitudinē adolefcit, si nō praecidatur. Poterion longos, molles, utiū modo lentos, graciles, & hircinae spinę similes ramulos producit. *Schlehen* dicitur uero non ramulos a terra mittit, sed crassum, durū, inflexilem, & si flectatur continuo fragilem caudicem erigit. Vidi ego Hircinae spinę ramulos, qui graciles mollesq; sunt, ut carduorum & aliarum herbarum ramuli. Sed nihil omnino commune cum hac arbore habebant. Poterion totū multa, tenui, lanosaq; lanugine uestitur. *Schlehen* dicitur uero nulla lanuginis uestigia habet, nisi forte aliquis in uetustis illius caudicibus muscum & ullosam caniciem lanuginem appellare uelit. Sic autem nequaquam intelligit Dioscorides. Multum enim differunt Muscus & Lanugo. Muscus etiam in crassissimis tantum arborum partibus inuenitur. Poterion uero totum tam ramulis minimis, quam maximis lanuginem ostendit. Poterion semen siue fructus odoratus, sed medicinae inutilis est. *Schlehen* dicitur uero inodorum & medicinae ualde utilem habet. Postremo Poterion sunt radices neruosae, quae in terra sectae gummi lachrymantur, *Schlehen* dicitur uero ligneas habet radices, quae in terra sectae nullum gummi emittunt. Certum igitur est, arborem quam nos *Schlehen* dicitur appellamus, Poterion non esse, neq; a Dioscoride describi. At si eam descripsisset, in primo libro, ubi Prunū & alias arbores recenset, quærēda esset, ac minime inter Carduos in hoc tertio, in quo de radicibus, herbis & seminibus describitur in praefatione huius libri pollicitus est:

Non est
Prunus syl
uestris.

ACANTHIVM. CAP. 18.

Acanthion diminutiuum est ab Acantho nomen. Est autem sine dubio Carduus, quem Benedictum uocant, Pharmacopola Itali Carduncellum diminuto a Carduo nomine, & Germani pariter Latinis Cardobenedictum, & proprio uocabulo *Spin* uocant, quasi araneae carduum, propterea quod aranearum telis capita ipsius simili septa sunt lanugine.

ACANTHVS. CAP. 19.

Ex Carduorum etiam genere Acanthus est. Itali eum Brancam ursinam Romanā uocant. In Germania a quibusdā spectaculi causa in hortis colitur. Differt a uulgo hic uocata Branca ursina, umbellifera herba plurimum, quae a Nicandro & Plinio Bupleuron, & a ueteribus Graecis etiam Buprestis appellatur. Est & Buprestis ex Cantharidum genere, de qua in Secundo dictum est.

*Branca ursina Romana, alia syluestris est, alia fatiua.

SYLVESTRIS ACANTHVS. CAP. 20.

Qualis sit syluestris Acanthus, nondum comperi,

ONONIS. CAP. 21.

Ononis ab Italis Remora aratri, Resta bouis, & Acutella, a Germanis uero *Naw* herba & *Stall* erant appellatur. Longissimas habet radices, quae boues & aratra in arando remorantur, unde etiam ab Italis nomen inuenitur.

LEVCACANTHA. CAP. 22.

Antea habuimus Carduum, qui duobus discretis nominibus *καυθα λευκή* appellabatur. Hic uerò composito ex duobus uocabulis nomine, *λευκάκανθα* uocatur. Quailis autem Carduus sit, hodie ignoratur.

TRAGACANTHA. CAP. 23.

Tragacantha Latini Hirci spinam uocant, cuius lachrymā quæ ex secta manat radice, adhuc in Pharmacopoliis Tragaganthum appellatur. Falluntur aliquot recentiores, qui gummi Arabicum Tragacanthæ lachrymam esse putant.

ERYNGIVM. CAP. 24.

Eryngion, quod hodie quidam Centumcapita, & Germani Wallendistel / uel Xadedistel uocant, omnium Carduorum pulcherrimum est, propter foliorum spectabilem formam, & capitulorum posituram, quæ alibi candida, alibi pallida, & in quibusdā locis cœrulea spectantur. Radices eius in Pharmacopoliis siccatae & Zacharo conditæ seruantur.

ALOE. CAP. 25.

Aloe omnibus Pharmacopoliis notus est succus, cuius frequentissimus est in Medicina usus. Affertur autem ex Iudæa. Herba ipsa etiam apud nos studiosè in hortis colitur, ea quæ à Dioscoride describitur figura. Quidā Semperuium Indicā appellant. * Aliqui Sedum maius uocant. Inspida apud nos est: sed in hypocaulis suspensa, amarescit, niuiq; ac uiret. Succotrina à loco Succot cognominatur quedam. Praefertur Hepatica, Vilis & arenosa est Caballina.

ABSINTHIUM. CAP. 26.

Absinthium Germani Wermut / & Eلسني uocant. Multas habet quæ statim insequuntur differentias. Hoc loco tamen de uulgari & ubiq; nascenti agitur. Errant qui album Abrotanum, Ponticum Absinthium esse dicunt. Errant etiam qui Cupressum herbam (quam nos Cypressen, Græci Chamæcyparissum nominant) Seriphis, id est, marinum Absinthium esse contendunt.

* Nostro Absinthio quia parum adstingit, admisceri potest Rosa.

MARINVM ABSINTHIUM. CAP. 27.

CAP. 28.

Marinum Absinthium à Seripho Insula etiam Seriphium dicitur. Nasctur maritimis locis, unde nomen inuenit. Pharmacopolæ ejus semen habent, quod Alexandrinum semen uocant, quidam etiam Sanctum semen, quod nomen à Santonico deductum est. Nam hoc marino Absinthio simile est, semine tantum exiliore. Nasctur hoc in Gallie & Germaniæ quibusdā locis, & semen ejus ab Italis Sandonigo, à Pharmacopoliis Zinzæ semen, uel semen Sanctum minus appellatur. Germani utrumque Wurmsamen / & Wurmfraut uocant.

* Huius semen aliqui semen Zedoarie uocant. Absinthium marinum aiunt etiam in Germaniæ ora, ut Seebergi, inueniri.

ABROTONVM. CAP. 29.

Abrotonum duplex est, scilicet nigrum & candidum. Illud mas, hoc uerò fœmina intelligitur. Mas apud nos in hortis plantatur, & Germanis Stabwurz / Garthwurz / Ebreiß / candidum similiter in hortis seritur, sed interim multis in locis sponte gignitur, propterea à nobis Wilde stabwurz & Weiße stabwurz appellatur. Mas apud nos rarò floret, ob nostri cœli frigiditatem.

HYSSOPVS. CAP. 30.

Hyssopus sine dubio est ea planta, quæ adhuc ab omnibus hoc nomine dicitur: quamuis multis argumentis contendere aliquis posset, nos Hyssopo carere. Sed ea argumenta faciliè dilui queunt. Germani Fiop uocant.

* Nasctur circa hunc fruticem Cuscuta, multò reliquis subtilior: qua pro Epithymo, si opus sit, rectè utemur. Item in montibus syluestribus etiam Hyssopus prouenit.

STICHAS. CAP. 31.

Stichas in Stichadibus Insulis è regione Massiliæ olim serebatur, unde & nomen inuenit.

uenit. Huius loco hodie Arabica Stichade utuntur pharmacopola, quæ omnino eadem est, sed densiorem spicam habet. Porro omnibus hodie ignotum est, quidnam sit ueteribus illa herba, quam nos Lauendulam maiorem, siue Spicam, appellamus. spica umb-
garis. Quidam tamen Nardum Celticam esse affirmant: quorum opinionem in Celtica Nardo confutauit. Alii Rorismarini genus quoddam existimant, inter quos Leoniceus, Manardus & Parens meus fuerunt. Verum neque horum opinioni assentiri possum, qui si integri nobis fuerint, nunquam in iudicandis plantis errare & falli possumus. Iam dudum itaque in ea opinione hesitauit, quod crederem Spicam istam Stichados speciem esse. Nam nascitur & plantatur iisdem locis, quibus Dioscorides Stichada nasci ait. Sed leue est hoc argumentum. Consultamus ergo omnes alios sensus, qui si integri nobis fuerint, nunquam in iudicandis plantis errare & falli possumus. Iam dudum itaque in ea opinione hesitauit, quod crederem Spicam istam Stichadis speciem esse. Noli tamen quicquam certi pronunciare, antequam utramque plantam uisum uiderem. Curauit igitur Arabicum Stichada, nostro orbi peregrinam plantam, mihi afferri, allatumque ex Narbonensi Gallia semen terræ mandauit aliquoties: & è semine prodijt planta ramulis, foliis, odore, sapore, & ramulorum foliorumque positu Spicæ Lauendulaceæ per omnia similis. Fragrantior tam est Arabica Stichas, quam Spica. Neque tamen his notis contentus fui. Animaduerti etiam flores & semina in utraque similima esse, quæ utraque in oblongis spicis gerit, Arabicæ tamen Stichadis Spica breuior est & densior, quam Lauendulæ siue spicæ.

Huius etiam generis est uulgaris ista Lauendula, quæ ex maiore illa in eam quam uidemus degenerauit. Porro Meseue uehementer errat, quod scribit Arabicam Stichada semen non habere, cum illi satis manifestum & perspicuum sit.

ORIGANVM OMNE. CAP. 32. 33. 34. 35.

Origani multe sunt species, ut Heracleoticum, Onitis, Origanus syluestris, et Hircina origanus, Heracleotica uero plures adhuc differentias habet, inueniturque una eius species, quæ forma foliorum & capitulorum Maioranam imitatur. Hæc iam ex Creta à quibusdam allata est, odore iucundissimo. Omnibus illis speciebus nos in nostro orbe caremus, sola syluestri Origano excepta, quæ copiose in nostris montibus gignitur, & à nobis Costen & Wolgemut appellatur. Hæc iam in pharmacopoliis habetur.

PULEGIUM. CAP. 36.

Nouerunt omnes Pulegium, quod humentibus locis sponte gignitur, & à quibusdam in hortis & perforatis fictilibus plantatur, propter miram germinandi facilitatem. Nam etiam minutim incisum satumque prouenit & germinat. Germani Poley uocant.

DICTAMNVS. CAP. 37.

Iam dudum à doctis deprehensum est, nos uera Dictamno carere, & diuersissimam ab ea radicem in eius locum recepisse, quam magno errore Dictamnus nominamus. Constat uera Dictamnus Pulegii foliis, nostra uero, qua pro Dictamno utimur, Fraxini folia habet, quæ longe à Pulegii foliorum similitudine recedunt. Vera Dictamnus etiam foliis Medicinam facit tantum, radices enim lignosæ sunt, propterea rarus illarum usus fuit. In nostra uero sola radices medicæ uim habent. Dictamni præterea folia densa lanugine utrinque uestita sunt: nostræ autem folia omnino glabra cernuntur. Quapropter in Dictamno hac ualde erramus. Ne autem calumnias & conuicia audire cogar, quod à cõmuni persuasione recedam, indicabo ubi nã uera sit Dictamnus: Georgius Agricola primus in Germaniam Dictamnus ueram attulit, cum ex Italia rediret. Vidit hic uiam Dictamnus cum Scordio in fictilibus uasculis Venetiis ex Creta allatam. Post hunc magnam illius copiam Olingerus Norimbergæ Venetiis aduexit, à quo peritiores etiam pharmacopole emunt. Nunc autem quotannis magnæ eius farcinge ex Creta Venetiis, à Venetiis Francofordiæ afferuntur. Et tam graphice ab omnibus descriptâ historiam exprimit, ut non possit melius. Verum minime caule caret, ut

Theophrastus scribit. Minime etiam flore, ut Dioscorides putat. Habet enim purpureum florem. Quapropter hac in parte potius Vergilio, quam Theophrasto & Dioscoridi crediderim, qui caulem & flores purpureos Dictamnino tribuit. Sed uenia dignos illos pronuncio, cum multae herbae quibusdam temporibus & locis neque caulem neque flores habeant. Non tamen id a proprietate illis inest. Simile in Cynoglossa Dioscorides commisit, quae quibusdam locis & temporibus caulem & flores minime producit, cum tamen alibi utrunque producat. Plures sunt herbae, quibus neque caulem, neque flores, neque semina Dioscorides esse dicit. Ego tamen multis nunc annis hoc obseruare uolens, tale nihil inueni, sed deprehendi eas herbas, quibus ille caules omnino negat, interdum, ut antea dixi, nasci. Illud tamen animaduerti uerum esse, nullam Filicem Filicis cognatam herbam, caules, flores & semina ferre. Thelypteris autem quamuis caulem ferat, flores tamen & semina minime gignit.

* Vulgarem Dictamninum, Itali Fraxinellam uocant: quod nomen aliqui sigillo Salomonis non recte adtribuunt.

PSEUDODICTAMNVS. CAP. 38.

Pseudodictamnus antedictae similis describitur, sed humidioribus locis gignitur. Necessse igitur est, maiorem priore fieri, quod ad folia & caules attinet. Viribus uero multo interior existit. Non affertur haec. Satius enim est nobis priore uti, quae uiribus hanc superat.

CRETENSIS DICTAMNVS. CAP. 39.

Non apportatur ad nos hoc Dictamni genus. Quidam credunt nostram Dictamninum illud esse. Sed haec ubique nascitur, propterea non opus fuisset, ex Creta eam in Graeciam afferri.

SALUIA. CAP. 40.

Elelisphacum Latini Saluiam uocant, Germani Salbey. Optima est quae minoram habet folia. Vehementiorem enim saporem remittit. Nota omnibus Saluia est.

* Saluia cruciata est, de qua Dioscorides sentit, minor. Maior uero, Sphacellus Theophrasti.

MENTHA SATIVA. CAP. 41.

ἡ δὲ σαρμὴ siue μινθῶν, Germani Krause müntz appellant, Saxones uero Krause müntchen, pharmacopola Mentham crispam, Satiua haec Mentha est, & nisi saepe transferatur, Sisymbrio similis fit.

MENTASTRVM. CAP. 42.

Mentastrum agrestis Mentha est: Germanice Pferde müntz appellatur. Serpit per terram hirsutioribus & grauius olentibus foliis, quam satiuam Mentha. Sed nemo aquaticam Mentham in intelligere hoc loco credat.

NEPETA. CAP. 43.

Nepeta tres habet species. Est enim montana, agrestis, & fruticosa. Montanam nondum uidi. Agrestis priuatim a Latinis Nepeta uocatur: quod nomen male nunc tertiae speciei, quae omnium ignauissima est, tribuitur. Habet uera Nepeta Pulegii similitudinem aliquam, & nobis Katzen müntz uocatur. Tertia species fruticosa & procerior est, Germanice Katzen müntz uocatur, quoniam feles ea delectatur. Ob eandem causam ab Italis Mentha cataria dicitur. Graeci omnes has species Calaminthas uocant. Recentiores pharmacopola ueram Nepetam Calamentum & Mentham non odoriferam dicunt, ut distinguatur a satiuam & odoratam Mentha. Verum inepta est haec distinctio, cum Calamentum etiam ualde odoratum sit.

* Nepeta alia est montana, Steu müntz, alia proprie dicta, in aruis & humidis locis, Boon müntz, alia salso dicta Nepeta, Katzen müntz.

THYMVM. CAP. 44.

Thymus in multis Germaniae locis in hortis plantatur, & a nobis Tymchen uocatur. In calidioribus regionibus sponte gignitur. Is uero qui in Creta nascitur, spicata habet capitula, & fragrantissimum spirat odorem. Nonnunquam etiam ad nos affertur, & a pharmacopolis Thymus aromaticus appellatur.

THYMERA. CAP. 45.

Thymbra sylvestris, & sativa est, utraque Cunila à Latinis dicitur, sativa uero Satureia tantum. Hæc à nobis Saturey & Gartenkümel dicitur. Nemo credat, Columellam Thymbra à Satureia diuersam facere herbam, cum ait: Et Satureia Thymireferens Thymbraeque saporem. Satureia enim uocabulo satiuam Cunilam intelligit, Thymbra uero sylvestrem. Quasi dicat: Satureia quæ Thymbra sativa est, medium habet inter Thymum & sylvestrem Thymbra saporem. Sylvestris autem Satureia, quæ proprie Thymbra uocatur, & ipsa iam asserture ex Creta pro Folio, sed falso, habetque circa se cuscutam Epithymi modo, quam Paulus Aegineta, Epithymbum uocat.

SERPILLVM. CAP. 46.

Serpillum quoddam satiuum, quoddam etiam sylvestre est. Satiuum hodie non temere cognoscitur. Errant itaque qui nostrum Pulegium illud esse credunt. Sylvestre uero ubique in asperis nascitur, & à nobis Quendelkümel & Feldkümel uocatur. Quidam adeo inertes sunt, ut Feidtkümel & Feldkümmel eandem rem esse credant, cum hoc uocabulo Caronagreste, illo uero Serpillum sylvestre Germani intelligant. Porro magnam similitudinem Cunila cum Serpillo habet. Propterea hoc illius etiam nomen sibi apud Germanos adoptauit.

SAMPſVCHVM. CAP. 47.

Sampfuchus siue Amaracus, Latinis Maiorana, Germanis Meyerott uocatur. Omnibus nota est herba. Illud tamen reticere nolo, Amaraci nomine etiam aliam herbam Galeno, Dioscoridi, & aliis Græcis significari. Nam Galenus libro tertio καράχιν Amaracum non boni odoris esse indicat, propterea eam delicati cuiusdam emplastro miscere noluit. Quid uero sit Amaracus, quam eo loco intelligit, postea eodem hoc libro in Parthenio indicabimus.

* Sampfuchum aliud semine feritur: aliud surculo, quod fruticescit.

MELILOTVS. CAP. 48.

Melilotum Latini Sertulam Campanam uocant. Non idem Melilotum omnes pharmacopoeie habent. Quidam enim humi stratam trifolii speciem, & Heluetii uocant Gäle (Taubentroppe) quæ luteos habet flores, pro Meliloto accipiunt, sed male. Neque recens enim, neque sicca aliquam odoris bonitatem habet. Melilotum uero fragrantissimum habere debet, præsertim siccum. Propterea hoc Dioscorides cum Sampfuchus inter alias odoratas herbas describit, illi tamen melius faciunt, qui Steintlee appellatam Loti siue Trifolii specie, pro Meliloto accipiunt. Odorata enim est ualde, præsertim quæ luteos habet flores: hi siccati melius etiam olent.

* Melilon uera gratissimum habet mellis odorem: eius uera effigies exhibetur à Fuchsio.

MARVM. CAP. 49.

Maron olim omnibus nota fuit herba, propterea (ut in re nota sit) forma eius descripta non fuit. Hinc factum est, ut hodie omnino ignoretur.

ACINOS. CAP. 50.

Acinos nisi Ocimum Cariophyllatum fuerit, quod Germani Krauß basilien uocant, omnino incognita est hoc tempore.

BACCHARIS. CAP. 51.

Bacchar siue Baccharis, coronaria est herba. Cuius caput in quibusdam exemplaribus male Asari capiti commixtum est, & ab imperitis additum, ut supra, cum de Asaro ageremus, dictum est. Bacchar uero quo nomine iam appelletur, ignoratur. Ruelius eam nouisse se putat. Ego uero qualem ille herbam intelligat, non scio.

RVTÄ. CAP. 52.

Rutam Germani Rauten / siue Weinrauten appellat. Omnibus nota est herba.

Habet

Habet autem suas differentias. Vna enim satiuæ est, de qua nunc agitur. Altera sylvestris, odoris & saporis acrimonia satiuam superans. Hanc Arabes Harmel siue Aramel uocant : pro cuius semine Cicutæ semen magno periculo hætenus in usu fuit, quem errorem alii ante nos animaduertentur.

RUTA SYLVESTRIS. CAP. 53.

Parens meus in suo Botanologico ait, nostrum uulgare Hypericum siue Perforatam, Ascyron, id est, alteram Hyperici speciem esse. Antonius Musa uerò negat, & scribit nostram Perforatam omnino eam esse, quæ hoc loco à Dioscoride Ruta sylvestris uocetur. Miror autem quomodo in tam peruersum iudicium incidere potuerit, uir ille aliàs acerrimus simplicium censor. Quod autem hac in re falsum iudicium tulerit, nunc conabimur ostendere, à temperamento Rutæ sumpto initio. Certum est secundum Galeni, & omnium Medicorum sententiam, atq; ipsa experientia comprobabat, satiuam Rutam in tertio iam completo exalfacientium ordine siue gradu esse, unde etiam tantam exiccandi uim acquisiuit, ut ipsum genitale semen exiccet, Sylvestris uerò Ruta integro gradu in caliditate & siccitate satiuam excellit; quo fit, ut non sine nocumento intra corpus sumatur. Qui igitur hæc probè considerauerit, nullo modo iudicabit Perforatam sylvestrem esse Rutam: quippe cum Perforata in secundo tantum calfaciendi & siccandi gradu sit. Vnde perspicuum est, eam nondum satiuæ Rutæ, nedum sylvestris temperamentum habere. Qui hoc credere noluerit, ipsum Galenum & certissima iudicia, quæ à gustu & experientia sumuntur, temerè reprehendit. Sed dicent aduersarii, & errorum eorum allectores (ut sunt ad calumnias prompti) cœli temperamentū in causa esse, ut Perforata apud nos in calore deficiat. Eos suo gladio iugulabo. Nōne idem cœli temperamentum etiam ipsam Rutam in calore deficere cogere deberet? Nōne Ruta præterquam quod satiuæ est, ex alio etiam orbe ad nos allata fuit, unde necessariò sequeretur eam frigidiorē multo fieri (sic cœli ratio tantum in mutandis herbarum uiribus ualeret) & tamen adhuc apud nos calida in tertio gradu existit. Cū uerò Perforata hinc minimè seratur, sed spōte ubi que proueniat, & omnia spōte genita satiuis acriora sint, etiā in eadē specie, & tamen in calore integri gradus interuallo satiuā rutam nō assequatur, minimè uerum esse potest, quod Musa ait Perforatā rutā sylvestrē esse. Nec animaduertit Rutę sylvestris caput deprauatissimū esse in Dioscoride, de quo nunc uerba faciemus. Duplex & diuersa sylvestris Rutę historia hoc capite in quibusdā exemplaribus legitur, ac malè si biipsi totum caput cohæret. Necesse igitur est unam ex illis notā & adiectitiam esse. Quæ autem illa sit, ipsa ratio & meliorum codicum fides docere potest. Siquidem in principio huius capitis tota Hyperici historia legitur, quæ malè ab imperito quodam hinc capiti preposita est. Quilibet enim hoc qui legere tantum Græcæ literas potest, iudicabit. Nam de uerbo ad uerbum totum Hyperici caput hinc loco accreuit. Hæc itaq; est notha & adulterina historia Rutæ sylvestris, cui Musæ suam Perforatam contulit, non animaduertens Hyperici descriptionem esse, neq; hoc loco in probatis & synceris codicibus legi. Abiecta igitur adulterina hæc historia, uera & genuina sequetur, quam illè neglexit. Eam autem Rutæ speciem à quibusdā in Italia seri uidit harum rerum diligentissimus obseruator Georgius Agricola, Medicinæ Doctor, qui aliquot cum foliis, floribus & seminibus ramulos secum ex Italia attulit, eos ego diligenter inspexi, & historiæ contuli. Cui postquam per omnia respondere sunt uisi, ipsa me rei ueritas pronunciare coegit, ipsos de Ruta sylvestri decerptos fuisse. Hæc uero Ruta omnibus ignota est pharmacopolis. Porro amicis hæc scripsimus. Nam si necesse foret, ualidiora adhuc allaturi essemus argumenta. Hæc candidis ingeniis sufficiant.

* Nostrum Ligusticum habet candidum semen, quia est satiuum: Dioscorides de sylvestri loquitur.

CAP. 54. Moly, Galeno & Hippocrati Myle est.

PANACES HERCVLEVUM. CAP. 55.

Panaces Herculeum malè apud Theophrastū Ligusticum interpretatus est Theodorus Gaza. Sunt enim natura diuersæ, non tamen penitus dissimiles ferulaceæ plantę, quod ad radicem, caulem & semina attinet, folia uero plurimum discrepant. Ipsa herba

herba apud nos non nascitur sponte, in Italia uero à quibusdam ostentationis gratia eam seri audio. Ex radice incisui liquor manat, qui opoponax & opoponacum uocatur, cuius adhuc est frequens in medicina usus. Atqui non queo satis admirari præcoces eos & temerarios in demonstrandis plantis iudices, qui quam primum unica tantum nota & similitudo historię siue descriptioni conuenerit, tam facile plantam aliquam, hoc uel illud esse pronunciant, reclamantibus interim plurimis descriptioni notis. In eorum etiam numero Itali quidam sunt, qui nostram uulgarem Brancam uersinam Panaces Herculeum esse putant, nobisque Germanis semen eius eeu rei exoticæ mittunt, cum tamen apud nos nihil illa uulgarius ex ferulaceis herbis inueniatur.

PANACES ASCLEPIVM. CAP. 56.

Panacis hoc genus ab inuentore suo nomen inuenit. Hodie uero non cognoscitur.

PANACES CHIRONIVM. CAP. 57.

Inuenit olim Chiron Centaurus, & à senominauit hoc, quod nunc ab omnibus ignoratur, Panaces.

* Quidam mentam Saracenicam uocant, sed falso: Theophrastus quidem Panaces Chironium, Helenium uidetur. Nam aliud quam Nicander & Dioscorides Chironium habet.

LIGVSTICVM. CAP. 58.

Ligusticum à Liguria, ubi copiose nascitur, appellatum est. Galenus Libypticum uocat, pharmacopolæ Leuisticum, Germani Liebstöckel.

* Nostrum Ligusticum habet candidum semen, quia est sativum: Dioscorides de syluestri loquitur.

PASTINACA ERRATICA. CAP. 59.

Erratica Pastinaca à Germanis Wilde Mören/ & Vogelsnest/ propter umbellæ figuram, appellatur. Græcis σταφυλίν & ἄγριον, pharmacopolis uero Daucum. Sed omnes authores Daucum diuersam herbam ab hac syluestri Pastinaca faciunt. Propterea hic scriptor Daucū seorsim etiam descripsit, cuius caput statim sequetur. Sunt igitur diuersæ herbæ, syluestris Pastinaca & Daucus.

* Pastinaca alia est sativa, alia syluestris. Satiua rursus duplex: Gallica, Pastenack uel Pasteneye Germanis. Carota, Mören/ Kåble. & similiter syluestris, alia Gallica, Kossibenelle/ Wilde Mören: alia Daucum dicitur, Germanis Vogels nest.

SESELE. CAP. 60. 61. 62.

Seseleos multæ sunt species, ut Massiliense, Aethiopicum & Peloponnesiacum: Est etiam Creticum, quod proxime sequitur. Aethiopicum autem & Peloponnesiacum, hodie à nobis non cognoscitur. Solius Massiliensis semen pharmacopolæ habent, Sileris montani appellatione, quod nomen à Sile deduxerunt. Nam Sesele ueteres etiam Sili & Seli uocabant. Siler uero pumile salicis genus quoddam est, in aëre quosius proueniens.

* Sesele Massiliense, uulgo Kossümme.

TORDYLVM, ID EST, CRETICVM SESELI. CAP. 63.

Τόρδυλον sunt qui τερνύλιον uocant. Nicander Hordylon, Aegineta τέρνλον, nisi uitium in exemplaribus sit. Herba hæc qualis ueteribus fuerit, nulli hæcenus cognitum est ex recentioribus, qui de simplicibus scripserunt. Ego tamen affirmare aulim, eam esse quæ à Germanis Berwurz appellatur, à quibusdam etiam Meur, sed falso. Parens noster in Botanologico suo herbam, quam Berwurz uocamus, Daucum Creticum esse putauit. Semen uero manifeste historię reclamat, quod ille nondum uiderat. Quapropter ab illius sententia libenter recedo, ne charum alioqui patrem pluris quam ipsam rei ueritatem aestimare uidear. Non enim is sum, qui suos suiq; parentis errores defendat. E contra uero si iniuste ab aduersariis reprehendatur, me illum defendere uis naturæ iubet.

SISON. CAP. 64.

Sison siue Sinon, exiguum semen est. Hoc tamen nomine à pharmacopolis non cognoscitur, qui duo semina Amomi appellatione ostendunt. Vnū rotundum & paupere minus, neq; acre, neq; odoratū, quod Botryos semē est. Alterum uero Apium siue Pe...

ue Petroselinum semen figura & quantitate æmulatur, colore nigrum, cum tunditur odoratum, & in gustu aromatica acrimonia linguam pungens (ut ferè omnia in umbellulis genita semina.) Posterius hoc sine dubio est illud semen, quod Dioscorides aliique ueteres Sison siue Sinona appellant. Recentiores Medici, qui barbaro illo seculo uixerunt, & pharmacorum compositiones in luminaribus suis, ut uocant, conscripserunt, malè Petroselinum Olusatrum (quod illi corruptè Olixatrum uocant) & Sinon (quod Sinonum appellant) idem esse putant.

ANISVM. CAP. 65.

Anisum omnibus notum est semen, quod in pharmacopoliis nomen suum retinet. Quidam etiam Fœniculum Romanum illud appellant, cum tamen Romæ idem habeant Fœniculum, quod nos. Semine uero nostro dissimile Fœniculo est. Seritur in Germania multis locis ad uectigal, & à nobis *Анисъ* uel *Энисъ* appellatur.

CARVM. CAP. 66.

Κάριον siue Caron, Latini Carum uel Careon, pharmacopolæ Carui, Germani *Wiesentümel* siue *Felotümel*, uocant. Nascitur in pratis & campestribus pinguibus (non tamen uliginosis) locis, Semine eius quotidie in cibis utimur.

ANETHVM. CAP. 67.

Anethum umbelliferum olus est, Fœniculo simile, latiore tantum semine. Pharmacopolæ herbam eodem nomine appellant, Germani uero *Till*.

CYMINVM SATIvvm. CAP. 68.

Cyminum sunt qui Cuminum appellant, pharmacopolæ Cyminum, siue Cuminum Romanum, Germani *Kramtümel* & *Ömüßher tümel*.

CYMINVM SYLVESTRE. CAP. 69.

Alterum
Nigella spec-
ies.
Nigella cornu-
ta.

Duplex sylvestris Cymini genus hoc capite describitur. Vnū satiuo simile semen, sed glutinosum ferens, quod *Habertümel* à Germanis uocatur, quoniam auenæ modo glutinosum sit. Apportatur hoc aliunde cum satiuo in Germaniam. Alterum *Nigella* potius quam Cymino simile est. Cum uero *Nigella* quoque à quibusdam Cyminum nigrum uocetur, potuit etiam ad hanc herbam Cymini appellatio transferri. Vidimus eam sæpe in agris, & hic quoque in Vuitenbergensi agro Medicinæ studiosis ostendimus. Est autem uere *Nigella* omnino similis foliorum incisuris, florum figura & colore, seminum colore & odore: fruticosior tantum, & semen non uasculo continuo ut *Nigella*, sed in corniculis pluribus ex uno principio sine flore sursum crescentibus. Hoc Germani *Doornümel* id est, cornutum Cyminum uocant, Ruellius libro iij. cap. xliij. ait, ad alterius sylvestris Cymini descriptionem satis accedere uideri herbam, quam sicut rura Cornutam (à Corniculis) uocant. Qua in re bene iudicat Ruellius, propterea nequeo non illius iudicium probare. Atque utinam ubique similiter iudicaret.

AMMIL. CAP. 70.

Ammi Latini Ammium, pharmacopolæ Ameos nominant. Peregrinum nobis semen est, & interdum eius loco Petroselinum semen Materialistæ pharmacopolis uendunt. Seui aliquoties mihi missum recens Ameos semen, & nostrum cœlum minime respuit, habetque mediam inter Apium & satiuum Petroselinum figuram.

* Circa Goslarum sponte nascitur.

CORIANDRV. CAP. 71.

Κόριανδρον & *Κοριαννον*, Latini Coriandrum, Germani *Wandstentill* (à cimicibus & anetho composito nomine) & *Coriander* uocant. Nomen inuenit à fœdo odore, quo, cum uirida adhuc est, Cimices imitatur. Pluribus Germaniæ locis ad uectigal ab holitoribus feritur.

HIERACIUM MAIUS. CAP. 72.

Non reor Dioscoridem hoc loco inter umbelliferas plantas Hieracium descripsisse. Cum enim sint Intybaeae & oleraceae herbae, eas in secundo libro, ubi de Lactuca & Intybo agitur, describi oportuit. Est autem Hieracium maius Intybi agrestis species, quae à Germanis *Wilde Scwidistel* uocatur.

HIERACIUM PARVUM. CAP. 73.

Hieracium paruum à Germanis *Pippaw/ Psaffenblatten/ & Sommerdohz* uocatur. Coliculus breuem, tenerum, concavum, & glabrum sine ramulis & foliis à terra ex circumstratis foliis erigit, in summo luteum orbiculatum & latum florem sustinens, qui postquam in pappos resolutus fuerit, uestigium relinquit sacrificulorum rasuris simile. Porro utrunque Hieracium nomen ab accipitribus accepit, qui eius lacteo liquore oculorum suorum aciem acuere existimantur. Idem etiam de Aquila quidam tradunt. Pharmacopolae raro has herbas colligunt.

* *Fuchs* *Hedypnoida* uocat.

APIUM SATIIVM. CAP. 74.

Omnibus cognitum est satium Apium, quod Germanis *Espe*/ deducto ab Apio nomine, & *Wercf*/ uocatur. Apium etiam sponte in nigro & pingui solo circa pagorum fossas acriuiolos nascitur, satiuo per omnia simile, & idem, praeterquam quod non colatur. Copiose autem hoc inter Lipsiam & Merseburgum urbes circa pagos crescit.

* Apium satiuum aliud est latifolium, *Wercf*. aliud crispum, nostrum *Petroselinum*.

PALVSTRE APIVM. CAP. 75.

Ελεοσλίον apud Theophrastum Paludapium non indocte uertit Theodorus Gaza. Qui quamuis Graecus natione esset, primus tamen fuit, qui in Latina lingua Graecarum dictionum compositiones imitari auderet, nec infeliciter Latinam linguam in rerum appellationibus auxillis uidetur. Est autem palustre, siue rusticum Apium, grādis herba, Apio satiuo similis, in palustribus proveniens, quae à Germanis *Wasserwercf* appellatur. Nullus eius apud nos est in Medicina usus. Cum tamen eadem omnia quae satiuum possit.

* *Ελεοσλίον* maius, *Wasserwercf*; minus, *Wilde Wercf*.

MONTANVM APIVM. CAP. 76.

Montanum Apium quid sit, hodie omnino ignoratur. Nolo tamen praeterire, uehementer errasse interpretem Virg. Marc. quod capitula huius Apii Papaueris capitibus comparauerit. Ruellius autem Cicutae capitibus illa similia uertit, & hoc quidē optime, ut nūc ostendemus. Magna enim est ineptia, umbelliferę plantę capitula, id est, ipsas umbellas papauerinis capitibus cōparare, cum nulla sit inter utraq; illas partes proportio uel similitudo. Greci tamē exēplaris culpa est, quod Verg. Marcellus in uertenda hac nota peccauerit. Nam in illo legitur: *κεφαλὰς μικρὰς περιμεφθόντες*, ubi ille *μικρὰς* Papauer uertit, cum tamen *μικρὰς* Papauer, *μικρὰν* uero ex papauere expressum succum significet. Quis igitur herbarum partes succo alicui conserret? Verum abundat in ea dictione *μυ*, syllaba, & simpliciter *κωνίω* legendum, quod est Cicutae. Et sic etiam uertit Barbarus. Omnes enim Apii species in umbellis flores & semina ferunt, & minime in papauerinis uasculis. Propterea sine dubio ipse Dioscorides huius montani Apii capitula siue umbellas Cicutae capitulis comparauit, quae etiam umbellas & minime papauerina uacula fert. Venia dignum Marcellum pronuntiarem, si non ipse etiam omnia argumenta, quae pro nobis sunt, probe sciuisset, & pro sua uersione contra Barbarum Apologiam scripsisset, in huius capituli Commentario.

PETROSELINVM. CAP. 77.

Quamuis Petroselinon quoque similiter in montibus ut Oreoselinum nascatur, ta-

men diuersæ sunt herba. Petroselinum enim non tantum in montibus gignitur, sed præruptis illorum petris, unde nomen inuenit. In Macedonia optimum nascitur, unde Macedonicum etiam appellatur. Ostendunt eodem nomine grande & nigrum quoddam semen pharmacopola, quod Ruellius etiam uerum Macedonicum Petroselinum esse credit, lib. iij, cap. xlvij. Cum uero Petroselini semen Ammio candido & minimo semini comparetur, nequaquam uulgo uocati Petroselini Macedonici semen, uerum Petroselinum esse potest. Hoc enim nigrum & grande est. Quod autem hoc semen Petroselinum Macedonicum non recte uocetur, eorum culpa est, quia suis luminaribus docent, Petroselinum Macedonicum & Olusatrum, siue Olisatrum, (ut illi pronunciant) idem esse: sed magno errore. Habet enim Olusatrum proprium & à Petroselino diuersum genus, eiusque semen est, quod falso Macedonicum uocatur Petroselinum, ut sequenti capite indicabimus. Porro uero Macedonico caremus: Quod uero eodem nomine apud nos in hortis seritur, illius speciem cultura mansuetam esse minimè inficias eo. Hoc à nobis *Petersilien* appellatur.

OLUSATRUM. CAP. 78.

Hipposelinum Theodorus Gaza apud Theophrastum Equapium uertit, propter magnitudinem sic à Græcis uocatum. Est autem Olusatrum sine dubio ea Apii species, cuius semen hodie in pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum appellatur. Omnes enim notæ descriptioni conueniunt. Idem etiam Musa sentit. Ruellius Olusatrum non cognouit, cum huius semen antea Petroselinum esse dixerit.

SMYRNIVM. CAP. 79.

Smyrnion à Myrrha nomen habet, quoniam radicis lachryma & semen Myrrhæ aliquem odorem & saporem habeant. Hanc herbam pater Angelicam esse dixit, non uulgarem tamen, sed quæ in Pomerania & Brisgoia nascitur, nigra foris radice: & hac in re dubium non est. Ruellius non sciuit, Smyrnium hodie Angelicam uocari, alioqui non affirmaret, Angelicam Laserpitium Gallicum esse. Inuenit enim in quibusdā artis ueterinariæ compositionibus Laserpitium Gallicum requiri. Postquam igitur satiuam Angelicam in Gallia uidisset, statim, (sed temere) iudicauit, eam Laserpitium Gallicum esse. Cum uero à nullo unquam probato auctore aliqua Laserpitii species in Gallia nasci scribatur, nec eius historia à quoquam ponatur, uana hæc est coniectura, qua patriam suam celebrare conatur, ut similiter Laserpitiferae appellentur Gallie, quemadmodum Cyrenæ, quas Catullus Laserpitiferas carmine suo appellat. Sed esto (quod non est) Angelica Laserpitium Gallicum uocetur, tamen etiam Smyrnium esse potest. Quapropter ipse Ruellius Smyrnium quoque non cognouit, quamuis herbam uiderit. Ille Smyrnium eam esse herbam dicit, quæ Gallis Leuechia, siue Leueche, appellatur. Cum uero ego compertum habeam, Leueche à Leuistico deductum & corruptum uocabulum esse, & sic Gallos satiuum Ligusticum appellare, † minimè uerum est quod scribit, Leueche Smyrnium Gallicum uocari. Porro uerum Smyrnium, id est, Angelica, à Germanis *Weitz geyst wurtz* / *Brustwurtz* & Angelicè uocatur: quibus nominibus ea est intelligenda, quæ ex Pomerania & Brisgoia affertur radice nigra. Nam aliud etiam genus ubique in uliginosis circa paludes & profluentes, & in humidis petris prouenit, quod multis notis à priore discerni potest.

† Bene diceret Cordus, si nostrum Ligusticum seu Leuisticum uulgo dictum, cum ueterum Ligustico conueniret.

ELAPHOBOSCVM. CAP. 80.

Ad Elaphobosci descriptionem satis accedere uidetur herba, quæ Germanis *Sirschke* appellatur, aliàs *Gerste* uel *Strenzel*.

FOENICVLVM. CAP. 81.

Marathrum Germani *Fenchel* appellant. Notum omnibus est, serulaceam & umbelliferam herbam esse Fœniculum.

HIPPOMARATHRVM. CAP. 82.

Hippomarathrum grande & syluestre est Fœniculum. Describitur & alia syluestris Fœniculi species, sed utraq; hodie ignoratur, quamuis Ruellius sibi Hippomarathrum cognouisse uideatur.

* Fœniculum syluestre crassius est satiuo, & grauioris odoris, Wilder Fenchel. Plerique, cum Peucedano confundunt hodie: sed Peucedano odor est grauiissimus, radix foris nigra, Hippomarathro candida.

DAUCVM. CAP. 83.

Hic Daucus à syluestri Pastinaca plurimum differt, habetq; multas species. Omnia uero maxima Pastinaca Gallica à Plinio uocatur, cuiuslibet similes sunt, sed multo minores. Omnes hæc in Germania Pimpinellæ uocantur; uulgo *Zibenelle*/quarum radices & semina ualde acrem habent saporem. Itali, inter quos etiam Musa est, aliam herbam Pimpinellam uocant: eam scilicet quam nos *Blüeströpflein* appellamus: cuius duæ sunt species. Vna purpureo, altera pallido, cum floret, capitulo. Hæc in æditis & asperis nascitur, illa in pinguibus & lutosis pratis: utraq; Italici ad cibos expetitur, habetq; Dauco, id est, Pimpinellæ nostræ similia folia, minimè tamè umbellæ. Temperamento uerò contrariò constat, uulnera capitis mira efficacia sanat, quas uires uulgares herbarii magno errore nostræ Pimpinellæ tribuunt. Porro minimè est negandum, quòd etiam Pastinaca syluestris à ueteribus, & ab hoc ipso authore inter dum Daucus uocetur. Propterea non merito aliquis Pharmacopolas reprehendet, quod Pastinacam syluestrem Daucum nominent.

DELPHINVM. CAP. 84.

Suspicio Dioscoridem nullum Delphinium, præsertim hoc loco, descripsisse. Neq; enim Galenus, neq; Aegineta huius mentionem in simplicium censu faciunt, cum tamen aliàs de omnibus quæ in Dioscoride describuntur simplicibus, ipsi quoq; agunt. Neq; hoc caput in antiquis codicibus legitur, neq; hoc loco inter umbelliferas herbas siliquis ferens describi debuit. Est enim hoc contra authoris huius ordinem. Non tamen nego fuisse Delphini appellatone ueteribus herbam, sed à Dioscoride non depictam.

* Aliqui Delphinium interpretantur *Weydenkraut*: cui folia salicis tribuunt, sed incisa.

DELPHINIVM ALTERVM.

PYRETHRVM. CAP. 85.

Pyrethrum Latini etiam Saliuarem appellarunt, Radices eius in pharmacopoliis habentur eodem nomine. Seritur in Germaniæ multis locis ad uestigal, & à nobis Græco uocabulo corrupto *Pertham*/ propriis uerò nominibus *Gemeurwurts*/ siue *Berferwurts*, id est, gustu feruida, & saluiaris uocatur. Ruellius malè folia eius Gallicæ Pastinacæ comparauit, cum tamen Dioscorides simpliciter ea syluestri Dauco comparauerit. Hoc autè loco per syluestre Daucum, Pastinacæ syluestrem intelligit. Nam huic similia folia Pyrethrum habere ipse inspexit, Gallica uero Pastinaca ualde lata habet, & Pyrethro dissimilima folia. Atqui Ruellius malè Gallicam Pastinacam idem cum syluestri Pastinaca, siue Carota esse putat. Quamuis autè Gallus fuerit Ruellius, minimè tamen Gallicam Pastinacam cognouit, neq; ipsum Pyrethrum nasci uidit: quod ex Plinio & illius uerbis facile demonstrare possem.

* Pyrethrum minus, *Wilder Bertram*. Draco non est Pyrethrum.

LIBANOTIS. CAP. 86.

Libanotidis species, quæ hoc loco describuntur, nobis hodie omnino incognitæ sunt, & plurimè differunt à nostro uulgari Rosmarino, qui frutex potius quam herba est. Quidam tamen putant nostratem Rosmarinum hanc ueram Libanotida esse, sed apud nos degenerare. Verum hi toto cœlo aberrant. Sunt enim diuersissimæ plantæ, illæ enim, de quibus hic agitur, umbellifera & Fœniculo similes sunt: quæ similitudo nullam habet cum nostrate Rosmarino proportionem. Nam quoties degenerant plantæ, minores aut maiores, aut debiliores euadunt, seruata semper eadem proportionem. Hanc autem Libanotida in Theriacis suis intelligit Nicander, & minimè nostratem, quæ proprium ab illo genus habet, ut proximo capite sequetur.

* Libanotidem primam aliqui putant esse Angelicam syluestrem uulgo dictam, *Wilde Angelica*, secundam uero *Schwartz Buschwurts*/ quam alij *Seseli* Aethiopicum faciunt.

CANCHRYS, SEMEN LIBANOTIDIS. CAP. 87.

Quæ hoc loco describitur coronaria Libanotis, à Romanis & Germanis Rosmarinus uocatur: & hæc est quæ ubiq; ad coronas plantatur, habetq; diuersum genus à priore. In Italia & quibusdam Galliar tractibus copiose nascitur sponte, apud nos uero satiuæ est tantum.

SPONDYLIVM. CAP. 90.

Spondylium Latini Verticillarem uocant. Hodie nobis incognita est planta: Ruellius eam cognouisse uidetur, ait enim à Gallis Panacum syluestrem uocari. Videntur igitur est, quamnam ille herbam intelligat.

* Ruellius procul dubio sentit de ea, herbam, quam multi imperiti apud Germanos brancham urfinam falso uocant. Ea quidem ad Spondylii descriptionem melius accedere uidetur quam Astrantia uulgò dicta, Neusterwurzel quæ nonnullis Spondylii nomine appellatur.

FERVLA. CAP. 91.

Νέσος Latinis Ferula appellatur. Grandis hæc est & Fœniculo similis planta, pharmacopolis hodie incognita. In Italia sponte quibusdam locis prouenit. Germania uero à paucissimis feritur ostentationis gratia. Omnes umbellifera plantæ ab hac ferulaceæ dicuntur, ceu Fœniculum, Peucedanum, Anethum, &c.

PEUCEDANVM. CAP. 92.

Πευκεδανόν, Latinis Peucedanum, Germanis Wai strangel uocatur. Notum est Medicis & pharmacopolis Peucedanum.

* Herba Sulphurata.

NIGELLA. CAP. 93.

Μελάνθιον Latini Nigellam, Germani Schwarzen Künmel appellant. Errant uehementer, qui in segetibus longis hirsutisq; foliis, & rubente flore nascentem herbam Nigellam uocant, quæ à nobis Naden appellatur.

LASERPITIVM. CAP. 94.

Σίλφιον Latini Laserpitiū, pharmacopolæ Asam foetidā, Arabes Anjudē, Germani Teüfelstod: et appellant. Multi opinantur (inter quos etiam pater meus fuit) Asam foetidam minime esse Silphii liquorem, solo odore rem æstimantes. Verum si falluntur. Differt enim secundum regionis diuersitatem Silphium. Optimum est Cyrenaicum, quo hodie caremus. Quod uero nos habemus, ex Media & Syria affertur, cui Dioscorides uirosū odorem tribuit, quem in Asa foetida apertè sentimus. Certum igitur est, nos eam saltem Silphii speciem habere. Illi autem uehementer errant, qui Asam dulcem siue Benzoi, uerum Laserpitiū esse putant, in quorum numero etiam est Ruellius, qui Beniuinum pro Benzuinum scripsit, & interpretatur prolem Iudææ parentis, cum tamen Benzoi non in Iudæa nascatur, sed ex India afferatur. Porro non erit inutile, differentiam ostendere inter Laserpitiū & Benzoi, ne aliquis ad falsam illorum opinionē inclinet. Certum est Silphii liquorē ex ferulacea & Apio simili planta manare. Qui uero Benzoi ex India afferunt, uidisse se dicunt procerem arborem, ex qua resinæ modo destillet, quod incolæ Benzoi nomen, ex hoc pinguisimum florem exprimi, quem sibi reseruent, ac potentissimis regibus pro magno dono mittant, oleum Benzuinum uocantes, & quo Diis suis supplicent. Sedimentum uero quod super fuerit, sicca resine simile aduenis mercatoribus uendi, & demum ad nos etiam afferri. Lignum etiam huius arboris in sacrificiis iucundissimo odore accendi, habetq; in maximo precio & honore.

SAGAPENVM. CAP. 95.

Σαγάπηνον pharmacopolæ corrupto uocabulo Serapinum dicunt. Herba ferulaceæ in Media nascentis liquor est.

EUPHORBIVM. CAP. 96.

Euphorbium acerrimus est liquor, qui eodem nomine in pharmacopoliis uocatur. Nomen uero ab Euphorbo, Iubæ regis Libyæ medico & fratre Musæ, Augusti Cæsaris medico, inuenit.

* Non est propriè arbor, liquor eius adulteratur lachryma Eulse & Tithymalli.

GALBANVM. CAP. 97.

Galbanum uerum eo dem nomine à pharmacopolis cognoscitur. Et hoc ferulaceę cuiusdam plantę, Metopium appellatę, liquor est.

GVTTA AMMONIACA. CAP. 98.

In Libya circa Hammonis Iouis delubrum, ex ferulacea planta colligitur Hammoniicus liquor, qui & Hammoniacum Thymiam a Gręcis Medicis appellatur. Qui dam autē Interpretes cum apud Galenum legunt: *Αμμωνιακή θυμιάματ'*, duas dictio nes uirgula distinguunt, diuerfas res intelligentes, sed falsō.

SARCOCOLLA. CAP. 99.

Sarcocolla notum est in pharmacopoliis gummi, quod in Perside ex arbore qua dam destillat, & in minimos grumulos concreuit.

GLVTINVM. CAP. 100.

Glutinum siue Gluten, *κόλλα* Gręcis, Germanis *Leim* uocatur. Ligna eo conglu tinantur, propterea etiam à Gręcis *κελόκολλα*: & quod ex taurino corio excoquitur, *ταυροκόλλα*, uocatur.

GLAUCIUM. CAP. 101.

Malè quidam credunt, Glaucium (Arabes Momithe uocant) cornuti Papaueris succum esse. Nam ex sui generis herba colligitur. Hodie uerò ad nos non amplius offertur.

* Quidam *Rattenzangel* interpretantur.

ICHTHYOCOLLA. CAP. 102.

Ichthyocolla à pharmacopolis colla, siue gluten piscium, à Germanis *Hausenbla sen* uocatur, quod scilicet piscis illius ex aluo sumpta membrana sit. Vtimur ea in ge landis croceis piscium iusculis. Excoquitur etiam ex membranis illis, quemadmo dum ex boum coriis pulchrum, flauum & translucentum gluten, Germanis *Wunderlein* uocatum, quod eius madefactis in ore frustis chartę glutinari soleant.

VISCVM. CAP. 103.

Germanis *Vogelleim* appellatur. Ex multis arboribus Viscum fit, quales sunt Myxæ fructus, Aquifolia, & ea quam nos *Wadich* appellamus. Hoc uero loco Dioscorides Viscum intelligit, quod ex frutice illo fit, quia Germanis *Wissel* appel latur, nunquam per se è terra crescente, sed aliis arboribus ceu accidens adnascente. In uenitur hic fructus in quercu, syluestri mālō & pyro, salice, betula, corylo, abiete, & nonnunquam etiam in uite.

* Melius Viscum fit è ramulis, quam è baccis. fit etiam ex Aquifolia.

APARINE. CAP. 104.

Aparine à quibusdam Lappa etiam uocatur, quod tota herba cum semine propter asperitatem suam prætereuntium uestibus adhæreat, Germani eam *Alebe* traut nominant.

ALYSSVM. CAP. 105.

Alysson hic author, & alii, rotundis foliis descriperunt, Plinius uero Rubiæ simi libus, sed malè. Qualis uerò sit hodie, ignoratur.

scilicet.

ASCLEPIAS. CAP. 106.

Asclepias ea est herba, quę à quibusdam Vincetoxicum, à Germanis *Schwal benwurt* uocatur, quoniam cum maturuit semen in Siliquis, Siliquę ipsę deli scunt, & hirundinibus uolantibus similes fiunt. Eandem ob causam ab aliquibus re centioribus Hirundinaria dicitur. Sed alia est Hirundinaria, quę 2. libro Chelido nium uocatur.

COLVS RVSTICA. CAP. 107.

Ατρακτυλῖς, Cnici, quem hodie Cartamum uocant, agrestior quædam species est, quæ hodie non temerè à quouis cognoscitur.

POLYCNEVM. CAP. 108.

Polycnemon qualis sit, hodie omnino ignoratur. Nomen à multis suris siue internodiis inuenit.

CLINOPODIUM. CAP. 109.

Clinopodium Germanis *Werbeld* est appellatur, multos habet, ut Marrubium, circa caules uerticillos, lactorum rotundis pedibus similes, à quibus Græci & Germani nomen illi indidere.

* *Origanum longum nimirum.*

LEONTOPETALVM. CAP. 110.

Leontopetalum omnino est incognita hoc tempore planta.

TEUCRION. CAP. 111.

Teucrium à Germanis *Kummertrost* uocatur. Huius etiam species est, quæ hodie dicitur (nomen Germanicum uidetur deesse) & nobis pro Chamædry in usu Germaniæ pharmacopolis habetur.

* Herba *Bleiner Kummertrost* nascitur saxosis locis, & alia species in montibus.

TRIXAGO. CAP. 112.

Χαμαίδρις Germanicè *Erdeiche* uocatur. Non cognoscitur hæc à Germaniæ pharmacopolis. Eius tamen loco Teucrii speciem habent, quam omnes etiam uulgares Herbarii Chamædryos appellatione indicant. Differunt autem plurimum inter se. Hæc enim ubiq; in campestribus nascitur, cœruleo flore, & minimo semine in compressis pericarpis clauso. Sed uerè Chamædry asperis & caluis exit montibus, flore purpureo, & semine nigro & rotundo in denticulatis caliculis, Hyoscyami uasculis similibus, multò tamen minoribus. Affertur iam ex Italia & Creta ad nos. Ego autem maximam eius copiam in Germania Ihenæ inueni. Brunfelsius eam in tertio Tomo sub Chamæpyteos nomine depinxit.

LEVCAS. CAP. 113.

Leucadis Nicander etiam meminit. Quo uero nomine nunc appelletur, nulli cognitum est.

LYCHNIS CORONARIA ET AGRESTIS. CAP. 114. 115.

Utraq; Lychnis hodie incognita est. Ruellius tamen eam cognouisse uidetur.

* *Lychnis satius*, *Dausent schôn*, *siluestris*, *Donner nägele*. Nostri *Caryophylli* nihil sunt quam *Lychnis* dis species. Plinius Rosam Græcam uocat. *Lychnites* *Marienrößlin*.

LILIVM. CAP. 116.

Multæ sunt Liliorum differentiæ. Hoc tamē loco candida Lilia intelligenda sunt, quæ nobis *Lilten* uocantur.

BALLOTE. CAP. 117.

Ballote Latinis nigrum, siue cantherinum Marrubium, & Viceraria, Germanis *Schwarzer Andorn* uocatur.

APIASTRVM. CAP. 118.

Duplex est Apiastrum. Vnum sic appellatur, quod Apio simile sit. Hoc alio nomine Ranunculus uocatur, & in Sardinia uenenatum est. Alterum ab Apibus Apiastrum uocatur, quæ hac herba delectantur. Melissophyllon hoc à Græcis uocatur. Plinius hanc distinctionem non cognouit, ut lib. xx. capite xi. uidere est. Vbi dicit: Apiastrum Higinus quidem Melissophyllon appellat, sed in confessa damnatione est uenenatum in Sardinia. Apiastrum uero, id est, Melissophyllon, quod Higinus intelligit, nequaquam est uenenatum. Pharmacopolæ hanc herbam Melissam, Germani *Binenkraut* dicunt.

* *Nascitur in Hesiâ montibus quibusdam.*

Prasion, Latini Marrubium, Germani Andorn & Gorts vergiß uocāt. Notā est omnibus herba.

STACHYS. CAP. 120.

Stachys spicata herba est, & Marrubio similis, candidior tamen, & ob eam causam Germanis Weißer Andorn, & Stettin Andorn uocatur.

PHYLLITIS. CAP. 121.

Omnibus persuasum, & Pharmacopolarum animis altius infixum est, Scolopendrium esse Linguam ceruinam, quæ Germanis Nürschling uocatur. Cum uero Scolopendrium Polypodii modo incisus foliis describatur ab omnibus, Lingua ceruina uero nullas omnino incisuras habeat, necesse est differre plurimum Scolopendrium & Linguam ceruinam. Quid autem reuera lingua ceruina sit, hoc loco indicabimus. Posthac etiam quid uerum Scolopendrium sit, indicaturi. Lingua ceruina igitur sine dubio est, quæ hic describitur, Phyllitis, tam graphicè omnes notæ descriptioni conueniunt.

PHALANGIUM. CAP. 122.

Phalangium hoc nomine omnino hodie ignoratur.

TRIFOLIUM. CAP. 123.

Multæ sunt Trifolii species in campis & pratis nascentes. Hoc autem loco diuersum ab illis Trifolii genus intelligit Dioscorides, quod priuatim Oxytriphylon & Asphaltion ab odore uocatur. Quale autem Trifolium hoc sit, nondum compertum est.

POLIUM. CAP. 124.

Duplex est montani Poli genus, sed neutrum Pharmacopolis in Germania cognitum. Quod enim hi Polium uocant, asperis locis exit, Serpyllo syluestri simile, deinceps per ramulos nascente semine, non in iucundè uiride hoc olet: siccatum uero nullum habet odorem, hyeme etiā perit. Sed uerum Polium altis & calidis exit montibus, in summis ramulis Corymbi figura capitula, & in his semina ferens. Viride & siccum suauiter olet, & hyeme tota uiret. Sic describitur Polium à ueteribus. Huius minor species ex Creta, Lugduno, & Massilia, Gallia urbibus ad paucos nostrates Pharmacopolas affertur. Maius uero in Germania copiosè nascitur, præsertim Ihenæ, & ab incolis Wilder Rosmarin uocatur, improprie tamen.

* Wilden Lauendel in Turingia appellant. Teucrium est propriè minus Polium.

SCORDIUM. CAP. 125.

Scordion hæc herba appellatur, quod odore tantum Allium imitetur. Forma enim Allii dissimilis est. Pharmacopolæ magno errore syluestre Allium Scordium appellant. Veruntamen Scordium in Germania multis locis nascitur, ut Rundenbergi, Peynæ in Brunswicensi Saxonia, ut in Cheruscorum agris, nec non Vuittenberge. Herba est Chamædri similis, odore Allii, nascitur palustribus locis, unde etiam Romanis palustris Trixago appellata est. Germanicum nomen nondum audire licuit; Scordium quod in Creta, Italia & Gallia nascitur, eandem habet cum nostrate figurā.

TVSSILAGO. CAP. 126.

Βήχιον καὶ χαμαελεύκη, siue χαμαί γερον, Latini Tusilago, Farfarella, Farfarago, & Ungula caballina, Germanis Düsselattich & Brandelattich appellatur.

ARTEMISIA. CAP. 127.

Artemisiae duo cognouimus genera. Alterum rubente, & alterum candicante caule. Pharmacopolæ eodem utrumque adhuc nomine appellant. Germani Wuggart & Beißfuß, * Artemisia latifolia, Weißer Beißfuß.

TENVIFOLIA ARTEMISIA. CAP. 128.

Huius Artemisiae caput genuinum non uidetur, quoniam antea etiam tenuioria Artemisiae mentionem fecit. Propterea in antiquis exemplaribus nusquam legitur.

AMBROSIA. CAP. 129.

Ambrosiam recentiores Tanacetum, id est, Reinsat esse putant, quidam etiam

Hirschwurz. Sed utrunq; falsum est. Nam Ambrosia Artemisiae speciebus annu-
meratur, Hodie uerò non cognoscitur.

BOTRYS HERBA. CAP. 130.

Ethac Botrys altera Ambrosiae species est, cuius semen ab aliquibus Pharmacopolis Amomum uocatur. Seritur à paucis in Germania. Herba est admodum odorata, & ab holitoribus, qui eam ferunt, *Türkischer Beifuss* uocatur. Nomen à copioso semine illi Graeci indiderunt, quod in racemulis paruis circa totos ramulos nascitur.

GERANIVM. CAP. 131.

Geranium siue Gruina, Germanicè *Kranzschmabel* & *Storckenschmabel* uocatur, quoniam semina gruini rostris similia ferat. Habet haec herba aliquot differentias, quae à foliorum & florum diuersitate cognoscuntur.

*Vna species quae habet *Malua* folia, dicitur *Pes columbinus*, quod nomen etiam Amomo tribuitur. Alia, Acumata uel herba Roperti.

TOMENTVM, SIVE CENTUNCVLVS. CAP. 132.

τρυφάλοιον, Latini Centunculum & Albinū, Germani *Rhülfraut* appellant, molli-
lis est & lanuginosa herba, quā pauperes olim culcitrae farciebant. Vnde à Graecis &
Latinis nomen inuenit. *Cotonaria *Rhülfraut*.

TYPHA. CAP. 133.

Typha palustris siue lacustris est planta, quae à Germanis *Folben* / siue *Warten-
Folben* uocatur, florem in summo densum, copiosum & clauae similem habens.
*Wasser Folben.

CIRCAEA. CAP. 134.

Circaea quo nomine iam appelletur, omnino incognitum est.

OENANTHE. CAP. 135.

Oenanthen Theodorus Gaza uitis florem apud Theophrastū interpretatus est: Satis huic descriptioni respondet herba, quae Filipendula iam uocatur, quod glandibus similes radices à longis & tenuibus fibris ceu filis pendeant. Germani proprio uocabulo *Erdeycheln* / quasi terrestrem glandem, à radicum similitudine appellāt. Videndum tamen est, ne cum hac Chamædrin confundamus, quae nobis *Erdeychel-
id* est, terrestris Quercus uocatur.

*Filipendula proximè accedit qualitatibus ad Peoniam.

CONYZA. CAP. 136.

Confundit Plinius cum Origano & Cunila Conyzam, diuersas naturae plantas, quas hic Dioscorides & alii ueteres seorsim diuersis etiam capitibus descripserunt. Nihil enim commune inter se habent. Sunt autem plures Conyzae species, quae magnitudine, natali solo, & odoris grauitate dignosci possunt, Germani generali uocabulo omnes eius species *Muudeaugen* uocant.

*Aliqui *Sucrewurz*. Species sunt tres. Montana, campestris, palustris. Prima ab odore thuris, etiam Libanotis dicitur: & recentioribus, Incensaria. nam Itali Thus, Incensum uocant.

HEMEROCALLIS. CAP. 137.

Hemerocallis syluestre Liliū est, quod Germani *Goldtopfs* / siue *Goldewurz* appellant. Pharmacopolae uerò Asphodelum, sed falsò, ut antea dictum est, cum de Asphodelo sermonem haberemus.

*Wild lilgen. Species una Porphyranthis dicitur. Altera Germanis *Goldlilgen*: quae in montibus Sueuiae sponte nascitur: alibi seritur.

VIOLAE. CAP. 138.

λευκόιον, Romani Violam albam, Arabes Cheiri, Germani *Gelbe violen* uocant: Inueniuntur albo, luteo, caeruleo & purpureo colore. Ad medicinam tamen utilis-
sima sunt luteae.

*Fuchsius pro *Damiaefen blumen* esse *Leucoia* putat.

CRATAEGONVM. CAP. 139.

Non cognoscitur hoc nomine aliqua herba. Est etiam arbor apud ueteres eiusdem nominis.

no minis. Porro si quis ea probè intellexerit, quæ proximo capite de Phyllo dicturus sum, manifestum erit Ruellium errare, quod Thelygonon & Arrhenogonon Persicaria species esse scribit.

PHYLLVM, HERBA. CAP. 140.

Phyllon superuacua habet in hoc authore historiam. Nulla enim per se est herba, quæ propriè Phyllon appelletur. Neque Dioscorides eius historiam quasi suam posuit, sed ex Crateua Herbario, ut ipse faretur, descripsit. Non tamen inutile futurum existimo, si quid sit Phyllon indicauero. Theophrastus lib. 9. cap. 19. de historia plantarum, herbam ponit, quæ duas habet species. Vnam appellat Arrhenogonon, quod masculinum sexum concipi faciat: alteram *θηλυγονον*, quod foemininus sexus ea pota concipiat. Ex quibus constat, hanc Theophrasti herbam cum Dioscoridis Arrhenogono & Thelygono, (quas etiam Phyllon uocat) eandem esse. Descriptio enim, nomen, & attributæ uires conueniunt. Quoniam uerò antè dixi, Phyllon non habere proprium genus, & tamen est herba quæ Arrhenogonon uocetur, necesse eam sub alio nomine latere: quod manifestum fiet, si quis Mercurialis historiam & uires ab hoc authore descriptas, cum Theophrasti Arrhenogono & Thelygono cõferat. Sunt enim sine dubio Arrhenogonon & Thelygonon, Phyllon & Mercurialis, una eademque herba, quæ duas habet species, ut suo loco indicabimus. Propterea nemo existimet, folium, herbam, hoc loco descriptum, diuersum à Mercuriali esse. Deprehensum à nullo hactenus est hoc in Dioscoride uitium. Nemo tamen hanc ob causam minus fidei Dioscoridi habere debet. Non enim ipse proprium Phyllo genus à Mercuriali diuersum constituit, sed hæc ex herbario Crateua descripsit, ad quem etiam ea reiiicit.

TESTICVLVS. CAP. 141.

ozxæ, Latinis Testiculus, siue Canis testiculus, Germanis *Knabenkraut* / *Agwurcz* / *Stendhart* / *Stendelwurcz* / *Geylwurz* / & *Erdsgeyln* uocatur. Pharmacopola omnes eius species Satyriones nominant, cum tamen Satyrion diuersum ab Orchi genus habeat.

ALTER TESTICVLVS. CAP. 142.

Orchis Serapias priori similis est, maiora tamen folia, & minores testiculos habet; Germani isdem hanc quibus illam nominibus appellant. Porro plures hodie Testiculorum species, quam à ueteribus descriptæ sunt, cognoscimus.

SATYRIVM, HERBA. CAP. 143.

Qualis hæc prima Satyrii species sit, non facile quis dixerit.

* Hoc etiam aliqui *Knabenkraut* interpretantur.

ALTERVM SATYRIVM. CAP. 144.

Alterum siue *Erythron Satyrion*, Germani *Rot Knabenkraut* uocant.

ORMINVM SATIvvm. CAP. 145.

Ormini duo sunt genera, Satiuum unum & syluestre unum. Vtruncque hodie Centrum galli, & malè etiam Gallitricum uocant. Quidam etiam Scarleam, unde Germanicum nomen *Scarlei* deductum est.

* *Orminum syluestre*, Wilde *Scharley* / wilde *Salbei*.

HEDYSARVM, uel PELECINVS latine Securidaca. CAP. 146.

ONOSMA. CAP. 147.

Onosma ex Anchusarum genere est. Hodie uerò quo nomine appelletur, non constat.

NYMPHAEA. CAP. 148.

Nymphæa ea est herba, quam Arabes *Nenuphar*, Germani *Seckennefen* / *Seeblumen* / & *Reusenwurcz* uocant. Prior hæc species grandem & candidum florem habet, multis oblongis foliis constantem:

ALTERA NYMPHAEA. CAP. 149.

Alterâ Nymphæa priori omnino foliis & fructu similis est. Flore differt, quem luteum & roseum similem habet.

ANDROSA.

ANDROSACES. CAP. 150.

Androsaces parens meus suspicabatur Cuscutam esse, nihil tamen certi pronunciauit, quoniam descriptioni Androsaces non per omnia responderet Cuscuta.

*Verum Androsaces Matthioli pingit.

ASPLENV. CAP. 151.

Asplenion, siue Asplenon, eadem est cum Scolopendrio. Scolopendrium uerò, ut in Phyllitide dictum fuit, non est Lingua ceruina. Propterea errant omnes, qui adhuc Linguam ceruinam Scolopendrium uocant. Verum autem Scolopendrium Arabes, & quidam Pharmacopole Ceterach uocant, Germani *Wesselschm* / id est, Scolopendre similem Filicem. Est enim Scolopendrium siue Asplenum, herba ex Filicis genere, Polypodii, & Scolopendræ uermis modo utrinque incisa, habens folia ex una parte glabra & uiridia, ex altera flaua & aspera. Quidam Germani Scolopendriū etiā *flein Spicant* / uocant. Dictum itaque iam est quid sit uerum Scolopendrium, siue Asplenum, & quid etiam sit Lingua ceruina, quæ hæcenus falso Scolopendriū est nominata. Sufficere igitur hæc puto iis, qui præteriti & barbari seculi erroribus adhæserunt.

HEMIONITIS. CAP. 152.

Hemionitida Theodorus Mula in Theophrasto uertit, propterea quod in Theophrasto non Hemionitis, sed *ἡμίονος* legitur. Quo autem nomine iam appelletur, nondum constat. Ruellius tamen putat Linguam ceruinam, quæ hodie falso Scolopendria uocatur, Hemionitida esse, sed antea ostensum à patre meo & me fuit, Ceruinam linguam sine dubio esse Phyllitida, quæ seorsim ab Hemionitide describitur. Illud tamen fateor, me sæpe suspicatum esse, & adhuc suspicari, quod Hemionitis & Phyllitis una eademque sit herba. Descriptio enim & uires conueniunt. Quod si fuerit, nemo Ruellium accusare poterit, quod Hemionitida Linguam ceruinā esse dixerit. Porro Verg. Marcellus maxime errat, quod Asplenon & Hemionitida eandem esse herbam suspicatur: in quam suspicionem ideo incidit, quod Asplenon etiam secundū uulgatum errorem Ceruinam linguā esse crediderit. Plinium, Teucrium & Hemionion, diuersas naturæ plantas, confundere, sciant Plinianilectores.

*Hemionitum ueram Matthioli exhibet.

ANTHYLLIS. CAP. 153.

Duæ sunt Anthyllidis species. Vna lentis, altera Chamæpity similis: utraq; falso est gustu. Propterea ab Italis Salsolæ appellantur, & stercus passerū. Priorem nondum uidi, Altera uerò quæ Chamæpityi similis est (licet malè in quibusdam Dioscoridis exemplaribus Chamædryi, scriptum reperiatur) in Apricis Hercyniæ syluæ locis nascitur, & à Germanis *Salsterrant* appellatur, tam manifesto salis sapore, ut etiam ex utraq; uista & non uista, Sal excoqui possit, quem Salem Alkali uocant Arabes. Propterea neque Aristotelem, neque Plinium rectè sensisse constat, quod scribant omnes sapores præter falsum plantis inesse. Nec enim sola Anthyllis excipitur, cum aliæ etiā plures huiusmodi inueniantur.

ANTHEMIS. CAP. 154.

Ανθεμης, siue *χαμαίμηλον*, corrupto nomine Pharmacopolis Camomilla uocatur. Germanicè Camillen, Hermelen, & *Weydbleimen*. Prior species, quæ foris candidum, intus luteum habet florem, hodie in omnibus Pharmacopoliis ad usum Medicinæ seruat.

*Leucanthomus cognominata, cæteris melior. Tertia species, cuius folia in ambitu floris aurea sunt, nascitur in montibus. Est & alia species, Anthemum Theophrasti.

PARTHENIVM. CAP. 155.

Parthenium hoc à Pharmacopolis Matricaria uocatur, quod Arabum quoque interpretes minimè latuit: Galenus hanc herbam Amaracum uocat, ut in Sampsocho dictum est. Propterea magno errore in sexto libro Gal. de Simplicib. Amaracū Maioranā uertit Theodorici Gerhardus Gaudanus. Nam Maioranæ Galenus postea in 8. meminit, sub nomine Sampsychi, & diuersum ei ab Amaraco temperamentum tribuit. Quinetiam ab hoc authore Parthenium Amaracus dicitur.

*Colula foetida non est Parthenium.

BYPHTHAL.

EUPHTALMVM. CAP. 156.

Sunt aliqui qui Buphthalmum & Chrysanthemon eandem herbam esse credant; quibus non uehementer repugnabo. Illud tamen nouisse oportet, plures esse Buphthalmi species: Sunt enim quibusdam candidi simulq; lutei flores, quarū maiorem nos *Rödtle* / minorem uerò *Hundsrotle* & *Hundeblümen* appellamus, Pharmacopolæ Cotulam foetidam. Quædam etiam species omnino luteos flores habet, & his Chrysanthemon nomen Græci indiderunt, Germani uerò, idem significante uocabulo *Geldtblümen*.

*Cotula alia foetida est & dicitur: alia non foetida, quæ potius fuerit Buphthalmum.

PAEONIA, SIVE GLYCYSIDE. CAP. 157.

Insignis est herba Pæonia, & omnibus cognita: habet tamen duas species sexu distinctas. Fœminam nos habemus, cui radices numerosæ ac gracilibus lſthmis coherent. Masculam uerò in Germania haberi nondum comperi, cuius semen aliunde mihi missum terræ mandauit, sed nulla cura mulceri potuit ut exiret. † Quamuis enim † Nobis auctores scribant ex omnibus seminibus nasci plantas, & Pæonia utraq; insigne semen habeat, nullum tamen audiui, qui ex sato semine germen nasci uidisset, tametsi quidem è semine non plures periculum fecerint, atque ipse etiam sæpius. Oportere igitur adesse certum ferendi tempus & modum, quidam uolunt, & illud etiam curari, ne unquam semina, una planta prouenit: cum è corniculis eximuntur, digitis attrectentur. Quibus an assentiri debeam, nescio, sed tardè. Quoniam etsi quotannis semen sponte è corniculis in terram excidat, & seipsum seruat (ubi magnam Pæoniæ copiam holitores habent) minimè tamen enascitur: quod diligenter ipse animaduerti, & hortulanos huius rei causa interrogauit, qui simile se deprehendisse responderunt. Pæoniam Germani *Pæonen* / & *Freyjam* roseis uocant. Pharmacopolæ Latino siue Græco nomine utuntur.

LITHOSPERMVM. CAP. 158.

Lithospermon, Germani *Steinsamē* / *Aechhirsē* / & *Steinhirsē*. Pharmacopolæ Milium solis uocant, Nullam herbā usq; adeo admiratus est Plinius, atq; hanc,

PHALARIS. CAP. 159.

Phalaris Pharmacopolis incognita est herba, nec cuiquam adhuc constat, quo nomine iam appelletur. Mihi uerò ante paucos annos semē è Norimberga missum est, à Gallis Milium syluestre uocati: quod cum seuissem, Phalaris ipsa, quā Dioscorides hoc loco describit, erupit. Optime descriptioni respondent notæ omnes. Germanicū eius nomen ignoro, quoniā apud nos adhuc neq; satiuam, neq; sponte nascentē uidi.

*Quidam *Blüthwurzen* interpretantur.

RUBIA. CAP. 160.

Ερυθρόδαμον, Theophrastus *Ερυθρόδαμον* appellat, quicquid longe aliter quam hic auctor describit: quam bene autem, non uideo. Siquidem nos cum omnibus antiquis & recentioribus Medicis optime Rubiam cognoscimus, ea qua Dioscorides eam describit figura. Seritur hæc in multis Germaniæ locis ad uectigal. Pharmacopolæ Rubiam tinctorum uocant, Germani *Röten*. Ii autē uehementer errant, qui Anchusæ, id est, Buglossæ asperæ siue rubetis radices pro Rubia accipiunt, quales noui multos.

LONCHITIS. CAP. 161.

Lonchitis hæc mihi adhuc incognita est. Hodie in Pharmacopoliis habetur nusquam, Ruellius tamen nouisse uidetur. Cum uerò nesciam qualem ille herbā nigros Caperos Gallice uocet, eidem assentiri non possum.

ALTERA LONCHITIS. CAP. 162.

Altera Lonchitis sine dubio ea mihi uidetur esse, quæ Germanis *groß Spicant*, appellatur. Mediam figuram inter Scolopendrium & Polipodiū habet, Scabræ sunt foliorum incisuræ. Vnde eam asperam Lonchitida cognominauerunt.

ALTHAEA. CAP. 163.

Althæa, syluestris Maluæ genus est, in uliginosis & palustribus locis nascens.

Planta

Plantatur à quibusdam etiam in hortis. Pharmacopolæ eam eodem & Bisfimalæ nomine nouerunt. Latinis Hibiscum olim dicebatur. Germani *Eibisch*/ *Sammere bappel*/ *Stoekwurz* appellant.

ALCEA. CAP. 164.

Et hæc sylvestris Maluæ species est. Folia profundius Verbenæ modo incisaha-
bet, florem uerò & sem̃ Althææ. Germani eam *Nochleichten* & *Signarswurz*
uocant, aliqui *Feltriz*/ quia rumpat pannos oculorum. Nascitur plerumq; in pratis,
quæ fluuii tumescentes attingere possunt, & non procul ab horum ripis. Pharmaco-
polæ hanc herbam non habent.

CANNABIS SYLVESTRIS. CAP. 165.

Sylvestris Cannabis omnibus nota est. Nullū habet apud nos in Medicina usum;
* *Wilde Eybis*. est similis Althææ.

CANNABIS SATIVA. CAP. 166.

Satiua Cannabis à nullo nō cognoscitur. Rarus & huius est in Medicina usus. Ma-
le huius folia Malo similia Verg. Marcellus interpretatus est. In Græco enim textu
Μελις id est, Fraxino, legitur.

ANAGYRIS. CAP. 167.

Anagyris, quæ ob fœtorem suum in prouerborum censu habetur, hodie non te-
merè à quouis cognoscitur.

* *Eruetex* est, qui post annum primum è semine prouenit: habet enim hoc officæ duritiei.

CEPHAEA HERBA. simpliciter Portulaca agrestis ei uidetur. CAP. 168.

Κρωάκ quamuis ab hortis nomen habeat, tamen in arenosis littoribus, & minime
in hortis nascitur. Est autem eadem herba cum Portulaca, præterquam quod Cepæa
sponte in asperis littoribus nascatur, cum Portulaca in hortis seratur. Apparet igitur
permutasse inuicem nomina sua has herbas. Germani Cepæam *wilde Dore* ei uo-
cant.

ALISMA. CAP. 169.

Alisma siue Damasonium, hodie Herbarii corrupto uocabulo Almeam uocant,
Germani *wilde Wegerich*/ uel *Durtenpfeiff*. Hic author unum tantum Damaso-
ni genus ponit. Plinius uerò duo. Nos autem plures eius differentias nouimus. Nul-
lus est hodie in Pharmacopoliis Domasonii usus.

ONOBRYCHIS. CAP. 170.

Qualis Onobrychis sit herba, hodie omnino ignotum est.

* Italorum hanc Ruia caprariam esse putant.

HYPERICVM. CAP. 171.

Tres sunt reuera Hyperici species. Prima propriè & simpliciter Hypericum uoca-
tur. Altera priuatim suo nomine Ascyron & Ascyroides nominatur. Tertia etiam
peculiari nomine Androsæmon appellatur: quamuis etiam omnes tres species An-
drosæmi appellatione ueniant, propterea quod digitis confricatæ earum comæ & flo-
res, sanguineo colore succum remittant. Prima igitur species, quæ priuatim Hyperic-
um dicitur, nondum mihi cognita est. In nostris autem Pharmacopoliis loco eius A-
scyroy utimur, quod altera est, ut antea indicauimus, Hyperici species. Demonstrau-
imus etiam male ab aliquo Hyperici caput sylvestris Ruta capiti commixtum esse, &
quod Ruta sylvestris differat à Perforata. Ruellius in tertio de natura stirpium libro,
cap. 74. scribit, Dioscoridem in Hyperico mentione floris digitorum attritu cruen-
tati non meminisse. Concederem ego hoc (quoniam sunt quædam Dioscoridis exem-
plaria, quibus ea nota deest, quale etiam Verg. Marcellus habuit) nisi in probatis co-
dicibus, ubi de Hyperico agitur, manifestè hæc uerbalegerentur: *Ανθος ἔχει μέλιον,*
ὁ διαβιβὼν τοῖς διακίχλινσι αἵματόδοντον χυλὸν ἐκκρίνει, ὅθεν καὶ αὐτὸς ὀσάει μοι κλύει. Quæ sic
uerti possunt: Florem habet luteum, qui digitis attritus sanguinem succū excernit,
unde & Androsæmon, id est, Humanus sanguis appellatur.

* Aliqui

*Aliqui hodie Hypericum uocant, cui folia sunt minora, perforata: Ascyron, latioribus folijs: Androsæmum, non perforatis. Vide mox in Ascyro & Androsæmo.

ASCYRON. CAP. 172.

Ascyron, quod aliqui Ascyroides uocant, secunda est Hyperici species, quam Pharmacopole etiā simpliciter Hypericon & Perforatā, Germani Dorthaw & Gartner Johanneſtæur appellāt. Folia eius inter lucem & oculos nostros posita crebris punctis ceu Perforata uidentur. Vnde etiā Perforatæ nomen inuenit. Hanc herbam Antonius Musa in suo simplicium examine Rutam syluestrem esse contendit, cuius sententiam antea consutauimus.

*Lege proximè retro caput de Hyperico.

ANDROSAEMVM. CAP. 173.

Androsæmum, quod Διονυσίαδæ etiā uocāt Græci, in nullo usu hodie habetur. Herba est rubente caule, cuius cortex ita striatur, ut quadrangulum reddat caulem. Ramulos & alas Ascyro similes, folia tantū maiora & minores flores quā Ascyron habet. Nascitur circa profluentes riuulos, & à Germanis rot Dorthaw appellatur.

*Vide superius caput de Hyperico.

CORIS. CAP. 174.

Coris à graui & cimicibus simili odore nomen inuenit. Fruticulus do drantal is est, folijs Ericæ similibus, profert etiā baccas Iuniperi baccis similes, sed minores, quæ cum folijs attritæ medium inter Iuniperum, Pinum, & Cimices odorem remittunt. Estq; hic nimè ingratus. Germani Coris Erdtuer, quasi paruam & terrestrem Thedam appellant, quoniam odore etiā Thedam arborem imitatur. Dioscorides fructus siue baccas eius non descripsit, quas tamen urinam & menses trahere dixit.

CHAMAEPITYS. CAP. 175. 176.

Chamaepityn Græci uocant herbam, Pini odorem aliquem habentem, cuius tres ponunt species, quæ olim omnes à Latinis Aiuga & Ibiga dicebantur. Hodie uerò quid reuera Chamaepitys sit, non omnibus est notū: quamuis à parente meo, & quibusdam aliis scriptis sit proditum. Quidam Pharmacopolæ Chamepeucen, à Germanis Zetche yde appellatā, Chamaepityn uocant. Quidam eius loco primam Syderitis speciem, quam Germani Zetjstæur appellant, ostendunt. Et hæc herba etiā à Venetis nobis huc transmittitur, cum tamen ubiq; apud nos in montibus nascatur. Sunt etiā qui ueram Chamaedryn Chamaepityn uocent. Alii quoq; alias herbas eo nomine indicant, sed omnes illi errant. Nam uera Chamaepitys est herba illa, quæ à Pharmacopolis lux dicitur.

VALERII CORDI SIMESUSIJ, in Pedacij Dioscoridis ANTZARBEI QVARTVM DE MEDICINA materia Librum, Annotationes.

VETONICA. CAP. I.



VETONICA, PHARMACOPOLIS BETONICA, GERMANIS Berthonia: uocatur. Nota est omnibus herba. Sequitur in quibusdam exemplaribus aliud Betonica caput, uerum illud non est Dioscoridis, quod superstitiosa uerba indicāt, quibus totum caput constat. Neq; etiā in antiquis scriptoribus legitur. Negandum tamen minimè est, aliud quoq; Vetonice genus esse, quod Aegineta Pulegii similitudine describit. Cuius Galenus etiā lib. 4. de sanitate tuenda meminit, atq; eam Saxifagon uocari: de qua in proprio loco dicturi sumus;

BRITANNICA. CAP. 2.

Certum est copiose nasci in Germania Britannicam, cum olim vires eius Frisii etiam cognite fuerint, qui eam Romanis contra Stomachacem demonstrarunt: Quo uero nomine iam appelletur, non constat, nisi quis Bistortam, seu herbam paralysios esse dixerit: quorum neutrum adhuc neque affirmo, neque nego.

*Bistorta potius Limonium fuerit.

LYSIMACHIA. CAP. 3.

Lysimachiam Leoniceus Corneolam esse putat, qua tinctores uiridem colorem inficiunt. Huic subscribit Ruellius lib. 3. cap 78. Quamuis post aliam herbam Lysimachion esse putet, quam Galli Pellibossam uocant. Ego autem nullo modo illis assentiri possum, qui Corneolam Lysimachion esse putant. Quoniam Corneola est fruticosa herba, quae a Germanis Giltbehrant appellatur, in aeditis nec aquosis nascens, neque gustu magnopere astringens. Hanc Corneolam Georgius Agricola, Medicinæ doctor, secum ex Italia attulit, sibi a Leoniceo pro Lysimachia demonstratam, sed plures notae non conueniunt. Vera tamen Lysimachia in aquosis nascitur, & a Germanis Weiderich appellatur. Ruellius eodem quo antea de Lysimachia eum scribere loco dixi, putat Lytri uocabulum corruptum esse a Luteo. Nam ut Victruius est author, qui non possunt Chrysocolla propter raritatem uti, herba Lutea appellata, caeruleum inficiunt. Verum nequaquam ibi Victruius per Luteum Lysimachiam intelligit (quod Lytron etiam appellatur) sed sui generis herbam, quae Graecis Isatis, Germanis Weyde, Latinis Lutea, siue Glastrum appellatur.

SANGVINALIS MASCULA. CAP. 4.

Polygonon mas, Latinis Sanguinalis mascula, & Proserpinaca, Pharmacopolis Lingua passerina, Corrigiola, & Cetonmedia: Germanis Wegedrit & Denngraß uocatur.

SANGVINALIS, FOEMINA. CAP. 5.

Πολύγονον θήλυ, quae Romanis Sanguinalis foemina, Germanis Schaffenhew appellatur, masculo omnino dissimilis est. Habet enim idem cum Hippuri genus, specie tantum differt. Nascitur in stagnantibus & lacustribus pratis, caulibus geniculatis, in se factis, & foliis Hippuridis (id est, Ροβιζαγελ) similis, qui mirum in modum eius pabulo delectantur. Huic etiam similis alia est, sed asperior, quam Germani Schabtauß appellant, quod ea sculptores in poliendis ligneis operibus uti soleant,

*Polygonos haec nascitur tantum in aquosis locis: Hippuris etiam extra aquas.

POLYGONATVM. CAP. 6.

Polygonatum sine dubio est ea herba, quam Pharmacopolae Sigillū Salomonis, Germani Weiswurz & Gelendwurz appellant. Vtraque gens ab articulata radice illi nomen indidit. Vulgares Germanici herbarii hanc herbam cum Dictamno & Helleboro albo confundunt, detestabili, & digno ut confutetur errore.

CLEMATIS. CAP. 7.

Clematis haec Peruinca species est, quae astringendi vires habet. Est enim alia quae Peruinca, quae aluum ducit: de qua hoc loco non agitur. Germani hanc Clematida wilden Singrün uocant: aliqui Ingrün/Veruind.

ALTERA CLEMATIS. [Quidam codices, ut a Gonpylo editus, Clematidem alteram hoc loco non habent.]

Alteram hanc Clematida, ut Galenus refert, Dioscorides in fine quarti libri descripsit. Nunc uero in principio libri quarti utraque describitur, sed male. Priorem enim in principio huius libri astringentibus herbis, seu Britannica, Lysimachia, & utraque Sanguinali, propter uirium similitudinē, coniunxit. Hanc uero quoniam aluum semper eius duceret, in quarti libri fine, ubi de purgantibus agitur, descripsit. Est autem Clematis haec duplicis differentiae. Una enim grandis frutex est, proceras arborescens, & singulis annis incrementum sumens, quoniam caudex & uiticulae illi aliarum arborum modo durant. Altera uero per omnia huic similis est, breuior tamen (quamuis & haec interdum 15. pedum longitudine adolescat) & autumnō caules siue uiticulae

uiticulas amittit. Nascitur hæc in pratis circa arbuta, quò fluuiorum inundationes peruenire queunt. Illa uerò in mōtibz arbores & uinearum sepes ascendit. Vtræq; Germanis *Ächling* uocatur. Arborefcens tamen maioris, & herbacea minoris cognomen habet. Saxones etiam *wilde weintrauden* nominant, quòd farmētis uitem æmulentur.

POLEMONIA. CAP. 8.

Polemonia quo nomīne iam uocetur, nulli cognitum est. Ruellius tamen Polemoniam eam esse credit, quam Gallica rura Boscfaluiam uocant, quod nomen cum Germanis commune habent Galli. Nos enim sic eam herbam uocamus, quod Saluæ sī similitudinem aliquam habeat, & in dumosis locis nascatur, quæ nos *Bursche* appellamus. Vulgo apud nos *Burschsalbei* herba hæc uocatur. Sed Ruellius eam uī ad historiam torquet. Neq; folia enim, neq; radix conueniunt, quas ille cōuenire dicit, contra oculis perspectam experientiam & testimonium:

PETRÆVM SYMPHYTVM. CAP. 9.

Συμφορον πετραίων, Latini Petræam Consolidam uocant, Germani *Steingunsel*. Nascitur petrosis & in petris. In pharmacopoliis autem hoc tempore non habetur, præsertim in Germania: quamuis in petrosis locis nascatur, quales sunt *Asciburgi*, duobus à Brunfuico miliaribus.

ALTERVM SYMPHYTVM. CAP. 10.

Alterum Symphytum sine dubio est aspera illa in uliginosis locis nascens herba, quam Pharmacopolæ maiorem Consolidam, Germani uerò *Beynwelle* / *Schmerwurß* / *Schwaißwurß* / *Walwurß* & *Loewurß* uocant.

HOLOSTEVM. CAP. 11.

Holosteum mollissima dicitur esse herba, quapropter ex aduerso sic appellata est. Quo nomīne iam dicatur, ignotum est. Ruellius eam à Gallis Denticulum canis appellari scribit. Cū uerò idem author alibi gramin, alibi Coronopum dentem canis esse dicat, parum sibi ipsi constat. Propterea illius opinionī astipulari non possum.

STOEBE. CAP. 12.

Stœbe quo nomīne iam appelletur, nondum comperi. Sunt tamen aliqui qui eam Scabiosam esse credant. Cū uerò ab hoc authore nulla eius descriptio ponatur, nihil affirmo.

✧ *Alia uidetur Stœbe Dioscoridis & Galeni, neutra uidetur esse Scabiosa.*

CLYMENV. CAP. 13.

Qualis Clymenon herba sit, nondum scio, Ruellius eam cognouisse uidetur.

PERICLYMENV. CAP. 14.

Periclymenon omnium doctorum consensu frutex est arbuta scandens, quem Itali & Pharmacopolæ Matris syluam, Germani *Getßblat* / id est, Caprifolium appellant. Porro cauendum est ne diuersas res confundamus. Nam quidam Itali & nostrates etiam Pharmacopolæ, pedali altitudine herbam quandam foliis oblongis per intervalla quiuuis plerumq; in uno geniculo stellæ modo dispositis, similiter Matris syluam uocant. Ea Germanis *Waldmeister* dicitur, & est Aparinæ syluestris quædam species.

✧ *Dioscoridis Periclymenum idem uidetur cum Cyclamino eius altero, & cum Vite syluestri, una planta tribus locis descripta.*

TRIBVLVS. CAP. 15.

Tribuli duplex est genus. Terrestre unum, & aquaticum alterum. Terrestrē in Germania nasci nondum uidi. Aridum tamen à Georgio Agricola ex Italia allatum conspexi, habetq; eā figuram, quam Dioscorides illi tribuit. Vehementer errant qui Tribulos in Georg. Vergiliū uulgares Carduos, id est, *Disiclin* interpretantur. Nihil enim cōmune cum his habent. Aquaticus uerò Tribulus, quem aliqui non rectè *Marrinum* cognominant, sine controuersia est, quam nos *Wasserriuss* / *Stachelriuss* / & *Spitzriuss* appellamus, cuius miram in germinando proprietatē obseruauimus: Nascitur in limolis & stagnantibus fluuiis, ut apud nos est inferior *Mildæ* pars circa *Dieben*; *Elster* in *Misnia*, *Albis*, & alii quidam.

SARXIPHAGON, SIVE SAXIFRAGA.

Credunt nonnulli non esse hoc caput Dioscoridis, eo solo argumento persuasi, quod Latina uox, Saxifraga, in principio capitis loco Græci nominis legatur, quam Græci in Sarxiphagon corruerunt, ut sit in alterius linguæ uocabilis non intellectis. Nullius autem est id argumentum ualoris. Nam ipsi Græci Latina quædam uocabula in suam linguam receperunt, quales sunt *ἄξυνγία*, id est, Axungia, & hæc Saxifraga, & alia quædam. Porro hoc Sarxiphagon est quod Galenus Cestron etiam dici restatur, quodque Aegineta Pulegio simile esse dicit, sed minus. In Cestri, id est, Betonica capite, Dioscorides cum Epithymo comparat, Ego uero suspicor non legendum esse Epithymum, quoniam nulla est inter Pulegium & Epithymum similitudo. Præterea in quibusdam Græcis exemplaribus non habetur hoc uocabulum. Quare Thymum pro Epithymo legendum esse non sine ratione conficio, quoniam magna est affinitas inter paruum Pulegium & Thymum. Nascitur apud nos herba quædam in asperis locis, mediam figuram inter Serpyllum, Thymum & Pulegium habens, quæ apud nos Pharmacopolæ pro Polio utuntur, Germanicè *wilder Rûnel* / *wilder Poley*. Hæc an Saxifraga sit animaduertendum. Errat Ruellius, quod hanc Saxifragiam esse putat Saluiam uitam. Nam Saluia uita idem est cum Adianto & Capillo Veneris, de quo seorsim, ferè in fine huius libri agit Dioscorides. Porro mira est hodie in appellandis herbis inconstantia. Quicquid enim sanguinem sistit, Sanguinariam uocant: & quicquid calculosis medetur, Saxifragiam, nimis laie patente significatione & uocabulo.

LIMONIUM. CAP. 16.

Limonium nomen inuenit, quod in palustribus pratis nascatur: pediculos ex una radice emittit tres uel quatuor, de drantali longitudine & in singulis tria sunt Betæ similia folia, quo fit, ut decem aut pluribus foliis à Dioscoride describatur. Flores habet candidos, quorum nullam mentionem Dioscorides facit, Germani hanc herbam *Wienmango*. & *Biberlee* appellant. Nullus est eius in Pharmacopolis usus, Sunt & alia duo syluestris Betæ genera, quæ ab Italis & Pharmacopolis Pirole, à Ger-
manis *Waldemango* / id est, syluestres Betæ, & *Wintergrün* appellantur, quorum Dioscorides non meminit.

Gefnerus
hanc sententiam non
probat: &
Bisfortian
potius Limonium
facit.

LEPORINVS PES, HERBA. CAP. 17.

Ἀζώπες qualis sit, uel quo nomine iam uocetur, uulgo incognitum est, quamuis, ubique in agris nascatur, estque Trifolii species, quam Germani *Wasserflee* uocant, & *Dajen pfoeren*.

MEDIUM. CAP. 18.

Medion ut minus cognoscamus, diuersæ eius apud authores descriptiones faciunt. Plinius enim Iridi satiuæ folia eius comparat, Dioscorides uero Seridi. Sunt etiam Græca Dioscoridis exemplaria, in quibus Iridi, manifestè pro Seride, legitur. Quare uidendum est, & rationibus & coniecturis artificiosis scrutandū, utrum Iridi, uel Seridi, legendum sit.

* Seridi potius quam Iridi legendum conijcimus.

EPIMEDIUM. CAP. 19.

Epimedium suo nomine similiter ut Medion hodie incognitum est. Sed nunc aliud habet nomen, nempe Trinitas, à tribus foliorum partibus. Unde etiam Græcis Trias uocatur.

* Trinitas dicitur apud Chirurgos Italis: Germanicè *Edel leber Fraut*.

GLADIOLVS. CAP. 20.

Non temerè cognoscitur hodie uerus Gladiolus. Veteres omnes herbas, quæ Gladio similia haberent folia, Gladiolos cognominabant, quales sunt Acorus, Sparganium, Xyris, Iris, &c. Quos hodie nos quoque imitatur, sed maiori quam par erat licentia. Est enim sui generis herba, quæ Gladiolus Latinis, & Græcis *ἰρίδιον*, *φάσγανον*, & *μαχαιρόριον* appellatur. Eam apud Theophrastum Gaza interdum pugionem, interdum ensen, interdum etiam Gladiolum interpretatus est. Quinetiam Ciperi sui generis lanquæ, Gladiolus uertit, sed malè. Verus autem Gladiolus in pinguibus & humidis locis

bus locis nascitur, quæ fluuiorum inundationes obterege possunt. Caulem habet infirmum leuore, ut Theophrastus ait. Propterea Ruellius contra Theophrastum & ipsam experientiam, scabrum caulem illi tribuit. In summo caule ceu umbellam habet, purpureis & ab inuicem distantibus floribus plenam. Hoc enim sibi uult in Græco Dioscoridis textu *σχιόλος*. Germani hunc Gladiolum *Schwertel* appellant. Videndum tamen est, ne aliam herbam pro hac aliquis intelligat. Nam Germani quoque, ut Græci & Latini, Gladioli nomen ad Iridis & Acori species transferunt.

*Gladiolum sunt qui Victorialem rotundam, aut feminam hodie nominant, unde *Sigwurz/Victinfräse*. Longa quidem uel mascula cognominata Victorialis, non est huius generis, sed Allium alpinum. Gladiolus uagum est nomen, ad herbam hic descriptam, & Gladiolum aquaticum, & Cyperum.

SPARGANIVM. CAP. 22.

Sparganium semen suum in pilulis fert: Nascitur humentibus locis, & Germanis *Degenkraut* uocatur. Nullus est huius, quemadmodum & ueri Gladioli, in nostris regionibus usus.

XYRIS. CAP. 23.

Xyris sine dubio est illa Iridis species, quæ ab Italis Spatula foetida nominatur, ea habet quidem florem, sed qui post multos annos primum erumpat: unde aliqui sine flore esse crediderunt, iuxta uulgares hos uersus.

Iris purpureum florem gerit, ireos album:

Gladiolus luteum, sed Spatula foetida nullum. &c.

ANCHUSA. CAP. 24.

Anchusæ prima species, quæ Onoclea dicitur, non temere apud nos prouenit. Herba est ex syluestris Buglossæ genere, cuius radix usque ad interiorum medullam siue neruum rubenti turget succo. Affertur radix eius ex aliis regionibus ad maritimæ Germaniæ urbes, ubi eam Alkannam, Orcanettam Galli, improprie uocant Pharmacopolæ. Nam Arabes Ligustrum Alkannam appellant, ut in primo libro diximus.

*Anchusa alia maior est, alia minor: & tertia species minima, quæ *Schminckwurz* uulgo nominatur.

ALTERA ANCHUSA. CAP. 24. 25.

Nullus adhuc ex recentioribus scriptis certi aliquid de Anchusa prodidit, præter patrem meum, qui suo studio inuenit, Anchusam alteram hanc esse in sabulosis nascentem, rubente radice, Buglossam. Nihil enim est quod descriptioni repugnet. Germani eam wilde *Schsenzungen* uocant. Radicis superficies per messem sanguineo succo manat. Male hæc à quibusdam Cynoglossa dicitur.

*Alqui hanc Echion faciunt.

LYCOPSIS. CAP. 26.

Lycopsis à florum figura dicta est, qui (scilicet flores) hiante suo rictu, patulas luporum fauces imitantur. Alteræ Anchusæ similis est, & species eius, longiorem tantum & asperiores caulem habens, Germani similiter wilde *Schsenzungen* / uel *Schwarzpfl.* *Schsenzungen* appellant. Nascitur in sabulosis campis, nonnunquam etiam in muris & circa arces in montibus sitas. Male & hæc ab aliquibus Cynoglossa appellatur.

ECHIVM. CAP. 27.

Echion absque controuersia est illa syluestris Buglossa, quam hodie Pharmacopolæ simpliciter Buglossam uocant, Germani *Schsenzungen*. Leoniceus, uir alioqui doctissimus, & qui primus commissos in plantis errores corrigere conatus est, non satis certis & sufficientibus rationibus, hanc Buglossam Cirsion esse putat: quæ secutus etiam est Ruellius. Equidem diligentius illos hanc herbam considerasse optarem. Porro cum iam dixerim, nostram uulgo uocatam Buglossam, non esse ueram Buglossam, sed Echion, necesse est in eius locum ueram Buglossam substituere, ne in calumniatorum caulationes incidam. Hoc autem in suum locum differemus. Est & alterum Echion prædicto minus, nigrioribus in purpura floribus. Nascitur hoc in pinguibus aruis. Nicander quoque duas Echii species cognouisse uidetur.

OCIMASTRVM. CAP. 28.

Onopordis Ruellius laceam albam esse putat, ubique in agris nascentem herbam.

quàm uerè autem, nondum uideo: Quandoquidem notæ, quas tamen Ruellius conuenire dicit, descriptioni non respondeant. **Gesnerus cum Ruellio sentit.*

BRINVS. CAP. 29.

Erinos hæc herba appellata est, quod Caprifici modo lacteum liquorem remittat. Hodie autem incognita est: quamuis Ruellius eam cognouisse uideatur.
**Aliqui Rapunculum sylvæ Erinum esse putant: quam rectè ipsi uiderint, wilc Rapunzel.*

GRAMEN. CAP. 30.

Ayasis, siue Gramen, quod Germani *Gras* appellant, hoc loco non quod uis scænum significat, sed eam herbam, quæ ubique in cultis nascitur, geniculatis & dulcibus per terram serpens radicibus ceu uiticulis: scilicet arundini similibus, sed multo minoribus. Hanc Germani singulari etiam uocabulo, *Quecten*, *Quectgras*, & *Gras* à iumentis appellant, quæ ea herba delectantur. *Quect* enim Saxonica lingua utentibus populis iumenta significat. Quapropter hoc uocabulo Germani *ayasis* interpretantur. Nam sic etiam Gramen à Græcis dicitur.

CAP. 31.

Gramen arundinaceum, Germanicè *Abgras*, *Saurhaw*.

CAP. 32.

Parnasinum uerò Gramen nobis incognitum est, quoniam in Parnaso monte gignitur.

SIDERITIS. CAP. 33.

Prima Sideritis à Germanis *Seyßerant* appellatur. Omnes enim notæ conueniunt descriptioni. Hanc herbam quidam *Chamaepityn* appellant, sed falsò, ut in fine tertii libri demonstrauimus. Ruellius herbam Iudaicam, siue Tetrabit Sideritida primam esse putat: quam uerò ipse Iudaicam herbam intelligat, non scio. Nam illi qui auctores huius nominis sunt, sibi ipsi non constant, quam herbam Tetrabit, siue Iudaicam appellent.

CAP. 34.

35.

Alteram Sideritida & tertiam, quæ Heraclea uocatur, ignorare me ingenuè fateor, Ruellius tamen utranq; cognouisse sibi uidetur.

ACHILLEIA. CAP. 36.

Αχιλλεία qualis sit, hodie omnino ignorant. Ruellius tamen hoc *αχιλλείον* Millefolium esse dicit. Intelligit autem Millefolium uulgare siue terrestre: sed magno errore. Nam nostrum Millefolium est *Stratiotes* Millefolia, siue terrestris, apud ueteres auctores. Hic autem error in grauiorem illum errorem coniecit, ubi *Stratioten* terrestrem indicare conatur: de qua re suo loco dicemus. Reuera autem *Achilleia* est terrestri Millefolio cognata planta, quam Germani *Feldgarbe* uocant, alii *weisse Aetjarn*. Copiosissime nascitur in pinguibus & quiescentibus aruis.

RUBVS. CAP. 37.

Βύζ, sunt etiam qui *κυνόβατον* appellant: quamuis *κυνόβατον* in primo inter arbores describatur, sitq; diuersus ab hoc Rubo. Hæc igitur nominum permutatio in causa est, quod diuersas *κυνόβατον* descriptiones apud auctores legamus. Rubus tetrò, de quo hic agitur, triplicem differentiam habet. Quidam enim frutices & arbuta ascendit. Quidam etiam paruus omnino est, & in opacis montibus gignitur, raro cubitum excedente longitudine, fructum post Solstitium maturum ostendens, spinis horret caulibus eius, quem singularem plerumq; erigit. Tertius humi in aruis & alibi repit in terra, aculeatos ramos siue uiticulas spargens, hanc *χμαλέατον* Theophrastus uocat, & à Theodoro Gazanò in præ Humirubus interpretatur. Omnes hæc species à nobis *Brahmè* & *Krazen* appellantur. Fructus uerò eius, qui *Mora* Rubi sunt, *Brahmbeer* & *Krazenbeer* appellantur. Malè quidam *mora* bacci pro bati, id est, Rubi, pronunciant. **Chamebatus*, *Saubenbeer*.

RUBVS IDAEVS. CAP. 38.

Rubus hic in Ida, Troadis monte, non tantum gignitur, unde nomen illi Greci indiderunt: Nascitur apud nos etiam in montibus & syluis, sine adminiculis per se uirgis recta ascendentibus subsistens, tenuibus & exilibus spinis, quamuis frequentissimus etiam sine spinis, omnino glabris inueniatur uirgis. Folia à tergo candidiora habens, quàm

quàm supradictus. Fructus quoq; solstitio maturefcere incipit, qui rufus & leniter hirsutus est. Germani hunc Rubum priuatim *Himpeer*, *Hindbehr*, & *Mora eius Himpre* uocant, quæ gustu iucundiora quam prioris Rubi fructus percipiuntur. Ruellius sine dubio cognouit hunc Idem Rubum, atq; à Gallis *Frambolesiam* appellari. Idem Ruellius traga Idæi rubi speciem quandam esse putat, nec malè, si non Idæus rubus frutex, & fragaria exilis herbula esset, quæ tota foliis, floribus & fructibus constat: neq; enim [†] dignos caules, neq; ramos aliarum herbarum modo ha- [†] *Hoc nomen ne dignos.*

HELXINE. CAP. 39.

Dux sunt herbæ Helxine appellatæ. Vna Cissampelos Græcis, Latinis Conuolulus uocatur: altera uero Parietaria Latinis dicitur. Vergilius autem Marcellus malè Cissampeli Helxines caput è Dioscoride, quasi adulterinum reiecit, nihilominus tamen nomina eius in Helxines (quæ Parietaria est) capitè relinquens, ut sunt Cissampelon, Cissampelon, Melampelon, & Cissanthemon. Helxine igitur, quæ Cissampelos uocatur, à Germanis *Winden*, *Wede winden*, & *Wandwinden* appellatur, cuius flores hæcenus Ligustrum interpretati sunt apud Verg. magno errore, ut in primo libro indicauimus. Nascitur etiam in segetibus Helxine, gracilibus & oblongis foliis, flore prædicti floribus simili, sed secundum proportionem minore. Vtraque lacteum liquorem confrica remittit, hæc *Ko:rwinden* Germanis appellatur. Huic Helxine Elatine similis est, propterea Serapio statim post Conuolulum Elatinen (Dioscoridem citans) describit. Idem tamen Serapio Cissampelon Aëui, Elatinen uero Athin, corruptis ab Helxine & Elatine nominibus, appellat. Altera uero Helxine, quæ parietaria, Perditium & Muralium dicitur, in parietibus & muris sub stillicidiis nascitur, unde à Germanis *Tranfferaut* uocatur ab aliis *S. Peters Kraut*, *Tag vnd nacht*. Huic similis est Alfine, cuius caput in secundum librum ante Auriculam muris ab aliquo transpositum est. Nam hoc loco omnes quatuor illæ herbæ describi debent, scilicet Helxine duplex, id est, Cissampelos & Parietaria, istisq; similes Elatine & Alfine. Hunc enim ordinem ipse Dioscorides in describendis his herbis seruauit. In multis hodie pharmacopoliis Alfinè (id est, *Tag vnd nacht*) Parietariam uocant, sed magno errore. Nam Parietaria tantū in stillicidiis circa muros & parietes nascitur, Alfine uero in syluis, plurimum à parietibus distante natali, à quoutraq; nomē suum inuenit. Cum autē hoc loco de Alfine mihi sermo sit, nequam omittere possum, magno errore apud Plinium Helxines appellatione Carduū quendam describi. Verba Plinii ex lib. xxi. cap. xvi. hæc sunt: Helxine rara uisu est, neque in omnibus terris: est radice foliosa, ex qua media ueluti malum extuberat, coniectum sua fronde. Huius uertex summus lachrymā continet iueundi saporis, Acanthiden Mastichen appellatam. Hæc autē de uerbo ad uerbū ex Theophrasti libro vi. cap. iiii. de plantarū historia desumpsit Plinius. Theophrastus uero hoc loco non Helxine habet, sed *gifu*, quæ carduus pinea à Theodoro interpretatur. Pliniū secutus est Hermolaus Barbarus, qui eadem in Corollario huius cap. scribit. Hunc autē errorem facile in librariorum et scriptores reieceret aliquis Collinutus, nisi ipse Plin. lib. xxii. cap. xvii. (ubi Dioscoridis Helxinè, id est, Parietariæ, siue Perditium describit) scriberet, se, qualis uera esset Helxine, in priori libro dixisse, hoc est, ubi Helxinen pro Ixine apud Theophrastū legit, ut suprà demonstrauī. Graue hunc errorem nullus adhuc in Plinio animaduertit, quamuis toties emendatus, & reprehensus sit. Sed satis esset, si quis eos errores corrigeret, qui post uitam Plinii librariorū incuria irrepserunt. Nam omnes ipsius authoris errores corrigere, onus esset ualde impar unius uiri humeris.

ELATINE. CAP. 40.

Elatine, ut iam diximus, Helxine Cissampelo similis est, florē habet ualde exilem, & triquetrum semen. lacteum liquorem non remittit, qua sola nota à Cissampelo distingui potest. Nascitur in aruis & cultis locis, Germanis *Erdwinden* appellatur. Hodie nullus illius est in Medicina usus.

* Quædam hanc Orbanchen faciunt.

EUPATORIUM. CAP. 41.

Eupatorii nomine non omnes pharmacopolæ eandē herbam ostendunt. Vt autē

breuiter dicam; Nullus uerum Eupatorium cognouit, præter eos qui hodie Agrimoniam uocatam herbam Eupatorium uocant. Nam reuera Eupatorium est ea quæ nunc falsò appellatur Agrimonia: qui error Dioscoridis etiam ætate fuit. Propterea illius auctores à Dioscoride in hoc capite iure reprehenduntur. Sed tanta fuit hæc tenus barbaries, ut nullus eam reprehensionem animaduertit. Dudum de hac scripserunt Leoniceus, parens meus, & alii plures, quibus etiam ipse Ruellius subscribit. Germani *Udermenig* Eupatorium uocant, & *Lebertietten* / quia lappa habet.

QUINQUEFOLIUM. CAP. 42.

Quinquefolium Græci *πεντάφυλλον*, Germani *Fünffblat* / & *Fürssinger* erant appellant. Serpit per terram multis & longis uiticulis, ex geniculis singulis radices in terram demittentibus. Est etiam sine dubio Pentaphylli species, quæ Tormentilla appellatur: quod ex foliorum & florum figura, & totius herbæ sapore, temperamento & uiribus iudicare quibus potest. Quapropter illi minime sunt accusandi, qui Tormentillam *πεντάφυλλον* esse scripserunt. Hi autem qui omnino nos uero Pentaphyllo carere scriptis prodiderunt, nullo modo probandi sunt. Vbiq; enim in pharmacopoliis uerum habetur *πεντάφυλλον*.

* *Quinquefolium simpliciter dictum, humi serpit: eiusdem species minor, id est, Tormentilla uulgò dicta, rectè sagit.*

PHOENIX. CAP. 43.

Phoenix hæc herba à punice coloris semine dicta fuit. Est autem frumentacea & spicata planta, in aruis & recenter illitis luto maceris nascens, & Germanis *Wenig Korn* / siue *Wenig gersten* appellatur, aliis *Fürst* habet / frumentum tectorum.

IDAEA RADIX. CAP. 44.

Idæa radix qualis sit, hodie omnino ignoratur. Nomen inuenit ab Ida monte, in quo fortè copiose nascitur. Quapropter non credo ubiq; eam apud nos prouenire.

* *Sunt qui aliud faciant Idæam herbam apud Plinium: aliud radicem Idæam, quarum parum à Rhodia distare putant, & fortè Ben rubrum uulgò dictum esse. Folia autem rusci non huic, sed herbarum Idææ attribuenda: confunduntriusq; historiam.*

RHODIA RADIX. CAP. 45.

Ex Macedonia olim Rhodia radix in Græciam ferebatur, propterea radicem tantum descripsit Dioscorides: folia uerò, caules, & alias eius partes quales sint, nullus unquam scriptor prodidit. Radicis tamen tam certæ à Dioscoride afferuntur notæ, ut facillimè deprehendi possit, si modò aliquis in eam incidat. Ego cum præterito anno apud circumforaneum herbarium radicem quandam uiderem omnes notas habere, quas Dioscorides Rhodiæ tribuit, statim iudicaui eam Rhodiam siue Rhodiad radicem esse: simulq; nomen ab eo quærens, quod Rosaria erat, cum audirem ipsum quoq; nomen conuenire, nihil dubitabam. Emptam itaq; radicem terræ mandauim, quæ proxima æstate caules, folia, flores, & semina maiori Crassulæ similia protulit. Eandem radicem cum in Italia uidisset Georgius Agricola Medicus, harum rerum studiosissimus sectator, statim ipse quoq; iudicauerat eam Rhodiam esse, cuius partem apud illum uidimus, estq; omnino cum nostra hæc eadem. Idem Agricola Portulacæ siue Crassulæ folia Rhodiam radicem habere in Italia obseruauit, qualia etiam in nostra domum ab illo reuersi inuenimus. Cum igitur diuerforum hominum iudicia in eadem re conueniant, respondentibus etiam omnibus descriptioni notis, nihil est, quod aliquis dubitet, Rosariam esse Rhodiam radicem, quam Germani *Rosenwurz* appellant, ab odore rosarum dictam, non à Rhodo. Nascitur copiose in Alpibus circa Saltzburgum. Porro illud constanter dicere ausim, Galenum hanc radicem non cognouisse, quoniam eam calidam in secundo, siue in principio tertii esse scribit: Quod temperamentum ex uiribus, quas Dioscorides illi tribuit, collegit. Verum cum ipsæ quoq; Rosæ similiter ut Rhodia radix, capitis doloribus medeantur, nec tamen calidæ sint, falsa est hæc ratiocinatio. Galenus autem Rhodiam radicem tantum digerendo capitis dolores pellere credidit, cum tamen id partim propter reperiendi uim, partim etiam propter aliquam partium tenuitatem faciat. Constat enim ex

nim ex contrariis qualitatibus, humida ac calida, scilicet terrea & frigida, quemadmodum ipsæ etiam Rosæ, quod ii qui plantarum odoribus nares, & saporibus linguam exercuerunt, facile percipere possunt. Nam odore, sapore, & colore omnino rosas imitatur Rhodiæ radix.

EQUISETVM. CAP. 46.

Hippuris, Cauda equina, siue Equisetum, à Germanis *Rannentraut / Roszagel / Schaffther / & Taubenroeten* id est, Columbina colus, appellatur quoniam præludium quoddam ante germinationem colo in torulos tornatæ simile, ceu penso inuolutum, primo uere emittit. Longiora folia & teneriorem habet caulem, quam Polygonos fœmina, nec in aquis, ut illud, prouenit. Facile igitur ab inuicem discerni possunt.

EQUISETVM ALTERVM. CAP. 47.

Alterum Equisetum priori simile est, breuioribus tantum foliis. Quapropter non existimo hoc genere ab illa differre, quoniam primam etiam Hippurum multum mutari secundum diuersos natales obseruauimus.

* *Nascitur in syluis, Wilder Roszagel.*

COCCVS INFECTORIVS. CAP. 48.

Frutex est sui generis, foliis Aquifoliæ. Kermes Arabibus. Est & alius Coccus uermiculus dictus, Zerbis Polonis.

TRAGIVM. CAP. 49.

Si (ut Dioscorides scribit) sola Creta Tragium gignit, nulla nobis spes est, quod in nostris regionibus inueniatur.

* *Non eodem modo ab authoribus describitur.*

ALIVD TRAGIVM. CAP. 50.

Aliud Tragium quo iam nomine appelletur, uel an apud nos proueniat, nondum compertum est.

* *Non est propriè frutex.*

TRAGVS, HERBA. CAP. 51.

De Trago hac parens meus in Botanologico suo disseruit, qui primus eam in lucem rursus restituit, Germani *Dünerebeci* siue *Dünertrauben* uocant, quidam etiam *Ranzentreublin* / uel *Blatloß*. Sed hoc nomen latius patet. Itali Pegnolla iam dicunt, quod oblongi eius acini, quos pro foliis habet, Pineis nucleis similes sint. Nascitur maritimis littoribus, fluminibus imminentibus apricis petris, & in muris, aliquando etiam in tegulis. Antonius Musa errat longè, quod Italorum Pegnollam Aizoon minus dicat esse. sunt enim tam similes inuicem herbe, ut non facile à quouis discerni possunt, minus Aizoon & Tragus. Propterea utriusque differentias ponere non crit inutile. Dioscorides Aizoon minori *ἀνθρ χαλκρά* tribuit. Significat autè hoc *λοχαλκρὸν* non simpliciter uiridem, sed luteū & modicè ad uiridem inclinatum colorè; Theophrastus etiam per *χαλκρὸν* simpliciter luteū intelligit lib. vii. de hist. plantarum in fine capitis xiii. Vbi Anthemi, id est, Chamemeli florè foris candidum, intus uero *χαλκρὸν* esse scribit. Eo loco Gaza malè uiridem, interpretatus est. Nam omnes uideamus, Chamemeli florem in medio nō uiridem, sed luteū colorem habere. Et ipse Dioscorides mediū floris Anthemidis ad aureum colorem inclinare scribit, qui plurimè à uiridi differt. Quapropter cū Aizoon minus *ἀνθρ χαλκρά*, id est, luteos flores habeat, quos sepius me etiam nos in ea herba uidimus, nullo modo Pegnolla minus Aizoon esse poterit. Habet enim Pegnolla, id est, Tragus, nō luteos, sed candidissimos flores, quos in omnibus locis producit. Hinc est quod nullos flores in Trago describit Dioscorides. * *Huius herbe folia Dioscorides fructus nominat.*

IUNCVS. CAP. 52.

Ξαίνον Græcis in genere omne luncus dicitur. Germanis *Bingen / Ait & Sempten*. Habet autem multas species luncus. Est enim molli acumine quidam, qui ubique apud nos in aquosis nascitur, & priuatim à Græcis *χοῖνον λῆα*, id est, leuis siue lenis luncus appellatur. Qui uero maritimis nascitur locis, acuto & ad uulnus infesto est acumine, *ξυλάριον* uocatus; eo nos caremus. Grandis uero luncus in lacubus

bus & stagnis nascens, quæ Græcis ἐλάγιον, Germanis Rosbîngen siue Pserde-
bîngen/Latinis Mariscus nominatur. Est & quartus Iuncus Euripici nomine, quam
uis quædam exemplaria Dioscoridis Aethiopicum eum appellant. Sed ut meam opi-
nionem dicam, nullus est hoc nomine apud omnes alios authores Iuncus. Quapro-
pter necesse est huic loco subesse mendam, & neq; Aethiopicus, neq; Euripicus legen-
dum. Nam Galenus, qui Iuncorum species & uires ex Dioscoride collegit, nullam fa-
cit Euripici siue Aethiopici Iunci mentionem. Et quod hic de Euripico legitur, ille
de Holoschoeno scribit. Serapio etiam qui de uerbo ad uerbum Dioscoridis caput de
Iunco interpretatur, nullum Aethiopicum siue Euripicum Iuncum habet, sed simili-
ter ut Galenus de tertio Iunco, id est, Holoschoeno eadē scribit, quæ nūc in exemplari-
bus Dioscoridis Euripico siue Aethiopico tribuuntur. Quapropter audacter ex
Dioscoride hæ duæ dictiones reiiciendæ sunt, Aethiopicus siue Euripicus, & in lo-
cum ἐλάγιον substituenda.

LICHEN, HERBA. CAP. 52.

Lichenem Græci hanc herbam appellant, quod more lichenis, id est, impetigi-
nis in humidis & umbrosis petris serperet. Serapio eam Hazez Alfacher appellat, in-
terpres uero Epaticam reddidit. Vulgo enim Epatica herba uocatur, quam Lichen
ueteres dixerunt. Sed præter hanc innumeras alias habent Epaticas, qui uulgaribus
& à nullis authoribus traditis nominibus delectantur. Lichen autem (ut ad rem no-
stram redeamus) herba est in humidis & umbrosis petris, nonnunquam etiam in ge-
lidorum puteorum lapidibus serpens. quam quidam Epaticam, Germani Stett-
flechten & Wîßflechten / & Lâberfrant appellant, neq; caulem, neq; flores, neq;
semen habet, quamuis interdum breuissimos quosdam pediculos, parua ceu acetabu-
la ferentia protrudat. Sed hæc nequæ flores, neq; caules, neq; semina propriè dici pos-
sunt.

PARONYCHIA. CAP. 54.

Paronychia quo nomine iam appelletur, non quiuis dixerit:

CHRYSOCOME. CAP. 55.

Similiter etiam ignoramus, quid Chrysocome sit, cui nomen aurei coloris corym-
bi indiderunt. Saracenica tamen Mentha, quam recentiores Græci Costum herbam,
Germani uero Warten inünze appellant, sine dubio est Chrysocome cognata. Ha-
bet enim in summis caulibus aurei splendoris corymbos, & Veratro nigro similes ra-
dices. Estq; herba tota cum radicibus admodum odorata.

CHRYSOGONVM. CAP. 56.

Chrysogonon ab aurei coloris semine nomen suum inuenit. Quo uero nomine
hodie uocetur, & an apud nos proueniat, omnibus adhuc ignotum est.

HELIOCHRYSUM. CAP. 57.

Heliochryson apud Theophrastum Aureliam interpretatur Theodorus Gaza.
Est autem herba quæ in pharmacopoliis Sticksados citrinum, & Germanis Actin-
blüm/Steinblüm/Winterblüm/& Jungling uocatur. Malè in hoc capite aquo-
sis conuallibus interpretatus est Verg. Marcel. Nam in Græcis codicibus χαράδρῳ-
σι τόποις legitur: quibus uocabulis significantur torrentibus & imbribus abrupta
loca, quæ alias siccæ sunt, præterquam cum per ea imbrium torrentes delabuntur. Hu-
iusmodi enim locis in aspero fabulo Heliochrysum nascitur, & nunquam in aquosis
uallibus. Nam aspero, arenoso & sicco solo gaudet. Apud Gal. & Aeginetam
per Amaranthū Heliochryson est intelligendum. Nam huius etiam flores, quemad-
modū purpurei Amaranthi, nō marcescunt, ut nomen indicat. Si quis autem illorum
authorum capita de Amarantho Dioscoridis Heliochryso conferat, omnino eandem
herbam esse pronunciare cogetur. Purpurea uero Amaranthus, Plinii nimirū, qui uul-
gò flos amoris dicitur, nullam facit Medicinam, propterea ab hoc authore non de-
scripta est. Ruellius minime uerū Heliochryson indicat, qui lib. iij. cap. xxiii. Stecha-
dosci-

dos citrinā uerā Stichada esse dixit, magno & ipsum errore. Nam Stichas uera longē alia est herba, quam quæ Stichados citrinum uocatur.

CHRYSANthemVM. CAP. 58.

De Chrysanthemō seu Caltha in Bupthralmo disseruimus, ubi eam à Germanis Goldblumen appellari indicauimus.

* Videatur hoc caput cum Bupthralmo confusum.

AGERATVM. CAP. 59.

Ageraton quo nomine iam appelletur, & an in nostris etiam regionibus nascatur, nulli cognitum est.

VERBENACA RECTA. CAP. 60.

Verbenaca hæc recta dicitur, quod rectis surgat caulibus. Germani hanc Danenamp appellant. Nascitur aquosis locis:

VERBENACA SVPIA. CAP. 61.

Hæc autem Verbenaca resupinatos erigit caules, & ubiq; adhuc in pharmacopoliis Verbenā, & à Germanis Eisenkraut / siue Eysenhart (ab effectu, quia incuruos habet circa radicem ramulos) appellatur. Columbræ utraq; Verbenā delectantur, unde illi *πενσεπλον* nomen Græci indiderunt, qui eam *ισαγ βοράν* etiam, id est, Scaram herbam uocant. Sunt hodie aliqui qui luteis & paruis floribus herbam quandam Verbenacam fœminam uocant, sed eam Irionem esse secundo libro docuimus: nihil enim cum Verbenaca commune habet.

ASTRAGALVS. CAP. 62.

Astragalus herba à radicem, cum talis, similitudine appellata est, hodie autē quid sit, ignorant omnes. Ruellius tamē cognoscere uisus est libi, cui cum ratione est adhibenda fides. Nascitur ubiq; æditis fruticosisq; locis. Germanis Anollenkraut uocatur, quibusdam Christianwurcz.

HYACINTHVS. CAP. 63.

Quantum ex poetis & aliis Reirusticæ scriptoribus intelligere possumus, non uisus tantum herbæ nomen Hyacinthus fuit. Nam Irin quoq; Hyacinthum aliqui nominarunt, & poetæ Lilio similem Hyacinthum esse dicunt, colore tamen differre, quoniam Lilio insit argenteus candor, Hyacintho uero purpureus color. Porro Hyacinthus quem Medici intelligunt, parua herba describitur, multis & purpureis in comagibbosa constitutis floribus. Hunc licet hodie omnino ignoremus, spero tamen me, quid reuera sit, non ita post longum tempus nos assecuturos. Nascitur in Comitatus Mansfeldensi iuxta montem Petricopiole, & Germanis Dicinling uocatur.

* Heluetijs, ut quidam aiunt, nescio quibus, Bolrosen.

PAPAVER ERRATICVM. CAP. 64.

Μακρυ ριζος, Latinis Papaueralis, & Papauer erraticum, pharmacopolis Papauer rubeum, Germanis Wilder mah / feldtmahn / Kornrosen / Klapper rosen, & *Altzicken* dicitur. Notum omnibus erraticum Papauer est, nascitur in aruis & segetibus. Scien dum est in hoc cap. improvidē comparari huius Rheodis Papaueris folia Origani & Thymi foliis, Non posset dissimilior esse horū proportio. Habet enim Rheas Eruca siue Cichorii modo incisa folia, à qua similitudine longissimè recedunt Thymi & Origani folia. Abundant igitur & ab aliquo male adiecta sunt uocabula ista. Vehemēter errant, qui hoc Papauer cornutū Papauer et Memithen, id est, Glaucio esse putāt. Est enim quelibet illarū ab aliis diuersa, et proprii generis herba.

SATIVM PAPAVER. CAP. 65.

Μακρυ ριζος, id est, satium Papauer, quod Germani Mahn / siue Wagen uocant, duo prima diuisione genera habet. Thylacite ab oblongo et utriculis simile capite nominatur, habet hoc candidum semen, quod hodie Papauer album dicitur. Alterum uero nigrum semen in lato sessili & doliole simili capite, unde etiam à Græcis Pithite nominatum est, uulgo hoc nigrum Papauer à pharmacopolis nuncupatur: Ex nigro hoc Papauere lacteus liquor leniter incisis uasculis colligitur, quæ Opium in omnibus adhuc pharmacopoliis nominant. Exprimitur etiam ex tuis foliis & uasculis succus, & exiccatur. Eum priuatim Græci *μακρυς* uocant, sed uiribus multo est liquore imbecillior, propter inconcoctam & aqueam substantiam, eandem ob causam.

ob causam faciliè putrescit & teredines sentit. Quidam interpretes cum apud Græcos authores Opon, siue Opium legunt, succum Papaueris interpretantur: sed magno errore. Nam *μικάνιον* succus est Papaueris, Opos uero siue Opium, est liquor eiusdem.

PAPAVER CORNUTVM. CAP. 66.

Μικόν κεράτιον, Latinis Corniculare, siue Cornutum Papauer, Germanis *Doornich*: appellatur. Non habetur hoc in nostris pharmacopoliis. A quibusdam tamen in hortis seritur. Siliquam habet longam Fœnugræci siliquæ æqualem. In Dioscoridis exemplaribus malè legitur *καρπὸν δε μικρόν*, id est, fructum breuem, ut Vergilius Marcellus interpretatus est. Cum uero eundem fructum cornu modo inflexum, & Fœnugræci siliquæ similem esse dicat, nequaquam *μικρόν* sed *μακρόν* legendum est, quod ipsius fructus oculis subiecta forma manifestè indicat. Serapio quoque, ubi hoc Papauer de uerbo ad uerbum ex Dioscoride descripsit, dicit, illud habere semen minutum in subtilibus & longis uaginis. Errant qui cornutum Papauer esse putant in segete nascens Papauer, quod antea Rhœada nominauimus. Differt etiam ab hoc Papauere cornuto Memythe, id est Glaucium, ut prius aliquoties indicauimus.

PAPAVER SPVMEVM. CAP. 67.

Μίκον ἀφρώδης, quod quidam etiam Herculeum, siue Heraclion uocant, ignota omnibus nunc est herba, neque ipse Plinius eam cognouit. Nam libro xx. capite xix. de hoc Papauere sic scribit: Alterum è syluestribus genus Heraclion uocatur, ab aliis Aphron, foliis (si procul intuearis) speciem passicui repræsentantibus, radice in summa terræ cute, semine spumeo, ex hoc lina splendorem trahunt æstate. Hæc autem de uerbo ad uerbum ex Theophrasti de hist. plant. l. bro ix. cap. xiii. desumpsit Plinius. Sed nequaquam Theophrasti mentem intullexit. Nam hic Papaueris huius folia Struthi: siue Struthii herbæ foliis comparauit quæ lanaria radícula etiam appellatur, quod scilicet radice eius lanæ & linteæ candorem acquirant. De Struthio hoc in secundo libro disseruimus. Commisit itaque hoc loco Plinius duplicem errorem, utrunque satis magnum. Primus est, quod pro herba Struthio passerem animal interpretatus sit. Alter uero, quod dixerit, Papauere lina candorem trahere. Cum igitur Struthos passerem etiam lignificet, facilis esset prior error, nisi ipse Theophrastus aperte indicaret, senon passerem, sed herbam Struthi appellatione intelligere. Dicit enim Heraclion Papauer folio constare Struthi, quo splendore in linteis tribuant. Candorem autem linteis non passare sed herba lanaria, quæ Struthos siue Struthion Græcè dicitur, tribuunt. Potuisset etiam ex hoc colligere Plinius, Theophrastum herbam & non auem intelligere, cum sic de Papauere Herculeo scribat: Constat folio Struthi. Quibus uerbis aperte indicatur, Struthon folia habere. quod plantis & non animalibus proprium esse omnes nouerunt. Ne autem alicui incredibile uideretur, herbæ huius folia passeris speciem habere, Theophrasti uerbis hanc parenthesin adiecit Plinius: Si procul intuearis.

† Hoc fortè est Ben album syluestre.

HYPECOM. CAP. 68.

Υπῆκοον quo iam nomine appelleretur, nullus adhuc scriptis prodidit, neque aliquis ex doctis nouit. Propterea mihi quoque ueniam dari non est iniquum, quod ipsum non nouerim.

APOLLINARIS. CAP. 69.

Υοσύναιον, Latinis Altercum, Apollinaris, Symphoniaca, & Hyoscyamus, Germanis *Südenkraut* uocatur. Tres habet differentias. Est enim purpureo flore & nigro semine quædam. Altera florem luteum & semen subflauum habet: utraque apud nos non nascitur, & quoniam uenenatæ sint, nihil refert quod nos careamus. Tertia omnium est innocentissima, quæ flore constat albo, sed in medio purpureo, & semine candido. Nascitur hæc apud nos ubique in rudibus, fossis, & circa oppida pagosque.

PSYLLIVM, SIVE PVLICARIS. CAP. 70.

ψύλλον & Pulicaris dicta hæc herba est, quod semen eius colore & quantitate pulicibus simile sit. Notum hoc est eodem nomine omnibus pharmacopolis, Herba ipsa sponte apud nos etiam & copiosissimè nascitur, præsertim luterboci, & vicinis locis.

SOLANVM QVOD EDENDO EST. CAP. 71.

Στρυγνὸν κυπαῖος, Latinis Solanum & Cacubalum, pharmacopolis Solatrum, Germanis Nachtschatten uocatur. Multa sunt solani genera, quæ deinceps enarrabimus.

Hoc loco Dioscorides uulgare solanum intelligit, quod nos simpliciter Nachtschatten / & pharmacopolæ Solatrum appellant. Serebatur olim cibi gratia. Nos uero illud in cibo uitamus. Theodorus Gaza omnes Solani species Vesicarias apud Theophrastum interpretatur, sed malè. Nam Vesicaria speciale nomen est, & unitantum Solani speciei proprium, quæ fructus uescicis similes fert, unde & nomen inuenit.

VESICARIA. CAP. 72.

Αλικαβόθ, quod φουαλῖα etiam hic author & Aëtius uocat, Arabibus & pharmacopolis corrupto ab Halicacabo nomine Alkekengi dicitur, Germanis uero Firsßen / Blasenbeer / Blasenfrissen / & Schlitten. Nascitur circa uineas sponte, in quibusdam etiam locis in hortis feritur: fructum habet in rubenti & leniter turbinato folliculo ceu uescica, croceum, & Ceraso magnitudine æqualem.

SOMNIFICVM SOLANVM. CAP. 73.

Στρυγνὸν ὑπνωτικόν hodie ignoramus. Id tamen certum est, Amarum dulcem, id est, Tengelger ie lieber / huic ualde cognatam esse. Foliis enim, florum forma, fructu & uiribus (quas in me ipso expertus sum) Solanum refert,

SOLANVM FVRIOSVM. CAP. 74.

Στρυγνὸν μανικόν in Aegypto copiose nascitur, unde ad nos fructus eius afferuntur, quos pharmacopolæ Cuculos de Leuante, id est, Solanum orientale uocant. Nam Cuculus idem est quod Cacubalus siue Solanum, Leuante uero Itali orientem alevando uocant. Antequam autem ad nos perferantur hi Cuculi, omnino exsiccantur interiores nuclei, & succosa caro quæ corticem ambit. Semel satis recentes uidimus. Pisces quamprimum eos deglutierint, uertigine corripiuntur, & supini aquis innatant, ita ut facillimè manibus apprehendi possint.

* Sihi Coccali orientis uulgò dicti cum Solani huius historia conuenire non uidentur.

DORYCNIVM. CAP. 75.

Nullus ex ueteribus tum Græcis tum Latinis, hanc herbam descripsit, præter Dioscoridem, qui historiam eius ex Crateua desumpsit. Plinius & alii quidam crediderunt, Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod falsum esse Nicander, Dioscorides, & plures alii testantur. Reuera autem sui generis herba est Dorycnium, de quo meam opinionem paucis proferam: Seritur à Venetis monachis, & à paucis in Germania Medicis herba, quam Granacordis & Halicaccabum alterum uocant, ab Halicacabi fructus similitudine. Habet hæc herba omnes notas & uires, quas Nicander & Dioscorides Dorycnio tribuunt, † sola tamen folia non conueniunt, quæ Dioscorides olei foliis similia esse dixit. Sed hoc me nihil mouet: Desumpta ex Crateua est historia, potuitque corrupti locus iste, ubi de foliis agitur. Respondet candidi flores, folliculi, unde etiam Halicaccabus à ueteribus & nostris appellatur. Conueniunt etiam ad amissim in folliculis contenta, rotunda, dura, leuia & colore uaria semina. Conueniunt etiam eorum numerus, & comanducata lacteum habent colorem & saporē, quas notas Dorycnio Nicander tribuit. Quinetiam somnifica sunt eius semina, nec sine periculo uitæ intra corpus sumuntur. Quapropter cum omnes alię notę conueniant, uerissimile est in foliorum comparatione mendam esse, Sequimus hanc herbam, uidimus & gu

† Reprehēdit hanc opinionem Matthiolum.

stauimus. Propterea non ex aliorum relatione ista de Dorycnio scripsimus: Grana eius comesta suauiores somnum quam Opium afferunt: Sed cauendus est magnus illorum numerus.

MANDRAGORAS. CAP. 76.

Non sine causa turbabitur, qui Theophrasti & Dioscoridis de Mandragora uerba considerabit. Dioscorides enim Mandragoræ primi fructus sorbi magnitudine, & luteo colore esse dixit, quamuis Marcellus malè uitellis ouorum interpretatus sit, ratus *ovis* legi oportere, quæ uox oua, non ouorum uitellis significat. Probat codices *ovæ*, id est, forbis, habent, ubi Serapio Mespilum interpretatus est, sed malè. Hoc autem peccatum potius interpreti, quam Serapioni adscripserim. Alterius uerò mala, siue fructus, duplo maiora, & croceo colore depinxit, utriusque etiam caulem negat. Sed Theophrastus Mandragoræ caulem esse manifestè indicat, de histo. plant. lib. vi. cap. ii. Vbi fructus eiusdem niger & acino uuæ similis describitur. Sed malè *παρυδάλης* racemosus reddidit Gaza. Nam *παρὰ γὰρ ὅς*, uuæ acinum significat, unde deriuatur *παρυδάλης*, quo uocabulo acino uuæ simile quiddam Græci intelligunt. Ruellius non racemum, sed ouum legi oportere apud Theophrastum censet, sed magno errore. Non enim corruptus est iste apud Theophrastum locus. Cum uerò contraria omnino sit Mandragoræ historia apud Theophrastum & Dioscoridem, facile temerarius quisdam alterutrum autorem mentitū esse pronunciet: quod ne aliquis faciat, moneo & suadeo. Nam uterque satis exquisitè & optimè Mandragoræ historiam excutit, (quod fortasse Paradoxon alcuni uidebitur.) Sed illud nunc demonstrare incipiam: Dioscorides tres Mandragoræ species enumerat, Theophrastus autem unam tantum. Dioscorides autem marem & foeminam Mandragoram, id est, priores duas species, quas solas uiderat, descripsit ea forma, qua adhuc in Italia cognoscuntur. Quin & ego fructus & semina uidi, plantati & enata folia historię conuenire animaduerti. Hos duos Mandragoras Theophrastus non cognouit, neque aliquam eorum mentionem facit. Tertiam uerò Mandragoræ speciem, quæ Morion priuatim dicitur, Dioscorides non uidit, ut ex uerbis illius aperte colligimus, & hæc est quam Theophrastus describit Mandragoras: grandem habet radicem, caulem procerum, folia Solani & Mandragoræ prioris foliorum mediam habent figuram, flores profert nigros, & post hos nigros fructus grandi uuæ acino æquales (id est, wie ein große Weinbeere) qui uinofum succum gustatus emittit. Vidimus eam plantam in Helliæ umbrosis & antiquis syluis iuxta speluncas nasci, Helliæ Dollfrant dicitur, quo nomine Græcorum Morion interpretantur, Alii etiam Schlaffbeer eam uocant, quoniam soporem fructus eius faciunt. Porro nullum tam stupidum esse existimo, qui credat in humanam formam sculptas illas radices, quas Agyrtæ ostentant, Mandragoram esse. Fingunt enim radicem aliqui ex radice bryoniæ & althææ, alii aliter. Veri Mandragoræ radicis cortex in pharmacopoliis suo genuino nomine habetur.

ACONITVM PARDALIANCHES. CAP. 77.

Pardalianches Aconitum, quo pantheras uenatores necant, hodie nulli cognoscitur. Si tamen huius historię conferamus herbam, quam nos ab uno fructu, quem solum fert, *Einbeer* uocamus, uiresque consideremus, manifestè uidebimus eam hoc Aconitum esse, quod Theophrastus alibi Telyphonon, alibi *μυόφρανον*, alibi etiam Scorpionem uocat, quoniam radicem habet graminis modo geniculatam, & scorpionis caudæ similem.

* Fallitur Cordus: est enim *Einbeer* Solanum sylvaticum quoddam, frigide facultatis, non septicæ.

ALTERVM ACONITVM, ID EST, LYCOCTONON, SIVE
Cynoctonon. CAP. 78.

Aconitum quod Lycotconon & Cynotconon dicitur, quoniam lupos & canes interimat, tres habet differentias: quarum una, quæ est efficacissima, à pharmacopoliis habetur, & ab his radix Aconiti dicitur. Germani uerò Græcum nomē Lycotconon interpretantur, Nam *Wouffwurtz* à nobis appellatur, quod uenatores Lupos & Vulpes eius radice necent.

* Id quod purpureos flores habet, dicitur *Münchschappen*.

CICUTA. CAP. 79.

Κίκυον Latini Cicutam, Germani Wüterich & Wütscherling uocāt. Non cognoscitur ab omnibus Cicutā. Nam aliam herbam minimè uenenatam hoc nomine habent pharmacopole, cuius semen longum & gracile existit, ideoq̃ creditur apud nos non esse uenenata Cicutā. In causa est, quod ueram Cicutam non nouerunt, quæ in nostris etiam terris præsens est uenenum : quod manifestissimis exemplis probari potest. Non enim rarò contingit pueros radice & semine eius, quod Aniso æquale est, uesci & intermori. Habet Cicutā fœdissimum odorem, quo solo statim abominabile eius uirus percipitur. Sunt autem plures eius species.

* De temperamento eius controuersia est, sicut de Coriandro. Species Cicutæ etiam in arborum nascitur, semine aniso simili, Gleysen.

TAXUS, ARBOR. CAP. 80.

Taxus arbor, quæ à Græcis Σμίλαξ appellatur, uenenum est. Ideoq̃ oportet, ut diligenter animaduertamus, quam rem intelligant scriptores, cum Smilacem apud eos legimus. Nam præter hanc arborem duæ sunt adhuc plantæ, quæ Smilaces appellantur. Vna lenis siue satiata dicitur Smilax, id est, Dolichus. Altera aspera est Smilax, siue Hedera Cylissa. Est autem Taxus arbor sine dubio ea, quam nos citta & eben uocamus, è cuius ligno adhuc arcus & scorpiones fiunt, quos optimos ex Taxo fieri aures thores tradunt. Hi autem maximè errant, qui Eben Ebenum esse credunt, sola nominis similitudine decepti. Noluit in primo libro inter arbores describere Taxum Dioscorides, ne cognata facultate præditæ res distraherentur. Cum igitur Taxus uenenum sit, non immeritò hoc loco inter uenenatas plantas recensetur.

ΑΠΟCΥΝΥΜ. CAP. 81.

Apocynon qualis sit herba, hodie omnino ignoramus. Cognominatur hæc etiam Cynocrambe, quoniam canes interimat. Porro alia est etiam quæ proprio nomine Cynocrambe uocatur, ut suo loco ostendemus. Quapropter uidendum est, ne diuersæ naturæ res confundamus.

* Apocynum uerum pingit Matthioli.

ΝΕΡΙΥΜ. CAP. 82.

Nerion quod aliqui Rhododaphnen & Rhododendron, à rosæ simili flore uocant, arbor est quibusdam temporibus uenenata, è cuius & Aconiti floribus in Ponto uenenatum mel apes colligunt. Arbuscula hæc in nostris regionibus non nascitur, in Italia à quibusdam in hortis ostentationis causa plantatur, & nos ipsius semina seuiimus: fructum habet longum, intus ceu carduorum pappis refertum, qui in quibusdam Dioscoridis exemplaribus malè Hyacinthi pappis similes esse leguntur. Cum autem Hyacinthus nullos omnino pappos habeat, legendum est Acanthi, id est, Spine siue Cardui alicuius, ut probati codices & ipsa experientia testantur. Monendi etiam Medicinæ studiosi sunt, apud Aëtium in compositione Esdræ malè seorsim legi Flores Nerii & Rosarū Rhododaphnes, Nam eadem arbor Nerion et Rhododaphne est. Rosæ itaq̃ Rhododaphnes nihil aliud sunt, quàm flores Nerii. Videtur itaq̃ flos Nerii interpretatio esse Rosarum Rhododaphnes ad marginem signata, quæ postea ab aliquo indocto in ipsum uerborum contextum posita est. Porro ipse Galenus & Dioscorides diuersas Nerio uires adscribunt. Ille enim Nerion homini quoq̃ uenenum esse dicit: Hic uerò homini contra uenena remedium facere. Possent autem hi aures thores conciliari hoc modo, si intra corpus sumatur Nerion uenenum esse, Si uero foris imponatur, contra uenenatorum morsum Medicinam facere. Sed sic ferè ueritas habet. Nam probata exemplaria addunt σὺν οἴνω πινόμενα, id est, cum uino pota, uide licet flores & folia. Sic etiam in Plinio manifestè legitur, qui proculdubio hoc ex Dioscoride transcripsit. Quin etiam in Esdræ Antidotum, cuius præcipuus usus est contra uenenata animalia, Nerii flores recipiuntur, ceu medicamentum contra uenena efficax. Id tamen uerum est, florem eius insaniam facere, sed non semper. Accidit enim hoc quibusdam locis, & quibusdam temporibus:

FRVGL. CAP. 83.

Fungorum multiplex est differentia. Quidam enim edendo sunt, quidam uero intra corpus sumpti strangulant. Germani omnes generali uocabulo Schwämme uocant. Qui autem edendo sunt, suis etiam distinguuntur generibus. Sunt enim quidam Piperis sapore, & lacteo liquore manant, hos Germani Pfifferlinge uocant. Sunt & Boleti, quos Böleie eadem nostra gens appellat, uenenati Fungi. Multa habent genera, sed omnia Poggenstia id est, Bufonum cathedræ siue fellæ Saxonibus dicuntur. Sub Betulis arboribus in candido & rufo colore uarii nascuntur Fungi, quos Fitegen; Schwämme/id est, Muscarios fungos uocamus, quoniam muscas lacte intriti occidunt. Pharmacopolæ etiam in suis Officiis Fungos habent, quos Boletos & Fungos ceruinos uocant. Ferunt eos in syluis ex semine ceruorum nasci, & propterea Venerem stimulare: sed falsum hoc est. Inueni enim hos Ceruinos fungos in præruptissimis montium syluis, quod ne Dama & Rupicapre quidem peruenire possent, nedum cerui. Nec uerisimile est eos Venerem stimulare, cum frigidum, pituitosum, crudum, & malignum succum in humano corpore gignant. Quæ enim Venerem accendere debent, contrarias facultates & qualitates habere necesse est.

* Fungorum edulium optimi sunt Pfifferlinge & Reißfen dicti.

COLCHICVM. CAP. 84.

Colchicon copiose in Colchide nascitur, unde etiam nomen inuenit. Estque in illis regionibus uenenata herba. Quod uero apud nos prouenit, amarius est, quo sapore ueneni aliqua pars diluitur, nec tamen omnino innoxium redditur. Homines enim quos eo purgauerimus, seussima incurrunt accidentia. Pharmacopolæ hanc herbam Hermodactylum, Germani Herbsiblinnen / Wiesenpfeffer / & Feitiosen appellant. Quidam huius florem Narcissum esse crediderunt, sed reuera Narcissus plurimum ab hac herba differt. Colchi cum aliqui etiam Ephemerum appellarunt, quod eadem die qua sumatur, hominem occidat.

* Huius radix tot habet annos, quot cortices Theophrastus Narcissum uocat, ut quidam putant, mihi non uidetur.

EPhEMERVm. CAP. 85.

Ephemerum hoc solo nomine Colchico simile est: uiribus enim & forma multum ab illo differt. Alio nomine etiam Iris agrestis uocatur. Hodie autem ignotum est.

* Non est Liliū conuallium, ut quidam rentur.

HElXINE. CAP. 86. Vide supra, Cap. 39.

AlSINE. CAP. 87. Vide supra, Cap. 39.

PA LVSTRIS LENS. CAP. 88.

Λενς ὁ ἐν τῷ τελευτῶν, id est, Lens in lacustribus locis genita. Differt hæc a lentele gumine. Nam aquis stagnantibus innatat ceu muscus, minimis & compressis foliis constat. Figuram Lentis semina repræsentant. Vnde & nomen inuenit. Germanis eadem significatione Wasserlinsen uocatur.

SEDVM MAIVS. CAP. 89.

Αἰζον τοῦ μεγάλου Latini Semperuiuam, siue Vitalem maiorem, pharmacopolæ Barbara Louis, Germani groß Danßwurts / groß Donnertraut / groß Zimmergrün / & Danßkraut appellant. Plinius Gramen & Aizoon diuersas naturas confudit, lib. xxiij. cap. ult. errore manifesto. Plinium secuti sunt Hermolaus Barbarus & Ruellius, qui ferè de uerbo ad uerbum illius errorem exscripserunt. Miror autem uehementer, hos doctissimos alioquin uiros, istum insignem Plinii errorem non obseruasse.

AIZOON MINVS. CAP. 90.

Semperuiua minor non est Italica uocata Pegnolla, ut antea in Trago demonstrauimus: Habet

Habet autem alterum Aizoon duas species. Prior Germanicè *Elein* *Haufswurz* / *Elein* *Donnerkraut* / *Daubenweiz* / & *Elein* *Immergrün* uocatur. Oblonga, pinguis, & acuminata habet folia, caulem gracilem, altitudine dodrantalem, in summo luteos flores, paululum ad uiridem colorem inclinat, ferentem. Flores huic tribuit Vergilius Marcellus interpres colore pallidos: in Greco uero *χλωρά* legitur, quæ uox etiam luteum colorem significat, ut antea quoque dictum est. Serapio uero eiusque interpretes citrinum interpretati sunt, & hoc optimè quidem. Recentiores minus Aizoon Vermicularem uocant, estque frigida herba, ut maius Aizoon, pro qua non striatam similem herbulam, sed contrario temperamento, accipiunt.

Altera minoris Aizoi species incertâ habet apud hunc authorem historiam. Corruptus enim uerborum contextus est, quod quilibet in hoc studio exercitatus facile me uidere potest. Plinius uero optimè eam describit, & uidentur omnia eius uerba, quæ facit de tribus Aizoi generibus, ex hoc authore desumpta esse. Eius authoris uerba ex libro xxv. cap. xlii. hæc sunt: Quod minus est in muris parietibusque nascitur, & tegulis, fruticosum à radice & sursum usque ad cacumen, foliis angustis, mucronatis, succosis, palmo alto caule, radix inutilis. His uerbis egregiè describit primam minoris Aizoi speciem, cui deinde alterum minus Aizoon comparat, dicens: † Huic similis est quam Græci *Andrachnen* agriam uocant, Itali *Illecebram*, pusillis, latoribus foliis, breviorè cacumine. Quibus uerbis euidenter indicat eam herbulam, quam Germani *Scutapfeffer* / *Scutapfeffer* / & *Scutapfeffer* appellant. Hæc sola ex omnibus Aizoi generibus calidum habet temperamentum. Propterea eam magno errore pro Vermiculari accipiunt. Distinximus itaque ab Aizoi speciebus Tragû, & omnes tres Aizoi differentias indicauimus, & scio me in hac re non errare.

ACETABVLVM. CAP. 92.

Primam *κοτυλιδόρα*, quam *Cimbation*, *Scitation*, *Acetabulum* & *Vmbilicum* *Veneris* uocant, in nostris regionibus nondum nasci uidimus. Quidam tamen hoc nomine herbam quãdam rotundo folio, cui in medio est pediculus, indicant, quam ego probè noui. Nascitur in humentibus & putridis arenosis locis: sed plurimum ab Acetabuli descriptione differt, radicem enim habet tenuissimam, Acetabulum uero oliue similem, & grandem. Quapropter qui herbis ignotis ex hoc authore nomina indere uolunt, ut omnes descriptionum notas considerent necesse est.

* Recentiores aliqui *Scatuncellum* uocant, Itali *Rondelam*.

ALTERVM ACETABVLVM. CAP. 93.

Alterum Acetabulum sine dubio mihi esse uidetur pinguis illa herba, quam recentiores *Crassulam* maiorem. Germani *Fettehenne* & *Donnerbonen* appellant. Crassa & carnosa habet folia, ut Aizoon maius, quæ hyeme unâ cum caule exarescunt.

* Genus *Crassulam* hanc ueteri Greco uocabulo *Anacamptero*tem uocat.

VRTICA. CAP. 94.

Ακαλήφῃ, siue *Κρί-Αῖ*, Germanis *Uessell* appellatur. Nota omnibus herba est. Plures eius inueniuntur species, quam ueteres descripserunt. Semen eius in pharmacopoliis seruatur.

* Fœmina passim uulgaris est, exili semine: mat, *Vrtica* Romana uocatur.

GALIOPSIS. CAP. 95.

Aflorum figura nomen hæc herba inuenit, qui hiantibus mustelæ faucibus similes sunt. Nota omnibus est, Germani eam *Bienfang* & *Tootnesselen* siue *Tait benesselen* appellant. Videndum tamen est ne quis eam cum *Ballote*, id est, *Marrubio* nigro, simili herba, confundat. Quod ne fiat, foliorum creber intuitus faciet. *Galiopsis* enim longiora & acuminata *Vrticæ* modo folia habet. *Ballote* uero rotundiora. Inueniuntur etiam *Galiopsis* species aliæ, candido, luteo & uario flore. Nam *Dioscorides* unam tantum speciem descripsit, quæ purpurascens habet flores.

* Plinius aliquando *Mesoleucum* & *Dialeucum* nominat. Non est *Scrophularia*.

GALION. CAP. 96.

Galion hoc à coagulando lacte nomē inuenit, Duplicis est differentiae. Vna enim candidum, altera luteum florem habet: utriq; Aparines sunt folia. Flores quamuis parui sunt, multitudine tamen herbam ex longinquo conspicuam reddunt. Germani Kaynritzen & Labtraut[†] appellant. Recentiores quidam Aspergulam, Sed latē patet hoc nomen, neq; in aliquo probato authore legitur.

[†] Nam Lab, coagulum uocant.

SENECIO. CAP. 97.

Εριγέρων & Senecio hæc herba dicitur, quod flores eius cito in ipsa iuuentute cālescant. Magnus hodie in hac herba error committitur, ne dicam maximus. Senecion enim refrigerandi uim habet. Hodie uero Senecionem alii Carduum benedictum, alii Nasturtium aquaticum uocant, herbas in tertio gradu calidas. Verum autē Erigeron siue Senecion, ubiq; cultis & incultis circa oppida, & in muris nascitur. Itali eam Petrellam, Germani Baldgreiße & Creüßtraut appellant. Sunt & huius plures species.

THALICTRVM. CAP. 98.

Thalictrum non est Argentina siue Argentilla, ut Ruellius opinatur, neq; hoc ille certò affirmat. Verum autem Thalictrum est ea herba, quam Germani Deyleblat appellant, qua rustici in Saxonia maxima curant uulnera, sine aliquo adiutore Medico. Nascitur in campestribus & in pratis, non ita humentibus. Sunt autem tres ipsius species, quæ suis differentis distingui possunt.

* Aliqui Widenrithon appellant: sed hoc uocabulum latē patet.

MVSCVS MARINVS. CAP. 99.

Βούρθαλασιον, Muscus marinus, Plinio Lactucæ similibus constat foliis, n̄ spurgosis & contractis, sine caule ab ima radice exeuntibus. Sed malè ista de Marino musco scribit. Intelligit enim eam herbam, quam antea Lichena esse ostendi. Muscus uero marinus multis capillamentis tenuior est, quam ut Lactucæ foliis constare possit. Mihi sine dubio Marinus muscus esse uidetur Muscus ille falsus, quem pharmacopoeia hodie Corallum herbam, siue Corallinam appellant. Idem etiam Antonius Musa iudicat. Affertur ex maritimis locis, una cum adhærentibus marinis testis. Est alia etiam herba nomine Carolina siue Carlina, cuius in Chamæleone mentionem fecimus.

MARINVS PHYCVS, SIVE ALGA. CAP. 100.

Nobis in mediterraneis locis habitantibus, omnino incognita est marina Alga.

POTAMOGETON. CAP. 101.

Potamogeton abellè nouisse se credit Vergilius Marcellus. Interim tamen ait, nomen inuenisse à uicinitate fluminum, prope quæ nascatur. Quæ uerba indicant, eum nullo modo herbam hanc cognouisse. Nam Potamogeton in ipsis aquis nascitur, & tantum folia paulum extra aquas eminentia ostendit. Quæ uero reuera sit Potamogeton, nondum constat. Noui ego herbam Betæ folio, sed longiore, quæ spicatum florem extra aquam erigit. Ipsa uero longis uiticulis in aqua spargitur, & gustu uehementè astringit. Nascitur stagnantibus & limosis fluuiorum partibus, & in aqua repletis urbium fossis. Est & alia huic omnino similis, sed rotundiore folio. Quamuis autem omnes huius herbæ notæ Potamogetoni conueniant, nullam certam tamen sententiam de ea ferre ausim.

* Aliqui Wasser mangolt uocant: quod nomen etiam Limonio Cordi attribunt.

AQVATICVS STRATIOTES. CAP. 102.

Si in Aegypto & Nili inundatione tantum hic Stratiotes nascitur, ut Plinius scribit, eum in nostris regionibus quærere superuacuum esset labor. Cum uero Dioscorides illum indefinitè aquis innatare & sine radice uiuere scribat, soli Plinio non credo. Quis enim omnium regionum fluuios & paludes uidit, ut certò affirmare ausit, nullam

quam

quàm nisi in Ægypto nasci huius. Stratiotes: Hodie uerò quid sit ignoramus. Nomen inuenit, quòd milites uulneratis hoc curarent. Sed malè cū illis ageretur, si ex Ægypti Nilo eum toties petere deberet, quoties uulnerarentur. Propterea eam in nostris quoque fluuiis inueniri non despero. Innat enim stagnantium undarum superficie ubique herba quædam pinguibus foliis, nec ullam e terra habet assurgentem radicem, fibras tamen in aquam spargit, ut lentæ aquaticæ, per quas nutritur. Germanicè hæc uocatur aut uocari potest *Wasser Wassei* Iunjen. Folium tamen Aizoi foliis simile non est, sed Afari. Propterea sepe suspicatus sum an ne Afari pro Aizoi legendum sit. Non parum certa est Aizoi foliorum comparatio, cum duæ potiores species Aizoi sint diuersæ figuræ folia habentes, nec adiecta sit distinctio, cuius nam Aizoi foliis Stratiotis huius folia similia essent. Habet autem hæc herba, quæ apud nos prouenit, refrigerandi & altringendi uim, ut ipse Stratiotes.

MILLEFOLIA STRATIOTES. CAP. 103.

Χυλόφυλλον ὀσφρατιώτης, id est, Millefolius Stratiotes sine dubio est illa herba, quæ hodie ubique Millefolium uocatur, à Germanis *Garben* & *Kelchen*. Hanc herbam Ruellius antea Achilleam esse credidit, sed magno errore. Propterea nunc etiam non minus in indicando Stratiote terrestris siue Millefolium errat. Nam ferulaceam quandam herbam, & Dauci speciem Millefolium Stratiotes esse dicit, quæ Daucus asininus, Anethum, syluestre, & Cuminum syluaticum à quibusdam appellatur. Quamuis autem Stratiotes hic Millefolius umbellæ similes corymbos habeat, minimè tamen ex ferulacearum siue umbelliferarum genere est. Porro hæc herba, quam Ruellius Stratiotes Millefolium esse falsò dicit, à Theophrasto Pastinaca Patrensis uocatur, nigrâ habet radicem, sapore & odore Pastinacæ.

*Est & alia Stratiote terrestris species, non descripta Dioscoridi, quam uulgo uocant *wild Wurmfraut*.

VERBASCUM. CAP. 104.

Φλόμος, id est, Verbasum multas habet species, quas Germani omnes generali uocabulo *Röntege Fetzgen* / *Feidefetzgen* & *Wullenkraut* appellant. Pharmacopoeia uerò corrupto nomine Tapsium barbatum, Barbasium siue Barbatum dicunt. Est etiam ferulacea planta Tapsia, ut suo loco audiemus, sed à Verbasco diuersa.

Porro Coronarium Verbasum Græcis *Lychnitis* & *ὀφραλμὶς* nominatur: quoniam ramulis illius & conuolutis foliis pro funiculis siue conuolutis lintcolis in lucernis quidam utuntur. Seritur hoc in hortis, foliis constat oblongis & hirsutis, floribus purpureis rosæ simplici similibus: quamuis etiam cædido colore inueniantur, hos Germani *Campelosen* / *Marien rosen* / *Sammet rosen* / & *Damasten rosen* appellant,

*Herbam paralytin uulgo dictam *Schlüsselblumen* / aliqui Verbasculum uocant, nescio quam rectè.

AETHIOPIS. CAP. 105.

Aethiopis quæ sit herba, nulli hodie ex doctis cognitum est, quoniam in peregrino & alio quam nostro orbe nascitur.

*Aethiopidis picturam apud Matthiolum reperies. Aliqui Symphyto maiori cognatam putant esse herbam.

ARCTION. CAP. 106.

Arction quo nomine iam appelletur, non constat, quamuis Ruellius hoc cognouisse uideatur.

ARCION. CAP. 107.

Ἀρχιον, siue *προσωπίς*, Latinis Personatia & Lappa grandis, Pharmacopolis *Baradana*; Germanis *Buzentletten* / *Roßletten* / *Buzebletter* & *rossle letten* uocatur. Confundunt quidam Arction cum Arcio, ut Brunfelsius & Ruellius, magno tamen errore. Sunt enim diuersæ herbæ, sed facile hoc Librarium & Chalcographorum incuria accidere potest. Brunfelsius uehementer errat, quòd Ungulam caballinam Arcion siue Personatiam esse dixerit.

PETASITES. CAP. 108.

Πετασίτης à petaso, id est, galero nomen habet. Grande enim illi est folium, quod caput humanum à solis aestu, uice galeri defendere potest impositum. Mediam habet hæc

herba inter Personatiam & Bechion figuram, folia tamen huic rotundiora quam Personatiae sunt. Primo uere spicam longam purpurascensibus floribus plenam protulit, qui lappularum aliquam habent similitudinem, sed reuera lappae non sunt. Germani Petaliten Deubien uocant, alii Camtrafft: uel Pestilentzwurz, quod rardix bubones pestilentiales maturet. Nascitur uliginosis & pinguibus locis.

EPIACTIS. CAP. 109.

Epipactis quae sit herba, hodie omnino ignoratur, nec facile erit eam inuenire, quoniam nullus ex ueteribus, ut in re nota sit, totam eius historiam posuit.

CAPNOS, ID EST FUMARIA. CAP. 110.

Κάπνος, Latinis Fumaria & Fumus terrae, Germanis Erdtrauch / Nunnene. Exant & Daubentropff dicitur. Sunt etiam qui Wilderauten appellant, sed male. Capnos haec, quam Dioscorides describit, ubique in Pharmacopolis Fumi terrae appellatione habetur. Nascitur in agris. Est & alia Capni species, cuius Plinius & Aetius meminerunt. Vocatur haec Capnos siue Capnium phragmites, quod in dumosis sepibus nascatur, & Capnos Chelidonia, quod Hirundinum aduentu erumpat. Capniculo eius, ubi terra erumpit, gallinaceorum calcaribus simile quiddam adiacet, a quo etiam Romanis pedes gallinaei dicta fuit haec herba, ut apud Plinium legitur. Haec Capni species proculdubio est ea herba, quam Germani Wolwurz & Nannenspon appellat, quam ubique per Germaniam Aristolochiam rotunda uocant, cuius species duae sunt, maior & minor, sed magno errore, ut in tertio libro diximus. Habent enim huius herbae folia Rutae & Fumi terrae foliorum mediam similitudinem. Aristolochiae uero omnes hederaceo constant folio.

SATIVA LOTVS. CAP. 111.

Graeci Loti appellatione eas herbas indicant, quas ipsi alio nomine τριφύλλα, & Latini Trifolium uocant, Germani Klee. Has omnes Arabes Andacochae appellatione comprehendunt. Loti species omnes sponte nascuntur, sola satiuia excepta, quae in hortis feritur. Propterea quamuis haec nullam habeat apud authores descriptionem, cum sola in hortis feratur, ex omnibus aliis Loti generibus, facile erit eam cognoscere. Est itaque haec sine dubio Trifolium illud satiuum, quod Germani GartenKlee, alii etiam ab odore, Nardes / id est, Nardum uocant. Spirat enim iucundum odorem siccata. Flores habet in capitulis ferè coeruleos, quibus in iisdem capitulis semina succrescunt. Foenugraeci seminibus similia, sed multò minora, in leniter aculeatis utriculis inclusa. Quoties igitur apud Arabes simpliciter Andacocham scriptum inuenerimus, haec herba accipienda est. Nam hodie ex Trifolii uulgaris genere sine odore herbulam hirsutam, nullas uires praeter astringendi habentem, & ubique in agris nascentem, Andacocham uocant, sed magno errore.

*Lotus satiuus Gallis & Italis Foenugraecula dicitur: Germanis Nardz / GartenKlee / Heluetijs Zigerkraut.

SYLVESTRIS LOTVS. CAP. 112.

Syluestris Lotus hoc nomine nulli hodie cognita est, propterea nihil adhuc certi de ea pronunciare ausim.

*Aliqui Melilotum uulgarem esse putant. SecinKlee.

CYTISVS. CAP. 113.

Satius cultu differt à sylvestri: qui frutex in Germania sponte prouenit, GessKlee / VergKlee.

LOTVS AEGYPTIA. CAP. 114.

MILLEFOLIUM. CAP. 115.

Μυριόφυλλον, quod Latini Millefolium uocant, plurimum differt ab ubique uocato Millefolio, quod antea Stratioten Millefolium esse indicauimus. Nam Stratiotes asperis & siccis locis nascitur, hoc uero Millefolium palustribus. Porro Germani hanc herbam Wasserfenchel / & Wasserriemen appellant, quoniam folia eius Foeniculo similia sunt, & tota herba nuper natam abietem figura imitatur.

MYRRHIS. CAP. 116.

Myrrhis umbellifera est herba, Cicuta ualde similis. Nascitur iuxta arbuta, & Germanis *Bur, bündern* uocatur. Sunt etiam qui *Kelberternen* appellant. Sed hoc nomine eam indicare non satis tutum est. Nam & Cicuta palustris etiā Germanis *Kelber* uocatur. Et non raro accidit, pueros nominum uicinitate deceptos, hanc pro illa cibi gratia tempore famis eruere, & comesta mori. Cuius rei aliquot exempla uidi.

MYAGRVM. CAP. 117.

Myagros hoc nomine ignota hodie est. Ruellius tamen eam cognouisse uidetur, sed sihi plū non constat. Nam lib. 3. cap. 25. semen eius Fœnugræco comparat, & bene. In quibusdā tamen Dioscoridis exemplaribus non *τῆλεδῆ*, id est, Fœnugræco, sed *τραχήλω*, id est, ceruici, magno errore comparat. Quam enim figuram Fœnugræci semen cum collo siue ceruice habet: Ruellius uerò in lib. 2 cap. 30. ubi quid sit *Μύαχρον* indicat, & deinceps notas eius descriptioni confert etiā, dicit semen eius in colli speciem exporrigi. Quo loco manifestè uidemus, quomodo cogat etiā falsam notā descriptioni respondere.

OENAGRA. CAP. 118.

οἶναχρον, siue *οἶνόδονα*, uel *ὀνάχρα*, ut quædam exemplaria habent, hodie ignota est planta.

CIRSIVM. CAP. 119.

Cirsion, quod aliqui transpositis literis Crission uocant, nequaquam est uulgo uocata Buglossa, ut Leoniceus & Ruellius scribunt, salua tamen doctissimorum uiro-
rum autoritate. Certum enim est uerum Buglossen esse Boraginem. Cirsion uerò quoniam Buglossa siue Boragine grandius est, grande etiam Buglossum appellabatur. Vulgaris autē Buglossa, siue Hircina barba uel lingua, Boragine multo minor existit. Ergo nequaquam Cirsion esse potest. Antea etiā uulgarē Buglossam Echion esse indicauimus. Sed uerum Cirsium grandis est herba, latis & multo longioribus quā Borago foliis, proceriore etiā caule. Seritur à quibusdam apud nos in hortis, siue Italicum uel Romanum Buglossum uocatur.

ASTER ATTICVS. CAP. 120.

Astera Atticum Arabum interpretes, & Pandectarum author Mattheus Syluaticus, cum Eryngio confundunt, sed fœdo errore. Sunt enim diuersissimi generis herbe. Ruellius quoque Astera Atticum non rectè indicat, quamuis non siam, sed aliorum de hac herba opinionem ponit. Ego autem scio me uerum Astera Atticū in montibus circa Ienam inuenisse. Non enim melius historiæ conuenire posset, tam exquisitè respondent descriptioni omnes eius herbe partes. Nascitur in petrosis montibus, ut quædam etiam Dioscoridis exemplaria indicant. In quibusdam etiam exemplariis de floribus eius leguntur, *αἰθρὸς πορφύρεον ἢ μῆλινον*, id est, florem purpureum aut luteum, sed falsò. Non enim in quibusdam locis purpureos, & in quibusdam luteos habet. Sed utrunque colorem simul iidem flores ostendunt. Quapropter *πορφύρεον ἢ μῆλινον*, id est, purpureum & luteum legendum est. Hoc enim alia exemplaria & ipsa floris figura testantur. Media namque floris pars luteum habet colorē, circa quam parua & purpurea foliola, ut in Chamæmeli floribus uidemus, disposita sunt, quo fit ut purpureo & luteo simul colore Asteris flos describatur. * *Sternkraut*.

ISOPYRVN, HERBA. CAP. 121.

Quæ sit Isopyron herba, hodie nulli non incognitum est, nec aliquis adhuc ex recentioribus eam inuenit.

* Sunt qui Nigellam Damascenam esse coniecerint.

VIOLA NIGRA. CAP. 122.

ἰορῶχρον, Romani Violam purpureā uocant, Germani *Violen* siue *Veiteln*. Nota omnibus hæc herba est, quæ primo Vere ubique in hortis & uepribus emicat, coliculo gracili, & ualde odorato flore. Herba eius in Pharmacopoliis Violaria uocatur.

CACALIA.

CACALIA. CAP. 123.

Cacalia non est agreste Carui, ut quidam apud Ruellium opinantur. Hodie enim omnino incognita est.

*Sunt qui Liliū conuallium aut cognatam herbam esse suspicentur.

BVNIVM. CAP. 124.

Bunio nulli hodie hoc nomine notū est. In secundo libro sermo de Buniade etiā habebatur, quæ plurimum ab hoc Bunio differt.

PSEVDVBVNIVM. CAP. 125.

Pseudobunium in Creta nasci Dioscorides scriptum reliquit. Quapropter nescio an apud nos etiam nascatur. Hodie uerò quid sit, omnes ignorant.

HEDERA TERRESTRIS. CAP. 126.

Terrestris Hedera, quam Græci χαμαίκισσος uocant, non est herba illa, quæ Germanis Gündelrebe dicitur: de qua re parens meus in Botanologico suo disseruit.

*Smirgel herba aliquo modo huic descriptioni conuenit, sed nulla est in floribus amaritudo.

CHAMAEPEUCE. CAP. 127.

Quædam exemplaria pro χαμαίπικνη, χαμαίπικνη habent, sed malè. Nam Chamæleuce diuersa est ab hac herba, & eadem cum Bechio, id est, Tussilagini. Correctiores uerò codices & Plinius Chamæpeuce habent, id est, pumila picea. Est enim paruus frutex Chamæpeuce, foliis uirentibus, & piceæ similibus, odore admodum graui, & Germanis Seertannen / Gichtannen / & Zeythcyde appellatur. Quidam hunc fruticem etiam Chamæpityn uocant, sed malè: ut suo loco indicauimus.

BVGLOSSVM. CAP. 128.

Verum Buglossum, quod ueteres medici intelligunt, sine dubio est omnibus nota Borrage. Nam Apuleius dicit Corraginē à Lucanis appellari Buglosson, B, litera in C, mutata. Folia Buglossi ueteres dixerunt animi uoluptates & letitiam facere, si uino iniiciantur. Idem nos Boraginis floribus tribuimus.

*Mesius facit duplicem Borraginem, unam syluestrem quæ est nostra Buglossa: & alteram satiuam, quæ est Borrageo.

CYNOGLOSSA. CAP. 129.

In hisce regionibus malè asperam Anchusam illam quam Lycosin esse diximus, Cynoglosson uocant. Veram autem Cynoglossam omnes aliæ Germaniæ gentes Fündszunge / id est, Caninam linguam uocant: quam etiam Pharmacopolia habent. Dioscorides ei caulem negat: & nos etiam sine caule eam nasci ubiq; uidemus, quibusdam tamen temporibus eadem caulem, purpureos flores, & post hoc minutas lappas producit, quas Plinius etiam illi tribuit. Ergo imprudenter Ruellius scribit, non esse Cynoglosson quod in Officinis habeatur, quoniam caules & lappas ferat. Multis enim nunc annis obseruauimus Cynoglossam interdū primo anno nimirum, fortè & secundo sine caule nasci, ut Dioscorides eam depingit, reuera tamen caulem fert. Duplex inuenitur Cynoglossa, maior & minor. Hæc Dioscoridinon fuit cognita, & foliis, caulibus, floribus & lappulis maiori similis est, sed minora hæc omnia habet. Quinetiam natales & odoris uires cum illa communia habet.

PHYTEUMA. CAP. 130.

Phyteuma hodie omnino incognita est herba, neq; opus ea magnopere habemus, si amatoris tantum ueneficiis est utilis:

LEONTOPODIVM. CAP. 131.

Leontopodion similiter ut Phyteuma incognita nobis est, nec alias habet in medicina uires, quàm quod amatoris ueneficiis utilis sit. Quædam tamen exemplaria eā corpori foris impositam abscessus discutere addunt.

HIPPOGLOTTON. CAP. 132.

Quædam exemplaria Hippoglosson habent, sed malè. Nam nomen suum ab Hippoglottide

poglosside inuenit. Habet enim, ut Plinius etiam ait, parua foliola linguularū forma ex foliis exeuntia. Propterea Vergilius Marcellus malè Hippoglosson legi censet, qui nequaquam etiam uerum Hippoglosson in suo Commentario indicat. Nescio enim quam spicatam lanuginem introducere conatur, cū tamen nullus unquam author alicuius lanuginis uel spicæ in hac herba mentionem faciat. Mihi profectò hoc Hippoglosson, siue Hippoglossidion, siue Hippoglosson eadē esse uidetur cum Lauro Alexandrina. Vtrūque enim Hippoglossum ab hoc autore & aliis omnibus uocatur, utrumque Rusci folio describitur. In Lauro Alexandrina tamen paruorum foliorum ex foliis nascentium non meminit; contra etiam in huius Hippoglossi historia, foliis a dñati fructus mentionem non facit. Sed hoc meam opinionem magis confirmat. Quod enim utriusque descriptioni deest, id etiam ex utriusque descriptione faciri potest. Quo fiet, ut unam tantum herbam Hippoglosson & Alexandrinam Laurum esse cognoscamus. Nam habemus in Pharmacopoliis herbā Vuulariæ nomine, cuius foliis alia minora nascuntur folia, quæ omnia Rusci modo aculeata sunt, sed molliora. In mediis uerò foliis iuxta parua foliola rubentem fert fructum, Ciceris magnitudine. Hæc itaque Vuularia Hippoglossi & Alexandrine Lauri descriptioni optime conuenit. Ruellius hoc loco laudandus est, quod Hippoglosson Bonifaciam, siue Paganam linguam ab Italis uocari scribit. Est enim Bonifacia eadē herba quæ Pharmacopolis Vuularia, & Germanis *Sepfflintrant* / *Sungenblat* / & *Herblat* appellatur. Nec memouet, quod Galenus & Aegineta diuersis locis de Hippoglossi & Alexandrina Lauro agāt. Aegineta enim ex Galeno, Galenus ex Dioscoride eam uires transcripsit. At certò scio, Galenum Hippoglossi nomine ab Alexandrina Lauro diuersam herbā nō cognouisse. Potuit itaque hæc una herba ab alio Hippoglossum, ab alio uerò autore daphne Alexandrina appellari. Nam Theophrastus Alexandrinæ lauri tantum meminit, proculdubio sub hac etiā Hippoglosson intelligens, cuius alibi nusquam mentionem facit. Vnde Dioscorides etiam, & qui Dioscoridē secuti sunt scriptores, occasione nati sunt credendi Hippoglossum ab Alexandrina Lauro differre. Talis quoque error ipsi Dioscoridi in Phyllo & Mercuriali accidit. Similes etiā innumeros in Plinio inuenias. Alexandrina Laurus etiā Idæa dicitur, quod si alicuius ignorauerit, & nomē illud solum apud authorem aliquē inuenerit, statim opinabitur, eam sui generis esse herbā, sed falsò. Constat etiā certissimis uulgi experimentis, Vuulariæ radicem etiam siccam bubones in peste maturare. Hinc est quod malaciticā uim Hippoglossi radici authores tribuant. Quinetiam Vuularia difficulter parientes epota adiuuat, menses cit, & calculos pellit, quæ licet omnia uulgi experimenta sint, tamen easdē etiā facultates Lauro Alexandrinæ authores adscribunt. Cum igitur Vuularia utriusque descriptioni respondeat, & utriusque etiam attributis uiribus polleat, ac Alexandrina Laurus & Hippoglosson etiam eandē historiam & idem nomē habeant, sine dubio Vuularia eadē est cum Alexandrina Lauro, & Alexandrina Laurus eadem cum Hippoglossi. Possemus hoc loco plura argumenta afferre, si non breuitatis causa illud omitteremus.

ANTIRRHINVM. CAP. 133.

Antirrhinon, siue Anarrhinum, quod alio nomine Cynocephalea & Bucranion appellatur, fructum fert canino siue uitulino capiti similem, tam exquisita similitudine, ut etiam os & nares appareant, quæ in maturitate in eo aperiuntur, ut per eas maturum semen excidere possit. Nascitur ubique in agris & hortis. Germanicum eius nomen est *Brackenbaupt* / Hæc etiam *Orant* uocatur. Quod uocabulū pluribus herbis tribuitur, quæ a ueneficiis hominem tueri superstitiosè creduntur. Idem etiam de Antirrhino ueteres tradiderunt.

* *Orant* den alten weibern wol besant. Aliud est *Orant* Tragi: quod tamen & ipse Antirrhinum facit.

CATANANCE. CAP. 134.

Catanances duæ sunt species. Cum uerò utriusque ad amatoriam tantum usus sit, nihil refert eam non cognosci. Mirum in modum autem errat Ruellius, quod Bistortam alteram Catanancen esse credit. Atque in hac sola herba uidere possumus, quomodo ad descriptiones torqueat plantarum partes. Catanance enim folia, figura & colore oleæ foliis similia deferuntur. At oleæ folia minimi hominis digiti longitudinem & latitudinem non habent. Bistortæ uerò folia dimidii ferè pedis latitudinē habent, & sesqui-

& sesquipedale etiam longiora sunt, quæ nullam cum oleagineis foliis proportionem habent. Cætera taceo.

TRIPOLIUM. CAP. 135.

Tripolium (si Arabibus, & ex his in simplicibus exercitatissimo Serapioni credimus,) nihil aliud est quam Turbith Arabice dicta herba, cuius radices in Pharmacopoliis habentur. Serapio in sui Turbith descriptione, totū Dioscoridis caput de Tripolio recenset. Dioscorides certè Tripolii radicem per aluum aquam & urinam pelere scribit, quas vires omnes Medici Turbith habere nouerunt. Illi uerò uehementer errant, qui Pityusam Turbith esse dicunt. Nam Arabes seorsum etiam à Turbith Pityusam describunt.

*Plinius uidetur Polium cum Tripolio confundere.

ADIANTUM. CAP. 136.

Duplex est Adianti genus, candidū & nigrum. Vtrūq; tamen Polytrichon, Calitrichon & Capillus Veneris uocatur. Recetiores inexcusabili errore Scarleam Calitrichon uocant, quæ diuersissima est herba ab Adianto. Hunc errorē Ruellius quoque animaduertit, qui Scarleam saluiam transmarinam appellat. Est autem Adiantum ex Filiciū genere ferè minima. Dioscorides nigrum tantummodo describit, quod diu caruimus, nunc uerò copiosè affertur, & à Pharmacopolis Capillus Veneris uocatur. Habet hoc nigros, splendentes & extremæ gracilitatis coliculos. Malè autem in eius historia legitur; *φύλλα ὁμοία ἡβερδι*, quæ uerba ab aliquo adiecta sunt, Nam antea eius folia diligenter descripsit, cum ait: *φύλλα ἴσα ἔχει καὶ τὰ ὅσα ὁμοία*. Imposititia & adulterina igitur sunt ista uocabula: Folia Filici similia. Nam ipse etiam Serapio ea non habet, quamuis totam Adianti historiam ex Dioscoride transcripserit. Candidum aliud Adiantum dicitur, quod respectu nigri candidiores habeat coliculos, qui alias reuera in uiridi pallent. Hoc à Germanis *Waurrauten* & *Elsfarlin* dicitur, quoniam onisci animalia in humidis muris, iuxta illius cespites agunt.

TRICHOMANES. CAP. 137.

Et Trichomanes quoq; à capillo similibus coliculis nomen inuenit. In Pharmacopoliis Polytrichon uocatur, quamuis hoc omnium Adianti specierum cognomen potius sit, Germanicum eius nomen est *Steinfarin* / *Fäderhar* / *Widerthon* / & *Steinfeder*. Sunt etiam qui Saxifragiam illud uocant, sed nimis latè patet hoc uocabulum.

XANTHIUM. CAP. 138.

Xanthion inde nomen habet, quod flauos faciat capillos. Nascitur ubique in iisdē in quibus Dioscorides ait locis, & Germanis *Betlers leuse* & *Jgelflecken* appellatur.

ÆGILOPS. CAP. 139.

Facile quidem est dictū, Ægilopem sterilem esse Auenam, & Hordeum necare, sed eam indicare non est cuiusuis.

BROMVS. CAP. 140.

Bromos quoq; sterilis Auenæ species est. Cum autem eius generis plures in aruis reperiantur herbæ, non facillè indicari potest. *Sanberhaber.

GLAUX. CAP. 141.

Glaux non tantum in maritimis locis nascitur, Nam apud nos etiam in siccis apricis montibus & abruptis uis inuenitur.

POLYGALA. CAP. 142.

Ab effectu nomen suum hæc herba inuenit. Lactis enim generandi facultatem possidet. Germanis wilde *Süßwurz* appellatur, uel wilde *Läuterz*.

OSYRIS. CAP. 143.

Osyris sine dubio est ea herba, quam nunc Linariam recentiores uocant, Germani uerò *Arrottenflachs* & *Harntraut*. De qua re etiam parens meus in suo Botanologico scripsit.

SMILAX ASPERA. CAP. 144.

Asperam Smilacem, quam Theophrastus etiam Cilissam hederam uocat, in Germania non nasci puto. Quoniam ex Cilicia in Græciam translata sit. Et nunc in Italiæ quibusdam locis in hortis ostentationis causa colitur. Florem habet odoratum, cuius Ouidius meminit, cum ait: Et Crocon in paruos uersum cum Smilace flores. Ramulos & folia eius uidi, quæ Georgius Agricola (cuius antea memini) secum ex Italia attulit.

LENIS SMILAX. CAP. 145.

Lenis Smilax eadē est cum satiuā, quæ Dolychus etiam appellatur; quod palam fiet, si quis alios authores de Smilace legat, qui eandem herbam lenem & satiuam esse indicant, & duo tantum Smilacis genera esse dicunt, scilicet asperum, & lenem, quod in hortis nascitur. Ad hæc si utriusq; descriptio & uires in hoc authore cōsiderentur, quilibet iudicabit eandē esse herbam, lenem & hortensem Smilacem. Propterea ipse Dioscorides errauit, quod crediderit lenem Smilacē propriū genus à satiuo habere. Dioscoridē in hac seculus est Galenus, qui ait, lenē Smilacē asperę similes uires obtinere, quod falsum est: Nam lenis Smilax terrestri constat substantia, ut omnia fere legumina: propterea etiā grauiā & tumultuosa facit insomnia. Asper uerō Smilax iōgē alio constat temperamēto, quod ex gustu percipi potest. Sapore enim nihil cōmune cum leni Smilace habet. Cum autem plantarum temperamenta & facultates (ipso Galeno teste) ex sapore iudicentur, necesse etiam est, asperam Smilacem nihil in uiribus cum leni Smilace commune habere, ut Dioscorides etiam indicat, qui Smilacem lenem tumultuosa insomnia facere dicit, Asperam uerō contra letalia uenena antidotum esse. Cum igitur tam breuiter Galenus lenis Smilacis uires perstringat, & minime uerum temperamentum illi assignet, facile colligitur, ipsum nesciuisse, quid lenis Smilax esset. * Turciseque bonen.

RUSCVS. CAP. 146.

Рускус αργεα, siue ὀφρυμυρσιν, Latinis Ruscus appellatur. In Germania eam nasci nondum uidi, uel ab aliis nasci audiui. Propterea nullum eius Germanicum nomen expiscari potui. Quidam cum mihi locum in Germania describeret, ubi copiose Ruscus nasceretur, eo ut uiderem uiuam plantam profectus sum. Ruscum minime inueni, sed aliam herbam graminis foliis, iisq; molliissimis, quorum figura nō posset magis à Rusci foliis differre, radices tamen Rusco simillimas, quod ad figuram attineret, habentem, quarum in plurimis Pharmacopoliis pro Rusco usus est, & Rusci radices appellantur, sed magno errore. Hanc aliqui pro Phalangitio ostendunt, Nam uerum Ruscum uidi aridum ex Italia allatum, dura & aculeata folia habentem: quam ob causam Vergilius quoq; horridum eum appellat.

Huius Oxymyrsine fructus plurimum differūt à Cubebis aromaticis granis, quos duos fructus, Serapio eosdem esse credidit: quem errorem iam dudum deprehendit & scriptis mandauit, doctissimus uir Nicolaus Leonicensis, cuius inuentum alii etiam libi adscripserunt.

LAURVS ALEXANDRINA. CAP. 147.

De Lauro Alexandrina, siue Idæa, in Hippoglossio satis dictum est. Melius scribitur Hypoglossius, quod in summo sub foliis ceuligulas exerat, authore Galeno & Dioscoride. Eadem uidetur Idæa Laurus. Serapio huius quoq; in Lauri capite meminit, Hippoglossi uerō nusquā procul dubio intelligēs Hippoglossion à Lauro Alexandrina nihil differre. Porro quod ad capitis huius emendationē faciat, etiam prosequamur. Omnia exemplaria folia Lauri Alexandrinæ, Rusci foliis cōparant, quædam tamen minora esse indicant, Rusci autem folia multo minora sunt, quam Vuulariæ. Ergo dicit aliquis, Vuulariam Laurum Alexandrinam non esse: cuius uenia dico, locum in Dioscoride corruptum esse, nec minora sed maiora legi debere, quod Plinius & Serapio clavis uerbis ostendunt. Hic enim de uerbo ad uerbum eius historiæ ex Dioscoride transcripsit. Testantur idem correctiora exemplaria, in quibus manifeste μέγιστα, id est, maiora legitur. Huius autem erroris causa & origo est, uocabulorū

contrariam significationē habentium similitudo. *μῆλον* enim minus, *μῆζον* uerò maius significat. Facilis itaq; & lubricus est ex alterutro in alterutrum lapsus. Fallitur Ruellius in indicanda hac uerba. Non enim cognouit eam cum Hippoglossio eandem esse.

DAPHNOIDES. CAP. 148.

Δαφνοειδής recentiores Laureolam uocant, quæ in nostris Pharmacopoliis nō habetur, nec ego quæ sit compertum habeo.

*Semen oblongum habere quidam aiunt, & Germanicè interpretantur *groß Kellerschälß*. *Daphnoides* pinum *Matthiolus* exhibuit.

CHAMAEDAPHNE. CAP. 149.

Chamaedaphne, ut à *Dioscoride* describitur, non multum ab *Alexandrina Lauro* differt. Hodie non cognoscitur, si alia & diuersa est ab *Alexandrina Lauro*.

VERATRUM ALBUM. CAP. 150.

Ελευθεριον λευκόν, id est, albū *Veratrū*, siue albus *Helleborus*, Germanis *weiß Nieswurrtz* uocatur, ubiq; in Pharmacopoliis habetur. Vulgares herbarii confundunt *Dictamnū*, *Helleborū* album, & *Sigillū* *Salomonis*, id est, *Polygonatū*, ut ante etiam dictum fuit. Albus *Helleborus* copiosè in Germaniæ alpinis iuxta *Heluetios* nasci dicitur.

VERATRUM NIGRUM. CAP. 151.

Ελευθεριον μελαν, id est, nigrum *Veratrū*, apud nos in hortis plantatur: quamuis quibusdam in locis sponte proueniat. Nascitur ad *Hercyniam syluam* *Sesamoidis* genus, cuius radices *Radicarii Agyptæ* Pharmacopolis pro *Helleboro* hoc uendunt. Sunt enim illi simillimæ, sed multo inefficaciores, quoniam non tam uehementer ut illæ purgant. Hinc est quod aliqui temerè pronunciant, nos uero *Helleboro* carere. Porro *Hellebori* huius flores à *Dioscoride* in candido purpurascens, & figurati acemosi describuntur, quod ex minori *Sesamoide* huc adscriptū est. Aliqui enim hunc *Helleborū* cum *Sesamoide* confundunt. Sed uerus niger *Helleborus* uiridem in pallido florem habet, & minimè racemosum, Germanicè *schwarz Nieswurrtz* & *Christwurrtz* appellatur. Folia habet *Platano*, siue *Aceri* similia, profundius tamen & usq; ad pediculum per ambitum secta, & qualibet eius diuisuræ seu partes undiq; ferræ modo asperis incisuris horrent. Quæ uerò ab *Agyptis* pro *Helleboro* iam uenditur, *Nigellæ* constat foliis: & *Sesamoides* minus esse uidetur.

SESAMOIDES MAIUS. CAP. 152.

Sesamoides dicitur, quod *Sesamo* simile semen habeat. Hoc in *Anticyra* nasci dicitur. Vires quas *Dioscorides* huic adscripsit, *Plinius* *Sesamo* assignauit, malè *Sesamū* pro *Sesamoides*, in hoc authore legens. *Pliniū* secutus est *Ruellius*. Sed miror hunc tam crassum errorem adeo non animaduertisse, ut etiam ipse in eum inciderit.

**Sueuis* *Leusefraut* ut quidam interpretantur, sed ea puto *Consiligo* fuerit, à *Sesamoide* longè diuersa.

SESAMOIDES MINUS. CAP. 153.

Minus *Sesamoides* foliis priori dissimile existit. Ab huius historia non multum ab iudit ea herba, quàm *Agyptæ* Pharmacopolis pro *Helleboro nigro* uendunt. Vires enim easdem habet, nec radicū descriptio dissidet, quæ tenues, graciles & nigri *Hellebori* radicibus similes sunt. Germanis hæc herba *klein Christwurrtz* appellatur. Videtur in *Helleboro nigro*.

CUCUMER AGRESTIS, ET ELATERIUM. CAP. 154.

Σικυς ἀγρική, Latinis *Cucumis agrestis*, siue *anguinus*, & à recentioribus *Asininus* appellatur. In Germaniæ quibusdam locis ad Medicinæ usum seritur, & ab holitoribus *Pompen* uocatur, propterea quod semen & humorem ei aculetur, quem admodum machinæ quædam aquam, quam nos *Pompen* appellamus. *Elaterion* uerò est exiccatus & in pastillos cōformatus fructuū succus. Dissidēt autē in eius electione grauissimi

†
Atqui tam
lis iam a-
gnosci-
tur uerus Hel-
leborus ni-
ger in Ita-
lia circa
Comum:
cuius tamē
uulgaris
noster, spe-
cies una
est.

grauissimi authores, Aegineta, Dioscorides, & alii. Ego autem Aeginetæ sententiæ magis laudauerim, qui illud probat, quod ad uiridem colorem inclinat, Dioscorides uerò candidum. Sed impossibile est uiridem per se succum, cum exiceatur, candidum fieri. Quod uerò ex radicibus fit Elaterion, candidum colorem acquirit. Nam ipse succus etiam lacteus est. Sunt & alia quædam in hoc capite absurda, ubi Elaterii compositi modus traditur. Sed huius instituti non est, omnes errores discutere.

Germanicè dici potest Zgelefürbe.

PEDICULARIS, HERBA. CAP. 156.

Staphis agria, siue Phthiroctonon, Latinis Pedicularis herba, & Pharmacopolis adhuc Staphis agria uocatur. In Germania eam nondum nasci uidi.

THAPSIA. CAP. 157.

Thapsia à Thapso Insula, in qua primum inuenta est, appellatur: rarò afferuntur ad nos radices, interdum tamen pro Turbith aduehuntur, sed Turbith est durius. Est autè ferulacea & Fœniculo similis planta. Nicaner Trinacriam Thapsiam probat. In Sicilia enim efficacissima nasci creditur.

*Duplex est: una, minor: altera, maior: quæ pro Coslo interdum affertur: & foris quidem Costi loco uti licuerit, intus non item.

GENISTA. CAP. 158.

Sparton, Latini Genistam, Germani Günsler uocant. Copiosissimè nascitur in Hællæ montibus, ubi etiam arborefcit. Semina eius in Pharmacopoliis habentur. Est autem duplicis differentię. Quædam in funes torquetur, ex qua etiã corbes truis passis & sicibus seruandis texuntur in Hispania. Spartum id ueteres uocarunt. Altera non tam lentas habet uirgulas, ut simile quiddam ex iis fieri possit.

SILYBUS. CAP. 159.

Silybus quid sit, nemo adhuc compertum habet. Serapio illud Hacub Alkandec uocat.

GLANS VNGVENTARIA. CAP. 160.

Βάλανος μύρεψικη, ab Arabibus granum Bén appellatur. Sunt etiam radices Been uocatae, sed ab Vnguentaria glande diuersæ. Videndum igitur est, ne res eas confundamus, ut quidam faciunt. Afferitur rursus ad nos ex Aegypto fructus hic. Theophrastus eum simpliciter etiã Βάλανον uocat, nulla adiecta differentię nota, Martialis quoque in Apoph. Myrobalanum, cum ait:

*Quod neq. Vergilius, neq. Carmine dixit Homerus,
Hoc ex unguento constat, & ex Balano.*

NARCISSVS. CAP. 161.

Narcissi plura sunt genera. Ex his purpurei serò florere feruntur. Cãdidi uerò Narcissi (de quibus Dioscorides scribit) genus est, flos ille quem Germani Werzenblümen & Jœsephsblüben appellant. Nascitur Lipsiæ in syluis. Et sponte in hortis & sepibus in Hællia. Hodie nullus est huius in Medicina usus.

*Narcissos aliqui interpretantur Hornungoblümen / Werzenblümen / Aprillenblümen / & Narcissum autumnalem pro Colchico accipiunt.

HIPPOPHAES, HERBA. CAP. 162.

Hippophaës quid sit, hodie omnino ignoramus. Herba autem est ex aculeatarum genere.

HIPPOPHÆSTVM. CAP. 163.

Hippophæston quoq. nulli hodie hoc nomine cognitum est.

RICINVS. CAP. 164.

Croton siue Cici, Latinis Ricinus dicitur, quoniam semen habeat Ricino insecto simile. Est autem Ricinus animal paruum, quod ouium, canum & boum feminibus ac cuti adhæret, exitu carens, propterea eo usq. sugendo se implet, donec rumpatur. Germanis ein Scete appellatur. Porro ipsam plantam Pharmacopolæ Cataputiam

maiores, Arabes Kērua, & Germani Wundelbaum / & Rōmischen Hanff appellānt, aliqui Xēussihāe bonent. Seritur à quibusdā ostentationis causa in hortis. Platano & Aceri similibus foliis, sed maioribus. Agyrtæ cum Tūrckischen hanff uocant; quod nomen uulgu etiam retinet.

TITHYMALI. CAP. 165.

Tithymalum Latini Lactariam herbam appellant. Est autem omnibus illius speciebus lacteus liquor, qui ex abrupta herba emanat. Cum uerò plures sint herbæ præter Tithymalos, quæ lacteum habent liquorē, necesse est earū differentias ponere, ne aliquis error committatur, qui in his herbis committi possunt maximī. Sunt enim quædam lacteum liquorem habentes frigidae, quædam etiam in summa caliditatis gradu constitutæ. Constituiamus igitur tres illarū differentias. Prima Tithymalorum esto, Altera Intybaceorum, Tertiæ uerò adscribamus eas plantas, quæ neq̃ ex Tithymali neq̃ ex Intybaceorum genere sunt. Quomodo autem illæ ab inuicem dignosci possint, nunc ostendemus. Tithymalus quamuis in multas species diuidatur, omnes tamen oblongo & nullis incisuris diuiso folio constant. Intybaceæ uerò herbæ omnes circumroso & inciso per ambitum constant folio. Tithymalorum maxima pars umbellam habet. Quibus uerò hæ non sunt, illæ loco earum in medio duorum foliorum singulos flores & fructus ferunt. Intybaceæ uerò in singulis pediculis singulos habent flores, ex minimis foliolis compactos, colore luteos, sola Condrilla minor & Cichorio excepto, quæ interdum cœruleos, interdum candidos flores producant. Intybaceorum omnium flores in lanuginē uocatam pappos resoluuntur. Tithymalorum uerò minime, qui omnes fructus habent tribus loculamentis distinctos, & in his singulis singulos nucleos. Intybaceorum semina cum pappis leniter per auram auolant. Tithymali cum impetu & crepitu suum semenci aculantur. Intybaceorum lacteus liquor amaro gustu statim in lingua percipitur, Tithymalorum liquor à bubuli lactis sapore nō multum recedit, dum primo gustatur, deinde paulatim totum os & fauces accendit, & Coccognidii modo urit, & foris cuti impositus exulcerat, quod Intybaceorum liquor minime facit, propter temperamentī frigiditatem. Hæ igitur herbæ quas iam ab Intybaceis suis notis distinxī, omnes Tithymali appellatione ueniunt, estq̃ hoc generale eorū nomen. Intybaceæ uero herbæ sunt omnes Lactucæ species, utraq̃ Chondrilla, utrunq̃ Hieracium, Intybum satium & agreste, quod Cichorium uocant, & quæcunque his similes sunt, & lacteo liquore manant. Tertia uero lactariarum plantarum differentia ad neutrum genus illorum referri potest, neq̃ simul unum proprium reuera genus habet, ut Tithymali & Intybaceæ. Non enim sibi ipsius, ut illa, similes sunt. At huiusmodi pauca inueniuntur, ut Ficus, Erinosa herba, Scammonia, Cissampelus utraq̃, & tenella minoris Clematidis germina, quæ singulæ proprium habent genus, nec omnes sub eodē genere contineri possunt, ut Tithymali & Intybaceæ.

*Rapunculi, etiam ut uulgo uocant, & herbæ ei cognatæ, lactis nonnihil habent: & Opuli folia. & ferulacæ herbæ, calide & acris naturæ liquorem lacteum non pauca continent.

Tithymalorum autem, quas Latini priuatim lactarias herbas uocant, plures sunt species, sed nobis non perinde cognitæ: quamuis nos non pauciores etiam cognitæ habeamus. Sed eæ quas nos habemus, partim à ueteribus nō descriptæ sunt: & e contra non habemus aliquot, quæ apud illos descriptæ sunt.

Prima itaq̃ Lactaria herba, quæ Characijs, id est, Vallaris appellatur, & mas existimatur, nulli hodie hoc uocabulo cognita est, aliqui Teufelsmilch interpretantur. Secunda, fœmina est, & Caryites Myrsinitesq̃ appellatur, fructus ferens ceu nuces, & hæc uulgo nō cognoscitur. Quidā tamen Nucē uomicā Pharmacopolis dictum fructum, cornea soliditate, in hac lactaria nasci credunt. Tertia paralius est, in maritimis nascens, quam nemo adhuc ex recētoribus indicauit. Quarta Helioscopius dicitur, quod comam suā cum sole circumagat. Hæc proculdubio mihi esse uidetur, quæ à Germanis Wundsmilch uocatur. Cyparissias quinta in ordine recensetur, ad quam refertur etiā Pityusa, quæ specie tantum ab hac differt. Miror autē cur Cyparissias appelletur, cum tamen Dioscorides eā nupernatæ Pinu similē esse, & inde nomē accepisse dicat. Vnde necessario sequitur, eā Pityusē nomē habere. Nam Pitys Pinus est cui nuper à semine enatē similis esse Cyparissias dicitur. Cyparissius uero Cupressus est. Eadē

igitur

igitur genere est Cyparissias & Pityusa. Porro duæ sunt Pityusæ, minor & maior, propterea etiam post septem hos Tithymalos priuatim describuntur. Sine dubio autem Cyparissias & minor Pityusa, eadē herba mihi uidetur, quam Arabes Scobram, Pharmacopolæ uerò & recentiores Medici Esulam minorem, & Germani Wolffemilch appellant. Sextum locum Dendroides habet, arboris modo ramosa & fruticosa hæc mihi esse uidetur sine controuersia, quam Germani Steynmilch uocant. Nascitur in petris. Septima est Platyphyllos, à latitudine foliorum dicta, quam non facile hodie aliquis demonstrauerit.

*Matthiolus Tithymalorum aliquot species pulchrè pinxit. Cyparissiam aliqui Esulam minorem uocant, Wolffemilch.

PITYUSA. CAP. 166.

Pityusa, ut antea dictum fuit, duplicem habet differentiam. Minor genere à Cyparissia nihil differt. Maior uerò in pinguibus & uliginosis nascitur locis, recentioribus Esula maior, & Germanis Teufelsmilch appellatur, uel wilde Wolffemilch.

LATHYRIS. CAP. 167.

Azouels quoque ex Tithymalorum genere est, forma & fruticosis ramulis insignis. Recentiores & Pharmacopolæ eam priuatim etiam Tithymalum uocant, & Cataputiam minorem, quoniam fructus & semina maiori Cataputiae, id est, Ricino similia habeat. Germanicè Springbömer/Springfamen, & Fuchsmilch uocatur.

PEPLUS, HERBA. CAP. 168.

Peplus parua est herba, ex Tithymali genere, ubique in hortis & uineis nascens, Germanicè Fleyen Hundsmilch dicitur:

PEPLIS. CAP. 169.

Peplis genere Peplo cognata est, sed quo nomine iam appelletur, nulli cognitum esse puto.

*Elicine Wolffemilch.

CHAMAESYCE. CAP. 170.

Chamaesyce dicitur hæc herba, quod Ficus modo lacteo liquore abundet. Hodie uerò incognita est.

SCAMMONIA. CAP. 171.

Scammonia herba est nostro Cyssampelo, id est, Conuoluulo similis, lacteo liquore etiam similiter plena, maiore tamen radice. Hinc est quod Cyssampelus tenuis Scammonia uocatur, quoniam multò tenuiorem radicem quam Scammonia habeat. Comparantur apud Dioscoridē Scammoniae folia Helxines foliis, quo loco Helxinē non Parietariam, sed Cyssampelum, id est, Conuoluulum significat. Colligitur ex Scammoniae radice liquor, qui exiccatus ad nos perfertur, & similiter ut planta, ex qua fit, Scammonea uel Scammonium uocatur.

CHAMELAEA. CAP. 172.

Chamelea est planta oleæ foliis, unde & nomen inuenit, quæ ab Arabibus & Pharmacopolis Mezereon appellatur. Huic similis est Thymelaea, id est, frutex in quo Coccognidion nascitur. Cōfundunt hodie diuersas has plantas. Nam Thymelæam quoque Mezereon, & Coccognidion grana Mezereon uocant, quantumuis admodum uerit Diofcorides Coccognidion non esse Chameleæ, id est Mezerei, sed Thymelææ semen.

THYMELAEA. CAP. 173.

Thymelaea frutex est, quem Germani Sebast- & Kellershalß appellant, ex quo colligitur granum gnidium, quod composito nomine etiam Coccognidion appellatur. Nascitur pinguibus, montanis & opacis locis.

SAMBUCVS. CAP. 174.

Arta. Latinis Sambucus, Germanis Holunder/ & Albern appellatur. Nota omnibus Sambucus est, flores candidos, & nigras baccas in latis umbellis ferens. Inuenitur etiam aliud Sambuci genus prædicto minus, floribus & baccis non in um-

bella, sed racemo constitutis. Baccæ rubentem habent colorem. Hoc à ueteribus non est descriptum. Nasctur pinguibus montanis locis: wilder Bolder.

EBVLVS. CAP. 175.

ἑβυλῶνα, id est, parua Sambucus, herba est. Autumno enim caules illi omnino pereunt, uirgas habet quadrangulas, Sambuci modo inanes, folia, flores, umbellæ & baccas Sambuco similes & æquales, quamuis baccæ non nigrum habeant, sed rufum colorem. Germani eam ἄτιον appellant.

PYCNOCOMVM. CAP. 176.

Pycnocomon quid sit omnino ignoramus. Brunfelsius in tertio Tomo nequaquam ueram huius imaginem pingi curauit. Malè Vergilius Marcellus semen eius Porro simile interpretatus est. Correctiores enim codices πικρὸς, id est, Marrubii, habent, non πικρὸν. Necesse enim est hanc herbam Marrubii semen habere, si Ocimo similes flores fert: quod si opus esset demonstrare, possemus ex plantarum constitutione, sumptis rationibus & argumentis.

APIOS. CAP. 177.

ἄπιον, quam ἰσχιὰδα etiam uocant, herba hæc dicitur, quod Pyro similem radicem habeat. Quidam etiam Raphanum syluestrem appellant. Videndum tamen est, ne cum agresti Raphano, id est, Armoracia confundatur. Quædam exemplaria radicem eius Asphodeli radici similem faciunt, quædam Spondylji, sed facili est ex altero in alterum lapsus. Ea uero exemplaria quæ radicem huius herbæ Asphodeli radici comparant, deprauata sunt, siue ea Theophrasti, siue Dioscoridis fuerint. Asphodelus enim multas oblongis glandibus similes radices habet, ut Pæonia fœmina, quibus nulla est cum Pyro similitudo. Spondylion uero rotundam habet, & Pyro conformem radicem. Ruellius se ueram hanc Ischiada inuenisse putat, sed fallitur: quod ex diuersis facultatibus colligere possumus. Nam Ischiadis siue Apji huius una tantum radix intra corpus sumpta, utrinque, id est, per aluum & uomitum purgat, eiusque liquor sesquiboli pondere, id est, scrup. s. & gra. v. idem præstat. Eius uero herbæ radice (quam Ruellius Ischiada esse putat) famis tempore pauperes in Gallia uescuntur, quod uidisse se Ruellius testatur. Cum uero Apji radix una tantum tam uehementer purget, & corpus inaniat, minimè cibis & alimentum esse potest, neque aliquis ea sine periculo uitæ uescetur. Illa autem cuius Ruellius meminit, alimentum est: Ergo minimè Ischias appellanda erit. Fateri autem omnes cogimur, nos hanc herbam ignorare.

*Hodie nota est, pingitur à Matthiolo.

COLOCYNTHIS. CAP. 178.

Colocynthis diminutiuum est à Colocyntha, id est, Cucurbita. Est autem Colocynthis Cucurbitæ syluestris genus, quam Pharmacopolæ Cucurbitam deserti, & Colocynthidam uocant.

*Huius species una fructu oblongiore, propriè est Colocynthis: hac olim pro uentosa utebantur. Altera Sompbon est, qua in Pharmacopolijs utimur.

EPITHYMVM. CAP. 179.

Epithymum, quo nos hodie utimur, uerum Epithymum esse negat Antonius Musa, infirmis admodum argumentis nitens, nos uero in utraque partem prolixè disputare possemus, si cum aduersariis res nobis esset. Cum uero hæc amicis scribamus, satis sit eos nouisse, uerum Epithymum in Pharmacopolijs haberi, & reuera nihil aliud esse quam Cuscutam in Thymo nascentem. Adnasctur etiam Thymbræ Cuscuta, quæ Epithymum appellatur. Cuscuta enim aliarum herbarum accidens est, è quarum caulibus non aliter quam uiscum ex arboribus, erumpit, quod nos diligenter obseruauimus. Propterea bene legitur apud Plinium, Epithymum sine radicibus nasci. Nam proprias radices minimè in terram agit, sed herbarum abundantis succo uiuit & nutritur.

ALYPVM. CAP. 180.

Alypum herbam qui cognosceret, nullum adhuc uidere uel audire mihi licuit.

EMPETRUM. CAP. 181.

Empetron hoc an idem sit cum Sarxiphago superius descripto, uel diuersum, non facile aliquis indicabit. Vt cuncq̃ fuerit, nulla iam hoc nomine extat herba.

* Querendum an Millegra uulgo dicta sit.

CLEMATIS. CAP. 182.

VITIS SYLVESTRIS. CAP. 183.

Aliquam planta hæc cum Vite similitudinem habet. Ideoq̃ hoc nomen inuenit, improprie tamen. Non enim idem genus cum Vite satiuā habet, ut satiuā cultura tantum ab hac distinguatur, sed suum genus à Vite diuersum habet. Germanis hæc syluestris Vitis Spectreben appellatur, & flores eius Spectilien/Periclymeno ualde similis est. Videndum ergo erit, ne cum eo confundatur.

VITIS ALBA. CAP. 184.

Αμπελ & λευκή, uiticulas, folia, & capreolos satiuæ Viti similia habet, & candidā radicem, propterea albæ Vitis nomen inuenit. Herba est sepes ascendens, quam phar macopolæ Bryoniam, Germani Saunreben/Gichtreben/Gichtwurß/Hundereben/ & Strickwurß appellant, Baccas ferubentes.

VITIS NIGRA. CAP. 185.

Αμπελ & μέλαινα in quibusdam similis est Albæ uiti, Radicem tamen nigram habet. Hæc eo dem nomine iam appellatur. Habet autem nigras baccas.

FILIX. CAP. 186.

Filix siue ῥέις hæc, mascula appellatur, folia ab una radice multa emittit, magnarum autiu malis similia, unde etiam nomen acquisiuit. Caulē nunquā producit, Germanicè Faren/siue Farentrant uocatur, propterea quod latos uentris lumbricos expellat, quos Faren Germani nominant.

THELYPTERIS. CAP. 187.

Θυλὶ ῥέις scemina est Filix, proceris constat caulibus, & foliis pluribus, mascula Filice latioribus & breuioribus. Germani hanc Rosfaren (an quod equis medeat, ut Tragus de hac aut illa scribit) appellant; aliqui Hofaren/Creinsfaren.

POLYPODIUM. CAP. 188.

Ex Filicum etiam genere est Polypodium, quod Latini Filiculam, siue Filicularem, & Germani Engelsß / & Stipsfaren appellant. Pharmacopolis Polypodii nomē cognitum est. Sunt etiam Germani qui Polypodium Steinfaren appellant, quoniam pleruncq̃ in muscosis petris nascitur. Hoc tamen nomen differt à Steinsfarlin id est, Trichomane.

* Filicula modo pro Polypodio, modo pro Trichomane accipitur.

DROPTERIS. CAP. 189.

Δρόπτερις thelypteridi similis est, multo tamen minor. Nascitur in uetustarum quercuum muscolis partibus. Germanis, quoniā parua sit Filix, Erdsfaren/Windfaren/Baumfaren/ & Eydsfaren appellatur. Vulnerarias habet uires, rusticis non incognitas. Querenda est in antiquis & umbrosis syluis, in quibus annosè Quercus fuerint. In piccis & abiignis syluis minimè prouenit.

* In marem & foeminam diuiditur.

CNICUS. CAP. 190.

Cnicopharmacopolæ & recentiores Medici Carthamum appellant. Germani Distelsaffran, siue Feldesaffran. Theophrastus de historia plant. lib. vi. cap. iiii; tria genera Cnici siue Cnici describit. Vnum satiuum, quod Carthamum appellatam diximus. Et duo syluestria. Ex his primum est quod à Dioscoride Atractylis libro tertio uocatur. Alterum uero syluestre Cnicum, Dioscorides & alii Græci Acanthii nomine indicant. Propterea minimè errat Ruellius, quod alterum syluestre Cni-

cum Carduum benedictum appellari scribit, quem nos Acanthium esse in tertio libro diximus. Porro Cnici flores à Dioscoride Croco comparantur, quo loco non ipsius Croci flores, sed in medio flore nascentia rubro colore stamina; quæ Crocus appellatur, intelligenda sunt. Nam Dioscorides non dicit, quòd Cnici flores Croci floribus similes sint, sed simpliciter Croco. Quilibet autem nouit Crocum nò ipsum florem sed floris stamina, ut iam diximus significare. Igitur nullum turbare uel in dubitationem rapere potest florum Cnici cum Croco comparatio.

MERCVRIALIS. CAP. 191.

Λινόζωσις Latinis Mercurialis, Germani Binglekraut appellatur. Duplex illius genus sexu distinguitur. Mascula appellatur, quæ bina semper, & testiculorum figura iuncta semina habet. Fœmina racemosos flores & semina producit. Repetantur hoc loco quæ superius de Phyllo herba dicta sunt, ubi indicauimus Phyllon proprii genus, & à Mercuriali hac diuersum non habere, sed idem esse Phyllon & Mercurialem Dioscoridis cum Theophrasti Arrhenogono, & Thelygono. Pharmacopolis hæc herba Latino nomine cognita est.

CANINA BRASSICA. CAP. 192.

Κυνικά, siue Cynoërambe, sine dubio est Mercurialis mascula syluestris: quod ipse Dioscorides etiam indicat. Herba est Mercuriali masculæ similis, semina uerò quam Mercurialis maiora habet. Fœmina in hoc genere non inuenitur. Nasctur in syluis, & Germanicè Wild Binglekraut appellatur. Ruellius in hac herba indicanda errauit.

HELIOTROPIVM MAIVS. CAP. 193.

Ηλιοτρόπιον τὸ μέγα, id est, Heliotropion maius, qualis sit herba, & quomodo iam uocetur, ignoro cum omnibus, Solus Ruellius eam sibi cognouisse uidetur, qui herbam Cancrì appellari scribit: ubi diligenter animaduertendum est, Ruellium longè aliam herbam intelligere quàm Millegranum, quæ apud nos herba Cancrì uocatur. Nam hæc tam exigua habet foliola, ut uix conspici possint, & in arenosis arcis nascitur. Quam uerò Ruellius sic uocat, pingui solo prouenit, & Ozimi folia habet, ut ille scribit. Vulgo creditur Heliotropium esse ea herba, quæ à Germanis Wegwart appellatur, sed falsò. Nam Wegwart Cichorium est, id est, Intybum agreste, cuius Dioscorides ij. libro meminit. Hoc autem loco Heliotropium seorsum ab illo describitur: Erroris causam protulit Plinius, qui cœruleum florem Heliotropio tribuit, qualem Cichorium habet, quem etiam cum sole circumagit. Quamuis igitur multæ sint her bæ, quæ solis cursum sequantur, una tamen est, quæ propriè Heliotropium dicitur, estq; duplex, maior & minor. De illa iam egimus. Hæc uerò iam sequetur.

HELIOTROPIVM MINVS. CAP. 194.

Ηλιοτρόπιον τὸ μικρόν quæ sit, hodie omnino ignoramus. Neq; aliquis adhuc eam scriptis ex recentioribus indicauit.

SCORPIOIDES. CAP. 195.

Scorpioides hoc plurimum differt ab herba, quam Theophrastus Scorpionem appellat. Nam Scorpioides hoc semina habet, Scorpionum caudis similia. Scorpio uero apud Theophrastum radice Scorpionis caudæ simili describitur. Theophrastus autem Scorpionis appellatione primum Aconiti genus intelligit, quod aliàs Telipphonon & Pardalianches appellatur. Porro Scorpioides quæ sit herba, hodie ignoramus.

77 **VALERII CORDI SI-** **mesusij, in Pedacij Dioscoridis** **ANAZARBEI QUINTVM DE ME-**

dica materia *Librum, Annotationes:*

Qui est de Vitibus, Vino, et Metallicis.

VINIFERA VITIS. CAP. 1.

OTA OMNIBVS EST QVAE IN VINEIS COLITVR VITIS, Germanicè *Weinstock* appellatur. Plurimas habet hae diuersis regionibus differentias.

* *Capreoli, Eläbern/Gäbele, Vinacea, Trebern/Träff.*

LABRVSCA. CAP. 2.

Αμυγδαλέα, Latine *Labrusca*, Germanicè *Wilder Weinstock* appellatur, eadem est cum praedicta *Vite*, preterquam quod non colatur. Sola igitur hac nota ab illa differt. Nascitur apud nos circa uineas, & in uinearū sepibus.

VVA. CAP. 3.

Σταφυλή, Latine *Vua*, Germanicè *Weintraub* uocatur. Intelligitur autem hac appellatione totus in *Vite* racemus multis acinis cōstans: der *Traub*. Ipse acinus *Vug* à *Græcis* *ῥάφι*, à *Germanis* *cum Weinbeer* appellatur. Passa uerò *Vua σαφίς* *Græcis*, & *Rosein* *Germanis* appellatur. Cuius in pharmacopoliis tres sunt differentiae: omnium maximae sunt, quas hodie *Cibebas* appellant, anteriori pollicis articulo magnitudine ferè equales. Arabibus *Vua* *Cibib* dictae. Secunda differentia continentur uulgares, quas simpliciter *Vuas* passas uocamus. Tertia uero omnium minima, nullo in-
tus nucleo. Afferuntur hae non in racemis, sed ab his decerpit, & in grandes massas compactae. Pharmacopole eas *Corinthiacas* siue minores *Passulas* uocant. Germanicè *klein Roßein*.

VVA PASSA ALBA. CAP. 4.

LABRVSCAE, FLOS. CAP. 5.

οινάβη syluestris *Vitis*, quam *Labruscam* uocant, flos est. Habetur eodem nomine herba etiam, quae in iii. lib. descripta est. Verg. Marc. Interpres in huius capituli Commentario scribit, se non meminisse, quod in aliquo loco apud *Dioscoridem* eo nomine herbam legerit, cum tamen illius caput interpretatus sit, & adiectis etiam Scholiis illustrauerit.

OMPHACIVM. CAP. 6.

ομφάκιον immaturae *Vuae*, quae *ομφάξ* *Græcè* dicitur, succus est: ab *Italis* nunc *Agresta* appellatus.

VINVM. CAP. 7.

Notum est omnibus *Vinum*, Cuius natura uuarum diuersis locis genitarum temperamentum sequitur.

VINVM ALBVM. CAP. 8.

VINVM SAPORE DIFFERENS ET MIXTIONE. CAP. 9.

VINVM LOCO DIFFERENS. CAP. 10.

VINI FACULTAS. CAP. 11.

OMPHACITES. CAP. 12.

LORA. CAP. 13.

Λευπίας, siue *πότημα*, Latinis *Lora*, Germanis *Laur* uocatur. Fit expressis *Vuit* affusa aqua, & iterum calcatis.

VINVM E SYLVESTRI VVA. CAP. 14.

VINVM

οἶνός μελιτίτης ex austero musto & melle conficitur. Hodie uerò an conficiatur, ne scio.

οἶνός μελι, id est, Mulsū, ex ueteri austero uino & melle conficitur, apud nos non præparatur.

μελίκρατος Latini Aquam mulsam, Germani Donigschrauff uocant. Differt Melicraton ab Hydromele, quod Melicraton ex melle & aqua simpliciter fiat, estq; subiectanea & temporanea confectio. Hydromeli uero similiter ex aqua & melle conficitur, sed præparatur ut seruari & uetustatem ferre possit. Cuiusmodi est quod in Germania Querc appellatur, quo præter Germanos etiam alii Septentrionales populi pro uino & ceruisia utuntur.

* Nō est quod ex sauis paratur, Apomeli est potius quam Hydromeli.

Nota est omnibus Aqua. Cuius qualitas secundum loca in quibus scaturit, uel per quæ fluit, uariatur.

Nota omnibus ad mare habitantibus Marina aqua existit, pro qua nos in mediterraneis habitantes salinarum muriam, uel ex aqua & sale confectam aquam, accipere oportet.

Purgationum causa conficiebatur olim θαλασσόμελι, nunc nusquam, quod ego sciam, conficitur.

οξύς Latine Acetum, Germanice Essig appellatur. Quoties Acetum apud Medicos scriptum inuenerimus, semper uini Acetum intelligere oportet, & nequaquam ceruisie. Est autem Acetum uinum uel ceruisia uetustate corruptum, & in aciditatem quoris saporem conuersum. Saxones qui Brunswicensem Saxoniam incolunt, ex industria etiam Acetum, quemadmodum ceruisiam coquunt, quod non sit ceruisia, sed statim musteum illud decoctum, refrigeratum in Acetum transit, quo illis finitima gentes ferè omnes pro Aceto in cibis utuntur.

οξύμελι pharmacopœe adhuc conficiunt, Oximel simplex uocantes:

οξύμελι ex aceto & muria conficiebatur: iam uero nullus restat eius usus.

θυμοξύμελι etiam Dioscoridis ætate non amplius conficiebatur, eius tamen præparandi rationem Dioscorides tradit.

Acetum Scilliticum adhuc in pharmacopoliis conficitur, & Acetum Squilliticum uocatur. Quid autem Scilla sit, in secundo libro dictum est.

* E cruda scilla fieri: nam è cocta facile putrescit.

Scilliticum uinum nusquam in Germania confici uidi.

Non conficiuntur apud nos eiusmodi uina:

Duplex est apud Dioscoridem huius confectio, sed altera tantum apud nos fit.

MELOMELL. CAP. 29.

μελόμेलι ex malo Cotoneo & melle conficitur. Rarus hodie est illius usus.

HYDROMALVM. CAP. 30.

υδρομέλου nusquam in Germania præparatur, neq; alibi confici existimo.

OMPHACOMELITES. CAP. 31.

ομφακόμेलι ex acerba uue succo & melle conficitur. Sed huius non ita frequens est in Germania confectio.

VINVM EX PYRIS CONFECTVM. CAP. 32.

Conficitur hoc quemadmodum Cydonite, Sed rarus est eius usus in Medicina. Helirustici ex Pyris sylvestribus succum exprimunt, qui uini saporem habet, sed ob frigidius temperamentum, & humiditatis inconcoctæ abundantiam statim acescit, ideoq; musteum ebibitur.

VINVM E LABRVSCAE FLORIBVS CONFECTVM. CAP. 33.

Huius conficiendi rationem Dioscorides docet, sed nusquam apud nos conficitur.

VINVM EX PVNICIS. CAP. 34.

Ex Punicis malis exprimitur hoc uinum. Seruatur in pharmacopoliis & uinum Granatorum appellatur.

ROSACEVM VINVM. CAP. 35.

Rosaceum uinum in Germania nusquam uidi præparari, Acetum uero Rosaceum ubiq; fit.

VINVM EX MYRTI BACCIS CONFECTVM. CAP. 36.

Ex confusis & expressis Myrti baccis conficitur Myrtite uinum, In nostris uero regionibus nusquam præparatur.

VINVM MYRTEVM. CAP. 37.

Vinum cui confusæ Myrti baccae & ramulorum foliis iniiciuntur, Græcis μυρτιάνη, Latinis Myrteum appellatur.

LENTISCINVM ET TEREBINTHINVM VINVM. CAP. 38. 39.

Lentiscum & Terebinthum arborem, nusquam in Germania habemus. Ideoq; hoc uinum apud nos non confici potest.

PALMEVM VINVM. CAP. 40.

Ex uulgaribus palmulis conficiebatur hoc uinum. Nos illud nunc non præparamus. Arabibus Nabith uocatur.

FICATVM VINVM. CAP. 41.

In Cypro olim ex Ficibus conficiebatur, eo quo Dioscorides docet modo, hoc uinum.

VINVM E SYCOMORIS. CAP. 42.

VINVM RESINATVM. CAP. 43.

Resina in frigidis regionibus uino adiicitur, ne acescat.

PINEIS NVCLEIS CONDITVM VINVM. CAP. 44.

Non præparatur hoc apud nos, nisi quis ex industria & Medicinæ causa conficiat.

CEDRINVM VINVM. CAP. 45.

Cedrus arbor apud nos non provenit. Quapropter illius baccis uinum condire non possumus.

E BACCIS IVNIPERI. CAP. 46.

CEDRITES. CAP. 47.

VINVM PICATVM. CAP. 48.

Picatum uinum nusquam adhuc confici uidi.

VINVM ABSINTHITE. CAP. 49.

Ex Absinthio ubiq; conficitur Vinum & Ceruisia, quod nulli incognitum esse existimo.

VINVM HYSSOPITE. CAP. 50.

Hyssopo etiam uinum, quemadmodum Absinthio, conditur, & in multis Germaniæ locis conficitur.

MVLTI ALIIS PLANTIS CONDITA VINA. CAP. 63.
et deinceps, usque ad 63. inclusivæ.

Plantæ quibus sequentia uina condiuntur, omnes antea descriptæ sunt. Ipsa uerò uina nondum confici uidi.

VINVM AROMATITE. CAP. 64.

Conficitur hodie multiplex Aromatite uinum, præsertim in maritima Germania & Saxonia, quæ Claretum, & Lanterranct appellant: hoc candidum; illud, crocæ-
 tum est. Sed secundum Dioscoridis descriptionem non conficiuntur.

PLVRIBVS DIVERSISQVE ODORAMENTIS CONDITA VINA:
 CAP. 65. Vsq; ad CAP. 70. inclusivæ.

Sequentia uina apud nos non præparantur, solo Nectarite excepto, quod ex Inu-
 læ etiam, Nectarion appellatæ, radicibus conficitur. Vbiq; uulgo *Alantwein* uo-
 catur.

PLVRIBVS HERBIS CONDITA VINA. CAP. 71. Vsq; ad CAP. 83.

Herbæ quibus sequentia uina condiuntur, antea explicatæ sunt. Satis igitur sit no-
 uisse, nullam ex illis apud nos confici præter Saluiacum. Conficitur tamen in quibus-
 dam locis etiam ex Dauco, quem syluestrem Pastinacam in iij. lib. nominauimus.
 Ihenæ in Thuringia ex Polio etiam uinum præparant, cuius Dioscorides nullam la-
 cit mentionem. Sequitur etiam uinum ex salis flore confectum. Quid uerò sit salis
 flos, ipse Dioscorides hoc eodem lib. scribit in Metallicis medicamentis, quæ nunc se-
 quuntur.

DE METALLICIS MEDICAMENTIS.

CADMIA. CAP. 84.

Multæ sunt Cadmiæ species, nos tantum duas in pharmacopoliis habemus: Vnâ
 ex fossilium genere, Alteram factitiam. Illam Germani *Galmey* & pharmacopolæ
 Lapidem calaminarem. Hanc uerò Thutiam appellant, quæ omnium efficacissima est.
 Thutia autem Arabica est dictio; qua metallicum Spodium & Pompholyga indicat
 Serapio. Posteriores uerò Botryiten Cadmiam minorem sic appellarunt, sed male:
 Est autem Botryites Cadmia minor, ex accenso & liquefacto aëroso lapide fuligo
 quædam sursum in caminos euolans, & ferreis hastis undique eminentibus tuberculis
 ceu racemus adhaerens. Cadmiæ uocabulum recentiores in Cmaiam & Chniām (a-
 lias Climiam, Catimiam) corruerunt. Reliquum autem Cadmiæ genus in multas
 diuiditur species, à Galeno & Dioscoride descriptas, quarum maximus olim erat in
 Chirurgia usus. Verum hæc omnes hodie ubiq; incognitæ sunt, quamuis in nostris
 metallicis fornacibus, maxime Goslaris, omnes species gignantur. Diuiditur autem
 omnis Cadmia in Natiuam & factitiam. Natiua duplex est. Vna cuius Galenus me-
 minit, quæ in Cypri montibus & torrentibus inuenitur, Galeni ætate omnibus aliis
 à quibusdam Medicis prælata, cuius magna copia in Vuestphaliæ montibus & tor-
 rentibus reperitur. Aspectu racemosa, & mixtis ueluti cubis constans, foris spadiceo,
 intus autem æreo aut argenteo colore. Altera lapis est ponderosus, scaber & uersico-
 lor quem antea lapidem Calaminarem appellauimus.

Factitia autem Cadmia in plures species conciditur. Prima Botryitis dicitur, quod
 grandis racemi instar, à fornaculateribus pèdeat. Hæc rursus duplex est. Vna qualē
 iam demonstrauimus, sponte & casu inter liquefaciendum genita. Altera minor est, &
 ferreis hastis ex industria fornacibus insertis, undique tuberosa, & racemosa facie ad-
 hærens. Secunda Cadmiæ species Placodes appellatur, quod ueluti latis crustis com-
 pacta sit, quæ & ipsa duplicem habet differentiam. Vna crassioribus constat crustis,
 altera multo tenuioribus, & sibi ipsi inuicem superiacentibus compacta est, quarum
 commissuras candicantes aut pallidæ lineæ cingulorum modo intersecant, quam ob
 causam Zonitis nominatur. Tertia uerò Ostracitis dicitur, quæ testaceâ & terrestrem
 habet substantiam, concretionem tenuis, & colore plerumq; nigricans, in ima fornace
 nascens,

nascens, cum cæteræ in mediis fornacibus gignantur. Omnes prædictæ Cadmiæ duræ & ponderosæ sunt. Quarta autem puluerulenta leuissimaq; est, Pompholygi, id est, Bullæ, substantia & pondere similima, colore ut plurimum ex candido in æreum aut cœruleum modicè degenerans. Inuenitur & subfusca, quæ prædictæ plurimum bonitate cedit, Capnitis uero uocatur, quod fuliginis & fumi modo levis sit. Gignitur hæc non ut reliquæ in ipsis fornacibus, sed in earum ore, quo flammæ eluctantur.

* Cadmia capnitis est fumus pyritæ lapidis. Pompholyx est fauilla (cum æri citrinus color inducitur, & aurichal cum sit) ad tectum ascendens: Spodium uerò cinis relabens. Tutia est Cadmia fistularis hodie in pharmacopoliis ita dicta, sed falso: nam Tutia Arabicum nomen Spodio debetur. Pyrites est materia æris & plumbi, & ubi non est Pyrites, ibi non gignitur Cadmia.

SPODIUM ET POMPHOLYX. CAP. 85.

Magno errore Spodium in pharmacopoliis uocatur Ebur ustum, siue Canna, id est, arundo combusta. Est enim hoc Arabum commentum. Adscribunt huic suo Spodio maximas in confortando epate uires, sed quas neq; ratione neq; aliqua experientia illi inesse cognoscere possumus. Verum tamen Spodium nihil aliud est, quàm ex tinctæ metallorum fauillæ, quæ propter pondus rursus decidunt, & circa fornacem eiusq; pavimentum colliguntur. Hoc hodie in pharmacopoliis Nihili griseum, et à Germanis Brau ni. ht appellatur. Pompholyx uero tenuissimis & leuissimis fauillis consistat, quæ summis fornacum caminis adherent, atq; in magnum corpus accrescunt, sed principio cum sit, in aqua surgentibus bullis similis est, unde etiam nomen inuenit. Pharmacopolæ eam Nihili album, Germani Wetp uia t appellant. Probatum apud nos quæ Norimbergæ conficitur. Antispodia ueteribus dicebantur arborum quæ CAP. 86. rundam frondes & chartæ exultæ, quibus utebantur pro Spodio, cum huius non esset copia. Tale etiam est Arabum Spodium. Nullum tamen Spodium, siue Antispodium intra corpus sumitur. Quapropter nemo credat Arabum Spodium eas uires in confortando hepate habere, quas illi adscripserunt.

* Lege etiam supra in capite de Cadmia. Spodium uulgare est antispodium, quo extrinsecus tantum uti conuenit: efficacius, quod præparatur cum camphora.

CREMATVM AES. CAP. 87.

Inualuit hodie consuetudo, ut cuiusuis metalli rudem adhuc materiam, quam Germani Metallici Erz uocant, æris uocabulo significant. Quidam etiam hoc omnium metallorum generale nomen esse existimant: sed falso. Nam nullus unquam author, siue Græcus, siue Latinus, qui de metallis scripsit, hoc testatus est, sed omnes æris appellatione, quod Græcis χαλκός dicitur, peculiare metallum significant, quod Germani Kupfer / & Latini recentiores Cuprum appellant, cuius laminæ uruntur, & in pharmacopoliis Aes ustum uocantur.

FLOS AERIS. CAP. 88.

χαλκὸς ἄνθος, id est, Aeris flos, plurimum differt à re metallica, composito nomine χαλκαῖον appellata: Est autem propriè Flos æris, tenuissima æris liquefacti substantia, quæ ex repentina frigide aque affusione in milii magnitudine colore purpureo eurgana densatur & expuitur. Nullum hodie in Medicina usum habet, quoniam ferè omnia metallica ignora hæctenus fuerunt. Errant aliqui ex recentioribus, qui eruginem, id est, Spangrium, florem esse æris existimant.

SQUAMA AERIS. CAP. 89.

Λαίς χαλκός, id est, Squama æris, est æris superficies, quæ malleorum ictu in squamas resoluatur. Duplex eius genus est, crassa, & farinæ modo tenuis. Crassa Kupfer schlag Germanis dicitur. Subtilior uero Kupfer braun, siue Aesselbraun. Tenuiorem Plinius etiam Stomoma appellat, quod ex summa lanugine excutitur. Porro Stomomatis squama, de qua hoc loco Dioscorides agit, à tenui illa plurimum differt. Nam tenuis squama ex ære fit. Stomomatis uero Squama ex optimo ferro, quod ueteres Stomoma appellabant, quoniam cultellorum et gladiorum acies (quas ora etiam appellat sacra scriptura) ex illo fierent. Stomoma ferrum hodie etiam Chalybs, & Germanicè Stachel uocatur, Vergilius Marcellus errat, quod Stomomatis CAP. 90.

squamam, æris squamam uocat. Nam ipse Dioscorides aliter scribit:

AERUGO. CAP. 94.

ἰοῦ Græci eruginem uocant, quoniam florida sit æris rubigo, quæ priuatim in ære ærugo, ut in ferro ferrugo, uocatur: utraque ceu putrefactio sui metalli est. Pharmaco polis uiride æris, Germanis Kupffergrün/Spangrün/ & Grünspan appellatur. Qui barbaris & impropriis uoculis delectantur, Aeruginē Prasion uiride uocant, ut simpliciter Prasion appellatam herbam ab ea distinguant. Sed ridicula hæc est distinctio. Sunt autem duo potiora æruginis genera. Vnum ἰός ἑρσός, à Græco uerbo ἑρσώ, quod rado significat, dicunt. Hoc ex industria & arte præparatur, & laminis æris deraditur, unde nomen inuenit. Derasum in massas formatur, & hæc est quæ ubiq; CAP. 94. habetur ærugo. Alterum eius genus sponte in arariis metallis siue fodinis gignitur, & interdum in uermiculorum formam coïnefcit, quapropter ἰός σκάλυψις nomenatum est. Hoc autem hodie in nullo usu Medicis est. Inuenitur tamen non raro in nostris ærariis fodinis.

FERRUGO. CAP. 95.

ἰός σιδῆρος, Latinis Rubigo ferri, siue ferrugo, Germanis Eisenrost appellatur. Nota omnibus res est.

RECREMENTVM FERRI. CAP. 94.

Omnium metallorum recrementum Græci σκωρία, Germani Schlacken appellant. Hoc uero capite de ferri tantum recremento agit Dioscorides, quod nos Eisen Schlacken/ appellamus. Quidam ex recentioribus ferri squamam improprie etiam σκωρία uocant, ex qua pilulas præparant, à calore resolutio uentriculo salutare.

PLUMBVM ELOTVM. CAP. 95.

Plumbum Græcis μόλυβδος, Germanis Blei uocatur. Duo habet genera Plumbum. Vnum nigrum, Alterum candidum dicitur. Illud est quod hodie simpliciter Plumbum, et à nobis Blei appellatur. Hoc uero iam Stannum tantum Latini, et Zinn Germani nominant. Porro elotum plumbum ex nigro fit, estq; nihil aliud quam ipsum Plumbum, cum liquo aliquo in crassiusculam substantiam detritum, quod siccatum in puluerem transit. Malignis & calidis ulceribus curandis utilissimum.

CREMATVM, SIVE VSTVM PLUMBVM. CAP. 96.

Plumbum usq; in cinerem crematum hoc loco intelligit Dioscorides. Rarus hodie eius est usus, nisi quod figuli eo utuntur.

RECREMENTVM PLUMBI. CAP. 97.

Plumbi σκωρία, siue recrementum, Germani Bleischlacken appellant.

PLUMBARIVS LAPIS. CAP. 98.

Λίθος μόλυβδος lapis est metallicus, colore plumbi, ex quo etiam Plumbum excoquitur. Germani Metallici illum Glanz appellant, Plinius etiam Galenam. Estq; pariter argenti & plumbi ferax uena.

STIBIVM. CAP. 99.

Stibium Græci σίμις & σίβις, pharmacopolæ Antimonium, Germani Spießglasß appellant, quod Plinius etiam lib. xxxiij. cap. vi. Alabastrum & Larbasum uocari scribit. Est autem scissile metallum, colore plumbi, cum prunis iniicitur, sulphuris modo liquefit, & foedum odorem remittit. Si diutius cremetur, tandem in plumbum transit.

*Vix est metallum, cum in laminas duci non possit, sed res metallica. Purgato hoc ad characteres fundendos typographi utuntur.

PLUMBAGO. CAP. 100.

Plumbaginem Græci μόλυβδαεναν uocant, Cuius duplex est genus. Fit enim quædam cum plumbo aurum, siue argentum purgatur. Estq; horum metallorum sæx, quæ ablata massa in fundo catini reperitur. Hæc Germanicè Test appellatur. Altera fossilis est, colore prædictæ non dissimilis, quæ plumbiferax uena est: nonnunquam etiam argenti. Eâ Germani Bleischweyß uocat. Plinius utraq; hæc plumbaginem, galenā etiam uocat:

Vtebantur

Vtebantur ueteres in emplastris Molybdæna, iam uero à Metallicis tantum cognoscitur.

* Quæ colorem lithargyri habet, aut fossilis aut factitia est: quæ plumbi, est lapis plumbarius, Galena fossilis Plinio.

ARGENTI RECREMENTVM. CAP. 101.

Argenti recrementum priuatim Græci *ἐλκυσμα*, Germani *Silberschlacken* uocant.

SPVMA ARGENTI. CAP. 102.

Argenti spuma Græcis *ἀργυρῆ*, pharmacopolis Lithargyrium, Germanis *Silberjaurum*, & *Gledt* uocatur. Duplex eius genus colore distinguitur. Quoddam enim aureo est colore, ideoq; Græcis *χρυσίτις*, pharmacopolis Lithargyrium auri, Germanis *Goldgledt* dicitur. Alterum colore argenteum candorem imitatur, quod Græcis *ἀργυρίτις*, pharmacopolis Lithargyrium argenti, Germanis *Silbergledt* nominatur. Est autem Lithargyrium plumbum nigrum, quod purgationis causa argento additur, cum argenti sordibus in spumam concretum.

CERVSSA. CAP. 103.

κίμυδιον Græci, Cerussa Latini, *Bleiweiß* Germani uocant. Et hæc plumbum est aceti acerrimi halitu in candidum pollinem resolutum. Hæc si uratur, donec rufum contrahat colorem, colorem facit, qui Sandix appellatur. Quem Vergilius intelligit, cum ait:

Sponte sua Sandix pascentes uestiet agnos.

Quo loco aliqui Sandicem herbam esse interpretati sunt, quæ lanas inficiat: sed male, quamuis ipse Plinius etiam crediderit Vergilium herbam intellexisse: quod tamen ex uerbis illius nullo modo colligi potest.

* Sandix est uulgarè minium.

CHRYSOCOLLA. CAP. 104.

Chrysocolle Germanis *Schifergrün* appellatur, qua olim pictores & aurifabri utebantur. Illi, quoniam iucundum haberet colorem: hi uerò ut aurum ferminarent, unde etiam nomen inuenit. Hodie nullum habet in Medicina usum.

* Humor est qui defluit per uenas auri & aris, & putrescit.

ARMENIVS LAPIS. CAP. 105.

Armenium, siue Armenius lapis, æruginosam habet substantiam, ideo ærugini quoq; secundum proportionem in uiribus respondet. Patissimè pharmacopole hæc lapidem habent, quidam tamen eundem Smaragdi nomine ostendunt, sed magno errore.

* Smaragdus pellucidus est, & sapore caret. Armenius Chrysocolle & Cœruleo cognatus est.

CŒRULEVS. CAP. 106.

κόκκινος, siue Cœruleum, Arabibus Lapis lazuli, Germanis *Lasurstein* uocatur. Duplex illius genus est. Vnum in aurifodinis inuenitur, uenis eius per lapidum commixturas in diuersas partes tendentibus. Alterum in maritimis quibusdam litoribus gignitur, crasso sabulo simile. Est etiam factitium, quo pictores tantum utuntur. In pharmacopoliis ex cœruleo pilulæ fiunt, quas de Lapide lazuli cognominant.

INDICVM. CAP. 107.

Male lapidis appellatio Indicò præponitur, neque enim lapis est, neq; terra, sed color in purpura cœruleus, propterea Dioscorides eum cœruleo coniungit. Est autem duplìcis differentię. Vna in India arundinibus adnascitur, ut scribit Dioscorides. Altera insectium, siue *βακτηρόν* appellatur, quæ apud nos à tinctoribus ex Indide herbæ præparatur, cuius florida spuma est, unde à Germanis *Weydtblüm* & *Indich* appellatur.

OCHRA. CAP. 108.

Ochralutei coloris terra est, quam Germani *Schergeel* uocant, cuius tres sunt differentię. Quoties Ochre colore plantarum flores à Dioscoride describuntur, non

pallidus color tantum, sed luteus etiam intelligendus est.

* Probatissima Goslarie effoditur.

CINNABARIS. CAP. 109.

Cinnabaris sine dubio est Gummi, siue exiccatus ille rubeus succus, qui in pharmacopoliis sanguis Draconis appellatur. Plinius ex Elephanto & Dracone pugna elisum & commixtum sanguinem esse credidit, uerum falsò, & mercatorum tabulis deceptus. Nostra ætate inuenium est, proceræ cuiusdam arboris in Aphrica genitæ Gummi, siue lachrymam esse. Fallitur Anto. Musa, dum putat nostrum Draconis sanguinem diuersum esse ab eo, qui à Serapione describitur, quoniam Serapio Sideritidis esse succum scribat. Qua in re errauit Serapio. Propterea non sequitur, quod sint res diuersæ.

* Natua ex arboribus fluit, & sanguis Draconis Arabice uocatur. Metallica propriè Minium uocatur. est autem uena argenti uiui. fit etiam factua ex argento uiuo & sulphure.

MINIUM.

Minium, cuius hoc capite meminit Dioscorides, uena est, ex qua Argentum uiuum conficitur, & alio uocabulo etiam *ἄνδραξ*, à colore uocatur, Germanis Bergzinner / & Quæd siuber eræ nominatur. Quod hodie ubiq; Minium à pharmacopoliis, & Germanis Denge dicitur, minime uerum est Minium, sed sandicis species, neq; unquam ex eo Argentum uiuum fieri potest, quod Minio proprium est.

ARGENTVM VIVVM. CAP. 110.

Argentum uiuum, siue Vena eius in marmore, siue per se inueniatur, idem est. Plinius Hydrargyron ab Argento uiuo distinguit, sed malè. Germanis Quæd siuber / pharmacopoliis Chimistis Mercurius appellatur.

RUBRICA SINOPICA. CAP. 111.

Μίλτ & *Σινωπικὴ* in Cappadocia olim effodiebatur, nunc uero in nullis pharmacopoliis habetur.

* Aliqui hodie pro uero bolo Armeno adferri putant.

FABRILIS RUBRICA. CAP. 112.

Fabrilis rubrica est rufa gleba, quam hodie Bolum appellamus. Huic etiam cognata est lapidosa ista terra, quam nos *Ῥόττει*, siue *Ῥόττειν* uocamus.

* Vna est natua: alia factua, *Βραυνοτ* ex Ochra cremata.

LEMNIA TERRA. CAP. 113.

Rarissime hodie Lemnia terra affertur. Mirum enim in modum adulteratur. Olim hæc Lemnia sphragis, id est, Sigillum appellabatur. Nunc uero Terræ sigillatæ appellatione in pharmacopoliis habetur, sed quæ minime uera sit.

ATRAMENTVM SVTORIVM. CAP. 114.

Atramentum sutorium Græci *χάλκανθον*, pharmacopolæ Vitriolum, Germani Kupferwasser appellant, multas habet differentias. Quoddam in stirias destillando concrescit, unde *σαλακτὶς*, *σαλακτικόν*, & *λοχνητόν* appellatur. Quoddam in glebas concrescit, quod *πηκτόν*, id est, gelatum uocatur. Tertium coquitur donec refrigeratum geletur, hoc *ἐφθόν* nominatur, & ubique habetur. Colore etiam distinguitur Chalcanthum. Est enim cœruleum, uiride, & candidum. Posterioris Dioscorides non meminit. Errat Antonius Musa, quum scribit Vitriolum Romanum nunc appellatum, ueterum Myfi esse. Olim coria sutores Chalcantho tingebant, unde apud Latinos nomen inuenit.

* Est aqua aluminosa, quæ destillauit per uenas areas, Stalactidem interpretantur Gogfel. Vide etiam in Additione ad Chalcitiam.

CHALCITIS. CAP. 115.

Quantum

Quantum ex Galeno conicere possumus, duplex est Chalcitis. Vna quæ in fodinis concreta inuenitur, Altera quæ ex Chalcantho fit. Vtraque hodie ignota est, quam uis in nostris ærariis fodinis reperiatur. Galenus cum scribit Chalcanthum etiam in Chalcitida paulatim mutari, incepta foris à superficie mutatione, non intelligit in superficie cuiusuis Chalcanthi colore in candidam seu pallidam substantiam resolui tam materiam, ut Musa falsò putat. Quapropter idem Musa immeritò reprehendit Galenum, qui ipse metallicas fodinas inspexit, & diligenter Chalcanthi in Chalcitida mutationem obseruauit.

* *Chalcites* Græcis alijs pyriten significat, sed additur lapis. alijs Chalcanthum ruffum, Rot Ruppferwaffer / nel Solet / inuenitur ex candidam Chalcanthum.

PSORICVM. CAP. 116.

Ψωριζόν compositio est, ex metallicis quibusdam medicamentis, contra scabiem facta, unde & nomen inuenit.

MISY. CAP. 117.

Misy non minus quam Chalcanthum, congelatus est humor, qui per commissuras Pyritidis, id est, ærarii lapidis, fluxit: Ibidem aliquandiu contentus in duram, sed interim friabilem substantiam concreuit. Est autem Misy gleba, substantia, sapore & uiribus Chalcantho similis aspectu, atque in friando arenosæ naturæ, colore aureo, stellatum & scintillarum ignis modo splendens. Fuit hoc medicamentum olim Galeni ætate in frequenti usu, à quo tempore usque ad nostram ætatem omnino incognitum fuit, nec adhuc à quoquam cognoscitur, uno atque altero excepto. Antonius Musa in suo de simplicibus examine scribit, Vitriolum uulgo appellatum in pharmacopoliis Romanum, uerum esse Misy, magno errore. Siquidem Vitriolum Romanum uiridissimum habet colorem, Misy aureum: nec est ulla in aspectu nota, quæ conueniat. Non animaduertit ille, Vitriolum Romanum illam esse Chalcanthi speciem, quæ Pecton uocatur, uiridi aut cæruleo colore, & sponte in fodinis concrescens, unde nomen inuenit. Verum autem Misy in maxima copia inueni Goslarie, cum in metallicas fodinas ibidem descendissem, omnino ea facie, colore, substantia & facultate, quibus à Dioscoride, Galeno & Plinio describitur. Cuius magnam quantitatem mecum Vuittenbergam attuli, sperans posse fieri, ut rursus in usum recipiatur.

* *Gelben Ruppferauß.*

ATRAMENTVM METALLICVM. CAP. 118.

Μελαντοπία pharmacopolæ adhuc Atramentum nigrum, siue griseum, Germani Atrament: appellant.

* *Vena est Chalcanthi, pura, non cocta: schwarz Ruppferauß.*

SORY. CAP. 119.

Σόρυ Melanteriæ cognata res esset, nisi ruffum magis colorem haberet. Pharmacopolæ Sory ostendunt sub Atramenti rubei nomine, Germani Rot Atrament uocant. Sciendum est Chalcanthum, Chalcitida, Misy, Melanteriam, & Sory, omnia ex una materia constare, nempe gelato humore, qui per lapides æs in se habentes, fluxit & destillauit, sed differre, secundum admixtam illi terræ diuersitatē, quo fit ut omnia illa in aqua cocta Chalcanthum remittant.

* *Hoc etiam uocant Schwarzgen Ruppferauß.*

DIPHRYGES. CAP. 120.

Triplex est Diphrygis genus. Primum luto simile quiddam est, & in cuniculis è terra eructatur, quod Dioscorides in sola Cypro gigni testatur. Sed hoc certò affirmare difficillimum est, cum tam spaciosum terrarum orbis, multa habeat loca omnium metallicorum medicamentorum feracia, quibus olim Cyprus nobilitata fuit. Inter quæ Germania iam diu principatum obtinet. Ipsum natium Diphryges non minus quam Cyprus gignens. Eructatur namque Goslarie è terra in cuniculis colore lu-

teum, substantia lentum glutinosum, & figulina cretae modo, tanto impetu, sed paulatim expuitur, ut lapillos etiam prodicens sursum attollat: natura & facultatibus Misfy respondet. Secundum saxæris est, quemadmodum Molybdæna auri & argenti. Tertium ex Pyrite lapide usto præparatur. Omnium tamẽ optimum est secundum, quod Germani *Schwebel* uocant, hodie nullum habet in Medicina usum. Pandectarius uehementer errat, quod Diphryga & lapidem Phrygium eandem rem esse scribit. Confundit enim hæc duo.

AVRIPIGMENTVM. CAP. 122.

Auripigmentum Græci *Αρσενικον* uocant, Germani *Auripigment* / siue *Sperment* *Goldgeel*. Chimistæ & pharmacopolæ Arsenicon ab Auripigmento hodie distinguunt. Nam Arsenici appellatione facta quædam ex metallicis quibusdam uenena indicant. Est autem apud Græcos & Latinos duplex Auripigmenti genus. Vnum in glebas concretum & lapidosum. Alterum in laminas, filile & purum. Hoc uero optimum est.

* *Arsenicum uulgare factitium est & chymicum.*

SANDARACHA. CAP. 123.

Sandaracha eandem habet cum Auripigmento materiam, & in iisdem fodinis, & in iisdem glebis inueniuntur. Differentia est quod flammeo colore, ut Cinnabaris metallica, fulgeat, propterea ab Arabibus Auripigmentum rubecum uocatur. Hodie in pharmacopoliis Gummi luniperi Sandaracha uocatur, maximo errore, & qui ab Arabum interpretibus originem duxerit, melius autem diceretur Sandarax. Antonius Musa, Georgium Agricola in Sandaracha reprehendit immerito, quoniam ipsius Agricolæ uerba de Sandaracha nullo modo intellexit.

* *Roter Schwefel / seu schwefel.*

ALVMEN. CAP. 125.

Alumen Græcis *Στυμφια*, Germanis *Alaun* uocatur. Multæ olim eius erant differentiae. Nos uero illud habemus, quod Græci *Βολιτιδα*, id est, glebosum, atq; hoc factitium. Nam ex natiuo glebofo scissile Alumen gignitur, quod flos ueluti illius est, uiribus efficacissimũ omnium. Antonius Musa errat, quod scribit Alumen scissile esse illud, quod hodie Alumẽ plumosum, siue de pluma uocatur. Nam omne Alumen in aqua resoluitur, & in igne exurit. Plumosum uero in aqua nunquam dissoluitur, neq; in igne mutatur, etiam si plumbus diebus cremaretur. Alumen scissile omnium efficacissimẽ totum os astringit, Alumen uero plumosum nihil omnino præter quod excicit. Quid uero Alumen de pluma sit, statim indicabitur, ubi ad lapides peruentum erit.

* *Alumen zucharinum sit & factitio subtilissimẽ trito & albumine oui. Boliitis, id est, glebosum, Arabes lamenum nominant. Pro omnibus speciebus uiri licebit nostro factitio.*

SVLPHVR. CAP. 124.

Θειον Græci Sulphur, Germani *Schwefel* appellant. Viuum Sulphur appellatur Græcis *αυρον*, quoniam ignem nondum expertum est. Tale existit omne fossile Sulphur, quod nondum liquefactum & in frustula fusum est.

* *Sulphur est adeps terræ, ideoq; in oleo resoluitur.*

PVMEX. CAP. 125.

Pumex lapis omnibus est notus, quem Græci *Κίονες*, Germani *Bimbe* appellant. Est autem lapis in ardentibus montibus natus, qualis in Melo, Lipara, Sicilia, & aliis quibusdã locis sunt, & quibus insulis & montibus mari expositis, nonnunquam in mare præcipitantur, cui postea innatant propter substantiæ raritatem, quod uident nautæ & mercatores, spumam maris esse pumicem credunt: sed falsò.

* *Alius est candidus, alius niger.*

SAL. CAP. 126.

Salis genera plurima sunt. Prima tamen diuisione in duo genera diuiditur. Quidã enim

fossilis est, & quidā factitius. Ex fossili olim maximē probabatur ad Medicinā Hamamoniacus, pro quo alius factitius eiusdē nominis irrepfit, aurifabris & rariis fabris quā Medicis utilior. Nunc uero ex fossili primam bonitatis notam habet, qui lucē transmittit, & in cubos dum frangitur se diuidit, quem gemmā salem Pharmacopoeia uocant.

* Marinus sal fit, cum marina aqua in lacubus concrefcit, Grob salz, Meer salz.

SALIS SPUMA, AVT LANUGO. CAP. 127.

Αλός ἄχνη, id est, Salis spuma, qua hodie omnino in nostris Pharmacopoliis caremus, quamuis etiam in nostris maris cautibus gignatur, ut in Suecia, Dania, & Noruegia.

* Est marina spuma densata, Meerblumen.

MURIA. CAP. 128.

Halme, id est, Muria, duplex est, Natiua & factitia. Natiua ex salinarum fontibus hauritur. Factitia eo modo præparatur, quo Columella docet. Germani Muriam factitiam Salzlaſchen. Natiuam uero Sali appellant.

* Non est Laſchen piſcium aut carnum, quod Garum uocari debet.

SALIS FLOS. CAP. 129.

Αλός ἄνθος in Aegypto Nili gignitur, & in aliis quibusdam locis. Quapropter nobis ignotus est.

* Non salis, sed maris florem interpretari oportebat: est autem nihil aliud quam Sperma ceti uulgo dictum. Dioscorides deſcribit crudum, nos præparatum habemus.

NITRUM. CAP. 130.

Nitri multæ sunt differentiae. Ex quibus etiam est quod hodie Salpetrae appellatur. Hoc substantiae tenuitate omne aliud Nitru antecellit, differtq; a ueterum, id est, uero nitro, quod salis modo candentibus testis prunisq; impositum, primum paucas bullas emittit, quibus cessantibus ipsum nitrum remanet, nec ab ipso igne accenditur aut consumi potest, sed salis modo tostum igni resistit. Nostri uero nitrum, quod ex nitrosae terrae diluto coquitur, contactu igne ocysissime flammam concipit, totumq; in aerem resoluitur. Hinc colligimus ualde esse tenuium partium. Nam gustatum quodque cum maxima tenuitate pungit, atq; copiosam ex alto saluam prouocat. Errant igitur, qui: nitrum frigidum esse pronunciant.

* Fel Nitri est nitrum arboreum, quo uti licet pro ueterum nitro.

SPUMA NITRI. CAP. 131.

Dupliciter huius medicamenti nomen profertur. Aut enim duobus separatim uocabulis Αφρονίτης nominatur, aut ex utroq; composito nomine ἀφρονίτης. Hinc Martialis in Apophoretis utrunq; illi nomen hoc disticho tribuit:

Rusticus es, nescis quid Græco nomine dicas,

Spuma uocor Nitri, dicor et Aphronitrum.

Gignitur autem duobus modis. Primum per se in cautibus cauernosis, nullo iuxta nascente nitro. Secundo autē, in ueri Nitri, quale in Aegypto habetur, acervis, superficietenus, in spumosa substantia resolutis eius glebis, quod ad nos omnino non adfertur, nec apud nos hactenus inuentum est. Primum uero in petris & antiquis muris ex nitroso tenuiq; humore in illis concepto gignitur, habetq; hoc duas ab inuicem diuersas species. Quod enim in petris nascitur, substantia habet magis terrestrem, ideoq; in testa prunis impositum, donec ipsa testa excanduerit, primum bullas agit, quibus atq; tolli desinentibus, id quod aqueum in eo erat, consumptum esse cognoscimus, quo consumpto quod terrestre est, salis & ueri nitri modo remanet. Hinc dicit Dioscorides, paulo post principium, quod utrunq; tam nitru quam spuma nitri, salis modo torreatur, uel crementur. Porro Aphronitru in antiquis muris nascentem, iam dicto aspectu simile est, colore candidissimum, substantia uero multo tenuiore, quam in petris natu constat. Ideoq; factitii nostratis nitri instar prunis inspersum, facillime flammam concipit, totumq; in flammam, fumum & aerem resoluitur: capelle uehementer huius linctu delectatur.

Nouisse autem oportet, omne nitrum quod accendi potest, nō esse illud nitrum quod ueteres describunt. Color uerō tam nitro quam Aphronitro non ubique terrarum idem est. Alibi enim rubent, alibi ad purpuram inclinant. At Aphronitrū quod Ihe-
nā cauernosis cautibus adnascitur, partim cinereo, partim candidissimo conficitur co-
lore, atq; hoc triticeæ farinæ aspectu simile est, ut etiam Galenus scribit. Quod autem
antiquis muris efflorescit, nunquam alio quam candido conspexi colore.

FAEX. CAP. 132.

Fæcis appellatione hoc loco Vini & Aceti facem intelligit Dioscorides. Est autē
Fæx horum liquorum sedimentum, quod Germani Deseu appellant.

CALX. CAP. 133.

Ασβής Græcè inextincta Calx appellatur, Germanicè vngelgeschter Kalk. Cre-
matur & Calx ex marinis buccinis, ut in maritima Germaniæ ora, ubi omnia ædificia,
tam publica quam priuata, huiusmodi calce extruuntur. In mediterraneis locis ex al-
bo lapide & marmoris genere quodam uiliore paratur.

* Calcarius lapis est de specie Marmoris.

GYPSVM. CAP. 134.

Gypsum in multa genera diuiditur. Quoddam in longos & rectos pectines fini-
ditur: quoddam uerō in laminas, quod idem est cum Aphrofelino, siue speculari lapi-
de. Quoddam etiā in glebas magnas concreuit. Omnia hæc genera Germani Gips
uocant.

* Gypsum aliud est Scissile, aliud alabastru simile, ex lapide speculari etiam, quem Erdglaß uocant, sit optimum
Gypsum.

SARMENTORVM VITIVM CINIS. CAP. 135.

Sarmenta uitis omnibus nota sunt, ex quibus Cinis lixiuig causa uritur: quamuis
ipse etiam Cinis per se Medicinam faciat.

ALCYONIVM. CAP. 136.

Αλκυονίον marinæ spumæ species est, propterea in Pharmacopoliis spuma maris uo-
catur, cuius quinque habentur differentiæ. * Meer-schaum.

ADARCES. CAP. 137.

Αδάρκης quoque, uel Pericalamitis, spumosum quiddam est, quod Itali Passam ma-
rinam uocant:

SPONGIÆ. CAP. 138.

Spongiæ omnibus notæ sunt, quibus mensæ & alia quædam exterguntur, Germa-
nicæ Sdyremme uocantur: quo nomine etiam Fungi continentur.

CORALLIVM. CAP. 139.

Corallium lapideus frutex est in marinus, cuius tres species triplici colore distin-
guuntur. Est enim nigrum, candidum & rufum, Omnes Germanicè Corallen ap-
pellantur. CAP. 140. Vulgatius est rufum, & preciosius candidum. Nigrum rarè inuenitur,
& priuatim ἀντριάς uocatur, Theophrasto memoratum:

PHRYGIUS LAPIS. CAP. 141.

Qualis sit lapis Phrygius, hodie omnino incognitum est, quamuis in omnibus fe-
rè Pharmacopoliis habeatur sub lapide Lyncis nomine. At cum duo sint lapides Lyn-
cis appellatione uenientes, necesse est ut indicem, uter horum Phrygius sit. Primus
itaque instar digiti oblongus atque teres est, & in mucronem desinit. Alter uerò aspe-
ctu terræ glebam pumicosam & laxam imitatur, mediamq; inter lapidem & terram
substantiam habet: colore est pallidus aut subfuscus, candidisq; maculis & lineis ue-
luti situm contraxisset, distinguitur. Posteriorem hunc Phrygium lapidem esse cense-
mus.

mus. Author Pandectarum atq; Serapio Diphryges & Phrygium lapidem confuderunt, eandem rem esse falsò existimantes.

LAPIS ASSIVS. CAP. 142.

Assius lapis in Asso Troadis promontorio inuenitur, unde nomen inuenit. Hodie uerò ignotus est.

*Idem Sarcophagus appellatur. Germanicè Walslein / lapis laxus & rarus. sed aliqui etiam Arabicum lapidē qui candidi coloris sit, Walslein interpretantur.

PYRITES LAPIS. CAP. 143.

Pyrites lapis, Arabibus Marchasita, Germanis Äiſſ uocatur, cuius multæ sunt species, metallicæ rei peritis cognitæ.

*Vnus est aurei coloris, Golt oder Gupffer Fieß: alius argentei.

HAEMATITES. CAP. 144.

Hæmatites lapis nomen suū in Pharmacopoliis retinet, & Germanicè Blütstein appellatur, cuius multæ species à Plinio enumerantur, quæ omnes in Hercyniæ Saxoniarum montibus gignuntur, una tantum excepta.

*Nomen ei uel à colore, uel ab effectu, idem cum ferro temperamentum habet, cum aliqua tamen caliditate. Bonus non statim debet resolui. Ambergi ex nigro sit ferrum.

SCHISTVS. CAP. 145.

Schistus scissilis est lapis, substantia & uiribus Hæmatiti similis, colore tamen magis pallido, & uiribus secundum proportionem debilioribus ab illo dignoscitur.

GAGATES. CAP. 146.

Gagates & Thracius lapis substantia & uiribus ualde similes sunt. Vterq; enim ex bituminosa materia constat. Distinguuntur inuicem formæ diuersitate. Gagates enim crustaceus est. Thracius uerò sibi ipsi undiq; æqualis. Porro lapidis Gagatæ species est; qui copiose in Germaniæ montibus inuenitur, & quo fabri æarii & ferrarii pro carbonibus utuntur, quod ex substantia, odore, uiribus & forma demonstrari potest. Germanicè hi lapides Steinfölen appellantur. Hoc Gagatæ genus Theophrastus ἄρδζακας γαδολας uocat. Vide mox in Thracio.

THRACIVS LAPIS. CAP. 147.

Thracius lapis idem est cum succino nigro, quod nos Schwartz Augstein appellamus.

*Aliqui Chalcanthum uocant Augstein / id est, Ophthalmicum lapidem. Succinum uero Augstein / nescio quæ ætymologia. Thracium aliqui putant Anthracium quoq; dici. Vide proximè retro in Gagatæ.

MAGNES LAPIS. CAP. 148.

Magnes lapis in multis Germaniæ locis inuenitur, propterea omnibus notus est; Germanicè Maquech & Etjenbraut uocatur. Nascitur in Misnie montibus, & in Hercynia Saxoniarum, prope Harzburgum, milliare Germanicum à Goslaria distantem arcem, & ab eius loci incolis Segelsfeyn appellatur, quod nautæ eo utantur.

ARABICVS, GALACTITES, MELITITES, MOROCHTHVS, ALABA-

strites, & Thyites lapides. CAP. 149. 150. 151. 152. 153. 154.

Arabicus, Galactites, Melitites, Morochthus, Alabastrites, & Thyites, hodie omnino incogniti sunt lapides: quamuis ad Thyiten etiam referri possit lapis, qui Stolpæ nascitur, duritie sua etiam ferrum durissimum respuens. Ex hoc olim mortaria fiebant, unde & nomen inuenit. Porro Galactites Hildenshemii gignitur, iisdem forma, substantia & uiribus, quas illi Dioscorides tribuit. aliqui uiridi colore describunt, sed malè. Arabicus quoque, quamuis non cognoscatur, Hildenshemii in montibus inuenitur, partim candidissimo, partim maculoso ebori similis. Vstus exasperatur, ideoq; optimum dentifricium existit.

*Arabicus

ANNOTAT VALERII CORDI

* Arabicus alius est cinerei coloris: alius candidi, quem Germanicè Walslein uocant: quanquam & Asium lapidem aliqui Walslein interpretantur. Alabastrites uel Onyx (quanquam & gemma Onyx est) hodie Alabastrum uulgo dicitur, & marmor candidum: est enim marmoris species. Alabaſter, weißer Marmelstein. Thytes est uiridis, & remittit lacteum liquorem: Auicenna uocat lapidem Nigrorum & Aethiopum.

IUDAICVS LAPIS. CAP. 155.

Iudaicus, qui etiam Balanites, Phœnicites, Tecolithus & Eurios appellatur, adhuc in Pharmacopoliis Iudaici nomine habetur. Plinius ex eo lapide quatuor fecit lapides, nominum diuersitate deceptus. Est autem insigni & mirabili forma lapis, in quo solo naturæ artificium cognosci potest.

* Species una est figura glandis, unde & Balanites dicitur: altera similis uertebrae piscium.

AMIAANTVS LAPIS. CAP. 156.

Amiantus lapis sine dubio est scissilis ille & friabilis lapis, quem Pharmacopola Alumenum plumosum uocant, qui eam habet naturam, ut igne nunquam consumatur, etiam si aliquot diebus cremetur. Multae eius differentiae sunt. Inuenitur interdum flexilis, ut fila & tela ex eo fieri possint. Agyrtæ pilos Salamandrae esse dicunt, sed falsò. Est enim lapis qui ex montibus effoditur. Plinius Indici cuiusdam lini meminit, quod igne consumi non possit: sed mercatorum fabulis deceptus. Nam idem est cum Amianto linum illud. Germanice hic lapis Federweiß. Steinflachs. Steindacht. vnd das Erwig ltecht appellatur. Est & alius Amiantus, qui in laminas finditur, ut lapis specularis, sed huius nullam facit mentionem Dioscorides.

* Videtur descriptio Amianti lapidi speculari potius convenire, nam in igne non consumitur, & purior redditur. Aliqui uocant Reujsisch glasz. Veteres Amiantum, etiam Thernitum uocant.

SAPPHIRVS. CAP. 157.

Sapphirus gemma est omnibus nota, cuius plures sunt species, uulgo Saphir uocatur.

MEMPHITES. CAP. 158.

Memphites circa Memphim urbem Aegypti inuenitur. Hodie uerò omnino incognitus est.

SELENITES. CAP. 159.

Selenites qui alio nomine Aphroselenus uocatur, idem est cum speculari lapide, quem Germani vñier Frauen Eiß & Erdglasz appellant. Finditur in laminas, ex quibus olim fenestrae fiebant, quales adhuc in uetustis templis & edificiis uidemus.

* Vide suprad in Amianto.

IASPIS. CAP. 160.

Iaspis multas habet species, quæ colore distinguuntur, hodie tantum notus est qui ad rufum colorem inclinat, Ienæ pluribusq; aliis locis in Germania nascens.

AETITES. CAP. 161.

Aetites non in Aquilarum nidis gignitur, sed in montibus & saxorum commissuris inuenitur. Germanicè Adlers stein uocatur.

OPHITES. CAP. 162.

Ophites multas habet differentias: Qui uerò cinereo est colore, & maculis distinctus, in Germania etiam inuenitur, & uulgo Schlangenstein appellatur, è quo cochlearia & pocula fiunt, quæ contra uenena uim habere creduntur. Diui Bennonis monumentum quatuor columnis ex Ophite factis sustentabatur Misnae in arcis templo, quod hoc anno destructum est.

Porro Ophites, cui grauitatem Dioscorides tribuit, hodie omnino non cognoscitur, dubiumq; est utrum ea uox βαρύς, id est, grauis, ad pondus an ad odoris grauitatem referenda sit. Porro Hildenshemii marmor planum ceditur, maculis atq; etiam squamis serpentinis similibus cõstans, odore cum teritur graui ustum cornu, simulq; putrida

putrida omnia referenti, qui etiam eo odore alioquin saluberrimum fontem sub huius marmoris petra largis undis scaturientem inficit. Nam ieiuno stomacho haustus, rursus cit, odorem & laporem ipsius lapidis referentes. Porro hoc marmor sine dubio est Ophitis species. Hinc colligitur, grauitatem non ad pondus, sed ad odorem referendam esse, cum alias terè omnes lapides ponderosi sint.

SPONGIARVM LAPIDES. CAP. 163.

In Spongiis testacei inueniuntur lapides, qui in Pharmacopoliis adhuc habentur.

LITHOCOLLA. CAP. 164.

Lithocolla gluten est, quo Lapideæ lapides fractos conglutinant. Germanicè *Steinleim* uocatur, cuius plures sunt confectiones.

OSTRACITES. CAP. 165.

Ostracites Hildenshemii nascitur substantia et asperitate testas lateresq; imitatur, atque percussus eorum modo resonat, concretione planus est, sibi ipsi crebris ceu lateribus interpositus, *forse impositum.*

SMYRIS LAPIS. CAP. 166.

Smyris duritia Adamanti proximus est, ideoq; Gemmaris utroque gemmas possiunt. Vitrum etiam eo finditur. Germanicè *Schmirgel* siue *Schmirril* uocatur.

*Aliqui *Smyrillum* uocant.

ARENA LITTORALIS. CAP. 167.

Hoc loco intelligenda est Harena, quæ in marinis littoribus inuenitur.

COS NAXIA. CAP. 68.

Naxiæ cotes in Cypro olim inueniebantur, nobis pro eis alias accipere licet, quæ simile habeant temperamentum.

GEODES LAPIS. CAP. 169.

Geodes lapis Aëtite cognatus est. Quæmododum enim Aëtites lapidem, ita Geodes terram in se complectitur, propterea à Græcis *γῆδης*, & à Germanis *Erdslein* uocatur. Gignitur in Misnia non procul à Dresda, & in Saxonia prope Hildenshemiam urbem.

TERRA. CAP. 170. *etc. usq; ad 178.*

Eretria, Samia, lapis in Samia terra repertus, Chia & Selenusia terræ hodie omnino non afferuntur. Cimolia uerò Creta etiam appellatur, cuius duplex genus colore distinguitur. Est enim purpurascens altera, & candida altera, hanc Cretam Latini, & Germani *Kreiden* siue *Chint* appellant. Afferitur ex Anglia.

*Pro terris illis ueterum, quæ ad nos non afferuntur, aliæ apud nos nascentes substitui possunt.

MARINAE TESTAE. CAP. 178.

In maritimis locis & littoribus ex salis aspersione, terra & calculis testacea corpora concresecunt, quæ Dioscorides hoc loco intelligit.

TERRA EX FURNACIBVS. CAP. 179.

Fornacum terra omnibus nota est, quam Germani *Ofen leymen* siue *Back ofen leymen* uocant. Non tamen intelligenda est terra, siue lutum ex quo fornaces fiunt, sed ea quæ iam in fornacibus longo tempore exusta est.

MELIA TERRA. CAP. 180.

Ex Melo insula olim terra hæc in alias terras ferebatur. Nunc illi cognata quædam alia ex Tripoli Aphricæ afferitur, temperamento, uiribus & substantia Meliam referens, qua Barbiton fores in extergendis peluibus utuntur. Ipsa tamen Hildeshemii inuenitur, ea substantia, colore, strepitu, & abstergendi ui, quibus hic describitur. Plinius candidæ etiam meminit, quæ Melini nomine & ipsa ibidem reperitur.

AMPELIA

AMPELITIS TERRA. CAP. 181.

Ampelitis, siue Pharmacitis terra, Bituminosam habet substantiam, & gagatis modo crustacea est, & in affulas finditur. Scissilis talis apud nos etiam cum fossilibus carbonibus (quos gagatis speciem esse dixi) ex montibus eruitur Zuccaue in Mishie finibus, & Aquisgrani in inferiori Germania à fabris lignariis *Schwarze Kreide* id est, Nigra creta appellatur.

FVLIGO CAP. 182.

Ασβόλη Græcis, Fuligo dicitur, *Schmutze* & *Kienrauch* Germanis. In primo libro de Fuligine dictum est, quæ ex pinguibus rebus conficitur. Hoc uero loco eam Fuliginem intelligit Dioscorides, quæ in Vitrariis officinis ex siccis lignis flamma re solutis gignitur. Inuenitur etiam pinguis, lenta, & in nigras massas pici similes concreta Fuligo, maxime in rusticis ædibus, trabibus supra focum adherens, quæ ex humidis lignis fit, & Germanis *Kuß* appellatur, acrimonia prædictam superans.

ATRAMENTVM LIBRARIVM. CAP. 183.

Omnibus notum est quo scribimus Atramentum. Hodie tamen alia ratione fit, quam qua Dioscorides docet.

Finis Annotationum Valerii Cordi in
Dioscoridem.

Hieronymo Heroldo Lipsensi, rei-

PVB. NORIMBERGENSIS MEDICO DO-
ctissimo, experientissimoq; CONRADVS GESNERVS medicus S. D.

De libris quatuor Valerij Cordi, quibus stirpes uarias, earumq; partes describit. De
adnotatiunculis adiectis, nominibus ab authore confectis, et eiconibus.



EMITTO humanitati tuæ nunc tandem clarissime
HEROLDE, diligentissimi desideratissimiq; VALERII
CORDI tui, quatuor illos sanè egregios, quibus uari
plantarū generis descriptiones accuratissimè persequi-
tur, libros, quos cum tu superiori anno liberaliter mihi
communicasses, utq; publicæ utilitatis ergo typis excu-
di efficerem, hortatus esses: ego mox reliquos etiam e-
iusdem authoris libros inquirere cœpi, ut pleraque eius
scripta uno uolumine concluderentur. In ea cogitatio-

ne dum uersor, commodum & insperatò mihi à præstantissimo medico Ioanne Pla-
cotomo, libri aliquot Cordi offeruntur; inter quos iidem quoq; De stirpibus libri e-
rant, uisq; ipsius authoris manu, sed prima festinataq; perscripti: ita ut quædam, nisi
apographo tuo adhibito, legi non facile à quouis potuissent. Videtur autem circa
annum à nato Domino quadringentesimum supra mille quingentos hæc condidisse.
Opus quidem cum aliàs imperfectum apparet, tum lacunis alicubi relictis (pro
quibus nos asteriscos inseruimus) dissitum & hiulcum: quarum tamen pleraq; ab
harum rerū studiosis obseruatoribus poterunt aliquando suppleri. Ipse, si uixisset,
emendaturus pleraq; ac suppleturus, si licuisset, erat. Ego quaecumq; est, publica lu-
ce dignum iudicauī, non minus (in suo quidem genere) quàm olim Aeneidem Au-
gustus. Parcent igitur operi posthumo ambitioni homines, & cornicum oculos con-
figere soliti, qui ut aliquid esse uideantur, nodum uel in scirpo quærunt: et reprehen-
dendis hisce libris, quibus extremam manum imponere authori non permiscere fa-
ta, abstinebunt. Sed mihi quoq; uitio non uertent, si quædam emendanda fortè præ-
teriuui. non meum enim hunc fœrum, sed alienū edo: in quo ingenium meum osten-
tare non libebat, neque vacabat, sed ne decuisset quidem opinor. Adnotatiuncu-
las illas breuissimas, quæ ad margines paginarum, uel ad principia aut fines capi-
tum leguntur, pleraq; ut reperi, partim in autographo Cordi, non ab ipso, sed do-
cto quodam uiro eiusq; nominis studioso (pro suo in singulis iudicio, præsertim
circa Germanica nomina:) partim in alio exemplari, similiter ab erudito quodam
adscriptas, reliqui. De meo pauca quædam sparsim addidi, nec ulla separauī nora.
Quod ad stirpium aliquot nomina à Cordo confecta attinet, ubi uetera Græca La-
tinæ uel non reperiēbat, monui ubique Lectorem, ne quis imperitior quam ut anti-
quæ nouis discernere ualeat, intricaretur. Finxit autem pleraq; omnia aptè, & ita
ut rerum quæ nominantur naturis perpulchrè congruant, eiusmodi quidem nomi-
narebus indere, ubi antiqua de sunt aut ignorantur, hominem philosophum & qui
rerum naturas calleat, maximè decet. Horum pauca quædam, in quibus Græcæ lin-
guæ proprietas & analogia non satis obseruatur, suis locis notaui, ita ut quo-
modo aptius formari possint, indicaremus. Eicones stirpium, ut nouit præstan-
tia tua, nullæ ab eo expressæ fuerūt: quas ego passim addendas curauī, ut hoc etiam
ornamentum libris eius accederet, idque eò libentius feci, quoniam Iosias Riheli-
us (Argentinenfis typographus, de bonis literis præclarè meritis, & inter alias
optimi parentis Vuendelini uirtutes huius etiam laudis heres, quòd multos subin-
de egregios diuersis in linguis codices suis prælis excudat) qui typis suis impri-

Adnotati-
uncule.

Nomina
stirpium.

Eicones.

mendum hoc uolumen susceperat, permultas iam prius imagines sculptas in prom-
 ptu habebat, quibus in publicandis De natura stirpium eruditus et copiosis illis Hieronymi Tragicommentariis, Germanica Latinâque lingua, Vuendelinus pater usus
 est. Subiui igitur non inuitus hunc laborem, ut quæ nam in Tragi libris propo-
 sitæ eicones, quibus à Cordo descriptis plantis congruerent, inquirerem & notarem:
 quod in nonnullis præstare satis difficile erat, ubi scilicet res una nominibus longè
 diuersis ab utroque describitur. His autem, quæ ex Tragi opere desumptæ sunt
 imaginibus, Tragi nomen, unâ cum libri, capitis, pagineque numero adscribere uo-
 lui: quo uidelicet ita non solum appareat, unda petita sit pictura: uerum etiam si quis
 plura de eadem stirpe cognoscere cupiat, mox inueniat locum. Porro præter has ei-
 cones, adieci nonnullas ex aliorum, qui hodie imaginibus stirpium insignes extant,
 libris, denique de meo stirpium pictarum thesauro, decemque, quarum lo. Kentmannus
 illustris medicus Torgæ apud Misenos candidissimè me participem fecit, multis sa-
 nè et raris, plerasque reliquas addidi: idque adeo non minus libenter et iucundè per-
 feci, quàm si uiuenti ipsi Cordo (cuius etiam memoriam còlo) impartiri eas mihi li-
 cuisset. Sacchari arundinis effigiem è Cosmographia Munsteri mutuatus sum.
 Quòd si ex his picturis aliquæ non admodum accuratæ aut elegantes uidebuntur,
 Lectorem tamen plerumque omnes, ut ad rerum ignotarum cognitionem facilius per-
 ueniat, promoueunt. Quòd uerò nonnullis Cordi descriptionibus eicones nullæ
 adiectæ sint, causa est, quoniam stirpes aliquæ (quamuis notæ mihi) hoc tempore
 haberi non potuerunt, uel quia aliquæ, ut nihil dissimulem, adhuc mihi incognitæ
 sunt, aut esse uidentur. Forte enim aliquas earum noui, non tamen ex istis tum no-
 minibus tum descriptionibus statim agnoscere potui. alicubi etiam picturæ quæ-
 dam minime necessaria mihi uisæ sunt, ut ubi proximè alia eiusdem generis & per
 omnia ferè similis proponitur pictura. Quare cum Nigellæ effigiem posuerim, illi-
 us quam Damascenam cognominant, omisi. Hoc certè quantum in me fuit per-
 ficere studui, ut Cordi lucubrationes hæcenus suppressæ, quibus medicamento-
 rum simplicium natura illustratur, in publicum usum ac lucem tanquam è tenebris
 productæ simul alijs prodesse, simul sui conditoris nomen celebrarent: & inter
 Germanos qui editis nostra memoria libris rem herbariâ excoluerunt, (ut sunt præ-
 cipuè Otho Brûtfellius, Leonhartus Fuchsius, Hieronymus Tragus, Adamus Lo-
 nicerus: et nuper uno alteroque libello etiam Antonius Schneebergerus eius meus,
 qui nunc Vilnæ in Polonia medendi artè egregie exercet, Valerius Cordus quoque me-
 ritò neque postremo loco, nominaretur. Et quoniâ tibi in primis doctissime Herolde,
 Cordi existimationem ac famam curæ esse sciebam, tum hanc ob causam: tum quia
 æquum erat, & gratitudinis officium postulabat, ut â te primo communicati mihi
 huius authoris libri, ad te quoque primum redirent, in tuo tanquam optimi patroni
 nomine eos apparere uoluî. Remitto igitur tibi sortem tuam cum usura ferè parâ,
 nempe alijs Cordi libris, & in eos quos tu miseris eiconibus scholijsque adiunctis.
 Spero autem te diligentiam meam, non quidem summam aut exquisitam, sed quan-
 tam hoc tempore præstare mihi licebat, boni consulturum: & si quid inciderit tibi
 per otium ad hæc legenda diuertenti, quod emendandum existimes: aut si addenda
 aliqua eicon communicari abs te queat, id omnino facturum, quod ego de humani-
 tate tua mihi polliceor: & quod præcipuum est Cordi nostri famam honorare, &
 Gesnerum tuum amare perpetuò dignaturum. Vale, Tiguri. VII. Cal. Decem-
 bris, Anno M. D. LIX.

VALERII

VALERII CORDI SIMESIJ, Historiæ plantarum, liber I. qui est de herbis diuersis.

*Provida quas hominum causa natura creavit,
Pulchrius est rerum cognitione nihil.*

DE RORELLA SIVE SALSIRORA, [*que ab alijs Ros Solis dicitur.*] CAP. I.



RORELLA habet minima, septem uel octo numero, plura interdum, & interdum pauciora, longis et rubentibus pediculis in orbem per terram sparsa, leniter plerumque, quæ

cælum spectant, concaua & hirsuta, ceu rubentis capillo uestita, coeque in medio breuiori, in ambitu uero longiori: liccissimis etiam temporibus ceu roris minutissimas guttas et aspergines habentia: sapore acri, nitent & glabra omnino sunt ex inferiore parte foliola, habentque tota minimice Calearis figuram: è medio uero foliorum coliculus exit do drante breuior, gracilis, rubescens, & sine ramulis, in summo paruos & pallidos flosculos sustinens, radículas habet paucas, breues, & capilli modo tenuissimas. Nascitur uliginosis & palustribus arenis. Habent folia, caules, & flosculi, acerbum, leniter acetosum & modice acrem saporem.



DE LIMNÉSIO SIVE CENTAVRIDE,
[*que uulgo Gratiola dicitur.*] CAP. II.

CENTAVRIDE ab uno radice cespitem multos erigit, teretes & do drantem altos, interdum uero altiores: in quibus folia centauro minori, hyperico, uel ascyro similia, longiora tamen, & ad hyssopi foliorum longitudinem accedentia, leniter per ambitum incisa, quatuor uersibus usque ad summum cacumen nascuntur. in quorum alis flores singulos oblongos, inferius ubi pediculo iunguntur, sul flauos, cætera candidos, & quatuor foliolis constantes producit: quorum inferiora tria clausa & contracta plerumque sunt, superius uero expansum ac sursum reflexum. quibus singulis singuli succedunt fructus, anagallidis fructui magnitudine æquales, sed oblongiores, & in turbinem desinentes, semina minima intra se claudentes. Radices candidas transversas & multas in terra spargit, graminis similes, crassiores tamen & crebrius geniculatas: a quibus plurime hellebori modo descendunt fibræ. saporem habet tota herba ualde amarum. ac omnino nihil (quod sensu percipi possit) adstrin-



gentem. purgat egregiè bilem & pituitam, nihil interanea lædens: quoniam horribili isto ac ingrato odore, quo cætera purgantia medicamenta prædita sunt, caret.


DE SAGITTA SIVE SAGITTALI, [*Sagittam inter ulnas
appellamus, quam Mago dicit Pistanam à Grecis appellari, &c.
Plinius lib. 21. cap. 17.*] CAP. III.

SAGITTA pediculos habet triquetros, intus raros & spongiosos, bicubita= les, interdum longiores, breuiorésq; secundum lacuum in quibus nascitur altitudinem. iis in summo triplici acumine folia alata sagittæ modo præfixa sunt: inter quæ caulis erumpit foliorum pediculis altitudine fere æqualis, & ipse rarus, spongiosus, rectus, & læuore insignis, in quo per interualla terni plerumq; candidi et tribus foliolis constantes contrariis pediculis nascuntur flores: quibus punicea intus sunt stamina, floribus subnascuntur hirsutæ et castanæ magnitudine pilulæ: quarum exterior pars tota copioso, plano, & tenui semine constat: in medio uerò globulus rotundus est, cui annectitur semen. radices habet multas, hellebori fibris similes, colore pallidas. Nascitur in lacubus & stagnantibus undis.

* *Telum Iouis in Albi.*

Sagitta.

Bistorta. Trag. 1. 105. pag. 321.



DE BISTORTA. CAP. IIII.

BISTORTA in triquetris pediculis folia circa radicem profert, tumici equa lia, acutiora tantum, superius uiridi, inferius candido ad cinericeum inclinante colore: è basi in utroq; pediculi latere deorsum fastigiata, & sinuosa: inter quæ cau- les affurgunt solidi, geniculati, & bicubitali ferè longitudine: quem singula ex geniculis prodeuntia ac sursum nascentia folia amplectuntur, inferioribus multo mino- ra: in summo minutos, candidos, & modicè purpurascens flores in spica disposi- tos ferunt: quibus triquetra, similia lapathi seminibus, sed maiora semina succedūt. radicem habet pollice crassiorē ceu geniculis distinctam, bis in sinum detortam ac inflexam: cui foris est nigricans, intus uerò in candido rubescens color. Adstringūt gustata, radix, et semen. folia præterquam quòd paululum etiam adstringunt, lubri- ca & glutinosa gustu percipiuntur. Nascitur pinguibus & lutosis pratis, nonnun- quam etiam in syluis antiquis.

DE CARDVO SPHAERO CEPHALO, [Spinam albam in Italia quidam
hodie uocant. querendū an Echinopus ueterum sit.] CAP. V.

SPHAER O Cephalus Carduus multa ab una radice folia mittit, pedali & ali-
quando maiore longitudine, latitudine pedis dimidi utrinq; aliquoties profun-



dis & spinam ferre cōtingentibus incisuris diuisa, per ambitum breuius nec adeo infestis aculeis armata, superius uiridia, inferius candidante lanugine obducta. Caules posthæc ab una radice duos aut tres, interdum etiam plures erigit, altitudine duorum triumue cubitorum, solidos robustosque intus ceu sambuci medullam habentes, rubente & tactu glutinosa lanugine uestitos, quæ digitis ad caules confricata odorem aliquem remittit. Caulibus folia (prius descriptis, similia) per interualla adnascuntur, minora quo

summitati propiora: è quorum alis circa superiorem caulium partem ramuli oriuntur. pilæ magnitudine, rotunda, hirsuta & aculeata capitula ferentes. Flores undiq; ex singulis capitulorum aculeis singuli nascuntur, colore candidi (aut ferruginei) quinque oblongis & ualde exiguis foliolis constantes. Habent etiam singuli (cum aperiuntur) flores singula cœrulea stamina: quorum deinde summitates in duos paruos et reflexos apices finduntur. Flores ex superiore capitulorum parte prius erumpunt. Ultimo autem inferius ubi ramulis iunguntur, quapropter particulatim & inæqualiter enascuntur flores, qui ubi defluerint in aculeis foramina relinquunt, quibus semina oblonga, candida, hirsuta & aspera lana ceu amianto obducta, includuntur. Radicem habet longam, crassam, & intus omnino lignosam. Folia & semina sapore leniter amara sunt. Nascitur saxosis & fluuiis imminuentibus collibus.

* *Crocodylium uidetur.*

DE SENA.


CAP. VI.

SENA caulem erigit cubitali altitudine paucis ramis fruticosum, foliis in singulis pediculis utrinque tribus uel quatuor binis semper per interualla ex contrario & rubente annexu erumpentibus, Portulacæ foliis figura similibus. In supremo pediculo nullo inter utrumque ordinem intercedente, quod (ut in reliquis siliquis ferentibus herbis fit) parem numerum turbet. Ex pediculorum alis (in quibus folia nascuntur) alii indiuidui & singulares prodeunt ramuli, circa quos ex interuallo dispositi sunt lutei & pallescentes flores, quinque foliis in concauitatem aliquam reflexis, constan

constantes eiusdem coloris stamina habentes, è quorum medio sursum incurvatum corniculum prominet, quod paulatim in latam, & lanam & compactam excrescit siliquam, sex uel septem cordis figura, & nigrescente colore semina intra se cludente. radice nititur oblonga, tenui, lignosa et inutili, odore ingrato tota herba sentitur, ut Cynoglossa & punice folia. flori stamina prius, deinde folia decidunt. Radice nititur tenui flavescente & inutili. Aestiuu est herba.

Sen. T. 3. p. 964.

Piperitis. Trag. 2. 148 p. o. 8.




DE PIPERITIDE SIVE SILIQVASTRO. Peruniano, [Capsico fortè
aut Cardamomo Arabico, cognata planta.] CAP. VII.

PIPERITIS caulem erigit cubitalem, minimi digiti crassitudine, in angulos striatum & circa foliorum ramorumq; eruptiones in purpureo colore nigricantem, intus seu sambuci medulla farctum. in summo in duos seu tres ramos similiter striata os diuisum, qui rursus in minores diuiduntur. oblongis foliis constat, in posteriore parte trium plerumq; & quatuor digitorum latitudine, in mucronem fastigiatum, quo fit ut mediam habeant lauri & folani foliorum similitudinem. flores ex alis ramulorum erumpunt candidi, quinque aut sex foliis stellæ modo dispositis. constantes paucis in medio staminibus, quibus amissis ex caliculis teretia & sine commissuris succrescunt ceu siliquæ, uascula longitudine digitali, latitudine uero pollicari (& interdum latiore) sensim in turbinem seu mucronem desinentia, principio uiridia.

P. iiii

cum autem maturuerint ruffa aut punicea, nitentia & deorsum, ut flores ipsi pendencia. quæ cultello in longitudinem aperta plurima in flauo candida, compressa & Lenti similia semina sed tenuiora ostendunt membranæ crassæ ceu callo per media uascula transeunti adnata constant intus uascula & calli pingui & succosa substantia quæ uetustate in puluerem resoluitur. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, & in minimas fibras diuisis: seritur fictilibus uasculis. radices, caulis, folia & flores nullam fatu dignam saporis qualitatem habent. uascula uero cū seminibus & quod carnosum in medio est acerrimo sapore linguam uellicant, & odorata sentiuntur. Aestiuæ est herba,

DE BALSAMELLA, [Balsamine peregrina, quam Fuchsius alteram facit, Dodonæus seminam. Itali (inquit) Balsaminum genere neutro uocant, ex Balsamina seu Charantia distinguunt.] CAP. VIII.



BALSAMELLA. la caulem cubito altiore a radice mittit, rubentem inferius circa terram, qua manum implere possit crassitudine, superius minimo digito multo graciliorem, cui ab inferiori parte usque ad summitatem undique cubitum longi, crassi & recti adnascuntur rami: ex his duo circa terram contrario sibi opponuntur exortu. caulis & ramis leuorē habent, & pingui, carnosæ, succosæque constant substantia ut portulacæ caules, sed multo robustiores sunt. pinguis et mollis totam herbam uestiunt folia tenui foliæ lauri foliis similia leniter per ambitum serrata, in utroque pediculo rum latere paruas & rufas excrecentias habentia. e quorum alis in ruffo purpurei flores erumpunt purpureis uiolis non dissimiles, sed multo maiores

(nullis in medio staminibus præter unum capitulum seminum ferendi causa enascens) a tergo breuem apicem & incuruam caudam ferentes, quamuis in anteriore etiam parte longiorem apicem gerant. ex singulis floribus singula hirsuta prodeunt capitula, magnitudine cynosbatī, in quibus milio equalia sunt semina, colore nigra et aliquantulum aspera. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, pinguibus & succosis ab eraso caulis trunco descendentibus. Aestiuæ est herba.

* Balsamina Amygdaloides.

DE DORYCNIO, [Ego neq; Dorycnium puto, neq; Solanis cognatum, et si
quidam Halicaccabum peregrinum nominant.] CAP. IX.

T. 2. 1. 9. p. 897.



DORYCNIVM ex breui caulis trunco plures singulares & striatas emittit iuncæ & gracilitatis uiticulas, duorū plerumq; cubitorum altitudine, tenuia affixa uirgulta ascendētes, ē quibus per intervalla striati pediculi, tria folia apio similia ferentes prodeunt, & quodlibet eorum in tres partes per ambitū profundius incisus diuiditur. hæc quo summitati propinqua fuerint eo minora etiā sunt, ex foliorū alis singuli exeunt pediculi, longitudine digitali, gracilitate sua mediocri filo equales, in extremitate duobus breuib; & retro flexis capreolis contrario annexi sibi ipsis oppositis. uirgultorum alas ac furculas apprehendētes, quo melius uiticulæ ea ascendere et imbecillitati suæ cōsulere possint, in fine pediculorū ante capreolos fert flores candidos, paruos, exiguis intus luteo colore staminibus, quorum magna pars caduca apud nos est: qui uero abortiui non ceciderint, sed remanserint, ē medio triquetros dēfos et aëre inflatos emittunt folliculos, magnitudine halicaccabi uescis equales, tenui admodum membrana constantes principio. Viride mox in ruffo pallescente intus tribus mēbranulis à medio ad angulorum intervalla usq; transeuntibus in tres camerulas interseptos, qui interdum non tribus tantum, sed quatuor constant angulis, uerū hæc non est propria eorum, sed monstrosa forma ex superabundanti in ea parte nutri-

mentali humore causam et originē habens singulis camerulis ubi in medio folliculo coniunguntur, singula semina innascuntur magnitudine parui pisi, figura rotunda, colore nigra ab una parte, nempe in annexu cādidam & satis magnam maculam habentia, figura quadam tenus azari folium uell latiusculum cor imitātem, unde etiam ipsa semina grana cordis appellātur, ea foris dura sunt, intus uero candidum & inflexo septo distinctum nucleum complectuntur, sapore dulcem, radicem habet digitali crassitudine, multis fibratam cirris. Aestiuā est herba.

DE ANBLATO, [Germanicè dicto: id est, Aphylo, quod folijs careat.
Orobanchen aliqui putant, non tamen ea, sed ei similis superficie herba
est nos aliquando Plinij Aegolethron esse putauimus.] CAP. X.


ANBLATVM primo uere coliculum profert longitudine dodrantalem, a minimo digito graciliorem, tenerum & succosum, à cuius medio quatuor florū ordines usq; ad summitatem enascuntur. & omnes antrorsum spectantes, flores in ruffo candicant, foris hirsuti & à tergo foliolis ceu squamis eiusdem coloris operiti sunt: ē quibus parua & acuminata prodeunt uascula plena seminibus paruis,

hyoscyami seminibus similibus, uascula maturo semine in duas partes se aperiant, radicibus nititur multis crassiss, succosisq, squamarū modo sibi ipsis superiacētibus & hyeme non pereuntibus. caret herba hæc foliis, nascitur putri et umbroso solo in syluis aut secus eas. saporem habet in acerbo leniter amarum, adiuncta pauca partium tenuitate.

Anblatum.



Helianthemum. T. 1. 73. p. 231.



DE HELIANTHEMO, id est, Sonnenblūme. Est hæc, ni fallor, immerito
Hyssopus sylvestris dicta à Trago, cuius eisonem etiam posuimus, Heyden
hyssop. CAP. XL.

HELIANTHEMUM coliculos producit graciles, lignosos & subhirsutos, in quibus folia sunt polygonii foliis similia, carnosa & leniter hirsuta, per quorum longitudinem singularis transit linea intus ceu cannale foliis impressa, foris uero eminens siue elata. coliculis flores lutei deinceps adnascuntur pentaphylli floribus similes forma & magnitudine, quibus singula succedunt oblongi erui magnitudine uascula, et in his papaueris quātitate semina, colore. Radicibus nititur tenuibus & lignosis nullius usus, habent folia & flores dulcem lubricumque saporem. folia item confracta mox apte coniuncta ob succi lentorem rursus coalescunt. Nascitur asperis, siccis & apricis, tam campestribus quàm montanis locis.

* Consolida aurea Chirurgis quibusdam,

DE HYOSCYAMO PERVNIANO, [*Stramonia*, uel
Nuce Meibei.] CAP. XII.

T. 2. 128. p. 896.



PERVNIANVS *Hyoscyamus*, prima qua seritur æstate caulē emittit uiridem, candicantibus punctis distinctū, crassitudine ferē digitali, longitudine cubitali, in paucos ramos diuisum. folia fert iuxta alas solani foliis similia: multo tamē maiora, longitudine spītamæ. latitudine paulo angustiora. mollitie, odore et sapore hyoscyamum uulgarem referentia, * quamuis etiam coctorum pisorum aliquo modo odorem referant. iuxta quē uirides, *imò M. m dragora fō* *lia & radi-* *cem oleit.* *et si fortius* *concaui & oblongi calices sunt, ē quibus singuli prodeūt flores, colore candidi, inferius angusti et striati, superius uerō cōplicati: postea se in calathi figuram explicant, resupinato undiq; labro: ē cuius circumferentia quinq; plerumq; aut sex erumpunt mollia acumina, paribus interuallis abin- uicem distantia, a quibus singulis ternē descendunt usq; in imam florum partem, lineæ, colore in uiridi, candicantes intus & extra conspicuæ, sed intus concauæ, foris uero eminentes, flores trīente sunt longiores & superius quatuor digitos lati: inferius uerō, qua ex caliculis prodeunt, unum tantum in mediis ipsis quina plerumq; sunt aut sena colore candido stamina, forma lilii staminibus similia, inter quē etiam claua ut in lilio apparet, in summa conuoluoli, id est, cyllampeli florum imaginem referunt, hīi toti decidunt, ima tantum calicu-*

lorum partibus relictis, ē quibus singula nascuntur rotunda & aculeata capitula, magnitudine iuglandis, & singulis eorum aculeis in flauo candidum durumq; subest semen magnitudine & figura senæ semini æquale. Radice nititur candida, digitali crassitudine in fibras distracta, eāq; inutili, seritur in hortis magno studio, sed rarō maturefcit. Aestiuā est herba.

DE GINGIDIO Syriaco olere. Icon hæc Gingidiū à Dodongo exhibetur. Bisacutum (inquit) Romani uocant, ut Dioscorides ait: cuius nominis uestigium hac ætate Itali et Hispani seruantes, hanc herbam uulgō Bisniago appellitant. Nasctur in Italia, in aruis frequens. utuntur coliculis eius ad dentium expurgationem. Brabantis rarō usum. CAP. XIII.

VMBELLIFERA & æstiuā herba Gingidiū est, hisce proximis annis ad nos primum in Germaniam allata. Prima æstate qua seritur geniculatum emittit caulem, minimi digiti crassitudine, cubito proceriore, nigricantibus striatum lineis, multosq; ramulos ferentem. folia sub geniculis exeunt, pastinacæ satiuæ foliis similia, tenuiora tamen, pluribusq; incisa eruptionibus, singulæ ramulorum diuisiones, umbellas, & in his candidos exiguosq; flosculos sustinent, Ammos uel



dam acrimoniā prae se fert. semina item Ammii saporem habēt, quamuis acriorē
amarioremq̃. folia deniq̃ radice & semine mitiora sunt, & ob id oleribus aptius
addi possunt.

DE MELONGENA, [Malum insanum aut Melanzanum uocant aliqui
recentiores, Simeon Sethi forte Mazanzanion.] CAP. XIII.

MELONGENA, quam Itali corrupto nomine Melanzanum uocāt. Prima qua
seritur æstate caulem erigit longitudine cubitali, crassitudine minimi digiti,
solidum lignosumq̃, in ramos inæquali ordine diuisum, ex quibus alia prodeunt
adnata folia iuxta alas fert dodrante breuiora, quatuor digitorum latitudine, per
ambitum parum et inæqualiter sinuosa, in mucronem desinentia aspera & in confr
cādo strepentina, secus ea longos rubentesq̃ pediculos & in his singulos aculeatos
calices, ex quibus singuli item nascuntur flores in quinque acuminata & rugosa foli
ola, stellæ modo diuisi, colore purpurascēte, estq̃ tota florum latitudo duorum se
rē digitorum, in quorum medio quinque sunt erecta, lutei coloris stamīna in medio
eorum uno eminente apice, florum foliola postquam defluerint ex calicibus sin
guli subnascūtur fructus anatis & interdum anseris oui magnitudine, nonnunquā
oblongi & ouati, nonnunquam etiam rotundi, & interdum sursum recurui, colore
plerumq̃ rubente, quamuis etiam flauī & candicantes inueniantur, intus rara,
lenta

lenta et fungosa carne constantes, apud nos serò maturescentes, in mediis fructibus sinuosa: quædam cavitates sunt, & in his semina copiosa figura lentis colore flavescente, minora tamen tenuiora. Radicibus nititur numerosis in minimas fibras seu capillamenta diuisis. feritur à nobis ad spectaculum in hortis aut fictilibus. Arabes etiam in alimentis fructu utuntur, sed uitiosum gignit succum, saporem habet in dulci fatuum, pauca admixta amaritudine.

Melongenæ. T. 2. 127. p. 894.



Scorodonia. T. 1. 4. p. 15.



DE SCORODONIA (id est, Wildesalbey.) *Sylvestris.* [Tragus
Saluam *sylvestrem* uocat lib. 2. cap. 4.] CAP. XV.

SCORODONIA caulem habet scordij modo quadrangulum, longitudine cubiti, & hirsutum, per intervalla singula folia ex oppositis lateribus alternis uisibus proferentem, Betonicæ folijs similia: minora tamen, tenuiora, candidiora. quorum alia supra medium caulem singuli nascuntur ramuli, & minora inferioribus folia, flores ex adnatorum & medii caulis uno latere erumpunt, hiantes & in cædido pallidi, deinceps usq; ad summitatem dispositi, semina fert nigricantia quaterna, plerumq; in singulis florum caliculis chamædryos seminum quantitate. Radice nititur tenui, lignosa & paucis fibrata cirris, ideoq; inutili, & singulis annis intereunte, quotannis autem semine se propagat: est enim æstiuæ herba. Folia gustu

Q iii

amara sunt, odore scordium & lupuli fructus imitantur. Nascitur editis incultis locis, inter arbuscula, & sylvis lucidioribus, solū amat aliquatenus arenosum uel aliquā asperum, non tamen omnino siccum.

* *Sindrleube.* Est scordium Montanum Odi.

DE POLYACANTHA cardui specie, fruticosus carduus est. Itali quidam Carduū stellatum uocant, à spinis stellatis: & aliqui, ni fallor, Calcatrippam: quod nomen Cordus lib. 2. cap. 140. Consolide regali uulgo quibusdam dicto adscribit. Polyacanthus Theophrastus alicubi inter acanacea numeratur, GAZA Aculeosam interpretatur, sed acanacea dicuntur, quorum & folia & conceptaculum florum spinosa sunt: id quod Polyacanthæ Cordi non conuenit.] CAP. XVI.



POLYACantha caulē habet gracilem in multas alas et adnata diuisum, cāque nonnunquā humi undiq; prostratas, circa quē ab inferiore parte folia sunt dodrante breuiora utrinque, profundius usque ad spinam incisa, suntq; eorū diuisiones seu partes ferē minimi digiti longitudine, latitudine eiusdē, maioribus intervallis dispositę et molliter hirsutę, capitula fert numerosa quinque aut sex gracilibus lōgis, acutissimis & flauescens aculeis septa, ex quibus purpurei prodeunt & capillacei flores: iis sub sunt parua, oblonga & candicantia

semina cum floribus in pappos resolutis auolantia, sub ipsis capitulis parua quædā foliola sunt quæ singula inferiorum foliorum partes figura imitantur, leniter & ipsa hirsuta. Radicem habet digitali crassitudine, longitudine dodrantali candidāq; per cuius medium lignosus à caule descendit neruus: ea gustu & odore uulgarium carduorum radices refert: folia uerò sapore amara sunt. Nascitur circa urbes, oppida & pagos, planis & campestribus locis, præsertim in Rhenana regione.

* Iconem ē Dodonęi libris mutuatū sumus, pictorū fortē incuria, non optimam: capitulum ex arida depictum, seorsim apposimus.

DE TANACETO PERVNIANO. CAP. XVII.

PERVNIANVM Tanacetum cuius flores alii Indianos charyophyllos, alii Indianas rosas uocant, paucos ante annos ad nos allatum est, sed uix summo studio & cultura ad maturitatem peruenit. Prima qua scribitur æstate caulem emittit trium cubitorum altitudine, in ruffo nigricantem, & angulis striatum, à quo iuxta terrâ bini alterno ordine seu positu resupinati & contrario exortu enascuntur rami, mediocaule paulo breuiores. folia habet in singulis pediculis multa tanaceti foliis similia, undiq; per ambitum serrata, flores foliaceos in summis ramorum surculis ex oblongis uiridibus et angulosis caliculis profert pulcherrimos aspectu, media inter caryophylli calendule et rosarum flores forma et magnitudine, quorum foliola inferius lutea sunt, intus uero in fuluo rubentia, et leniter holoferici modo hirsuta, in mediis floribus stamina sunt similiter lutea, semina in caliculis fert oblonga, nigra et tenuia, florum foliolis annexa. Radices subsunt tenuibus cirris fibratae, quotannis intereuntes, folia trita ualde odorata sunt, flores uero imbecillem spirant odorem, gaudet assiduo sole & crebra rigatione.

* Petilium aliqui suspicantur.

DE ALTERO NIGRO HELLEBORO, uel Helleborine
maiore. CAP. XVIII.

CAULEM habet singularem minimi digiti crassitudine, dodrantali altitudine, propter foliorum quæ defluerunt uestigia asperum, circa quem folia sunt nigri hellebori foliis similia, molliora tamen, candidiora: caulis superius in ramulos diuiditur, quos folia sine pediculo prioribus dissimilia uestiunt, duorum serè digitorum latitudine in extremitate in quinque, sex uel septem partes ceu digitos diuisa, quorum medio flores prodeunt lati & concavi, foris uirides, intus uero in uiridi candicantes, quibus singula succedunt nigellæ capitibus similia uascula, maiora tamen, & in his nigricantia semina tritico similia, sed multo minora. Radice nititur tenui, lignosa, foris nigra, paucis fibrata cirris, eaq; inutili. Olēt folia grauiter quem admodum sambucus, & amara gustu percipiuntur, quemadmodum ipsa etiam semina. Nascitur asperis, apricis calculosisq; montibus, plurimumq; in Sueuia Vuirtembergenfi, iuxta Reutlingam & Messingam in Taurino monte.

* Consiligo Columelle.

DE AIZOO serrato, [quod folijs albicantibus & serratis in saxis montium
prouenit, Sischjung aliqui uocant.] CAP. XIX.

AIZOVM serratum circa radicem numerosa & crassa habet folia, maiora aizoo similia, multò tamen minora & undiq; minimis sursumq; uergentibus incisuris instar ferræ incisa, aizoi maioris modo globum ueluti oculum constituentia, caulem erigit unum atq; alterum, gracilem, longitudine pedis, pauca & deinceps disposita foliola ferentem: in cuius cacumine flores sunt candicantes, minoris aizoi floribus similes: quibus succedunt minima semina, radicibus adhæret paucis, nigris, & tenuissimis. Adstringit tota herba, folia uerò efficacius. Nascitur altissimis calcariis petris, iisq; humido musco obductis: ut supra Reutlingam, auff der Almen, non longe à Nebulosa spelunca in Sueuia.

* Aizoi serrati species duas appinximus: quarum ea, cui rariores sunt flores, eosdem punctis sanguineis distinctos habet.

*Aizoum serratum.**Aizoum serratum alterum,*

DE HELLEBORINE tenui folia, [Matthiolus hanc Consiliginem esse suspicatur,
sed uera Consiligo descripta est superius, secundo ante hoc caput.] CAP. XX.

COLICVLOS ab uno radice capite plures erigit teneros, teretes, longitudi-
ne dodrantali: circa quos folia sunt abrotono aut Chamemelo similia, in sum-
mis coliculis colicorumq; indiuiduis: adnatis ueris principio singuli sunt stellati
flores: quorum hæc est forma, in medio paruum eminet capitulum flauum aspe-
rumq; per ambitum numerosis & luteis staminibus circumuallatum, è quorum an-
nexu floris foliola enascuntur undique in orbem radiorum modo disposita uncie
longitudine, latitudine uerò quarta uncie non excedentia, colore lutea & ut purissi-
mum aurum splendentia, à tergo alia & minora sunt foliola, colore nigricante, qui-
bus nondum apertus flos continebatur. Radices habet numerosas, nigras, graci-
les, hellebori nigro similes sapore amaro. Nascitur montanis asperisq; locis.

* Est Sesumoides nostrum minus.

Helle

Helieborinum T. 1. 135. p. 406.*Epimedium*, T. 1. 177 p. 318.

DE TRINITATE, id est, *Epimedio*. [Germani aliqui *Hepaticam* nobilem,
uel auream nominant.] CAP. XXI.


FOLIA asaro æqualia similiaq̃ habet, sed in tres partes diuisa, unde nomen inuenit, superius uiridia, inferius rubentia, asari instar, contra hyemem contumacia. è quorum medio primo uere do drante breuiores prodeunt graciles teretesq̃ coliculi, & in singulis singuli flores, magnitudine & colore purpureis uiolis similes, sex paruis foliolis constantes, in medio paruum est capitulum, paucis & exiguis staminibus circumdatum. Radices subsunt graciles, numerosæ nigraeq̃, in diuersa tendentes. Nascitur umbrosis syluis.

* *Anthera*.

DE BECHIO, [id est, *Tussilagine*.] CAP. XXII.

BECHION primo uere singulares, molles, hirsutos, do drantalesq̃ emittit coliculos, oblongis squamis ceu foliolis deinceps uestitos, in quorum summitate singuli sunt flores in orbem circumacti, luteis et capillatis foliolis constantes in medio eiusdem coloris stamina sunt, minimis liliis similia partimq̃ reflexa.

R



DE ANCHUSA minima. [Eadem autem cognatissima videtur, quam Tragus
gluestris Buglosse nomine describit lib. 1. cap. 77.] CAP. XXIII.

MINIMA anchusa primo vere caule assurgit gracili, anguloso, solido & hirsuto, foliis oblongis hirsutisq; uestito, inferius minimi digiti ferè longitudine, in summitate verò multò minora. diuiditur caulis in pedales ramulos, in quibus per intervalla exigui & singuli flores minimis foliolis obsidentur, quibus quaternæ plerumq; succedunt semina, colore nigro, forma & quantitate echii seminibus æqualia. floret particulatim, ita ut in summis ramulis tantum flores conspiciantur. Radicem habet longam & gracilem, foris sanguineo colore tinctam, & tingentem, maximè sole taurum occupante. deinde æstate arescente herba, ipsa quoq; nigrescit & moritur. qualitatibus echio & aliis anhusis respondet. nascitur in aggeribus & aruis.

DE LITHOSPERMO. CAP. XXIII.

LITHOSpermon ab una radice plurimis assurgit cubitalibus aut maioribus caulibus, iunceis, teretibus, asperis & foliis, digiti minimi longitudine et latitudine, foliis utrinq; acuminatis et asperis uestitis, superius in copiosos ramulos diffusis. in quibus breui intervallo utrinque folia sunt inferioribus breviora, in exortu non coniuncta, se alternatim oppositorum spaciis contraria. secus quæ

quæ singuli sunt, breuesq; pediculi in quinque minima foliola diuisi, & in horum medio terna plerumque aut bina & singula semina milii quantitate, modicè superius turbinata, colore in candido cæsia, splendida & dura, intus minimum nucleolum habentia. floret particulatim in summitate tantum conspicuis floribus, paruis candidisq; similibus et equalibus minime anchusæ, sed diutius floret usq; in autumnum. Radice nititur digitali crassitudine, longitudine pedali, in partes distracta foris, initio ueris usque ad solstitium, ferè anchusæ modo, cruento et roseo succo tincta, intus autem cãdidam quæ singulis annis nouos emittit caules, eoq; plures quo annosior fiat. donec deinde nimia radicum copia & senio suffocetur, qualitatibus & temperamento Anchusis & Echio æquipollet. ad illorum itaq; genus referendum est, quod ueteres non animaduenerunt.

Lithospermon. T. 1. 183. p. 536.

Filipendula. T. 2. 122. p. 883.



DE FILIPENDULA, [aliqui Oenanthen Dioscoridis faciunt.] CAP. XXV.

FILIPENDULA multos do drantales à radice capite coliculos emittit, admodum graciles, utrinque ex interuallo breui semuncia longioribus & ferratis foliis alatos, sine peciolo, pediculo adnatis, in summis pediculis unum folium ueluti in tria diuiditur, ita ut duo ad utrumque latus inclinet, medium uerò rectâ promineat: omnibus autem foliorum interuallis ueluti paruula foliorum rudimenta immixta sunt.

R ii

Caulem emittit singularem, cubitalem aut interdum maiorem iuncēq; gracilitatis: te-
 retem, solidum, modicē rubentem & minimē profundē striatum geniculis, longo
 interuallo præinctum, ē geniculis singula prodeunt folia prædictis similia, sed iux-
 ta exortum latiusculis duabus laciniis utrinq; caulem amplectentia. flores medio
 uere in summis profert caulibus corymbi figura acervatos antequam aperiantur
 in ruffo candicantes, totus deinde corymbus in plures graciles & inæquli longitudi-
 ne furculos diuiditur, floribus paruis, cādidis et septē plerumq; foliolis compositis
 plenos, multis in medio capillatis staminibus, dilabētibus florum foliolis semen re-
 manet paruum, oblongū, gracile, copiosum et capitulum constituens ueluti * Me-
 desusii semen, non tamē inuolutum. in omnibus furculorum maioribus sinibus et
 euidentioribus furcis singularis est flos, & postea seminibus constans capitulum si-
 cie terræ minimi digiti crassitudine, oblongam, à qua undiq; exeunt graciles teretē
 que fibræ, in extremitate singulis plerumq; ueluti caudatis glandibus, substantia
 carnosus capitate omnibus in uniuersum radicibus. foris niger est color, intus uerō
 in candido modicē ruffus, tota herba diuersis constat qualitatibus, partim enim ad-
 stringit, partim tenuem quendam saporem & ueluti uinosum palato imprimit, ca-
 put & olfactum odore etiam cum gustatur tentantem, flores inter optimum mel &
 uinum & pgoniam medium habent odorem, estq; hic non iniucundus, omninoq; si-
 milis Medesiusii floribus, cui tota etiam equalis est temperamento. Nascitur in pra-
 tis, campis & herbosis locis, nonnunquam etiam frutetosus.

Id est, argen-
 tille ma-
 ioris que et
 framipff-
 wurzel
 dicitur.

Tormentilla. T. 1. 171. p. 502.




DE TORMENTILLA, id est,
 Pentaphyllo recto. CAP. XXVI.

TORMENTILLA, graciles do-
 drantalesq; à radice emittit coliculos,
 breui interuallo, quinis, senis aut septenis fo-
 liis uestitos pētafhylo similibus, multo ta-
 men minoribus. in summis coliculis luteis flo-
 res sunt, & semina pentaphyllo similia, mi-
 nores tantum. Radice nititur crassa, oblon-
 ga, tuberosa, intorta capillamentis, et fibris
 uillosa, foris nigricante, intus ruffa et carno-
 sa, quæ efficacissimē cum quadam tenuium
 uirium participatione adstringit. Nascitur
 aliquo modo uliginosis, macris, & herbosis
 locis, tam editis quàm planis, nonnunquam
 etiā in altissimis sed humentibus montibus,

DE FRAXINELLA, [cuius radice uulgō
 hactenus pharmacopole nostri pro Dictamnio
 abusi sunt.] CAP. XXVII.

FRAXINELLA caules erigit lon-
 giores cubito, teretes, uirides, inferius
 glabros, superius leniter asperos & ruben-
 tes, in nullos ramulos diuisos, à quibus folia
 exeunt posita & figura fraxino similia. (un-
 de nomen inuenit) nam bina, ex interuallo
 contrario exortu, longo intusq; canalicula-
 to pediculo enascuntur, uno inter utrumq;
 ordi-

Fraxinella. T. 1. 7. p. 27.



liores, candidas, carnosasq̃, per longitudinem lignoso, lento & exemptu facili transeunte nervio, qui quoniam inutilis abiicitur. habent folia ruthæ saporem & odorem, superior uerò caulis pars cum floribus multum grauiissimumq̃, nec tamen inuictum odorem spirat. Radicibus acris, & amarus est sapor adiuncta euidenti partium tenuitate, qua diu palatum detinet. odorem uerò spirat, ueluti si quis dauci radicem, syluestris pastinacæ semen & piper commisceat. Nascitur editis montanis, & frutetosis locis, solum amat luto sum saxosumq̃. minimeq̃ arenosum.

DE DRACUNCULO palustri, [Aliqui Arum palustre uocant,
Euchbius Dracunculum Plinij tertium.] CAP. XXVIII.

DRACUNCULVS Palustris coliculos spargit pedales minimi digiti crassitudine, uirides & glabros geniculatos, ex geniculis fibratas candidasq̃ radices fundentes intus raros, fungosos latioribusq̃ & contiguis foraminibus in longitudinem porosos: in articulis rotunda, lataq̃ folia proferentes, acruatim in tenuem mucronem desinentia, iuxta pediculum sinuata glabra, & inferius nitida. horum pediculi longis foliolis ueluti tunicis inuoluti sunt, quæ primum ipsos pediculos uestiunt & amplectuntur, in uniuersum autem hæderaceorum figuram expriment, nisi multo maiora & speciosiora essent. à medio cespitis capite alius erigitur pediculus singularis, plerumq̃ longitudine dodrantalis, digito paulo gracilior, te-

R iii



res, glaber, nitidus, prioribus concolor & similiter æqualis, porosus, in cuius summo paruum oblongumq; est capitulum, breuibus candidisq; staminibus circumdatum, quod paulatim in racemum excrescit uiglandis quantitate, per æstatem uiridem, autumno demum rufescens, substantia fungosum, cuius sacni seu potius folliculi semina in se claudunt parua, oblonga, & fusca muscerdis minora, cōgelato aut ueluti coagulato pellucidoq; humore, cristalloidi oculorum humori simile circumfusa. Racemo adnatum est singulare folium prædictis multo minus & acuminatius, intus quarracemum respicit candidum. Radicē habet cubito plerumq; multo longiorem, crassitudine ferē digitali, crebro geniculatam, æqualibus teretibus, glabris & porosis internodiis, iuxta caput radicis ē superioribus geniculis graciles, longæ, candidæ, copiosæq; descendunt fibræ. gustu tota herba aro similis est, primum enim satuo occurrit sapore, mox adeo uellicat linguam ueluti spinarum aculeis assiduo perforetur. Nascitur uliginosis palustribusq; locis, & in ipsis paludibus ac pigris camporum riuulis, interim modicam

adnascensium Alnorum umbram amat. solo macro & putrido maxime gignitur, pingui uerò & lutofo nondum mihi uisa est nasci, diuturna est herba.

DE PENTAPHYLLO palustri.

CAP. XXIX.

PENT Aphyllon palustre uiticulas per terram spargit longas, graciles & angulatis striatas, in quibus ramuli & folia pentaphyllo similia et æqualia sunt, quinque aut septem numero, inferius in cinerco candicantia, superius uerò uiridia. flores in medio uere & postea profert foliatos, in quinque aut sex folia diuisos, colore ferē purpureos eiusdem coloris staminibus in medio paruum capitulum cingentibus, quod paulatim in fructum rubētem excrescit; quantitate, figura et colore nondum rubentis fragi, nullo intus succo. radicibus nititur longis, tenuibus, nigricantibus et in geniculis fibratis, adstringit tota herba, præsertim fructus. Nascitur uliginosis, putridis & macris pratis. herba est diuturna.

* Heptaphyllum Plinij fragiferum.

De

Pentaphyllum palustre.

DE TRIFOLIO palustri.

CAP. XXX.

TRIFOLIUM palustre coliculos emittit breues, minimo digito graciliores, teretes, geniculatos, uirides, & intus porosos. è singulis geniculi pediculi exeunt digito longiores, terna folia iuglandi similia: ferentes, caules erigit cubitales, teretes glabros & æquales, in quibus sole ex tauro in geminos eunte, deinceps dispositi flores sunt foliati, candidi q̃. floribus succedunt rotundi & parui folliculi papaueri simili semine pleni. Radicibus nititur plurimis, teretibus crebro geniculatis, intus porosis, undique in transversum tendentibus & seipsas quotannis propagantibus: hinc fit ut tanta huius herbæ copia eodem loco gignatur, cohærentibus in terra propaginibus. è radicum articulis, aliæ erumpunt radiculæ, longitudine dodrantes, iunci lenis crassitudine, teretes & tam foris quàm intus candidæ. saporem tota herba amarum habet, sine alia euidenti qualitate. nascitur uliginosis, palustribus & maris pratis, plerumq̃ iuxta palustre pentaphyllum, iisdem enim proueniunt natalibus.

* Limonium Odi. Eiberflee.

R iij



DE BRASSICA sylvestri, uirgata.

CAP. XXXI.

BRASSICÆ sylvestris, quædam est species, quæ caulem erigit bicubitalem, & ferè teretem, glabrum, intus medullaceum. cui statim à terra usq; ad summitatem iunceæ gracilitatis deinceps adnascuntur rectæ uirgæ, longitudine cubitali, sub his iuxta exortum singula sunt folia longitudine digitalia, inferius uncia, aut interdum duûm digitorum latitudine, in mucronem desinentia, pinguiâ & glabra, sine pediculo caulem & uirgas, ueluti sinu quodam circum amplexentia. totis uirgis siliquas erectas producit, digiti longitudine, uehementèr graciles, intus sinapi similia semina continentes, quæ per longitudinem in duas partes tenuissima quadam membrana diuiduntur, flores uere & æstatis initio in summis tantum uirgis apparent candidi, minimis quatuor foliolis & paucis staminibus constantes. floret particulatim: itaq; simul maturas & maturescètes siliculas, simulq; flores habet. Radix subest dodrantalis digiti mediocris crassitudine. Tota herba satiuam Brassicam sapore æmulatur.

DE VICTORIALI *scœmina, id est, sylvestri Gladiolo. [Longa victorialis
uulgò dicta, non Gladioli, sed Allij genus est in Alpibus.]* CAP. XXXII.



VICTORIALIS *scœmina* post ueris initium rectum et mucronatum emit tit folium : è quo alia duo aut tria erumpunt, Iridi similia, multò tamen angustiora, utrinque striata et Iridis modo sibi inserta : iuncum, teretem, cubito longiorem, & glabrum caulem amplectentia : in cuius summitate quinque, sex aut septem egregiæ figuræ & coloris flores, sole cancrum ingrediente, se proferunt, à se inuicem distantes, in unam partem caulis se inclinantes, & deorsum nutantes. constāt hi sex folijs, uncia parum longioribus, simul ab uno exortu prodeuntibus : ex quibus quatuor semuncia paulò latiora sunt, colore roseo, sed multò letiore & pulchriore : interdiu, cum sole tanguntur, ignis & scintillarum modo exteriori superficie coruscantia, & ueluti flagrantia, reflexis labris profundioris calathi figuram referentia, reliqua duo foliola prædictis multò tenuiora sunt, ac intra florem cōstituta, inferius aliquantulum prominent, & candidam, longam, & in medio latiore maculam habent : quam undiq; purpurea linea circumscribit, & terminat. superiori floris folio stamen subest trifidum, & inter hoc et folium singularis apex. floret paucis diebus, ab inferiori parte incipiendo. aperiēte enim se qui in summitate est flore, inferior flaccescit & clauditur. floribus singuli folliculi succedunt, in rotundo modi

cè oblongi, tenuibus uenulis distincti, nucis auellanæ quantitate : qui cū immaturerunt in tres partes diuiduntur, & tenuia paleacea, flauaq; semina ostendunt : in quibus rubens, cartilagineus, & paruus est nucleus. radicem habet non profundam, paruam, rotundam, bulbosam, ab ima basi uersus germen turbinatam, aliquot crinitis & reticulatis tunicis, ueluti lorice uestitam : quibus detractis duo exigui candidi, carnosiq; apparent bulbi, uno alteri insidente, superiori quidem ueris initio minore, sed uegetiore : inferiore autem maiore & latiore, uerū flaccido et fungoso. perit enim & flaccescere incipit, prioris anni bulbus ueris initio supernascent alio. itaq; simul decrecentem & increcentem radicem habet, nonnunquam etiam inferiori subest tertius bulbus, sed adeò flaccidus & inanis, ut inter effodiendum, (quia non est spectabilis) negligatur, dum floret superior & minor bulbus increscit, uincitq; soliditate & quantitate inferiorem : nam cum flaccescere flos incipit, digiti crassitudinem, & globuli figuram acquirit. fibras ab inferioris bulbi base emittit tenues, candidasq;. saporem radix habet præ cæteris herbæ partibus excellentem, nempe dulcem & modicè acrem. relinquit enim in palato aliquandiu linguam & fauces aliquantulum urentem & saliuam elicientem (flores & folia idem faciunt sine dulcedine) acrimoniam. Nascitur editis, frutetosis & herbosis locis, magis tamen pla-

nis, nec adeò altis ut hyacinthus. solum amat lutosum, prouenit copiosissimè in syl-
uulis frutetosis circa pedem Lauterbergi, hoc est sereni montis, quem hodie mon-
tem diui Petri uocant, uno atq; altero ab Hala Saxoniae miliaribus.

Eiconem hanc à Io. Kentmanno accepimus.

* Est Victorialis rotunda quam inueni prope Gatterstedt. Longa uocatur Siegwurz, & in Austria, Ale-
pibusq; nascitur. Figuram habet oblonge barbe bifida, sed rotundam, Germanicè. Aller mañ harnisch,
& runde Siegwurz, appellant aliqui etiam Oberharnisch. De longa uide Ioannem Ammonium
Agricolam.

DE THALICTRO nigro. [Hanc Galli Saxifragam nominant: aliqui luteam
cognominant.] CAP. XXXIII.




nuem præ se fert saporem, saliuam elicentem. flores subacri, & erucæ, rapisq; simili
odore sentiuntur. Nascitur in campis & pratis quibusdam,

DE THALICTRO tenuifolio.

CAP. XXXIIII.

THALICTRUM tenuifolium, nigri altitudine, caulem emittit, & interdum proceri-
orem: paulò graciliorem, profundius striatum, colore in uiridi pallidum, lon-
gioribus interuallis geniculatum. folia è geniculis profert utrinq; pediculis adnata,
in uicè circa exortum nigri Thalictri modo respondentia: in tenues, angustas, unci-
ales,



ales, indiuiduas, & non serratas partes; dissecta, glabra, & undiq; uiridia. Toti autem cum foliis pediculi, syluestris pastinacæ foliorum figuram ferè exprimunt. in summo caule sex aut septem digito longiora adnata sunt: æstatis initio plures, exiguoq; corymbos ferentia, capillatis, breuis & flauis flosculis ueluti staminibus compositos: quibus succedunt nigro Thalicthro, æqualia ferè & similia semina. Radicibus nititur nigri similibus et æqualibus, non tamen adeò lignosis, sed carnosioribus, nec adeò croceis. Gustu & qualitatibus tota herba nigro Thalicthro, remissioribus constat. flores uerò odore Canopum, id est, sambuci flores æmulantur. Nascitur iisdem quibus nigrum natalibus: nonnunquam etiam humidioribus pratis, præsertim uliginosis & macris.

* Ea cuius hic effigiem damus herba, si non Thalictrum leptophyllum Cordi est, genere tamen proximo continetur.

DE AIZOO minimo, [quod acre non est, sed acri per simile.] CAP. XXXV.

AIZOON minimum coliculis & foliis minori simile existit, multò tamen exilioribus, minoribusq; his partibus constat. flores habet foliolis quinque stellæ modo radiatis constantes, quinque exiguis acuminatis in medio apicibus se-

mini ferendo natis, iisdemq; decem staminibus circumuallatis, aizoo acris floribus, forma, quantitate & luteo colore similes, positu tamen differentes, non enim minoris aut acris aizoi modo umbellam siue capitulum constituunt, sed deinceps ab uncialibus aut longioribus coliculorum adnatis utrinq; alterno situ exeunt, ex his qui ab uno latere enascuntur, oppositorum spaciis iunguntur. Radicibus nititur tenuibus et capillatis. Adstringunt uehementer coliculi, foliola & flores, quemadmodum minus aizoon, sed uehementius. siccior enim est. Nascitur iisdem, quibus acre & minus aizoon natalibus. Cauendum ne harum similitudine fallamur, acrem pro hac accipientes: uiret semper, unde nomen inuenit.

DE MILLEGRANA, [Galli Herniariam uocant, Tragus Empetron, nescio quam rectè.] CAP. XXXVI.

MILLEgrana dodrantes, numerososq; per terram undique spargit coliculos, admodum graciles, colore in uiridi flauos & teretes, breui interuallo rutæ similibus foliis, minoribus tamen uestitos: secusq; ramuli exeunt duarum aut trium unciarum longitudine, omnibus ramulis copiosi & minimi in lateribus ramuli adnascuntur, colore flauis, principio circa ueris exitum tenuissimis & leuissimis flosculis, deinde minimis seminibus pleni. Radice nititur singulari, tenui, candida et infertius fibrata, et inutile. Herba odore nullo commendatur, saporem uerò primum in-

lipidum, mox subamarum, & modicè acrem habet. Nascitur apricis, arenosis, sabu-
losisq; campis, littoribus & ripis.

* Est herba canceri minor.

Millegrana. T. 1. 181. p. 527.



DE ASTRAGALO herba. [Turnerus Apion
Fuchsij Astragalum facit. Sed alium Astraga-
lum pingit Matthiolus, qui cum Dioscoridis
descriptione melius quadrat.] CAP.
XXXVII.

ASTRAGALUS viticulis similes cau-
les spargit, tenues, angulosos et cice-
ri non dissimiles, longitudine pedales aut
do drantales, in quibus ex interuallo qua-
terna aut sena sunt folia, longitudine unci-
ali: latitudine autem semunciae, utrinq; acu-
minata: forma & magnitudine ciceris foliis
similia, non tamen per ambitum ferrata, ne-
que hirta sed glabra. flores habet circa ue-
ris exitum purpureos, ciceris floribus quan-
titate & figura similes: quibus succedunt ses-
quiunciales angustę siliquę, aliquantulum
teretes, & in his quaterna aut quina plerum
que semina estatis initio, uicię similia, pau-
lò tamen minora, colore cęsia. Radicibus
nititur ab uno eodemq; interdum tubero-
so principio, in plures graciles, nigra; & uiti-
culas, per transversum in terrę superficie
distractas, quę in geniculis tuberosę, cras-
sę, uillosę, fibratę & superficie tenus nigre
sunt: intus autem candidę, sapore ut glycy-
rhiza dulci, adstringente & acerbato, quarum
usus est. semē quoq; adstringit, sed crassū et
terrestri constat substantia, ueluti uicia. Na-
scitur montanis, frutetosis, incultis & uento

per flatūs locis: plurimaq; Gosslarię in uicinis Rammo montibus.


* Germanis Christianwurzeln & Knollen wurzel: aliqui Cicer montanum uocant.

DE NYMPHAEA Alba.

CAP. XXXVIII.

NYMPHAEA quę à candido florum colore alba dicitur, à radicis capite pe-
diculos, secundum stagnorum profunditatem, bicubitales aut tricubitales
emittit, crassitudine minimi digiti, teretes, uirides, indius duos, molles et flexiles, gla-
bros, intusq; satis amplis in longitudinem tendentibus foraminibus porosos, qui
singula ferunt folia do drantis aut pedis, quoquo uersus latitudine superius omni-
no læuia, glabra, æqualia & nitida, inferius autem ramosis uenis distincta, aquę in-
natantia, & forma rotunda, nisi iuxta pediculi annexum in digito plerumq; profun-
diorem sinum recederent. Caulēs ab eodem radicis capite plures profertur eisdem
longitudinis, crassitudinis, formę & substantię, in russo aliquantulum nigrican-
tes, & similiter latis & contiguīs foraminibus peruios, in superficie aquę definen-
tes, nullis penitus foliis ornatos, singulos flores in summitate ueris exitu ac æstate
seren=

T. 2. 48. p. 696.



habent dulcedinem & aperti aliquantulum grauius olent, semen autem glutinosum habet saporem. Radices amaræ sunt & adstringunt. Nascitur in stagnis & lacubus, quorum fundus lutosus & limosus est.

DE NYMPHAEA *Citrina*.



CAP. XXXIX.

NYMPHAEA altera quæ à luteo floris colore citrina aut lutea cognominatur, albæ similis est, suis tamen notis (ut ostendimus) dignoscitur . pediculos enim in quibus singula sunt folia, non teretes, sed angulosi sunt, duobus utrinque cidentibus angulis, unoque obtuso, tertium latus ueluti teretis pediculi pars est . folia habet non adeo rotunda ut alba sed oblongiora, caules item similes et æquales, paulo tamen crassiores, & colore in flauo uirides, multo angustioribus poris peruios . flores uero omnino dissimiles, non enim oblongum antequam aperiuntur, capitulum constituunt, sed rotundum & modice latum, in quinque folia rotunda et uncialia se expandentes foris uiridia, maxime quæ e caule exeunt, intus uero lutea et splendentia. Stamina intus in orbem disponuntur numerosa, lutea, forasque reflexa, inter quæ et exteriora quinque folia minora sunt, & multa foliola, eiusdem coloris in medio stamina, uigente adhuc flore, capitulum erumpit rotundum, uiride tam recens quam maturum, & piri modo turbinatum in summitate lata & modice concaua, ueluti stella, non tamen incisa, aliquam uentrosi canthari similitudinem referens, hoc pereunte

flore maximi, papaueris utriculi magnitudinem acquirit, quod antequam penitus maturescat, incisum uiscoſa, in diuellendo emittit fila, ſemen in fungolis loculamentis multo maius quàm alba habet, colore ſtauum. Radicem habet diuturnam multò longiorem et craſſiorem, rarioribus pediculorum ueſtigiiſ tuberoſam, foris et inuſ candidam, tranſuerſamq; à qua omnino nigræ in limum descendunt fibre, albæ ſiſ bris craſſiores, totius radicis ſubſtantia, poroſa & fungoſa eſt, guſtu aqueo ſubamaro, & aliquantulum adſtringente. flores autem & ſemina uehementer adſtringunt. Odorem radix iniucundum ſpirat, flos uerò iucunde cum grauitate aliſ qua, olet et guſta habitum oris ſuaue reddit. Nascitur iſſdem quibus alba Nymphaea, locis ſimulq; cum illa floret & fruificat.

Nymphaea Citrina. T. 2. 48. p. 697.

Cicer nigrum. T. 2. 10. p. 609.



DE CICERE nigro ſeu arietino.

CAP. XL.

CICER nigrum quod arietinum quidam appellant ſtatim à terra in plures pedes longiores diuiditur ramos, ſolidos, teretes et modicè hirsutos, in plura adnata, inæquali ordine ſubdiuiſos. è quorum geniculis folia prodeunt, uncia breuiora, oblonga & aliquantulum ſerrata, digitali ſerè pediculo utrinque ex intervallo breui adnata, in extremo pediculo unum rectà inter utrumque ordinem extenditur flores ſecus folia ex aliſ exeunt, æ ſtatim initio & aliquandiu poſt, ſingulares, parui, papilionum figura in purpura rubenes, quibus ſinguli ſuccedunt folliculi uncia longi-

Fœnograecum, T. 1. 4. p. 197.



longitudine hirsuti & ueluti flatu distenti, in quibus bina, aut terna clauduntur semina, pisi mediocris quãtitate, angulosa, turbinata, arietini capitis propemodum figura, unde nomen inuenit, foris nigra, intus autem flaua. Radice nititur gracili, candida & inutuli. Seritur in hortis aliorum leguminum modo. Totius herbæ superficiei minimæ & ruscidæ insident guttæ etiã siccissimis diebus, præsertim folliculis & foliis gustu simul acetoso & salso, semina pisis suauiore habent saporem, herba uerò ipsa gustu reliquis leguminibus respõdet.

DE FOENOGRAECO. CAP. XLI.

Fœnograecum singularem cubito plerumq; prociorem rectumq; emit tit caulem, iuncq; gracilitatis, teretem, uiridem & concuum: è quo ex interuallo longiore, dodrantalia exeunt adnata, folia habet in uno pediculo terna, unciali longitudine, semunciae latitudine, iuxta annexum angusta, in summitate uerò latiora & in rotunditatem desinentia, superius uiridia, inferius cineracea, quorum natura est sereno cœlo & sole supra horizontem existente, se demittere, turbido autem ac pluuioso, & sole occidẽ, sursum se erigere atq; inuertere, ut inferior eorũ pars reddatur superior. flores circa exitum ueris in summis uirgis exiguos & oblongos

profert, colore pallidos, figura uero papilionibus similes, eosq; in singulis uirgis una uice singulares, quo decidente supra eum alius erumpit, quo fit ut paulatim & successiue etiam fructificet, siliquas post flores fert digito longiores, graciles, acuminatas, incuruas ac reflexas, caprinorum cornuum figura, (unde Grecis ægoceros uocatur) in quibus semina oblõga, angulosa & flaua sunt, umbilico ueluti cauda quadam siliculis adhærentia, quibus exiccatis medicatus est sapor. Olor uerò cum grauitate aliqua iucundus, ueluti Loto satiuo. Radice nititur longa, tenui, candida & in utili: seritur in hortis ad medicinæ usum.

DE PASTINACA nigra syluestri, cui radix foris nigricat, intus candicat, perennis. CAP. XLII.

PASTINACA nigra folia à radice capite emittit pastinacæ syluestri aut satiuæ similia & æqualia: neq; tamen hirsuta, neq; aspera, sed glabra & aspectu pulchra: è quorum medio caulis plerumq; bicubitalis assurgit, minimo digito gracilior, uiridis, & glaber, non omnino teres, sed aliquantulum angulosus, & lineis striatus, geniculis dodrantali aut pedali interuallo ab inferiori parte præcinctus. è quibus folia exeunt prædictis similia, sed minora. Ramos à foliorum sinu singulos producit pedales, aliquando maiores, in summo caule ramorumq; adnatis umbellæ sunt, æstatis initio, luteis in pallido flosculis plenæ: quibus succedit oblongum, angulosum &

duplex semen, magnitudine, figura & colore inter foeniculi & cari semen medium. Radice nititur cubitali, neruosa, digitali serè crassitudine, foris nigra, intus autem candida, eaq; perenni; què gustata simul Tordyli & Pastinacæ Gallicæ saporem æmulatur, semen subamarum, subacrem, & tenuem habet saporem : folia autem non admodum dissimilem sed amariorem. Nascitur in campis et pratis, quæ fluuiorum inundationibus irrigantur.


DE CARO.

CAP. XLIII.

CARON ea æstate qua seritur folia tantum à radice emittit pastinacæ sylvestris similia, paulo tamen minora, nec adeo in latitudinē explicata, neq; hirsuta; altero dehinc uere caulē singularem profert, longitudine bicubitalem, gracilem, teretem, uiridem, glabrum, concavum, & geniculis interseptū : in quibus ramuli sunt & folia, iis quæ iuxta terram crant minora. flores medio uere in umbellis exiguos, candidosq; fert, & post illos semina oblonga, parua, angulosa, in cinereo nigrantia, dupliaq;. Radice nititur serè dodrantali, gracili & candida. ea antequam caulem proferat, mollis est & pastinacæ saporem imitatur, at postquam caulem emisit ligrosa fit & perit. Semen acrem, tenuemq; saporem habet, anetho non dissimilem. Nascitur in pinguibus campis ac pratis, quò fluminū inundationes peruenire queunt, nonnunquam etiam editis, sed tamen pinguibus campis ac pratis.

Caron. T. 1. 152. p. 455.

Phasiolus. T. 2. 12. 613.



De

DE PHASIOLO minore, satiuo: [uel Eruo anguloso, à uiticularum angulis dicto, satiuo. Tragus Pisum Græcorum uocat.] CAP. XLIIII.


PHASIOLUS minor, qui ab aliquibus angulosum eruum appellatur, statim à terra in plures bicubitales spargitur uitculas, easq; latas & angulosas, duobus angulis in molliciem & foliaceam substantiam desinentibus. folia ex interuallo è geniculis profert bina, digitalia, semunciae latitudine indiuiduis neruis à tergo uenosa, glabra & utrinq; in mucronem desinentia, uni pediculo inhaerentia, iis circa annexum singulares adnascuntur & intorti capreoli, quibus aut adminicula apprehendit, aut eorum inopia seipsam comprehēdit. foliorum præterea pediculi quauitculis iunguntur binis, paruis, acuminatisq; foliolis excipiuntur, flores ætatis initio habet candidos papilionum figura. quibus siliquæ succedunt, minimi digiti longitudine & latitudine compressæ, lato & anguloso dorso, uentre autem in aciem attenuato, in quibus semina sunt pisilis mediocribus æqualia, angulosa, & in aciem obtusam desinentia, colore candida, & gustu pisilis similia. Radice nititur parua, candida, fibrata, tuberculis plerumq; exiguis plena: seritur aliorum leguminum modo.

* Weysse & Schern. Alius est phasolus sponte sua stans, quem Colonia uidit.

DE PHALARIDE.

CAP. XLV.

T. 2. 35. p. 669.



PHALARIS culmos tres aut quatuor erigit cubitales, & nonnunquam proceriores, geniculatos, Zeæ aut olyrae culmis non dissimiles, folia è geniculis singula exeunt, dodrætalia, semuncie latitudine in mucronem fastigiata, parua arundini aut tritico similia: ex iisdem geniculis singuli etiam culmi ramorum uice ascendunt, foliis amplexi, spicas desinente uere summis culmis & adnatis singulas rectasq; è foliorum inuolucris protrudit, unciales aut sesquiunciales, digitali crassitudine, teretes, in summitate turbinatas, breuibus, latiusculis, candicantibus & uiridibus lineis distinctis aristis, ueluti squamis compactas: è quibus flores exigui, pallidi staminibus aut tritici floribus similes se proferunt, semen inter squamos fert, milio non dissimile candicans, splendidum, oblongum, & in mucronem acuminatum, gustu milio non dissimile. Radice nititur multifida & fibrata. Culmi & folia graminis aut arundinis, siue aliorum frumentaceorum modo aque am dulcedinem gustu præ se ferunt. Seritur à quibusdam, ut aliæ fruges, estq; estiuum frumentum.

DE ASPARAGO. CAP. XLVI.

ASPARAGUS caules emittit primo uere teneros, longos, teretes, uirides,

T

glabros & sine foliis ab uno cespite plures, qui paulatim in numerosos, tenues & lentos diuiduntur ramos & uirgas, & circa has foliola frequentia, unciae longitudine, indiuidua & capillorum aut setarum modo tenuia: tota itaq; herba cum foeniculo aliquam in foliis similitudinem habet, & duum cubitorum altitudinem petit. Flores sole in geminos transeunte circa ramulos copiosos, paruos, et pallidos producit, & post eos baccas pili quantitate, rotundas, rubentescq; intus carne sua duo aut tria nigra & cornea soliditatis semina claudentes. Radicibus nititur perennibus, numerosis, ab uno transuerso, & propter caulium uestigia, aspero, uillosoq; dorso, utrinque in obliquum descendentibus, longis, teretibus, lentis, foris cineraceis, intus autem candidis, quibus dulcis & glutinosus est sapor: coliculi item adhuc teneri admodum suauem saporem habent, sic ipsa etiam semina. Nascitur campestribus tam editis quam planis locis, quamuis etiam seratur.

Asparagus. T. 1. 74. p. 222.

Althaea. T. 1. 121. p. 371.



DE ALTHAEA, seu Malua palustri.

CAP. XLVII.


ALTHAEA quae palustris malua est, caules erigit plerumq; bicubitales minimi digiti crassitudine, teretes, lanuginosos & solidos, foliis oblongo pediculo insidentibus ex intervallo usq; ad summitem uestitos, ex rotundo in angulos exeuntibus per ambitum serratis, quatuor unciarum aut digitorum latitudine, tactu mollibus, breui & densa, & ueluti detonsa lanugine, holoserico similibus. Ramulos

mulos ē singulis foliorum alis profert similiter foliatis, flores in summis virgis & ramulis emittit candidos, sole in cancro existente, sylvestrium rosarum figura, paulo minores tamen, quinque uncialibus foliolis constantes. in quorum medio paruum est nucamentum, iulo simile, colore rubescens, semen habet latum, paruum, in orbē centro cuidam circumpositum, quod cortice detractō nigricat. Radicibus nititur diuturnis, ab uno trunco descendētibz, cubitalibus, pollicis aut digiti crassitudinis, foris subpallidis, intus autem candidis: substantia & gustu nervosis, lentis, glutinosis, dulcibus & mucilaginosi, aquam coagulantibus. tota herba easdem habet qualitates. Nasctur pinguibz, uliginosis, humentibus & palustribz pratis, & in fossis.

DE PHV maiore, [hortensi.]

CAP. XLVIII.

T. I. 19. p. 60.



PHV maius caules emittit bicubitales, minimi digiti crassitudine, teneros, glabros, concauos, geniculatos, & ueluti candicante polline conspersos. habent adnata etiam caules, eaqz bina in singulis geniculis. flores æstate in caulium & ramulorum summitate exiguos, in purpurea candicantes, corymbis latis & umbellis similibus, insidentes habet: & post eos semina exigua, quibus lanuginosum, & pappis simile quiddam adheret. folia à terra circa caulium pedes multa emittit mollia, glabraqz, sex aut octo unciarum longitudine, latitudine autem trium digitorum, longis, teneris & canaliculatis pediculis insidentia: ea partim incisuris carent, partim uerò in pinnas profundius secta sunt. Radicibus nititur longis, perennibus, in latitudinem se propagatibus, crebrò propter foliorum

uestigia geniculatis, digiti crassitudine, colore cæsiis, transuersis, & in superficie terræ inhaerentibus: à quibus longæ, teretes & iunceæ fibræ in rectum & obliquum descendunt, gustu amaris & subacribus, odore uerò admodum medicato, & Nardi Indicæ aut Celticæ similibus, aliquantulum tamen uirosioribus: nobis colitur in hortis.

T. I. 135. p. 405.



HELLEBORUS niger qui apud nos gignitur, ab uno radice cespit, numerosos emittit pediculos, longitudine dodrantales, aut pedales, iunco crassiores, glabros, in tereti aliquantulum canaliculatos et ab imo rubentes, & nigricantibus maculis variatos, in quorum summitate ex uno principio in latitudinem se pandunt folia, quinque aut sex unciarum longitudine, latitudine uncie aut sesquialterius uncie utroque capite mucronata, per ambitum asperis et aculeatis incisuris, serrata, tactu rigida, inferius in viridi nigricantia, superius autem nigriora, ex his quædam minora sunt, & tria aut quatuor sibi coniunguntur. iuxta utrumque canalis latus quo pediculi sulcantur. Profert etiam coliculos foliorum pediculis æquales: in quorum summitate flores sunt hyeme usque ad ueris initium quatuor aut quinque, pallidis

in viridi foliis: & pollicis ungui æqualibus constantes, plerumque pronos: & quorum medio capitulum angulosum, cornutum, & ueluti filiculis congestum exeritur, aliquot oblongis & nigris seminibus onusta. Radicibus nititur perennibus, crassis & nigris, à quibus plurimæ quoque uersus emittuntur longæ, teretes, iuncæ & nigrae fibræ, odore dum eruuntur admodum graui, ac sambuco non dissimili, sapore amaro, acri & nauseoso: seminibus eadem est qualitas. Nascitur in quibusdam duellæ montibus, saxoso & tamen pingui solo: In Misnia uero & Turingia, Hesseia, Saxonia, & pluribus aliis Germaniæ prouinciis, in hortis colitur.

DE ARO. CAP. L.

ARON primo uere in uolucris modo conuoluta in mucronem emittit folia: ea se paulatim expandunt, & hederaceorum formam asciunt, hisce tamen multo maiora fiunt, nam in dodrantalem plerumque longitudinem excrescunt, & in acutum desinunt, retro uero iuxta pediculum in latitudinem expanduntur, & in sinum recedunt, quibusdam etiam in locis purpureis maculis distinguuntur. Ab eo tempore aliud quoque emittit inuolucrum, breui coliculo insidens & erectum, quod sole ad gemi-

ad geminos properanti aperitur, in leporinæ aut asininæ auriculæ formam, intusq[ue] pistillo culinario simile quiddam ostendit, minimi digiti longitudine, idq[ue] erectum & colore in purpura liuidum aut cinereum, purpureo cuidam & aspero tuberculo innitens, sub quo aliud quoddam tuberculum est prædicto æquale, sed colore pallidum. hoc flaccescente superiori tuberculo atq[ue] pistillo, in iuglandis magnitudinem increfcit, & uiræ rubentis figuram acquirit, singulisq[ue] acinis unum atq[ue] alterum semen continet, eruo paulo minus: hoc instante æstiuo solstitio perficitur, inueniturq[ue] tum temporis sine foliis coliculo, nitens uua: quæ postq[ue] defluxerit, absconditur tota herba. Radice nititur bulbosa, diuturna, pollicis anteriori articulo æquali, candida, teneraq[ue], quæ enascente herba flaccescit, post maturitatem uerò arefciente increfcit & tumida fit: multosq[ue] oculos seu tubercula emittit, quibus se propagat. Odorem omnes herbæ partes grauem spirant: sapore uero adeo acri, linguam & palatum pungunt, ut carduorum & spinarum aculeos esitare se gustantes credant. Nasctur umbrosis, antiquis syluis & uetustis, umbrosisq[ue] urbium & castrorum fossis, ac iuxta sepes: Seritur à quibusdam etiam in hortis.

Aron. T. 2. 80. p. 774.

Perfoliata. T. 1. 162. p. 482.



DE PERFOLIATA. CAP. LL

PERFOLIATA hæc herba dicitur, quoniam caulis per ipsa folia crescit. Singularem emittit caulem cubito longiorem, gracilem, teretem, rubentem, concauū,

& tamen solidum ex intervallo foliis singulis eleganter uestitum, per quæ traiectus esse caulis uidetur, non omnino per medium, sed eo loco ubi omnes eorum uenę ueluti in centro coeunt. habent folia duarum aut trium unciarum longitudinem, præsertim quæ caulem amplectuntur, nam quæ in ramulis sunt iis magnitudine cedunt, omnia tamen subrotunda, modicę turbinata & glabra existunt, inferius autem iuxta terram nulla caulis circumfunduntur, ex omnibus geniculis ramuli exeunt graciles, similiter foliati, eo positu semper seruato, ut ab ima parte foliorum unicus caulis aut ramulus sit, & quāprimum uero caulis aut ramulus folia transierit, in furcam diuidatur, hic ordo usq; ad summam continuatur, in qua plures corymbi sunt, foliis exiguis & in exortu simul coniunctis pediculis insidentibus congesti: in quorū medio, semen paruum, oblongum, angulosum, cartilaginofum, liuidum, numerosum, nudumq; continetur: id flores non habet, præter aliquid luteę cuiusdam lanuginis, nascenti insidentis, Radice nititur candida, tenui, fibrata, lignosa & annua, idēq; inutuli, semen gustu subamarum, acreq; est, & tenuitate sua saluam elicit, folia autem remissiore habent saporem. Nascitur editis & pinguibus aruis, ut Eymbeci & in Hesiā quibusdam aruis, ac alibi etiam, quinetiam a quibusdam in hortis feritur.

DE TITHY MALLO pentaclono, [communipilo, radice inutuli.] CAP. LII.

TITHY MALLVS pentaclonus ab uno radicis cespite plures emittit caules, pede plerumq; proceriores, iunci modo graciles, teretes & glabros. foliis glabris duarum & nonnunquam trium unciarum longitudine, digitiq; latitudine, ac incerto ordine dispositis, uestitos, hi ex summitatis capite ueluti ex centro quinos proferunt furculos, longitudine digitales, admodum graciles & teretes, sub quibus singula sunt folia inferioribus æqualia. Omnes furculi superius in binos, exiguos furculos, furcarum modo diuiduntur: singulisq; furculis bina subsunt folia, prioribus multo minora, longitudine unciali, digiti latitudine, & in mucronem desinētia, furculi autem extremi furcarum semel atq; iterum ex intervallo binis amplectuntur foliolis, sibi in exortu contrariis, proxime descriptis similibus, minoribus tantum. Flores qui propriē sic appellantur non habet, quemadmodum ferē omnes Tithymalli: sed singulos fructus in singulis furculorum eruptionibus, & iuxta foliorum furculos amplectentium principia, magnitudine seminis uicē, figura triquetros, obtusis tamen angulis: aliquantulum hirsutos, in tria loculamenta diuisos: quæ singula continent semina milii aut panico æqualia, foris nigro cortice, intus autem candida, pingui nucleo, gustu dulci: ea in maturitate apertis repente loculamenti proliunt: furculi alios caules etiam proferunt, ē foliorum sinu, sub quinquepartito capite, simili fructu prægnantes, uerū in æqualiter dispositos, Radicibus nititur perennibus, ab uno principio numerosis (maximē pingui, culto, neherboso loco) transuersis, non in altum descendentibus, tortuosis, minimo digito aliquanto gracilioribus, carnosis, in candido flauis, multos rubentesq; asparagos emittentibus, ex quibus sequenti anno germina prodibunt. fibras demittunt radices numerosas, quibus herbanutritur, maiores enim radices caulium tantum ferendorum causa natę sunt, abundat tota herba lacteo liquore: & gustu ac reliquis qualitatibus, cæteris Tithymallis respondet. Nascitur frutetosis locis.

Radices.

DE DAVCO anguloso caulis. CAP. LIII.

DA V C V S angulosus dum ē semine nascitur, primo anno caulem non fert, sed folia undiq; circa radicis caput per terram strata, ea ratione, ut multa folia singula constituent, pedalis enim et canaliculatis pediculis utrinq; apposita sunt, duarum unciarum longitudine, folia ab utroq; latere profundius usq; ad suum quoque

que pediculum in partes per ambitum serratas dissecta: ex his maxima sunt, quae posteriori pediculorum parte exeunt: minima uero, quae anteriore. Caulem altero & nonnunquam tertio anno erigit tripedalem, minimo digito graciliorem, angulosum, & iuxta terram ferè triquetrum, nisi plures intercederent minores anguli, solidum & geniculis præcinctum. folia è geniculis se proferunt inferioribus similia, breuiori tamen pediculo: & ex horum alis pedales, ac plerumq; indiuidui ramuli, angulis striati: in quorum cacumine aestate singulae sunt umbellae, forma conuexae, densae & candidis, minimisq; floribus farctae, melleo liquore ueluti conspersae, quibus odore est lixiuui aut saponis, siue mellis calce mixti. semen * Radice nititur diuturna pedali, pollicis aut digiti crassitudine, candida, circa caput propter amissorum foliorum uestigia & neruos pilosa & uillosa: in crassiores fibras distracta, per quam lignosus descendit neruus. ea gustu acris est, saluam prouocat, diuq; feruorem in gustantis palato relinquit: folia acrimoniae mixtam quoq; amaritudinem habent. Semen uero * Nascitur asperis & editis locis: copiosissimaq; lenae, in uinearum incultis calculosisq; partibus: & Vuitembergæ in tumulis quibusdam sabulosis, qua ex urbae uersus septentrionem itur.

* Querendum numquid cum Oreoselino, hoc est, Apio montano, commune habeat hæc herba.

DE IXOPO. [Intybacea herba, cui nomen à liquore, quem Greci *opon* uocant, quem *ixi*, id est, uisci instar uiscosum habet, consinxit.] CAP. LIIII.

IXOPVS intybacea herba est, ea numerosa emittit à radice capite folia, longitudine do drantali, latitudine unciali, acuminata, & undiq; per terram strata, parum etiam in obliquum erecta: è quorum medio unus atq; alter, aut nonnunquam plures exeunt do drantales, & interdum pedales coliculi, teretes, teneriq; in quorum cacumine, circa ueris medium singuli sunt orbiculati flores, multis luteis capilamentis uni calici insidentibus constantes: qui deinde in pappos resoluti auolant, una cum oblongo & inferius annexo semine. Radice nititur perenni, pedali, duum digitorum crassitudine, foris nigra, intus candida, carnosae & fungosae: quae præcisa, copiosum emittit liquorem, colore in lacteo modicè cinereum, qui digitis tractatus, aut gustatus, substantia uisco similis fit, & in longum ductilis, siccatu uero rufescit, paulatimq; nigrescit. Tota herba gustu dulcis est, chondrilla prioris modo. liquor non ignauiter etiam adstringit, odore uero nullo commendatur. Nascitur editis, apricis, montanis locis: terram amat pinguem, calcario lapide mixtam plurimo, ideo provenit circa lenam.

* Vidimus nos similem herbam in solo argilloso ad pedem montis, folijs ferè plantaginis minoris: radice chærida suffluta, iuniperum ferè olente, etc.

DE THAMECNEMO.


CAP. LV.

THAMECNEMUM caulem habet pedalem, teretem, glabrum, solidum, singularem, inferius tumidis geniculis binum digitorum intervallo interceptum, in summitate crebris furculis, usq; bifidis & trifidis, atq; è geniculis prodeuntibus, ramosum. folia è singulis geniculis exeunt bina, pingua & glabra, in uiridi cœrulea, longitudine digitali, latitudine uero unciali. flores aestatis initio fert in summis furculis paruos, quinque folios, colore puniceos, nuncq; omnino se aperientes, sed semiclaussis similes, tumido, molli & quinque angulari calici insidentes, quo detracto, capitulum emicat nuce auellana minus. hoc cum maturuit, in quatuor plerumq; partes dehiscit, & rotunda nigraq; semina ostendit milio paulò maiora. Radice nititur parua, annua & inutili, folia gustu subamara sunt & brassicae saporem referunt. Nascitur in aruis, solum amat pingue, album, & marga stercoreatum, quare Hamelanum est in Angrinariis.

* Videtur ad polemonij uel perfoliate species pertinere. Graece lingua peritus forè Thamoocnemum potius dixerit, siue à *laqueis*, siue à *laquadi*, quod est creber.

Thamecnemum.

Lavandula maior. T. 1. 18. p. 58.



DE LAVANDULA maiore, [quam spicam nardi vulgus nominat: Dodonæus
Lavandulam marem] CAP. LVI.

LAVANDula maior frutex est cubitalis plerumq; à breui & scabro caudice in plurimos foliatis furculos diuisus, uirgas æstate profert numerosas, nonnunquã cubitales, iunco graciliores, quadrangulares, aliquantulum hirtas & striatas, geniculis longo inreruallo interceptos: è singulis geniculis folia prodeunt duarum unciarum longitudine, tenuia, angusta & hirta. flores summis uirgis fert paruos, hiantes & purpureos, in gracili & digitali longitudine spica dispositos, angustis, striatisque caliculis insidentes, quibus exigua, nigra & splendentia semina succedunt, uirgæ maturo femine exarescunt, qui uerò circa terram è caudice profunt surculi perennes sunt, & tota hyeme folijs cinerei coloris uestiuntur. Radice nititur lignea & fibrata, saporem habent folia et flores amarum, subacrem, aromaticũ, tenuem et totum palatum penetrantem, odorem quoq; uehementem, acrem, tenuem & iucundum: eadem substantia constant, pingui, ideòq; copiosum oleum, uulgo spicæ oleũ appellatum, in sublimatione remittunt. Colitur apud nos in hortis, in Narbonensi autem Gallia sponte provenit tantacopia, ut non temerè alia materia accendendo igni adhibeatur.

DE LAVENDULA minore, & quam uulgò simpliciter Lauendulam nominant. Dodonæus
Lauendulam feminam.] CAP. LVII.

LAUENDula minor maiori in cunctis similis est, minoribus tamen furculis & foliis, breuioribusq; spicis constat, odore quoq; & sapore remissiori, olfactum recreat, non enim adeò grauem odorem spirat, minusq; pinguis existit. Colitur & hæc in hortis.

Lauendula minor. T. 1. 18. p. 57.

Stichas. T. 1. 79. p. 213.



DE STICHADE Arabica.

CAP. LVIII.

STichas quæ hodie Arabica stichas appellatur, mediam habet inter maiorem & minorem Lauendulam figuram, spica tantum crassiore & multò densiore constat, flores alioquin Lauendulæ forma & colore similes fert maiores tamen; odore & sapore maiorem Lauendulam æmulatur, sed multum superat, uelimentissimū enim & aromaticum odorem spirat, substantia quoq; non minus pingui constat ac illa, in Germania semine sata pullulat quidem, primaq; æstate fœliciter adolescit, hyemem tamen nequaquam tolerat, quapropter eo tempore intra tectum ferenda est, & tepida nec obnoxia gelu camera fouenda. Cellariis humidioribus seruata, contrahit situm & perit, ideo tutissime prædicto loco seruatur. In Narbonensis autem Galliæ

quibusdam locis sponte cum Lauendula nascitur, praesertim in Massiliensi provincia.

* Nostra Spica & Lauandula sunt sylvestres species Stechadis. maiores lignosiores, odore & gustu ignauiores.

T. 2. 106. p. 347.



DE DIPSAKO sylvestri. CAP. LIX.

DIPSAcus aculeata est herba, ex car-
duaceo genere, primo anno cum e se-
mine aut sponte enata fuerit caulem non
fert, sed tantum folia, longitudine dodran-
talia, latitudine trium digitorum, nonnun-
quam etiam maiora, aspera, rugosa & supe-
rius aculeis armata, undiq; in orbem à radi-
cis capite strata, & in terra iacentia, totaq;
hyeme uirentia: ex quorum medio sequenti
anno caulis assurgit rectus, bicubitalis, mi-
nimi digiti crassitudine, teres, glaber, inter-
imq; angulis striatus, maxime in summita-
te tactu solidus, intus tamè aliquantum con-
cauus, colore cādicans, geniculatus et spi-
nis Raie piscis modo armatus, praesertim in
summis uirgis. folia è singulis geniculis bi-
na exeunt, praedictis plerumq; longiora &
magis acuminata, nullis in superficie spinis
horrida, nam aculeos tantum in eminenti
dorso ferūt Luciorum dentibus similes, ex
his aliquot quæ à duobus aut tribus inferi-
oribus geniculis prodeunt, non ab inuicem
discreta sunt sed cōtinua iuxta exortum, &
concauo sinu ueluti labro quodam cau-
lem amplectuntur, quo rores & pluuiales
aquæ etiam siccis diebus aliquando conti-
nentur. supra hæc foliorum labra ramuli ex-
eunt, è singulis geniculis bini, alterno & cru-
ciformi positi, caulis modo geniculati &

aculeati, in quorum summitate singula sunt oblonga & ouata capita, longitudine di-
gitali, et latitudine duarum unciarum aut trium digitorum, aculeis longis, angustis,
mollibus & obliquo ordine dispositis constantia: sub his ubi ramulis insident, in or-
bem se proferunt, ueluti longi quidam radii, resupinati & inferius aculeati. flores in
ter aculeos capita proferunt æstate paruos, in ruffo purpureos, lanuginosos & pa-
uis staminibus, quibus singula succedunt oblonga & angulosa semina, omnia capi-
ta intus oblongam habent concauitatem, lanuginosa quadam medulla plenam: in
qua nonnunq; uermiculi gignuntur: maximum autem est quod medio cauli insidet
caput. Radice nititur fere dodrantali, digiti crassitudine, candida & fibrata, primo
anno carnosa, altero uerò lignosa, & postquam exaruerit caulis, intereunte. folia gu-
stu amara sunt, quemadmodum & radix. Nascitur campestribus, planis locis, circa
fossas & riuulos.

DE DIPSACO satiuo: [cuius capitum aculei deorsum inflexi sunt: aliud ferè nihil differt à superiore.] CAP. LX.

DIPSACUS satiuus syluestri per omnia ferè similis est, maioribus tamen omnibus partibus constat, nec quicquam etiam differt partium positu aliusque proprietatibus, præterquam quod capitum aculei duriores, & deorsum inflexi sunt: floresque candidiores ferat. Capitibus in uellicando panto fullones utuntur, cuius rei causa, in hortis feritur, uiribus syluestri responder, quamuis paulò debilioribus.

DE PEPLO, [quem aliqui Esulam rotundam uocant, folijs non serratis, etc. autumnò locis cultis diu apparet, sub hyemis etiam initium.]

CAP. LXI.



PEPLVS Tithymalli species est semestris, eadem enim æstate qua ex semine prodierit, interit, sparsoque semine se quotannis propagat. Caulem unum atque alterum statim à terra emittit iunco crassiores, teretem, glabrum, subrubens-tem, & solidum, aliquot ab ima parte adnatis inequali et incerto ordine dispositis frondosum, in tres ramulos diuisum, quorum singuli deinde in binas, quinquies, sexies, aut sæpius circa exortum coeuntibus, subdiuiduntur. folia sub singulis furcis è geniculis prodeunt bina, contrario positu Rutæ latifoliæ & hyperici folijs similia & æqualia. Sub trifidis autem ramulis terna sunt folia, ex his rotundiora sunt ac iuxta annexum angustiora, quæ ab inferioribus anomalis adnatis incerto ordine exeunt, in extremarum furcularum angulis exiguum & hirsutum quiddam floris loco conspicitur, secus quod exigui sunt & triquetri folliculi in terram annuente, in singulis furcularum angulis singuli, quibus terra clauduntur semina papaueri æquale, foris nigrum, intus autem candidum, inferiores furculæ primò semen ferunt, deinde superiores ideoque successiue, fructificat tota æstate seorsumque maturum eiacularur, & propter diffusos ramulos humi frequenter sternitur. Radice nititur gracili, breui, candida, multis capillamentis fibrata, lignosa & inuili. Abundantia

trahit & folia lacteo liquore, primum subdulci, interimque modicè acri, deinde paulatim fauces exurente, semen dulcius est, sed similiter gustantis os accendit. Nasceitur in hortis & uineis.

DE PARIETARIA, [uulgo dicta, Helxine ueterum.] CAP. LXII.

PARIETARIA caules ab uno cespite plures emittit cubito proceriores, teretes, uirides & solidos, ab inferiori parte ultra medium usque ramosos, ex quibus per

interualla exeunt singula folia, oblonga, duarum unciarum aut digitorum latitudine, in summis uirgis minora, in oblongum mucronem fastigiata, & iuxta pediculum similiter ferè acuminata, tactu aspera, hirsuta & streptentia. secus quæ parua et asperè quædam sunt, & numerosæ ueluti lappæ, uerticillorum Marrubii modo caulibus circumpositæ, uestibus tenaciter adhærentes, candicantibus flosculis plenæ, adeò paruis ut uisum ferè subterfugiant, iisdemq; antequam aperiantur rubētibus, semina lappis continentur, admodum parua, nigra & splendentia. Radicibus nititur perennibus, numerosis, do drantalibus, candicantibus, & iunco crassioribus, foris carnofo, molliq; cortice uestitis, intus autem lignosis & fibratis, facileq; dum manibus stringuntur, corticem remittentibus. Saporem habent folia & lappæ dulcem & aqueum. Caules uerò aliquantulum cum aqueo sapore amarescunt. Radices postremo prædictis, gustu respondent, præterquam quod simul non parum adstringant. Nascitur circa macerías, parietes & muros, in tectorum stillicidiis.

Parietaria. T. 1. 63. p. 193.

Botrys. T. 1. 124. p. 887.



DE BOTRY.

CAP. LXIII.

BOTRYS, quæ etiam Ambrosia appellatur, æstiuæ herba est. Caulem erigit rubentem, hirsutum, minimo digito graciliorem, tortuosum et solidum, nec omnino teretè, multis alis & ramis fruticosum. folia habet inferius sub ramulis singula digito longiora, duorum digitorum aut unciarum latitudine, per ambitum Cichorii, quercus

rii, quercus & Erucae modo laciniata & sinuosa, aliquantulum hirsuta, à tergo, id est, subtus crassa, eminente, fragiliq; spina, & uenis ad lacinias prodeuntibus distincta, ac colore in pallidum uergentia, superius uerò uiridiora, & concavis canaliculis infra eminentibus contrariis, sulcata, quæ autem ramulis breui intervallo adnascuntur folia prædictis multo minora sunt, æstate totis ramulis secus folia adnascuntur, in latitudinem diffusi racemi admodum parui, parietariæ lappulis non dissimiles, præterquam quod uirgas non amplectantur, sed ab iis ad latera extendantur. Flores qui propriè sic appellari possint non habet, paruam enim & quæ uix cognosci possit in racemis fert lanuginem colore candicantem, figura parietariæ flosculis respondentem, semen in racemulis fert papaueri minus. Radice nititur semestri, breui, fibrata, lignosa & inutili. Saporem racemi amarum habent, quibus maturescen-
bus, folia pallescunt & decidunt. Odorem tota herba admodum iucundum & uis-
nosum spirat. Seritur apud nos in hortis.

DE ABROTONO nigro masculo.

CAP. LXIIII.


T. I. 112. p. 341.



ABR Otonum nigrum seu masculum frutex est odoratus, uirgas ab uno radice trunco, profert numerosas et lignosas: à quibus plures erigit cubitales & graciles turculos, capillaris, angustis, incisis, & in latitudinem diffusis foliis plenos, flores & semina æstate circa surculos numerosos fert, colore ad aurum inclinantes, figura absynthii floribus & seminibus respondentes, quamuis in plurimis Germaniæ regionibus neque flores neq; semen producat, propter aliosam naturā, & nostratis cœli frigiditatem. Radice nititur lignosa & ramosa, folia & summas surculorum partes hyeme amittit. Odorem habent comæ eius uehementer acrem, & aliquantulum grauem, saporem uerò amarum, tenui & palatū penetranti acrimoniæ mixtum. Colitur apud nos in hortis.

DE ABROTONO candido seu femina. [Aliqui pro Abrotono semina Chamecoparissum dunt.] CAP. LXV.

ABR Otonum candidum surculos, nigro Abrotono similes producit, similibusq; foliis, floribus et seminibus uestitos, præterquam quod folia non ita tenuia sint, sed aliquam habeant cum Achilleæ foliis similitudinem eadem superius nigro Abrotono candidiora sunt, inferius autem multo candidiora & cinerea, surculos hyeme omnino amittit. Radicibus nititur perennibus, gracilibus & fibratis, plurimas quoque uersus sub terræ superficie uiticulas spargens, quibus se quotannis cum scenore propagat, ideoq; non unus atq; alter surculus solus inuenitur, sed integra sylua simul: saporem & odorem nigro Abrotono ferè similem habet, remissiorem tamen. Nasctur cœtis campis,

*Abrotonum candidum.**Hyssopus sativa.* T. 1. 14. p. 47.DE HYSSOPO *sativa.*

CAP. LXVI.

HYSSOPUS *sativa* caudicem habet in ramos diuisum, à quibus lignosæ, geniculatæ, quadrangulares & cubitales assurgunt uirgæ. è quorum geniculis binæ & circa exortum coniuncti prodeunt furculi alterno & cruciformi positi: folia sub hisdem furculis è geniculis exeunt quaterna, bina aut plura, longitudine uncialia, angusta & utrinque acuminata, glabra & ueluti acu puncta, non tamen perforata: in summis furculis parui & denticulati calices exiguos corymbos constituunt, in spica dispositos, flores æstate à caliculis singuli prodeunt hiantes, qui plerumque stamina exerentes, colore in purpura cœruleos & omnino saluiæ floribus similes, minores tamen, semina flores singuli ut plurimum quaterna relinquunt, nigra & admodum parua, hyeme summas uirgas amittit saluis inferioribus. Radice nititur lignosa & perenni. Odorem coma eius acrem, aromaticum & iucundum spirat, saporem habet amarum, feruidum & tenuitate sua totum palatum penetrantem. Colitur in hortis, prouenit etiam in murorum coronis.


De

CEPA ouata prima æstate qua seritur folia uulgaris similia profert. Altero uero anno cum rursus deponitur quatuor aut quinque emittit caules, uulgari similes: in quorum summitate globosa sunt capitula, & in his flores & semina nostrati æqualia. ipsa uero Cepa à nostrati differt, quod longa & utrinque acuminata est: minus etiam inflat quam uulgaris Cepa.

* Alia est quam Ascaloniam nonnulli cognominant, utpote sterilis.

DE THLASPI Cardamoide. CAP. LXVIII.

T. 1. 27. p. 87.




THLASPICARDAMOIDES siue nasturtium, folia habet modicè pinguis, digitali longitudine & latitudine aliquantum serrata, ex his aliquot profundius sunt incisa, omnia per terram undiq; sternuntur. Caulem è medio foliorum singularem erigit, pede proceriorem, teretem et leniter hirsutum, brevioribus foliis uestitum, in summitate in ramulos furculaceos diuisum: quibus enascentibus folia quæ circa terram sunt exarescunt: flores habet exiguos, candidos & numerosos, undiq; ramulis circumpositos, eosq; non simul, sed particulatim & tantum in summitate pro ducit, semen habet copiosum, totis ramulis adnascens in singulis pericarpis, iisq; inferioribus conuexis, superius aliquantulum concavis & compressis, geminum, figura & quantitate nasturtii, colore rufum, totum pericarpium conuexi alicuius clypeoli formam refert, & utrinq; eminenti semine aliquam cordis speciem ostendit. Radice nititur semestri, oblonga, gracili, candida, lignosa & inutili, folia gustu uehementer acris sunt, & nasturtium æmulantur, semina autem glutinosum lentorem acrimoniæ commixtum habent. Nascitur lutosis & pinguibus aruis, secus uias inter segetes, copiosissimumq; inter Gofslariam & Hildesheimium in Saxonia.

DE ISOPHYLLO.

CAP. LXIX.

ISOPHYLLON quamuis umbellifera sit herba suum habet proprium genus neq; enim incilis constat foliis, sed indiuiduis & æqualibus. Caules ab una radice emittit duos tres aut quatuor bicubitales ferè ut plurimum crebro geniculatos, graciles, teretes, glabros & uirides, folia è geniculis singula profert quatuor aut quinque unciarum longitudine, unius uncie aut digiti latitudine, uiridia, glabra & uenosa, minimè incisa, ac sine pediculo geniculis adnascens, quæ tamen iuxta ter-

Isophyllon. T. 1. 143. p. 431.



ram sunt, folia antequam caules adoleſcant latiora ſunt, quæ uerò in ſummitate prodeunt, multò minora prædictis exiſtunt. Ramulos à geniculis producit longos, in quorum ſummitate exiguæ ſunt umbellæ, paruis & luteis floſculis plenæ, quibus ſemina ſuccedunt, perfoliatæ ſimilia. Radice nititur perenni, candicante, gracili & in partes diſtracta, lignoſo intus neruo. Saporem habet tota herba ſubacrem, aliquantulum amarum, & ſaliuam prouocantem, perfoliatæ non diſſimilem. Naſcitur montanis locis, ſolum amat argillaceum, calcario lapidi mixtum.

* Heyl aller welt. Pontanus Elaphuſcum uocat ex Gallia.

DE GERANIO ſupino maiore, [ſolijs ſerè cicutæ, locis cultis naſcitur, etc: Videtur autem cognatum Geranio primo Dioſcoridis.] CAP. LXX.

GERANium ſupinum maius, uiticulas ab una radice emittit plures, plerumque cubitales aut maiores, (nili ſolis ſiccitas impediât,) geniculatas, hirsutas & molles, undique per terram ſtratas. folia habet longiora quam uncia, profundius incifa et ferrata, cicutæ folijs non diſſimilia, modicè hirsuta, dodrantalibus aut breuioribus pediculis utrinque adnaſcentia, non tamen in exortu coniuncta. Flores tota æſtate fert in longis

& gracilibus pediculis, ab uno principio prodeuntes, paruos, quinqueſolios, colore puniceos, numero quinque ſex aut ſeptem, quibus totidem roſtrata ſuccedunt & reſupina capitula, quorum roſtra acubus æqualia ſunt, ea in maturitate inferius in quas partes dehifcunt, et contrahuntur, ſinguliſque partibus ſingula adhaerent ſemina, oblonga, flaua & lanuginofa. Radice nititur oblonga, gracili, in partes diſtracta, candida, & ſemeftri: quæ aliquantulum foetet, Saporem habet tota herba aqueum ſerè. Naſcitur cultis agris & hortis, & minimè in campis aut herbofis locis.

DE VERTICA minore.

CAP. LXXI.

VERTICA minor caulem pedalem aut proceriorem erigit, aliquantulum ſtriatum, & aculeatum, folia ex interuallo profert bina, breuibus quidem, ſed ad pungendum & urendum infeſtis ſpinulis armata, unciarum ſerè duarum longitudine, latitudine unius, utrinque acuminata, per ambitum profundius ferræ modo incifa, in exortu contrariis pediculis coeuntia, ſecus quæ quaterni ſunt in ſingulis geniculis, ueluti exigui racemuli, minimos floſculos proferentes, parietariæ floribus, ſi gura, colore & quantitate æquales, quibus ſuccedunt nigra ſemina lino ſimilia, multò tamen minora. Profert etiam adnatae foliorum alis ſingula ſimilibus folijs & racemulis uestita. Radice nititur breui, gracili, candida, ſemeftri & inutili. Odorem habet dum tractatur grauem, guſtuque dulcis eſt, præſertim ſemen, corpori admotum uehement-

mentissime urit, mirumq; est tam parvis aculeis adeo feruidam inesse naturam, ut ignis modo dolorem & pustulas excitent. Nascitur in hortorum areis, fossis, rudibus & areis circa pagos.

* Beyster Vessel.

Urtica minor. T. 1. 1. p. 3. *maior ibi male legitur, pro minor.*

Chamaepitys prima. T. 1. 25. p. 80.



DE CHAMAEPITY prima. [Aliqui tertiam hanc faciunt.] CAP. LXXII.

CHAMEpitys prima ab uno radice capite plures emittit coliculos, longitudine do drantales, nonnunq; etiam pedales, graciles, teretes, rubentes, hirsutos & solidos, foliis undiq; plenis. ea breui admodu interuallo, cruciformi & alterno posita a coliculis exeunt, e singulis geniculis bina in exortu coniuncta, ab uno principio internas unciales, angustas, hirsutas et minimè serratas partes diuisa; flores in foliorum alis singulos habet, Polii, Scordii aut Chama dryos floribus similes & equales, colore luteos, floret paulatim ab imis geniculis incipiens, quapropter per totam aestatem flores producit: iis singulis quaterna succedunt, parua, oblonga & teretia, semina florum caliculis insidentia. Radice nititur oblonga, candida, semestri & inutili. Herba odorem spirat aliquantulum grauem, resiniferis arboribus non dissimilem, quarum comas forma etiam æmulatur, unde nomen inuenit. Saporem habet amarum. Nascitur in uineis & aruis, plurimumq; circa Viirciburgum, in Boioheymia, & Renano tractu, solum amat aliquantulum pingue & calida loca.

T. 1. 78. p. 237.



BVGLOSSA urbana, quæ hodie Borrago ab omnibus medicis & pharmacopolis vocatur, caulem habet inferius pollice multo crassiore, statim à terra in plura sesquicubitalia, ramosa et cōcava brachia inæquali ordine diffusum, folia habet per terram strata, longitudine do drātalīa, quinque aut sex unciarum latitudine, utrinque ferè rotunda, digitali pediculo cauli adhærentia, rugosa, aspera & tactu strepentina: quæ uerò in ramis sub adnatis sunt folia prædictis minora existunt, sed similiter aspera. uestitur tota herba plurimis, parvis et fragilibus aculeis, tactu pruritum excitantibus, flores particulatim per totam profert ætatem, in summis adnatis cœruleos, latitudine unciales, in quinque acuminatas partes stellæ modo diuisos, teneros et in terram pronos, in quorū medio quini nigricantes apices

prominent, flores singuli ultra diem non durant, quibus excidentibus calix ipsorum radiatus clauditur, & incrementum capescit, fouetq; in se quaterna (ut plurimum) aut pauciora semina, oblonga, aspera, serpentinis capitibus aliquantulum similia, inferius ueluti angustum collum habentia, ea cum foris nigrum colorem in maturitate contraxerint, apertis denuo calicibus excidunt, & sequenti uere germinant. Radice nititur crassa, breui, candida, carnosâ & semestri, nigris dodrantalibus fibris nutrimentum attrahente. Saporem habet tota herba dulcem & suauem. Nascitur in hortis, semel autem sata difficulter deletur.

DE ALTERA Buglossa urbana.

CAP. LXXIIII.

EST & alia urbana Buglossa siue Borrago, quæ solo florum colore à priore differt, omnino enim candidos fert flores.

De

DE HERACLEA [Sideritidem hanc primam facium, aliqui Tetrabit aut
herbam Iudaicam nuncupant.] CAP. LXXV.

HERACLEA, quæ etiam Sideritis Heraclea uocatur, caulem habet dodrantalem, gracilem, quadrangularem & hirsutum, in binos ex intervallo ramulos, alternis & contrariis lateribus exeuntes, ex intervallo distractum. folia statim à terra usque ad summitatem fert breui interstitio, chamædryos quantitate, profundius & pulchrius ex obliquo incisa, minora & paucioribus incisuris diuisa quo summitati propiora: hæc è singulis geniculis bina alternis lateribus & cruciformi positu prodeunt. flores æstate paruos secus folia, ternos, quaternos aut nonnunquam plures fert, uiridibus, resupinatis & denticulatis caliculis insidentes, scordij aut chamædryos floribus, figura & rubente colore similes, quibus decidentibus demittuntur eorum caliculi, seminaque in se gignunt, exiguum, nigrum, scordio aut Chamædryi æquale. Radice nititur breui, fibrata, candida, annua & inuitili: semen cum æstate ceciderit autumnii initio germinat, folia tantum proferens, ea proximo uere enato caule flaccescunt: saporem habet amarum, odorem uerò acrem, grauem, ueluti si quis uinum & lupulum commisceat. Nascitur in uineis, & earum muris, caluicisq; apricis & editis locis, nonnunquã etiam in aruis. solum amat pingue, calcario lapidi mixtum.

* Est 3eyßgenfrait. Non est Sideritis Euchlij, quæ multò maior hac est, & arthriticis prodest. Germanice Beruffraut.

T. 1. 39. p. 111.



DE PANICO. CAP. LXXXVL

PANICUM æstiuum est frumentum, culmum ex uno semine singularem erigit duobus plerumque cubitis, fecundo solo proceriorem, solidum & geniculis tumētib; præinctum, in cacumine attenuatum, folia à geniculis singula exeunt longitudine plerumque cubitalia, latitudine unciali, acuminata & arundinea. spicam in summo culmo fert dodrantalem, & nonnunquã pedale duorum ferè digitorum crassitudine, pronam & uulpinæ caudæ similem, semine exiguo, flauo & milio simili, plenam et confertam, prodeunte è foliis, & crescente spica à duobus inferioribus culmi, geniculis, undique in orbem enascuntur, & in terram descendunt fulcra, quibus fulcitur ipse culmus, ne pondere nutantis spicæ sternatur, & humi procumbat: tanta est diuinæ prouidentiae erga tam uilem herbam clementia, benignitas et sollicitudo. Radicibus nititur fibratis, gustu et qualitate milio respondet. Seritur in agris.

DE PVLEGIO. CAP. LXXXVII.

PVLEGium exigua est herba per terram serpens, folia habet parua, subrotunda modice acuminata, et obscuris incisuris

X ij

T. 1. 6. p. 23.



trantem . Nascitur campestribus, necherbosis locis, fluminum inundationi obnoxiiis.

DE HORDEO *glabro*.

CAP. LXXVIII.

HORDEUM glabrum æstivum est frumentum, culmos ex uno grano emittit decem, viginti, triginta, aut nonnunquam plures fecundo solo, nostrati hordeo similes & æquales, quod etiam spicis & spicarum aristis æmulatur, semen habet hordeo æquale, tritici modo purum, glabrum & nitidum, facile dum tractatur, à glumis recedens. Radicibus nititur multis, tenuibus & fibratis. Semen gustu hordeum & triticum imitatur. Solum amat fecundum.

* Dodonæus, à quo Eiconem hanc mutuati sumus, zeopyron vocat: & ex Galeno etiam Gymnocrithon id est, Hordeum nudum. Tritici (inquit) species est, zeæ & hordei similitudinem quandam referens.

De

Hordeum glabrum.


DE CHAMAEPEUCE. [*Querendum an hæc Erica altera Matthioli sit, quam pingit, non describit.*] CAP. LXXIX.

CHAMAEPEUCE frutex est plurimis à terra assurgens uirgis, in summitate ru- Dioscori =
 bête lanugine oblitis. folia habet sesquiunciali longitudine, angusta, gracilia, des flores
 retroflexis utrinq; laterum extremitatibus, & à tergo modicè hirsuta, flaua, hyeme rosæ ei tri-
 uirentia: flores ueris exitu in summis uirgis producit, paruos, candidos, & folia buit, quod
 ceos, corymborum modo coaceruatos, his singuli succedunt parui, aridiq; fructus, forte perpe-
 hordeo minores, in quibus tantillum clauditur semen. Radicibus nititur longis, ram legi-
 obliquis & fibratis, foris in flauo rubentibus. Odorem folia, flores & fructus gra- tur. Plinius
 uissimum habent: saporem uerò acrem & uehementer tenuem. Nascitur macris, florum nos
 putridis uliginosisq; locis, sub Tædis arboribus. meminit.

* Hæc non Cordi Chamæpeuce, mihi ignota: sed nostra est.

Chamaepeuce. T. 1. 189. p. 555.

Mercurialis mascula sylvestris.



DE MERCVRIALI mascula sylvestri. CAP. LXXX.

MERCVRialis mascula sylvestris, masculæ Mercuriali in cultis locis nascen-
ti, caulibus, foliis & semine similis existit, folia tamen nigriora, duriora, siccl-
oraq; habet, semen etiam multò maius. Radicibus nititur obliquis aut transuersis,
(à quibus plures exeunt fibræ) iisq; non annuis, ut urbana, sed diuturnis & perennibus.
Qualitate urbanæ responderet, non tamen adeò efficax est in soluenda aluo.
Nascitur in pinguibus sylvis.

DE MERCVRIALI foemina sylvestri: [Aliqui foeminam in hoc genere esse
negant: nec ego reperisse memini.] CAP. LXXXI.

MERCVRialis foemina sylvestris, Mercuriali foemine in cultis provenienti si-
milis est, nigrioribus tamen foliis, & maioribus seminum racemulis constat,
neque annuam habet radicem, sed perennem, obliquam, & fibratam: qualitatibus
Masculæ responderet, iisdemq; locis gignitur.

De

BACTR Ianum ſiue Indicum triticum æſtium eſt frumentum. Culmum pro-
fert tricutale, geniculatum, digiti craſſitudine, ſolidum, intus fungoſa me-
dulla plenum. folia habet cubito plerumq; longiora, trium aut quatuor unciarum
latitudine, uenoſa & arundinea. ſpicas in ſummo culmo fert dodrantes, plerumq;
graciles & raras olyre ſpicas ſimiles, & ſimiliter flores, aliquando quindecim, ui-
ginti aut triginta, quæ poſtquam deſloruerunt exareſcunt, & nullum ſemen produ-
cunt, quæ uerò fructum ferunt ſpica, inferius è culmi geniculis exeunt, nonnunquã
tres aut quatuor, at à ſingulis nodis ſingulæ, longitudine do drantes aut maiores,
manum implente craſſitudine, multis foliaceis tunicis tectæ, tam ſtriectæ in ſummi-
tate conuolutis, ut ne aquam quidem tranſmittant quæ ſpicas corrumpere poſſit. ſpi-
cæ cum ad iuſtam magnitudinem peruenerint ſorum uice numeroſos, longos, &
candicantes producant, ueluti capillos è ſtriecto cacumine prominentes, & ſinguli
ſingulis adhærent ſeminibus, ea detractis (cum exaruerunt tunicis) conſpiciuntur
pili maioris quantitate, & ſine glumis aut ariſtis octo aut decem uerſibus in longi-
tudinem porrectis, fungoſum mediaſtinum undiq; amplectuntur, tamq; arcu con-
iunguntur, ut propter compreſſionem anguloſa fiant, & nonnunquam rumpantur,
colorem habent flauum aut croceum. inuenitur etiam peculiare genus, omnino ru-
bentibus & nigricantibus granis. Radicibus nititur multis, obliquis & fibratis,
quibus etiam accedunt fulcra quædam ab imo geniculo undiq; exeuntia, & in terrâ
demiffa, quibus uento agitata ſeges ſuſtentatur: ſolum amat pingue & humidum.
Saporem ſemina habent cæteris frumentaceis dulciorem & ſuauiorem.

* *Türkiſch oder Indianiſch Korn.*

Triticum Baſtrianum, T. 1. 26. p. 651.

Aſarum, T. 1. 20. p. 64.



ASARVM breues per terram spargit colículos, à quibus folia exeunt hederacea, trium digitorum aut duarum unciarum latitudine, densa, rotunda & iuxta pediculum in sinum recedentia. flores iuxta terram, foliorum pediculis annexos, primo uere producit, Hyoscyami uasculis similes, minores tamē trifido labro, & introrsum curuato, colore purpurascens, in quibus semina sunt uitis acinorum nucelēis similia, minora tamen, angulosa & breuissimis ueluti aculeis exasperata. Radices per terrae superficiem spargit perennes, numerosas, in geniculis fibratas, iuncē grācilitatis, in pallido fuscas, sapore aromatum modo acri & iucundo, odore ad modum grato, uehementi & Nardum æmulante, quæ mansæ uomitum cient, uiret tota hyeme, & radicibus se propagat, nascitur etiam ex semine. Prouenit montanis & frutetosis locis, solum amat pingue & densum, plurimumq; sub corylis.

DE CORRUDA. [uel syluestri Asparago aculeato.] CAP. LXXXIII.

CORRUDA Asparagi species est, syluestri Asparago similima, præterquā quod folia non mollia, sed aculeorum modo dura & acuminata habeat. Nascitur iisdem quibus syluestris Asparagus locis. rarō tamen simul proueniunt. maior enim Germaniæ pars syluestri Asparago abundat. ex uerō Germaniæ regiones quæ Viennam Austriæ circumiacent, Corruda scaten, qualitates habet easdem quas inculcus Asparagus.

* Corruda siue Myacantha imaginem ex Dodonæi libris apposuimus.

Corruda.

Phyllitis, T. 1, 188, p. 549.




DE PHYLITIDE. CAP. LXXXV.

PHYLITIS, quæ etiam Hemionium appellatur, plura ab uno cespite folia emittit do drantalia aut pedalia, duarum unciarum plerumq; latitudine, acuto Rumici similia, obtusiora tamen, speciosiora, glabra & densa: à tergo ab utraq; spinæ parte oblongos, hirsutos, flavos aut rubentes, ueluti uermiculos, deinceps per transversum, & ferè obliquum dispositos ferentia. Radicibus nititur numerosis, masculæ filici similibus, implicitis foliorum uestigiis consistentibus, fibratis, foris nigricantibus, intus autem in pallido uiridibus: neque caulem, neq; florem, neque semen fert, è uermiculis tamen foliorum, in puluerem resolutis & sparsis nascitur. Viret tota hyeme, & ab iisdem radicibus noua folia singulis annis profert, prioribus numerosiora: saporem habet tota herba adstringentem, cum tenuitate aliqua. Prouenit umbrosis & saxosis montibus: solum amat pingue, non tamen ex ipsa terra immediate nascitur, sed ex musco lapides & præsertim calcarios tegente.

* Unser Burschung.

DE POLYGONATO tenuifolio [aliqui erectum, uel angustifolium cognominant.] CAP. LXXXVI.

T. I. 31. p. 400.




POLYGONATUM tenuifolium, caulem (aut aliquando plures) erigit cubitalem, iuncæ gracilitatis, teretem, leniter striatum, aliquantulum asperum & purpureis punctis seu maculis conspersum, foliis uenosis, glabris, digito paulò longioribus, semunciali latitudine, & utrinq; acuminatis uestitum, secus quæ ueris exitu oblongi candidiq; flores sunt, quibus parue rubetes & rotundæ succedunt bacca, unum atq; alterum * cartilagineum semen continentes. * imò tria semper. Radice nititur perenni, longa, digitali crassitudine, geniculis ex intervallo præcincta, in quibus singulorum caulium uestigia eaque impressa apparent, foris sufflata, intus candida & fragili in transversum sub terræ superficie sparsa, tenuibus fibris capillata, Polygonato simili, ea gustu dulcis, simulq; amara existit. Bacca eius asparagi baccas glutinosa substantia & sapore imitantur. Nascitur editis & montanis syluis, plurimacp in Hercyniæ syluis.

DE POLYGONATO, [quod uulgo sigillum Salomonis uocant.] CAP. LXXXVII.

POLYGONATUM caulem erigit cubitalem (nonnunquam etiam plures) iuncimodo gracilem, teretem & glabrum, ex intervallo singulis uestitum foliis, digitali longitudine, & duorum digitorum aut unciarum latitudine, uenosis, glabris & utrinq; in obtusum mucronem turbinatis, secus quæ flores medio uere erumpunt candidi & oblongi, foliis numerosiores præ-

Y

Polygonatum. T. 1. 132. p. 339.



fertim à radice incepta supputatione, quibus singulae succedunt baccae, pisi medio-
cris quantitate & rotunditate, primum uirides, in maturitate uerò nigrae, cartilagineo
semine farctae. Radice nititur perenni, lon-
ga, digitali crassitudine, ex interuallo geni-
culis praecincta (in quibus foliorum impres-
sa uestigia apparent) candida, fibrata, fra-
gili & transversa, quae gustata glutinosum,
subdulcem et nauseabundum cum saporem
tum odorem remittit, baccis eadem est qua-
litas. Nasceitur in syluis tam planis quam
montanis.

* Polygonatum curuum seu latifolium, Germanice
Weyßwurz/ Gelengwurzgel.

DE POLYGONATO anguloso, [quod supe-
riori simile est, sed caule anguloso. etc.] CAP.
LXXXVIII.

POLYGONATUM angulosum uulgariter
Polygonato per omnia respondet, præ-
terquam quod caulem non teretem, sed an-
gulosum proferat, & flores multò maiores,
& ab inferiori parte subuirtides, radices quo-
que non adeò tumidisturgent geniculis, &
fibras non solum ab inferiori parte, uerum
etiam à superiori proferunt, qualitatibus
autem uulgare polygonatum æmulatur.

DE MALVA fatua laciniosa.

CAP LXXXIX.

MALVA fatua laciniosa, caulem singularem erigit, humana statura plerumque
multò proceriorem, numerosis & cubitalibus adnatis ramosum, iuxta ter-
ram unciam & nonnunquam duos digitos crassitudine uincientem, modicè angu-
losum, glabrum, intusque angusta concavitate peruium, folia fert glabra, sub ramu-
lorum exortu singula, inferius do drantali quoquo uersus latitudine, in quinas, se-
nas aut septenas (non tamen profundius incisae) per ambitum crebro laciniosas
& infractas partes diuisa, quae uerò in summis uirgis folia sunt, his magnitudine ce-
dunt, flores per totam æstatem secus folia fert plures, paruos, candidos & quinque-
folios, quibus singulis plura succedunt semina in orbem mucroni cuidam ueluti
centro circumposita, quinquepartito calice insidentia. Radice nititur semestri, pede
longiore, inferiorem caulis partem crassitudine æquante, singulari, candida & fibra-
ta, tota herba gustu dulcem, lubricum & glutinosum refert saporem. Triti caules
muco similem lentorem remittunt, seritur in hortis.

De

Malva hortensis crispā.*Malva sylvestris recta.*

DE MALVA sylvestri recta.

CAP. XC.

MALVA sylvestris recta rectum erigit caulem sesquicubitalem, minimi digiti crassitudine teretem, raris pilis hirsutum, statim à terra in ramos divisum, folia habet longis pediculis insidentia, quinque digitorum aut unciarum latitudine, & quinquepartita. flores æstate fert secus ramos & folia sylvestribus rosis similes & æquales, quinquefolios, & in ruffo candicantes, quibus in orbē disposita succedūt semina. Radice nititur semestri, pedali aut longiore, digiti crassitudine, candida & in partes distracta, tota herba gustu dulci & glutinoso sentitur. Nascitur in aggeribus, hortorum areis, & circa rudera.

Y. 10

DE OCIMO nigro, [Basilici specie, cuius nigra sunt semina. Herba Ocimo maiori cognata videtur, cuius eiconem è Trago addidimus. CAP. XCL

Ocimum nigrum. T. I. 8. p. 31.



OCIMVM nigrum caulem emittit pede proceriorem, per intervalla binos ramulos contrario exortu & alterno positu proferentem, colore purpureos & glabros. folia sub ramulis habet sesquiuncialia plerumq; paulò angustiora, in mucronem desinentia, glabra & modicè per ambitum incisà, folani foliis similia, minora tamen, in summis uirgis breui intervallo se proferunt, ueluti uerticilli colore in purpura nigricantes: à quibus candidi & hiantes prominent flores, superiori & erecta parte rubescentes, quibus dilabentibus succedunt exigua & nigra semina denticulatis caliculis insidentia. Radicem nititur longa, gracili, fibrata, semestri & inutuli. Tota herba uehementer odorata est, saporem habet dulcem, modicè acrem & tenuem. feritur apud nos in hortis odoris causa.

DE INTYBO nauseoso. CAP. XCII.

INTYbum nauseosum folia habet digitalia longiora, unciali plerumq; latitudine, utrinq; in partes diuisa, & hirsuta, undique per terram strata. è quorum medio duo aut tres assurgunt caules, in plures dodrantales ramulos & furculos diuisi, in quorum summitate lutei et capillati sunt flores, in pap-

pos canescentes, qui una cum oblongo semine auolant. floret particulatim & diu. folia enatis ramulis pereunt. quæ uerò in uirgis sunt folia prædictis multò minora existunt, radicem habent paruam & fibratam, quæ una cum foliis inferioribus liquorem incisa remittit non omnino candidum, gustu uehementer acrem & nauseabundum, cuius qualitas nullis uerbis exprimi potest. Nascitur in editis uineis, solo pingui & glutinoso.

DE COLOCYNTHIDE grandi, oblonga. CAP. XCIII.

COLOCynthis grandis, oblonga, ab una radice uiticulam emittit digitali aut pollicari crassitudine, quæ in multas alias angulosas, undique per terram aliquot orgyarum longitudine sparsas diuiditur, hæ iuxta exortum graciliores sunt. at aliquantulum reptando progressæ digiti ferè crassitudinè consequuntur, eadem dodrantali intervallo geniculis præcinguntur, secus quæ capreolos emittit, & singula erigit tolia longitudine & latitudine pedali, in tres partes lupuli modo secta, tactu aspera & breuibus aculeis horrida, pedalibus aut cubitalibus, teretibus, asperis, conca-

concauiscq; pediculis insidentia, ab iisdem geniculis radices in terram demittit tenuas, quibus nutriendo fructui succurrit, flores secus foliorum exortum profert duplicis generis, fecundos & steriles. Steriles longo concauoq; insident pediculo, liliicę figuram & quantitatem habent, præterquam quod intus hirsutus & colore luteus sit, atq; labrum ipsius in quinas tantum partes dissecetur; reliqua floris pars concaua & continua est, in cuius medio cachryi simile capitulum eminet, retro ipsum florem nullum extuberat tuberculum, quod secuturi fructus spem faciat, fecundus autem flos breuiori, solidiori & crassiori nititur pediculo, intusq; tria crassa, hirsuta, luteaq; tubercula, staminum uice continet, quibus in fundo floris melleus liquor circumfunditur: retro florem capitulum eminet, quod decedente flore in grandem & humi procumbentem excrescit fructum, longitudine plerumq; do drātalem, ea crassitudine, quæ utraq; manu circumamplecti uix possit, duarum ciuiliū librarum pondo habet, is primum uiridem colorem, postea candicantibus maculis conspergitur, in maturitate postremo totus in luteo pallet, & circa pediculum eminentibus angulis distinguitur, dissecitur, corticem primum ostendit durum, lignosumq;, mox flauam, cartilaginofamq; carnem, & in medio eius sex ordines seminum candidorum, oblongorum, acuminatorum, latorum & planorum. in quibus candidus est nucleus. Radice nititur semestri & admodum breui, à qua aliæ multæ candidę in diuersas partes exeunt, longitudine cubitales, & funiculorum modo tenues, quod si quis plantam hanc humi repere nolit, supra cameras perticis extructas ducas, ea enim ratione capreolos apprehendet, & attegias siue scenas faciet. Saporem fructus habet amarissimum & grauem odorem, seminis autem nucleus dulcis est. Scribitur spectaculi gratia in latis hortorum arcis.

DE COLOCYNTHIDE *grandi, rotunda.*

CAP. XCIII.

Colocynthis grandis, rotunda, oblongæ grandis et colocynthidi, uiticulis, capreolis, floribus, foliorum magnitudine, radicibus, asperitate atq; omnibus aliis accidentibus similis & æqualis est, duobus tantum differt. folia namq; in quibus partes diuisa habet, fructusq; minores superficiei æquali, pondere ciuilem libræ excedentes, & globi instar rotundos aut modicę planos utrinq; tam circa pediculū quam floris uestigium modicę eminentibus angulis distinctos; quibus color est primum uiridis, in maturitate uerò pallidus, qui dissecitur substantia, seminum ordine & figura oblongis similes sunt, præterquam quod nonnunquam octonos seminum ordines habeat, ætotidem quoq; oblongæ colocynthidi contingere possunt. Sapore recto odore oblongæ respondent.

DE ZVCHA *rotunda, mediocri.*

CAP. XCV.

Zvcha rotunda, mediocris uiticulis, capreolis, foliis, floribus, radicibus, asperitate, atq; omnibus aliis proprietatibus oblongæ & grandis colocynthidis similis existit: fructum uerò habet globi modo rotundum, aut modicę compressum; in superficie modicę, ita ut uix appareat tuberosum, quam grandis, rotundæ colocynthidi paulò maiorem, pondere ciuilis libræ unius cum dimidia: principio uiridē, deinde maculosum, in maturitate uerò luteum; qui dissecitur luteam carnem ostendit, & in medio eius sex latorum, acuminatorum, candidorumq; seminum ordines, quibus candidus inest nucleus. Saporem habet fructus dulcem, semen uerò dulciorem, scribitur prædictorum modo.

DE ZVCHA *rotunda minore.* [Zucha Italica Cucurbita est. Matthiolus zuchas Indicas depingit.]

CAP. XCVI.

Zvcha rotunda, minor per omnia mediocri similis est, præterquam quod folia latiora habeat, fructus autem minores, sed eminentioribus angulis striatos,

& in superficie magis tuberosos, quorum etiam cortex multo lignosior & durior est quàm mediocris zuchæ, carnem habent ferè croceam, et senos seminum ordines, sapore mediocri zuchæ respondet, cui etiam similiter colitur.

DE COLOCYNTHIDE *turbinata*.

CAP. XCVII.

T. 1. 98. p. 828.



COLocynthis turbinata uiticulas, capreolos, folia & flores grandi & oblongæ colocynthidi similis præfert, & similiter per terram repit, sed omnes partes tenuiores habet. fructum producit piri modo turbinatum (cuius pyramis circa pediculum est) & uo maiorem in maturitate flauum, & candicantibus lineis per longitudinē distinctū, foris durū et lignosum, intus autem fungosa carne plenum, in qua quatuor oblongorum, planorum, paruiorum ac candidorum seminum ordines continentur. Radicibus nititur prædictis similibus, sed minoribus multò, quibus seminis est uita, & geniculis autem nullas in terram demittit radices. Saporem habet amarum, ut prædictæ colocynthis species, quibus etiam similiter colitur.

DE COLOCYNTHIDE *oblonga, glabra*.

CAP. XCVIII.

COLocynthis oblonga, glabra, uiticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus grandi & oblongæ colocynthidi similis & æqualis est, folia tamē quoquoque sus dodrantē uix excedunt, & non longè à mucrone duabus incisuris, sed non profundis in tres partes diuiduntur: fructum habet oblongum, eidem colocynthidi similem, sed sine angulis & omnino glabrum, minoremq̃, nam longitudinis circumferentiā quindecim uncias: raro excedit, latitudinis uerò duodecim uncias completur, colorem habet primū uiridem, in maturitate uerò obscurè luteum ac in pallore saturatum degenerantem, seminum ordine, colore & quantitate, atq̃ carnis substantia colore ac sapore prædictas colocynthides æmulatur, quibus etiam similiter in hortis colitur.

De

T. 2. 97. p. 824.



CUCURBITA *cameraria* quæ ante *camerarum* fenestras feritur, uiticulam ab una radice emittit, quæ in multas alias angulosas, teneras & modicè concavas uiticulas diuiditur, folia ex intervallo proferentes, singula ferè rotunda, nihil in iis anteriori maxime parte tres plerùmque acuminati anguli eminerent: eadem eminentiis quibusdam breuissimis rarissq; per ambitum circumuallantur, & tactu mollia sunt, foliorum *Altheæ* modo, magnitudo eorum seu latitudo secundum natalium diuersitatem uariatur, fecundo autem aprico et humido solo, apud nos in Germania pedem cum quadrante interdum latitudine excedunt: pediculus iis est longus, tener, leniter hirsutus, modicè concavus et propemodum teres, si non modicè canaliculatus esset eo latere, quo superiori foliorum parti respondet. capreolos secus folia producit singulos, quibus affixos baculos

& perticas apprehendit, in magnam altitudinem ascendens, flores iuxta folia & capreolos fert figura liliaceos, partim steriles, partim uerò fecundos, utriusque quinque candidis, intus hirsutis, sesquiuncia longioribus, uncia paulò angustioribus, forasq; modicè reflexis & repandis constant foliis, differunt tamen inter se. Si quidem steriles breues habent in medio apices & hirsutiores sunt, nec quicquam habent tumidi post se (ubi pediculo iunguntur) quod sequuturi fructus spem faciat. Fecundi uerò in medio tria crassiuscula, bifidaq; stamina continent. nec immediatè pediculo iunguntur, nam inter ipsos flores & pediculum paruum & leniter hirsutum extuberrat, quod tenera cucurbita est, capitulum, iuxta annexum in angustum collum desinens, quod marcescente flore paulatim accrescit, deinde ab autumno in magnam molem, quam cucurbitam uocamus auctum maturescat, magnitudo & forma non est eadem omnibus cucurbitis: quædam enim longæ sunt, quædam uerò inferius uentrosæ existunt, & superius in angustum collum coarctantur. Cum apud nos in Germania feliciter enata maturuerint, longè quinos, senosq; pedes longitudine & doctantem cum uncia assequuntur, maxime si pensili licentia concessa, liberè pependerit. Ventrosæ autem interdum in duorum pedum longitudinem & pedalem latitudinem adolescunt: utrumque tamen genus frequentius minus capit incrementum

tum. eam enim magnitudinem quam posuimus non semper nec ubiq; consequuntur, color omnibus est in maturitate flauus, duruscq; & ligneus correx, pulpa teneris est candida, gustu dulcis, maturis uerò fungosa, seminibusq; plena, præterquam in collo: nam eo loco uentrosæ nullum semen continent: longitudo semini uncialis est, latitudo autem semuncialis: idem planum et compressum est, atq; anteriori parte modicè acuminatum, posteriori uerò latiusculum, duobusq; eminentiis cornutum. cor ticem habet lignosum, candidum, acuminatum, compressum, gustuq; dulcem nudum claudentem. Radice tota herba nititur candida, in multas tenues partes distracta, eaq; semestri: in hortis sata cameras perticis extructas ascendit & obtegit, facitq; iucundas frigidâsq; scenas, latis foliis solem arcens, feritur etiam in hortis pensilibus, ante cameras & fenestras, ut dictum est. unde hoc cucurbitę genus camerarium Romani appellabant, ut Plinius testatur.

DE CVCVRBITA Plebeia.

CAP. C.

CVCVRbita Plebeia uiticulis, foliis, floribus & semine camerariæ similis est, fructum tantum dissimilem producit, cui duorum dodrantum aut nonnunquam cubiti apud nos est longitudo, latitudo uerò quincunx aut sextans, forma sunt inæquali: nam inferius longum habent uentrem, à quo in longum nec angustum collum desinunt, interdum etiam incuruantur. Est & alia, quibus distinguuntur, differentia. cameraria altitudinis auida est, plebeia uerò humi prorrepit, quousque uersus uiticulas suas spargens. Saporem habet dulcem, carnemq; cum tenera adhuc est, quæ edendo sit.

DE BRYONIA nigra, [quæ baccis tantum nigris ab alba differt.] CAP. CI.

BRyonia quæ nigra fert baccas, ab una radice uiticulas emittit plures, tenues, longas & angulosas, foliis asperis, scabris & forma uitigineis similibus uestitis. secus quæ singuli, longi, intortiq; exeunt capreoli, arbustorum uirgas & sepium sarmenta apprehendentes, quo facilius ipsæ uiticulæ, alioquin infirmæ, sepes scandant, quas ubi ascenderint, in omnes partes reptantes se expandunt: flores à ueris exitu usq; post medium æstatis fert paruos, foliaceos, colore pallidos, pauca in utroque stamina habentes, quibus singulę succedunt baccae seu acini, mediocris pili quantitatem, forma rotundæ, colore primum uirides, in maturitate uerò nigræ, & in exiguo racemos congestæ, tactu molles, intusq; lubrico & glutinoso succo plenæ, quo quina senaue semina continentur, cannabis colore & quantitate, sed modicè acuminata, in latitudinem compressa, & candidum nucleum intra se claudentia. Radicem nititur perenni, secundum ætatem grandis carnosaq; longitudine plerumq; cubitum excedente, crassitudine brachij aut tibię, longo rapo aut Raphano simili, capite multis seu uerucis tuberoso, in profundo in duas uel tres partes distracta, colore, foris incandido cineracea, intus autem candida, aut buxi modo pallida, quæ gustu amara & subacris est, cum adstrictione non pauca, & aliqua nauseosa qualitate abundanti, eadē lubrico & glutinoso succo, & grauem odorem spirat, bacce siue acini, radicem qualitatibus æmulantur, minus tamen siccant. Colligitur primo uere mox prodituris asparagis, ex radice aqua, præfecto radicis capite, & excavata radice, quæ in cauum, (singulis diebus matutino tempore tollenda) confluit, ischiadici utilis. Nascitur in sepibus.

DE BRYONIA alba seu ruffa. [Radix enim alba est, acini rubent.] CAP. CII.

HANC Bryoniæ speciem ob radicis candorem albam nominare cuius licet, eandem propter acinorum ruborem ruffam uocare minimè absurdum est, ut
ticulis

Bryonia alba. T. 2. 95. p. 320.

ticulis, foliis, capreolis, floribus, acinorum figura & substantia, & radicis mole nigrae similis est. differt tamen ab illa quod acinos habeat rubentes, et radicem tam foris quam intus candidiorem. succum radix habet nigra paulò uiscosior, easdem habet cum illa qualitates, sed efficaciores. Nasitur iisdem quibus illa locis, plurimāq; in Vuirtembergensi Sueuia atq; Renana prouincia. in Hesiā uerò, Saxonia, Vuestphalia, Pomerania, Marchia, Vuirtembergensi Electoratu, & Misnia nondum uidi nasci. nam hæ regiones nigra tantum abundant.

* Stuckwurz/ Teufelskirche.

DE ZVCHA maiore longa, cuius fructus grandis & oblongus Colocynthidis similis ac dulcis est.] CAP. CIII.

ZVCHA maior longa, uiticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus & asperitate, grandi oblonga & colocynthidis similis existit. fructu uerò eius sapore ab illa differt. siquidem figura est longus, in longitudinis circumferentia uiginti sex plerumq; uncias complectens, latitudinis uerò ambitu octodecim uncias raro excedit. Pondere autem quinque libras sex uncias superat, pediculo hæret crasso, anguloso, nigro, solido & tactu aspero: à cuius annexu contigui inter se & tereti superficie exeunt anguli, ipsum fructum circa pediculum ueluti crassioribus striis ornantes. colorem

habet principio uiridem, & candicantibus maculis conspersum: in maturitate uerò citrinum, superficie constat aliquantulum tuberosa, cauernosa & gustu dulcedinem respicit. Colitur in hortis.


DE ZVCHA maiore rotunda.

CAP. CIIII.

ZVCHA maior rotunda, uiticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus atq; asperitate iam dictæ longæ zuchæ similis est, folia tamen figura aliquantulum ad uitis ac ficus folia accedunt. Fructum fert globi modo rotundum, aut modicè in latitudinem depressum, crasso, anguloso, aspero, solidòq; pediculo herentem, (à quo longæ iusta anguli circumquaque exeunt) longitudinis circumferentia uiginti duas aut nonnunquam plures, pauciores uero uncias complectentem, ambitu uero latitudinis uiginti quatuor uncias nonnunquam excedentem, pondere autem quinque libras atq; octo uncias habentem, colore & cauernosa superficie longam maiorem zucham æmulantem, saporem habet dulcem, a quo succo dilutum. Colitur ut longa.

Querendū an hæc sit zucha Indica Matthioli.

ZVCHA magna, glabra, rotunda, maioribus zuchis uiticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus & asperitate similis est. fructum productum grandi & rotundæ zuchæ figura similem, tam longitudinis quàm latitudinis ambitu uiginti duas plerumq; uncias complectentem, pondere autem quinque libras duabus uncias excedentem, pediculo crasso, anguloso, aspero, nigro solidoque harentem, à quo eminentes prodeunt anguli, undique per fructus latera transeuntes, donec circa floris uestigium collecti, rursus coniungantur. colorem habet etiã circa maturitatem in nigro subuiridem. Si uerò serenus & tepidus fuerit autumnus citrinum colorem induit, quod si cœlum frigidum & triste fuerit, tepido loco fouendus est, ut citrinescat, Carne constat flaua & dulci. Colitur prædictorum modo.



MELON quem ueteres cucumerem appellant uiticulas per terram spargit asperas, bicubitales aut nonnunquam longiores, à quibus breui intervallo folia exeunt, in rotundo modicè angulosa, plerumque trientalia aut quadrantalia, iuxta pediculum quam alibi latiora, aliquantulum incisa, modicè serrata & aspera, sæcæ quæ singuli intortique se proferunt capreoli, & iuxta hos flores foliacei in pallido flauo, qui partim steriles, partim fecundi sunt, steriles post se nihil habent tuberosum: fecun-

dum uerò à tergo habent tuberculum, quod paulatim in fructum excrefcit grandem, globosum, per longitudinem undique impressis angulis striatum, subscabrum, colore in cæcio flauum, magnitudine secundum regionum temperiem uariantem, plerumque tamen tam longitudine quàm latitudine sex uncias excedit, uariat etiam figuram, partim enim exquilatæ sunt rotunditatis, partim etiam oblongi: dissectus per longitudinem fructus, primum ostendit subuiridem corticem, mox carnem teneram, mollem,

mollem, succosam, colore in flauo croceam, gustu dulcem, suauem atq; aliquantulum odoratam, in medio autem fructu pulpa est mollis, mucilaginosaq; candidis, oblongis, acuminatis atq; compressis seminibus plena: quibus foris est lentus cortex, intus uerò candidus nucleus gustu dulcis, cum siccatus fuerit, pinguis & oleosus, semina integra longitudine semunciam habent, eam tamen plerumq; excedunt. Radice nititur oblonga, candida, carnosa & semestri. Colitur in hortis, copiosissimuscq; Bambergi.

DE MELONE moschatellino.

CAP. CVII.

MELON moschatellinus uiticulis, foliis, floribus, fructu, radice et asperitate, uugarum similis est, omnia tamen habet minora, teretioraq; folia quoq; concinniora sunt, fructus gustus suauitate uulgarem excellit, atq; aliquem moschi odorem præ se fert, unde nomen inuenit. Culturam apud nos diligentiorē desiderat.

DE PEPONE.

CAP. CVIII.



PEPO non habet suum proprium genus, à Melone diuersum. Nam ut Plinius inquit libro nono, capite quinto, Cucumeres cum magnitudine excellere pepones uocantur. Veteres namq; (ut antè etiam dictum est) cucumeres appellabant, quos modo Melones uocamus, neq; usquā inuenitur apud antiquos scriptores, Melonis uocabulum in hac significatione. Est itaq; Pepo grandis melon seu cucumis, ob magnitudinē & maturitatē, molliori, fluidioreq; carne & pulpa constans, huius

plures species nouerunt hortulani, uulgares gustu Melones imitantur. qui uerò Germanicè Melpfeben appellantur, quasi Alphitopepones, farinæ modo in guttantiū ore dilabuntur, succoq; qui propriè sic uocetur carentes, Bambergi felicissimè proueniunt.

COL Ocyntis oblonga, candida, grandis, uiticulis, foliis, capreolis, floribus, fructus quantitate, semine, radicibus, asperitate atq; amaro sapore, oblonga, grandi & flauæ colocynthidi similis est, solo ferè colore huius fructus ab illius fructu differt, siquidem principio uiret, mox albicantibus, inæqualibus maculis ceu nubeculis aspergitur, postremo in maturitate totus albicat. Colitur in hortis prædictorum modo.

COLOcyntis leuis, quæ in frequenti usu est, uiticulas per terram spargit asperas, Meloni similes, in quibus folia sunt aspera & scabra, longitudine quadrantalit aut maiore, latitudine paulò minore, in mucronem desinentia, atq; utrinque ex obliquo, & profundius in ternas plerumq; partes secta, ipsæ quoque partes suas incisuras habent. flores secus folia producit luteos, partim steriles, partim fœcundos, quos ex prædictorum descriptionibus discernere licebit. Fœcundos autem flores fructus sequuntur pilæ quantitate & rotunditate, à principio uirides, in maturitate uerò flauæ, qui postq; exaruerunt ferè extremam leuitatem acquirunt, cortice uestiuntur propemodum coriaceo, quo detractò, candida apparet leuisq; inanis, & fungosa pulpa, in qua per orbem longæ cauernulæ sunt, piro similibus seminibus plenæ, colore spadiceis, duro cortice candidum nucleum claudentibus. Radice nittitur oblonga, fibrata, candida atq; semestri. Fructus saporem habet amarissimum, nulla alia saporis specie admixta. Colitur apud nos, sed paucissimis. trans maria uerò in calidioribus locis sponte in asperis gignitur.

CUCUMis puniceus, quem pleriq; Momordicam & Charatiam uocant, uiticulas emittit numerosas, graciles & angulosas, lōgitudine bicubitales aut tricubitales, undique foliorum plenas, quæ uitis aut Bryoniæ foliorum modo in partes secta sunt, tactu aspectuq; glabra & mollia, latitudine quoquoersus trientalia, quadrantalitæue, capreolos secus folia singula producit, quibus in tortis uicinos furculos Bryoniæ modo apprehendit, affixas uirgas ascendens. Flores æstate è foliorum sinu enascuntur, antequam aperiantur uiridi inclusa alabastriculo, postea se in quinque foliola ad florum foliorum spacia trāsitura, aperiente quinis paruis, modicè ex rotundo turbinatis, rugosis, luteisq; foliis constantes, latitudine interdum unciam excedentes, quorum aliqui steriles, aliqui uerò fœcundi sunt. Steriles pauca, breuia, luteaq; stamina in medio habent, sed nullum post se tuberculum quod secuturi fructus principium sit. Fœcundi uerò terna reflexa, bifidaq; stamina in medio continent, & retro se oblongum capitulum secuturi cucumeris rudimentum, quod dilabentibus florum foliolis, paulatim in fructum excrefcit oblongum, figura plerumque ouatum, superficie tuberosum, aculeis horridum, colore in ruffo puniceum, longitudine interdum Bessis, latitudine uerò sesquiunciam rarò excedentem, cartilaginea & rubente carne constantem, qui cum autumno iamiam imminente gelu maturitatem consequutus est, rumpitur ac dissilit, grauidamq; aluum seminibus ostendit, longitudine semuncialibus, latitudine angustioribus, anteriori parte modicè acuminatis, posteriori autem rotundis, planis ac ueluti compressis, fusco nigroque, aliquantulum rugoso, aspero, atq; ualde duro cortice, candidum nucleum,

propor=

T. 2. 130. p. 899.



proportione, toti semini similem, claudenti
 bus. Radice nititur semestri, breui, minimo
 digito graciliori, et in fibras desinente, foris
 candicante, intus pallida. quæ gustata pri-
 mum aliquam dulcedinem respicit, mox
 parua amaritudine atque acrimonia mani-
 festa, gustus organa afficit, saluam ciens, nu-
 clei dulcem habent saporem, cum qualitate
 nauseam minante. At ipsius fructus cartila-
 go Colitur apud nos magno studio,
 solum amat pingue, suspensum, crebram
 rigationem atq; assiduos solis radios.

FINIS LIBRI I.

Z in


VALERII CORDI DE plantis, liber II, quo illas præci- PVE PERSEQVITVR, QV ARVM HI, floria à veteribus uel exacte tradita non est, uel omnino præterita.

Quàm uarijs rerum ludat natura figuris,
Sola uel herbarum turba docere potest.

DE RANUNCVLIS: Et primum de primo uel palustri: deinde de
reliquis tribus à Dioscoride descriptis formis: tum de alijs quibusdam.
CAP. I.

Ranunculus palustris. T. 1. 30. p. 93.

* Vulgo
Grosch
pfeffer.



* Sardous
Ranuncu-
lus.



RANUNCV-
lus multas speci-
es habet: quarum
prima in pingui-
bus, aquosis &
uliginosis locis
prouenit. caulem
profert cubita-
lem, & aliquan-

do proceriorem. habet is adnata ramulosq;
multos. folia coriandri modo incisa sunt,
multò tamen maiora, pinguiora, pallida &
glabra. flores fert copiosos, unde & polyan-
themus appellatur, foliaceos, (ut omnes
eius species) luteos, & aliquando purpure-
os (hos autem raro apud nos) minores es-
tiam quàm reliquæ eius species. semen par-
uum, densum & copiosum, in oblongo ceu
capitulo. radices habet multas, candidas &
capillatas, ex uno capite prodeuntes, sapore
subamaro & acri: caules quoque, folia, flo-
res & semina gustu acerrima sunt. Habet
hæc præ cæteris apud nos prouenientibus,
exulcerandi uim maximam.

SECUNDA species.

ALTEra Ranunculi species copiosè
in Sardinia nascitur, unde illi Sardoæ
uel Sardinæ herbæ nomen, differt à priore,
quòd lanuginosa, & pluribus foliorum inci-
suris spectetur.

Tertia

TERTIA species.

TERTIA minima est, nascitur in dumosis, subhumidis, & stirpibus confectis locis, coliculo assurgit ferè dodrantali, & unico: cui tria folia contrariis pediculis canaliū modo cauis adnascuntur. folia singula in plures diuiduntur incisuras: & quorum medio unus flos luteus, foliaceus, intus eiusdem coloris, stamina rosarum modo habens, emicat. dilabentibus florum foliolis, remanet in medio capitulum, unde enascebantur stamina, quod fabæ magnitudinem capessit, leuiter aculeato semine constans. Radicē mitit transversam, crassitudine iunci, foris subrubram, intus uerò candidam, sapore ualde ingrato, qui uix definiri possit. folia & pars coliculi florū uicinior maximam habent acrimoniam.

QUARTA species, cognata tertia.

QUARTA huic figura similima est, sed magnitudine paulū excedit: folia tantū nigriora habens. florum uerò foliola candida sunt: in quorum medio lutea (ut in tertia) stamina uisuntur. nascitur iisdem quibus tertia locis: utriusque radix uenenosa esse dicitur. Hæ autem sunt ranunculi species, quarum Dioscorides meminit, præter has uerò sunt aliæ, quas nos enumerare iam incipiemus.

Ranunculi genus, quod uulgò à mense Martio nblūmen uocant, id flores uel albos, uel roseos, uel luteos proferit.

T. 1. 30. p. 95. ad tertiam speciem.

Ranunculus aruensis. ad quintam speciem.



QVINTA species.

QVINTA plerumq; in cultis prouenit, primæ similis, minoribus tamen & tenerioribus foliis: graciliori, cōcauo et singulari caule, paucioribus floribus colore luteis, quibus singula subnascuntur capitula, in quinque, sex aut septem aculeatas partes (quæ semen sunt) diuisa. Radicibus nititur polyanthemī similibus, cui qualitate etiam respondet. Nascitur in aruis.

* *Ranunculus fegetalis*, *Acker Hancensfuß*.

SEXTA species, flammula. [Nostra Flammula ceu rapulum in radice habet. Vide in octaua.]

SEXTA est quæ à quibusdam ob igneam mordacitatem flammula uocatur, iisdem nascitur locis. latioribus foliis iisdemq; hirsutis, pluribus ab una radice hirsutis caulibus. flores hæc maiores profert egregii splendoris, dilabentibus florum foliolis, capitulum è medio enascitur rotundum, asperumq; paruis planisq; seminibus constans.

Ranunculus multiplex. ad septimam speciem.

T. 1. 30. p. 94. ad octauam speciem.



SEPTIMA species.

* *Gesül-ter Hancensfuß*. **SEPTIMA** coronaria uocatur, quæ in hortis ad usum coronarum seritur: estq; factitia potius quàm natiua, folia habet circa cubitales caules apio similia, hirsutaque, profundius secta: flores luteos egregii splendoris, non quinque sed pluribus foliolis factos.

Tragus

* *Tragus Ranunculum sylvestrem tum dulcem tum acrem, cultura multiplicare flores ait, Nos etiam album multiplicem habemus in Helvetijs.*

OCTAVA species. [Hec forte est quam pingit Tragus libro 1. c. 30. hac Icone, nisi sexta sit preposita.]

OCTAVA lata, nigra & profundius secta habet folia: circa cubitales ferè caules, floribus, capitulis & qualitatibus sextæ similis.

NONA species. [quam nostri Flammulam uocant, non sextam.]

NONA subasperis & incultis locis provenit, cognomento rotunda: folia, flores, capitula & caules sextæ similes profert, ni breuiiores essent caules, radicem habet parvam, globuli modo rotundam; à qua graciles & candidæ descendunt fibræ. Germanicè *Ortswurcz* appellatur.

* *Runder Hanenfuß.*

Ranunculus minor, flammula. ad nonam speciem.

T. 1. 137. p. 413. ad decimam speciem.



DECIMA species. [quam aliqui Anemonis adnumerant, Germani *Ruchenschell* uocant.]

DECIMA leptophyllon & comatum cognominare possumus, folia habet agrestis pastinacæ similia, è quorum medio singularis exit caulis, cuius mediū aliud folium incisuris diuisum, ac si multa essent amplectitur: in summo unicum florem sustinet, grandem, purpureum, foliis oblongis & repandis constantem. in quo

stamina lutea . quæ uerò in medio sunt stamina in hirsutam comam mutantur, sub quibus semen est clematidi simile.

* Anemone quibusdam, Buchschell / Buchschell, Ad Rhenum, Gadelosen,

VNDECIMA species.

VNDECIMA in montibus nascitur, quartæ speciei caulem foliaq; similia habet asperiora tantum, florem item candidum sed maiorem, è cuius medio, postquàm folia floris deflexerint, capitulum auellanae magnitudine enascitur, totum candida lanugine constans, in qua semen paruum, acerrimi saporis inuenitur. Radicibus nititur nigris, tenuib;.

* Weisse bigwurz Helueticis, uel Grawmchile, uel Groß Schneeglöckchen, eadem uel cognata est.

DVODECIMA species.

DVODECIMA platyphyllos non impropriè diceretur. Caules cubitales erigunt, foliis oblongis, inerioribus laurifolij similibus, gracilioribus tamen. Flores, capitula, & radices octauæ respondent.

Ranunculi species duodecima Cordo. Reperitur & leuibus & serratis folijs.

Chelidonium minus. T. 35 p. 113.




DE CHELIDONIA minore.

CAP. II.

CHELIDonium minus cuius florem Virgilius in quarto Georgicorum amelum uocat, folia primo uere (circa hirundinum aduentum) ex una radice multa fundit longis pediculis, hederæ foliis similia minora tantum, mollia & pingua, & quæ pediculis iunguntur in sinum utrinque excurrentia; inest mediis foliis purpurea macula, quæ tamen in locis plus æquo humidioribus illis deest, coliculos ex uno radicis cespite, multos eoque singulares sine ramulis mittit, teneros, rubentes & concauos binis plerumque contrariis foliis uestitos, in quorum summitate flos est luteus & aurei splendoris, stellæ modo per ambitum radiantibus, in eo foliolis pallidioribus, nec adeo splendentibus, ubi in medio staminibus (quæ & ipsa lutea sunt) iunguntur, radices subsunt candidæ, multæ, coaceruatæ tritici granis similes, maiores tamen, & ad oliuæ cornique nucleorum magnitudinem accedentes, quarum superior & germinibus propior pars gracilior existit, radices quoque triticeis granis similes, ex coliculatorum geniculis iuxta foliorum eruptionem emittit ubi ipsi coliculi in terra sternuntur. Sapore tota herba est subacri & aspero, nascitur humentibus & planis, & incultis locis.

DE CHELIDONIA palustri, [Ego Caltham palustrem uocârim: nostri
Nosblûmen.] CAP. III.

T. 44. p. 142.




CHELIDoniû palustre, minori Chelidoniæ similis est, per omnia tamen maius, minus rubent huius coliculi, folia item profundiore circa pediculum sinu constant, & purpureis maculis carent. est etiam alia differentia, quod minoris Chelidoniæ coliculi sine ramulis nascantur. hoc uerò circa singula in coliculo folia binos emittit ramulos cum in minore Chelidonia bina semper folia singulares coliculos uestiant. Flores in summitatibus singulorum coliculatorum singulos producit luteos, paucioribus tamen rotundioribus, multoque maioribus foliolis quam illius, constantes: in quorum medio stamina eiusdem coloris uisuntur. radices uerò subsunt minori Chelidoniæ dissimiles: hellebori radicum fibris similes, foris obnigræ, intus candidæ, longæ, graciles & insipidæ, folia florisque similem minori Chelidonio saporem habent. nascitur uliginosis pratis & palustribus locis: iisdem quibus minor Chelidonia temporibus * Capitulum seminum est echinatum.

* Wyesenblûmen/ Seierblûmen.

DE CHELIDONIA phragmite, [salso haustus usurpata pro Aristolochia rotunda apud Germanos.] CAP. IIII.

CHELIDonia phragmitis, quam Aetius Capnium, Plinius uerò Capnum phragmitem & pedes Gallinaceos appellat

.T. 2. 78. p. 767.



lat. Nomē suū inuenit, quōd primo uere circa hirundinū aduentum germinet ac floreat. Capnium uerō & Capnium phragmitis dicitur, quoniam herba priuatim capnus dicitur, floribus et foliis similis sit, quōdque circa sepes & dumos nascatur. Duplicis est hec, ut subiungemus iam, differentiē, una eius species coliculos, plerumque duos diuaticatos, rubentes, longitudine dodrantales ex una radice profert: in quibus folia sunt tria semper, ex uno pediculo exeuntia, & in plura incisa, media inter capnum, rutamque figura & quantitate tenera, ab inferi ore parte tenuissimas uenulas ceu lineas habentia. subest coliculis ubi terrae iunguntur, folliculus pallidus, concauus, superius apertus, gallinaceorum calcaribus similis (unde & nomen) in quo antequam prorumperet tenella adhuc germina continebantur. flores primo uere profert in summis coliculis purpureos, paruos, oblongos, concauos, ex una parte in acutam caudam, ex altera uerō ceu in bubonis caput desinentes, habetque totus flos antequam aperiatur minimę cuiusdam auiculę figuram, qui deinde circa caput inhiantem rictum panditur. Semen in siliculis breuibus & latiusculis fert nigrum, rotundum & lentis modo planum, splendidissimum, duplici ordine, nam utriusque silicularum commissuris adnascitur, ipsi quoque semini candidum quiddam adnascitur. statim primo uere ex uiribus

dibus adhuc siliculis fillis semen excidit. Radicem habet globuli modo rotundam, minimi mespili magnitudine, tenui & sufflauo cortice uestitam, intus uerō candidā, cuius exterior pars cum floret rara & flaccida, interior uerō spissior nuclei modo existit, quæ & ipsa in se adhuc minimum nucleum ceu centrum continet. Altera illius species huic similis est in omnibus partibus, quæ supra terram sunt, flore tantum copiosiore, cuius color in iisdem natalibus in alio coliculo purpureus, in alio candidus, & in alio in candido uiridis interdum apparet, habentque flores minima quedam circa se foliola, ubi ex coliculo nascuntur. Radicem uerō priori similiter bulbosam, quæ quamprimum herba floruerit, rumpitur & concaua fit, quæ concauitas deinde terra repletur, radices hæc foris densiores sunt, & contractæ, in uiridi pallidū colorem ostendunt, nascitur similiter ut prior illa circa ueteres uiuas sepes atque uesperes, pinguius tamen quam illa solum diligit.

DE SISYRINCHIO, [cuius radices plerumque duæ, pisi quantitate, sibi ipsi insidentes, etc. flores lutei.] CAP. V.

SISYRINCHION primo uere folia croco similia emittit: secus quæ coliculum tenerum, longitudine ferè dodrantali producit, in quo unum & alterum solum est, antedictis multò breuius, & hirsutum: è quorum alis pro numero foliorum eorum dem

dem flores lutei Chelidonii minoris foliis ✱ similes, nascuntur: quorum ✱ forte flo-
foliola foris in luteo uiridia existunt. Stamina in flore numero & positura folio-
lis respondent: in quorum medio exerit se triquetrum capitulum, ut in uiolis purpu-
reis post florem, pallidum, eiusdem coloris apicem habens. Radices subsunt ple-
rumque duæ pisi quantitate, sibi ipsi insidentes, foris interdum luteæ, intus uerò can-
didæ, dulces & hordeum ✱ pisumque aqua maceratum sapore imitantes. numero ✱ Inde
sæpe à radice remittit sobolem milii quantitate & figura: quæ postquam proximo quidam
anno excreuerit, (non eodem sed altero anno,) caules floresque producit. Nascitur Erd=
arenosis, iisq; aliquantulum humentibus aruis. Qui uerò in pingui planoque solo sub malis ap=
arboribus nascitur, quò fluuiorum inundationes perueniunt, maior quidem est, sed pellant.

✱ Sparganium minus olim Odus appellabat. Vide an Hyacintho paruo cœruleo Euchsij cognatum sit, uel
potius Gladiolo.

DE PETASITE. CAP. VI.

T. 1. 138. p. 4. 15.



PETASITES, quæ pro-
pter foliorum cum pe-
taso similitudinem sic dici-
tur, Bechio cognata est, &
statim primo uere cum be-
chio & Chelidonia omni
erumpit ceu uua purpurei
coloris, quam paulatim co-
liculus rubens digitali fere
crassitudine protrudit, ceu
foliolis oblongis, rubentibus,
& in cauitatem inflexis
ab inuicem distantibus
plenus, quæ operimentum
in terra adhuc contentæ u-
uæ fuerant. uua autem ipsa
postq; eruperit, in multa et
ab inuicem distantia capi-
tula diuiditur: in quibus
numerosi minimi & stellæ
modo radiantes, intus pur-
purei, in extremitatibus ue-
rò candidi nascuntur floscu-
li, singuli in medio singula-
re stamen candido colore
exerentes, coliculus proces-
su temporis resolutus in
pappos floribus flaccidus
& perit, à quo tempore fo-
lia, quæ à radice post flo-
rem erumpunt, incremen-

tum accipiunt usq; ad autumnum, ea sunt prius bechii foliis similia, nigriora tantū,
cum uerò ad iustam magnitudinem peruenerint, cucurbitinis foliis figura similia fi-
unt, quibus neq; magnitudine etiam in autumnō cedunt. Radicem habet magnam
geniculis præcinctam, cui à lateribus aliæ graciliores ceu propagines adnascuntur

geniculatae & ipsae habet tota herba cum radice, praesertim si digitis conteratur grauem odorem. Nascitur pinguibus & uliginosis locis, & iuxta pigros profluentes.

* Pestilenz wurz/Groß Leerschén


DE POLYGALO: [Quidam non rectè Hedyсарum, neq. melius alij Fœno-
græcum sylvestre nominant.] CAP. VII.

POLYGALON caules dodrante longiores profert cui utrinq. folia usque ad summum cacumen adnascuntur, ea alterno ordine ex oppositorum spacijs prodeunt, & lenti similia sunt, latiora tantum, & multa contrarijs utrinq. pediculis uniramulo innituntur, extremitate uerò unum folium plerumque impari numerum efficit. exeunt è singulis alis secus folia longi pediculi, quibus in summo est coma purpureis floribus plena, qui cum casuri sunt paulatim flauescunt, floribus succedunt uiciae similes siliculae: in quibus semina lentibus æqualia sunt, radicem unam atq. alteram habet dodrantali longitudine, digitali uerò crassitudine, colore flauam, & sapore dulci & leniter acerbo.

* Glycyrrhiza sylvestris. conuenit enim glycyrrhizæ sapore radicis.

Polygon. T. 2. s. p. 599.

Erucula maior. T. 1. 32. p. 102.



ERVCVLa olus est mediā quandam brassicæ & Erucae similitudinem referens, folia habet erucæ modo diuisa, modicè pinguiā & brassicæ modo leuiā, sapore acri & amaro, ramulos ex uno caule statim à radice fert multos, cubitales & interdum maiores, in quorum summitatibus flores sunt Leucoitis similes, in pallido candidi, nigricantibus uenis distincti, qui quatuor tantum foliolis constant. diu floret & ob id semen totis ramulis adnascitur, quo l paruum, nigrum & oblongum est, & in erucæ similibus non tamen hirsutis siliculis clauditur, in summo ubi nullū inest semē, compressis & acuminatis. radicem habet paruam, lignosam, & ob id inutilem.

DE GLADIOLO palustris: E quem quidam Theophrasto sic dictum suspicantur: sed Theoph. Cypirum, *λευκον*, Gaza Plinium secutus Gladiolum uertit, Xiphion uerò ensem. CAP. IX.

GLAdiolus palustris, folia ab una radice erigit multa, iridi similia, angustiora tamen, triquetra, & superius in mucronem desinētia, ē quorū medio caulis dum triumue cubitorum altitudine erumpit, insigni leuore & æqualitate præditus, in cuius summo flores multi, longis pediculis, ex uno principio nascuntur, in purpura candidi, tribus foliolis constantes: sub quorum interuallis alia tria (sed illis minorā) sunt. stamina in se flores habent numero plerumq; nouem, croceo in summitate puluisculo manus atrectantium inficientia. Habent singuli flores in medio capitulum, semini ferendo natum, & sex partibus diuisum, quibus sunt singuli in summo repandi apices, omnibus huius capituli, angulis singulæ adhærent guttæ, admodū paræ, crystalli modo translucidæ, sapore & substantia mellis. Radices habet duas, quarum gracilior & nigrior descendit: crassior uerò superius ferè in superficie terræ transversa fertur. utriq; propagines aliquot & multæ fibræ adnascuntur. habent radices saporem dulcem & glutinosum. nascitur autem pinguibus, limosis & humenibus locis, quò fluuiorum inundationes peruenire possunt.


* Gladiolus Theophrasti hic uidetur: alius uerò Dioscoridis Gladiolus in segetibus nascens, nempe Victorialis nostratunda uel femina.

DE STRVTHIO uocato hodie, [uulgò Astrantia uel Imperatoria.]

CAP. X.

STRVthion folia habet lata, in singulis pediculis tria: quorum posteriora duo sineo latere, quo pediculo propiora sunt, singulas habent profundiores usque ad spinam diuisiones. tertium uerò quod in anteriore parte constitutum duas, nam in utroque latere usq; ad spinæ principium diuisum est, omnia præterea similiter per ambitum serræ modo incisuras habent. Caules ex uno radice cespite erigit plures concauos & geniculatos: ē quibus ramuli & adnata umbellas latas, candidis flosculis plenas ferentia nascuntur. floribus succedunt candida, plana, latiuscula & anetho similia, sed paulò maiora semina. Radices ex uno trunco nascuntur multę, pollicari crassitudine, geniculatę, quę partim in terram descendunt, partim obliquę & transversę undiq; feruntur, quibus se mira fecunditate propagat. radicibus multæ ac tues fibræ adhærent. dissecta radix caules & folia candicantem, pinguem & copiosum fundunt liquorem, qui gustu acerrimus & tenuissimarum uirium percipitur, non tamen talem acrimoniam habet qualem coccos gnidijs uel Tithymali, qua fauces similiter urere possit, sed illa acrimonia sola partium tenuitate constat.

* Myster wurzel.



DE LEPIDIO maiore.

CAP. XI.

LEPIDium siue Hiberis maior, caules habet bicubitales * teretes, in quo candidum quiddam ad cœruleum uergens colorem appareat, quod digitis facile ceu minimus pulvis abstergetur. Cauli ramuli & adnata plura adnascuntur, plena candidis, minimis, copiosis & muscosis flosculis, quibus odor inest ligustri florum odorem referens, sed non adeo fragrans. folia à radice cauli & ramulis adnascuntur, quæ densa & satis crassa sunt, & lauri foliorum formam habent, multò tamen maiora, quæ quò summitati & cacumini propinquiora fuerint, eo minora, angustiora & acutiora spectantur. Radicem habet digitali crassitudine candidam, & ualdè longam. quæ in ipsa terra se propagat, & procul etiam à cespite è terra diuersis locis erumpit & germinat. saporem radix & folia habent ualdè acrem nasturtio similem.

DE POLIO maiore, [Supino] quod in Germanina non infrequens est, ut sequens quoq; sed aliud peregrinum nobis & nobilius polium est, folijs serratis, etc.

CAP. XII.

POLIVM maius frutex est paruus, graciles, copiosos & do dranrali longitudine ramulos undiq; per terram spargens, plenos folijs, thymo similibus, maioribus

Polium maius.

bus tantum, rectâ
& sine uenulis spi-
na per media folia
transit, quæ infe-
rius candida et te-
nui lanugine ob-
ducta sunt, supe-
rius uerò uiridia
spectatur. ramuli
in summitate sin-
gulos habent co-
rymbos, candidis
floribus, ex acule-
atis & candicanti-
bus caliculis ena-
scētibus, plenos.
post flores in cali-
culis, quaterna
plerumque semi-
na sinapi simi-
lia inueniuntur.
folia & corymbi
grauiter, non sine
suauitate odorata
sunt. Radice ha-
bet superius ferè
digitum crassam,
quæ in multas fi-
bras diuidatur.
habent folia &
flores ualdè ama-

rum saporem. quæ hyeme non amittit, sed semper uirentia conseruat. Nascitur mar-
morosis, calcariis, caluís & apricis montibus inter calculos.

* Nascitur Ienæ, ubi Wilden Rosenmarin & Tollen Rosenmarin uocant.

DE POLIO minore, [recto, aliàs cognato superiori.] CAP. XIII.

MINVS uerò Polium, non per terram sternitur, sed rectâ assurgit. est autem
paruus, ramosus & do drantali altitudine frutex, qui totus candida & tenui
dictamni Cretici modo lanugine uestitur. folia habet plurima, maiori similia, mino-
ra tantû, & undiq; cana lanugine cādicantia. in cacumine ramulorû singula capitula,
quibus flores & semina corymbacea priori similia fert, sed minora omnia, magisq;
candicantia. Odoris suauitate & aromatico sapore hoc polium maiori præfertur.
Nascitur iisdem quibus illud locis, sed non in omnibus terris inuenitur: hyeme simi-
liter etiam ut maius folia reseruat & uiret.

* Quidam de Polio Germanis peregrino eum loqui putant, et omittere foliorum serraturam in ambitum lit-
star Chamædryos. mihi non de peregrino, sed Germanico altero loqui uidetur.

DE PEUCEDANO. [Tragus, Fuchsius, Dodonaeus, & ut uidetur, etiam Matthiolum, eandem pro peucedano herbam pingunt, quam hic è Tragi libro exhibemus: quæ an cum Cordi descriptione conueniat, querendum.] CAP. XIII.

T. 2. 121. p. 881.




PE Vcedanum densum foliorum, foeniculo similitum, cespitem ex una radice producit: foliorum autem talis est forma & constitutio. pediculi è radice exeunt multi, densi, lenti & rectis uillis nervosi: qui singuli, in tres diuiduntur ramulos, qui & ipsi in tres, & hi rursum in totidem, qui & postea aliquoties in tot, sed minimas diuisuras, quæ folia sunt, erumpunt. Caulem (et si hunc aliam quando & in quibusdam locis non ferat) erigit bicubitalem, & aliquando maiorem, densum, foeniculo similem, sed paulò tenuiorem, geniculis uerò magis quam in foeniculo protuberantibus distinctum. ex quibus longi & singuli nascuntur ramuli, qui in nulos deinde diuidantur, sed singulas ferant umbellas, quæ propterea quod longis & tenuibus constent pediculis, principio cum ex folliculis eruperint, pendunt, robustiores uerò facti sursum riget, flores habet minimos, ad luteum inclinante colore. semen uerò latum, duplex, anetho simile, sed maius in candido parum nigricans: umbellæ huius pediculi, medii & inferiores, breuiores, exteriores uero longiores, quo fit ut concaua reddatur umbella. Radicem habet foris nigrâ, intus candicantem: grandem, interdum bicubitalem longitudine in terram descendentem: crassitudine qua manum implere possit, superius uerò, ubi in multa capita diuiditur, crassiores fibras, in latere obliquis plerumque ordinibus descendentibus, planam, hæc copiosum, flauum & graueolentem liquorè dissecta è cortice suo remittit, qui statim exiccatur & sulphuri flauo similis fit. saporis radix & liquor feruidum habent. folia uerò his similem, sed multò ignauiorcm. Nasçitur montanis locis, inter parua arbuta, nonnunquam etiam in apricis & pinguibus pratis.

DE CHAMAEDRY.

CAP. XV.

CH Amædrys coliculos, tenues, duros, hirsutos & dodrantes erigit, qui interdum in binos ramulos geniculatim diuidantur, eos uestiunt serrata, hirsuta & parua folia, quernis iamiam primo uere erumpentibus, foliolis similia, quæ in summis uirgulis sub floribus multò quam in inferiore parte minora sunt, & aliquantulum concaua, flores habet purpurascetes, exiguos & deorsum pendentes, unico foliolo, ceu coclear, concauo constantes, quibus in summo duo, triaue tenuia stamina adnascuntur, habentque toti cum caliculis flores formam et magnitudinem, cum polii maioris floribus eandem. cui semina quoque similia in paruis, denticulatis & aculeatis caliculis producit. Radices graciles, numerosas et geniculatas per terram spargit, sed inutiles, totaque herba odorata est et gustu amara. Nasçitur apricis, caluis et calculosis montibus.

De

Chamaedrys. T. 1. 67. p. 104.*Lotus sativa*. T. 2. 2. p. 388.

DE LOTO *sativa*, [quam aliqui non rectè *Trifolium simpliciter* nominant,
Germani *Sibengezeyt*.] CAP. XVI.

SATIUA lotus concauum, angulosum & duorum pedum altitudine caulem profert, ex quo per intervalla in singulis pediculis tria nascuntur folia, anteriori pollicis articulo ad indicem compresso & dilatato similia, minora & oblongiora quo cacumini propinquiora. quæ per ambitum leniter acutis nec profundis incisuris diuisa sunt, ex quorum alis singuli prodeunt pediculi, habentia in summo parua capitula, exiguis & ferè cœruleis flosculis plena, quibus fœno græco similia semina, sed multo minora, in molliter aculeatis utriculis contenta succedunt. Radice nititur gracili, lignosa & inutuli, tota herba odorata est, præsertim siccata, tum enim magis quam uiridis redolet.

DE CORIANDRO.

CAP. XVII.

CORLANDRUM circa inferiorem caulis partem folia in singulis pediculis quina, plerumq; inferius nitentia producit, eo ordine ut bina per intervalla in pediculo contrariis nitantur pediculis, in pediculorum summitate quinto intercedente, &

b ij

parem numerum turbante, habent hæc folia apii similitudinem, multo tamen minora & crebrius incisa sunt, quæ uerò in summo caule sunt foliola, inferioribus multo tenuiora & fœniculi modo secta uidentur. Caulis illi est teres, tenuis, glaber & cubito altior, in cuius summo multa graciliâq; enascuntur adnata, paruas umbellas (candidis & nonnunq; purpurascens) flosculis plenas) ferentia. Semen floribus succedit, globuli modo rotundum, magnitudine . * quod siccatum ualde leue redditur. Radice nititur tenui, oblonga & lignosa, odorem tota herba habet, inter cicutam & cimices medium, unde & nomen accepit.

Coriandrum. T. 1. 36. p. 115.



Anisum. T. 1. 151. p. 455.



DE ANISO.

CAP. XVIII.

ANISVM postquam ex semine suo exierit, duo triâue pollicis latitudine, rotunda ferè & per ambitum serrata folia profert. à quo tempore caulem Coriandro similem & æqualem, hirsutiorẽ tantum. in geniculis folia incisuris diuisa, satui petroselini foliis similia habentem, eaq; superius minora quàm inferius. è caule adnata coriandri modo exeunt, umbellas latas minutis candidisq; floribus plenas habentia, quæ post florem semina cinerice coloris ferunt, Radi-

Radicem habet breuem, lignosam, tenuem & fibratam. folia, caules, flores & semina gustu dulcia & leniter acria percipiuntur, estq; hic sapor gratus ualde.

DE AMMI.

CAP. XIX.

T. 2. 118. p. 374.



AMMI circa terram & recenter è semine enatum, sambuci nuper erumpentibus foliis similia habet folia, pluribus tamen incisuris diuisa, quina plerumq; ex uno pediculo coriandri ordine nascentia. pediculi autem in quibus ea hærent, superius canalium modo concaui sunt. caulem fert bicubitalem, minimi digiti ferè crassitudine, teretem, modicè striatum, & statim à terra in multos diuisum ramulos, quæ uerò circa eum folia sunt inferioribus, multò sunt minora & pluribus incisuris diuisa, ramuli & adnata latas, planas & aniso similes umbellas ferunt, in quibus candidi, exigui flores, ac post hos minuta, oblonga & cumino similia nascuntur semina, sed minora multò, sub umbellis item foliola sunt, coronopi foliorum anterioribus partibus similia, tenuiora tamen: hæc hirsuta. Radicem habet digitali ferè crassitudine & lignosam.

DE SATIVA siue leni smilace, [quam
& Dolichum uocant.] CAP. XX.

DOLICHUS ab una radice plures mittit clauiculas, longis baculis affixis se circumuolutes, ita tamen, ut semper contra solem circumagantur: ex quibus per interualla longi & angulosi enascuntur pediculi, tria folia hederæ similia, sed maiora se

rentes, ex his quod in anteriori parte cõstitutum est, longiori annectitur pediculo, & spinam per medium transeuntem habet. alia duo utrinq; breui admodum annexi hærent: atq; exteriore latere longius à spina recedunt, gibbumq; faciunt, habent clauiculæ & folia lenem asperitatem quandam, flores ex omnibus alis à radice usque ad summitates clauicularum erumpunt numerosi, foliacei (ut omnium leguminũ) qui aut candidi aut pallidi, aut lutei, aut rubentes cernuntur. floribus subnascuntur longæ, ac deorsum pendentes siliquæ, in latitudinem extensæ, in extremitate incuruo & auium unguibus simili apice armatæ. Lupini siliquis similes, longiores tamen & tenuiores, quæ postquam maturuerint semina in se continent, sex, septem, octo aut nouem numero, fabis magnitudine equalia, & forma ouium renibus similia, nisi leniter in latitudine compressa essent, quorum multa sunt genera, colore tantum distincta. nam inueniuntur candido, pallido, luteo, nigro, rubente & uario colore, quos colores flores etiam sequuntur. fiunt ex smilace hac scenæ, & tabernacula æstate, ascendit enim triginta pedum longitudine uirgas, si radicibus quotidie humor suppedietur, si uerò nulli affigantur baculi, quibus circumuoluatur, humi procumbit, tardè germinans, & difficulter fructificans.


DE PHASEOLO, [qui superiori cognatus, hoc ab eo differt, quòd nullam asperitatem habeat: nec tam altè excrescat, etc. Semina profert candida, minora rotundioraq; quàm superior.] CAP. XXI.

PHASEOLO, siue phaselo, siue phasiolo proprium & diuersum à prædicta similace seu dolicho genus est: quamuis magnam cum illa affinitatem habeat. clauiculis & folia à radice profert dolicho similia, ac eodem modo contra solem baculis aduoluitur. differunt tamen, quòd nullam asperitatem habeat, nec in tantam altitudinem adolescat. folia etiam in superiore parte candicantem lineam per medium transeuntem ostendunt, ac iuxta fastigium rotundiora sunt. ex caule iuxta terram dodrantem longi nascuntur pediculi, mediocriter crassi, leniter striati, ac sursum erecti, è quibus candidi flores papilionibus similes erumpunt, dolichi floribus multò maiores, eadem die qua aperiuntur rursus se claudentes, foris in uiridi colore pallentes, quorum magna pars apud nos caduca existit. erumpunt etiam ex clauicularum geniculis flores, quibus omnibus longæ, nigrae, teretes & sursum rigentes subnascuntur siliquæ, dolichi siliquis graciliores & teretes magis, nullo in extremitate apice, qualem dolichi fructibus esse diximus. quæ 7. 8. 12. 13 aut 14 colore candido in se claudunt semina circa annexum nigricantia, & dolichi seminibus similia, sed rotundiora minorâq;.

Phaseolus, T. 2. 13. p. 615.



Nigella cornuta.



DE NIGELLA cornuta, siue sylvestri, Equam Dioscoridis Cuminum sylvestre alterum facit, sicut & Euchsus à quo depingitur. Matt huius reprehendit Monachos, qui in Mesuen commentarios edidere, quod nigellam Citrinam (id est, subflauiseminis) Cuminum Syluij primum fecerint.] CAP. XXII.

NIGELLA cornuta, quam Dioscorides alterum sylvestre cuminum uocat, fruticosa est herba, ab una radice caulem fundens, statim à terra in multos, cubitali ferè longitudine, ramos diuisum : qui adhuc in plura adnata ac alas diuiduntur, ex illis inferiores undiq; per terram supini sternuntur. folia sub ramulis ac alis exeunt breuia & tenuia, peucedani extremis foliis similia: (non tamen eo ordine incisa) quorum eruptiones siue partes in latitudinem reflectuntur. singula adnata in summitate singulos ferunt flores, in cœruleo candicantibus foliolis in orbem dispositis cōstantes, multis intus staminibus, sed duplicis generis, nam exteriora breuia, latiuscula, ac singula in binos apices diuisa sunt, & rotæ figura orbem constituunt, colore uarium: interiora uerò longiora & graciliora sunt, partimq; per interualla prædictorum ad latus feruntur, partim etiam erecta, modicè resupinantur: è quorū medio plures sursum eriguntur corniculorum figura siliculæ, in quibus semen figura, odore & sapore nigellæ simile, sed minus clauditur. radice nititur flaua, gracili, lignosaq; ideòq; inutili. Nascitur in segete & agrorum aggeribus, æstiuua herba est.

DE NIGELLA.

CAP. XXIII.

Nigella, T. i. 37. p. 117.

NIGELLA caulem habet tenuem, circa quem folia sunt sylvestris pastinacæ foliis similia, minora tamen & tenuiora. caulis in plures diuiditur ramulos, in quibus rotæ figura flores sunt, colore incandido cœrulei, cornutæ Nigellæ floribus similes, è mediis floribus paulatim enascuntur oblonga, angulosa & superius quinque plerumque aut sex apices ferentia uascula, ceu papaueris, multo tamen minora, interiorius quinque aut sex membranis rectè descendentibus in totidem camerulas seu loculae menta discretæ: quibus milii quantitate nigra, angulosa continentur semina, intus candidam medullam habentia. Radice nititur tenui et superuacua. Habet eius semina pastinacæ odorem & saporem, multo tamen acriorem utrumq;. æstiuua herba est. Est & alterum huius genus semine tantum differens, quod candidum seu flauescens habet.

DE NIGELLA Damascena.

CAP. XXIII.

QUAE uerò Damascena appellatur, nigella & ante paucos annos ad nos allata est, prædictæ tota similis existit, statim tamen à terra multis alis surgentibus fruticosior. Vascula uerò maiora producit, quorum eminentiores partes purpurascentem habent colorem, profundiores uerò in uiridi candicantem, subipsis uasculis

b iij

ubi pediculis iunguntur, admodum tenuia foliola in orbem disposita enascuntur. semen item prædictæ simile fert, sapore tamen & odore minus efficax, ideoq; uiribus etiam ignauius. Radicem habet tenuem paucis fibratam cirris & superuacua. & hæc æstiuæ est herba.

DE ASCLEPIADE, Equam uulgò Hirundinariam appellant.]


CAP. XXV.

ASCLEPIAS ab uno radicis cespite, plures erigit surculo sos fractu contumaces, solidos & teretes caules, longitudine cubitali, & interdum proceriores: in quibus folia sunt è latitudine in acumen fastigiata, hederaceorum figura, circa inferiorem caulium partem breuiora & latiora, superius uerò paulatim angustiora & oblonga. Flores in summis uirgis initio æstatis candidos, foliaceos & paruos profert, grauiter cum suauitate aliqua, quemadmodum rapi flores odoratos. floribus singulis singulæ succedunt triquetrae, & in mucronem desinentes filique, minimi digiti longitudine, nigri, angulosi & candidæ lanugini annexi seminibus plenæ. quæ in maturitate in alas aperte figuram uolantium hirundinum præ se ferunt, unde etiam Germanicum illi nomen factum est. Radices subsunt numerosæ, candidæ, graciles, longæ, hellebori nigri radicibus similes, ab uno capite seu principio partim rectæ, partim oblique descendentes, grauiter odoratas, sapore modicè acri, amaro & tenui. Nascitur montanis, calculosis, saxosis & stirpibus conferetis, apricisq; locis, quamuis in campis & pratis quibusdam etiã humidioribus copiosissimè gignatur, ut Spiræ, semine eò de montibus per torrentes & fluuiorum inundationes delato. Radix hyemem illæsa perfert, singulisq; annis regerminat.

* Vincetoxicum. Germanicè Schwalmenwurz, id est, Hirundinaria: et Japant, à multis capillamentis radicis.

Asclepias. T. 1. p. 128.

Orchis maior. T. 2. p. 778.



DE ORCHI, siue Testiculo maiore. [Idem, aut cognatus uidetur Orchis, hic primus Tragi.] CAP. XXVI.

ORCHIS siue testiculus herba, folia à radice & inferiore caulis parte lilio similia profert, paulò tamen minora: caulem singularem in nullos ramulos diuisum, tenerum, longitudine pedali, maiorem interdum, nonnunquò uerò etiam minorem: in summitate purpureis floribus undiquaq; circumdatum, Capni, Chelidonii floribus similibus. singulis floribus parua admodum, oblonga et acuminata subnascuntur foliola. Radices habet duas oblongas, magnitudine palmi, superius qua caulis erumpit iunctas, paucisq; ab annexu descendentes fibris & testiculis similes: quarum una plena, carnosaq; est, altera uerò flaccida & rara. saporem utraq; habet glutinosum & aliquantulum dulcem, nascitur montanis, calculosis locis, & interdum asperioribus, editis, & stirpibus confectis campis. Alterum genus huic similitimum est floribus tantum in candido luteis differens, omnium testiculorum radices alternis annis flaccescunt, & carnosæ fiunt.

DE TESTICVLO minore, uiolaceis floribus, etc. [Hic aut similis fuerit Orchis sextus Tragi, quem hic exhibemus: nostri uocant Teüffels anlir.] CAP. XXVII.

Orchis minor. T. 2. 61. p. 783.



ORCHIS hic folia & caulem prædicto similia habet, tenuiorem tamen caulem & minora folia. Flores in summo caule quinque, sex, septem aut octo, à se inuicem distantes, & deinceps dispositos profert, grato aspectu, purpureis uiolis figura & colore similes, inferius latiore & hiantes prominentes parte: in qua parua & pauca sunt stamina, superius uerò in tres partes ceu tenuia foliola diuisi. horum profundior & gratiores aspectu purpurea est, quam uiole. Radices fibrasq; habet prædicto similes, minores tamen multò & rotundiores, & sapore magis dulci. Nascitur editis, siccisq; campis.

DE TESTICVLO alio, [cui flores rubent, etc. Conferri cum hoc possunt posite à Trago icones hæc due.] CAP. XXVIII.

EST & alius testiculus dodrantali aut maiore, gracili, tereti & glabro caule: foliis singulis liliaceis, multò tamen minoribus, minimi digiti longitudine, deinceps amplexus in summitate comam sustinens, rubentium florum plenam. Radicibus nititur binis, paruis, globosis, altera flaccida, altera autem uegeta. saporem tota herba cæteris testiculis eundem habet. Nascitur in humentibus & macris pratis.

T. 1. 82. p. 779.



T. 1. 82. p. 780.



DE TESTICULO *candido, odorato maiore.* [Odoratus est præcipue hic etiam Tragi Orchis.]
CAP. XXIX.

ORCHIS siue testiculus, candidis, maioribus et odoratis floribus, folia tria à radice profert: quorum duo liliæ foliis paulò minora, tertium uerò multò minus existit, è quorum medio caulis exit pedalis, in tereti striatus, uno atq; altero minimo foliolo uestitus, flores in summitate ex interuallo profert candidos, striatis & intortis pediculis annexos, quadripartitos, tribus deorsum prominentibus partibus, quarta breuiore & duplici, ueluti galea prioribus superius insidente, à quibus singule retrorsum exeunt uncia breuiiores, graciles, incuruæ & concauæ caudæ, intus melleo liquore usq; ad medium plenæ. Radicibus nititur binis, oblongis, ueluti medioeribus oliuis, candidis, carnis & caudatis: quarum altera uegeta, altera uerò flaccida existit, quibus dulcis inest sapor, flores admixtam dulcedini amaritudinem habent, suauiterq; olent. Nascitur humentibus, nec adeo pinguib; pratis & campis,

De

Testiculus candidus. T. 2. 82. p. 782.*Testiculus pumilio*. T. 2. 82. p. 784.DE TESTICULO *pumilione*.

CAP. XXX.

Deest descriptio. Nos Testiculi minimi è libro secundo
Tragi iconem hîc exhibere uoluimus.

DE TESTICULO *candido, odorato minore*.

CAP. XXXI.



TESTICVLus odoratus minor, folia prope terram habet tria quatuorue admodum parua, oblonga, acuminata atq; aliorum testiculorum modo pinguia & glabra, longitudine unciam rarò excedentia, latitudine autem quartam unciae partem æquantia, ut plurimum erecta. è quorum medio exiguus, tener, gracilisq; exit coliculus, longitudine quadrantalîs, à media sui parte usq; ad cacumen continua, minimorum candidorumq; florum, intus melleum liquorem continens, serie circumuolutus. Radicibus nititur duabus oblongis, paruis, nonnunquam etiam ternis, semunciam longitudine excedentibus. Tota herba glutinosum saporem habet, flores insuper amaritudinem respiciunt. Radices dulcedinem aliorum modo. Flores odorem habent suauissimum & fragrantissimum. Nascentur editis campis, usq; subcaluis.

DE PALMA Christi, [folijs maculosis. Tragus palmas Christi Orches feminas
appellat.] CAP. XXXII.

PALMA Christi folia habet pauca iuxta terram, lilio similia, minora tamen, purpureis maculis plena: è quorum medio caulis affurgit pedalis ex interuallo, foliatus, purpureis in summitate & caudatis floribus orchis similibus. radicibus nititur binis, crassis, latis & pinguibus, in partes ueluti digitos diuisis, unde etiam nomen accepit, sapore testiculum imitatur. nascitur in pratis. Altera eius species iuxta terram nulla habet folia. caulem tamen altiore, & in purpura candicantes flores. nascitur iisdem locis. Tertia multò longiora habet folia, & angustiora, hiacyntho similia circa cubitalem caulem, rarò purpureis punctis distincta. flores in longa spica priori similes, interdum uiolaceos, nonnunquam etiam candidos, gignitur in herbosis montibus.

Palma Christi. T. 2. 82. p. 781.

Palma Christi alia. T. 2. 82. p. 780.



DE PALMA Christi alia, [folijs non maculosis.]

CAP. XXXIII.

EST & alia palma Christi, caulem habens pede longiorem, plerumq; glabrum, minimo digito graciliorem, ex interuallo singulis liliaceis folijs acuminatioribus

bus paulò minoribus sine purpureis maculis amplexum. flores summitate ueluti ita longa spica dispositos, inæ quali colore purpurascens: sub quibus singula sunt angusta & parua foliola, in purpuram uergentia. Radices habet binas, latas, crassas, carnosas & candidas, in binas, tres aut quatuor partes ueluti digitos distractas, quarum una strigosa, fungosa & nigrior est: altera uerò uegeta & solida. saporem prædictis eundem habet, nascitur humentibus & macris pratis.

DE SYMPHYTO syluestri. [Species est pulmonariæ Plinij.]

CAP. XXXIII.

Pulmonaria Plinij.

turbinata. Radici nititur tenui ueluti præmorsa, ex qua aliæ graciliores in diuersas partes distractæ oriuntur. Tota herba saporem lubricum & glutinosum habet, quemadmodum proximè descripta Solidago magna.

DE PAPAVERE cornuto.

CAP. XXXV.

CORNUTUM papauer, in multos annos durans herba est, ideoq; prima qua scribitur æstate, neq; caulem, neq; florem, neq; fructum producit, sed tantum folia crassa, pingua & hirsuta, longitudine spithamæ, latitudine uerò quatuor digitorum, uel: balci foliis quadamtenus similia, nisi per ambitum serrata, et profundius

Papauer cornutum. T. 1. 39. p. 123.



incisa essent, humi ea procumbunt, & hyemis iniuriam contumaciter perferunt. sequenti deinde æstate caulem promit geniculatum, & in multos ramos diuisum. folia uerò quæ è caulis geniculis prodeunt prædictis minora sunt, & parcius incisuris diuisa, quo summitati propiora fuerint, aliqua heraceorum foliorum similitudine, è cuiusq; autem sinu bina plerumq; erumpunt germina, unum indiuiduū, florem fructumq; ferens. alterum iuxta alterius folii sinum rursus in bina prædicto modo diuiditur. eaq; diuisio usq; ad summitatem ramulorum ab hac herba feruatur. minora igitur & indiuidua germina seu pediculi singulos ferunt flores, colore luteos, papaueris satius floribus æquales, quatuor latis tenuissimisq; foliis constantes: in quorum medio eiusdem coloris numerosa stamina capitulum constitunt, ex quo deinde incurua

& gracilis siliqua rãgenti aspera, longitudine digitali erumpit, scenogreci siliquæ æqualis, non tamen adeo in acumen desinens, sed in summitate nigricans, capitulum alatae sagittæ quandam similitudinem præ se ferens habet, sed obtusa acumine siliqua utrinq; lineam profundã ceu incisam per longitudinem transeuntẽ habet, quæ commissuræ eius sunt, quibus matura aperitur, semina intus continentur papaueri similia, colore admodum nigro. Radice nititur crassa, longa, foris nigricante, quæ quotannis regerminat. feritur apud nos in hortis. in calidioribus uerò regionibus sponte in asperis maritimis exit. grauem habet tota herba odorem, & amarum saporem, qualem reliqua papaueris genera.

DE CYCLAMINO.

CAP. XXXVI.

Cyclaminus asari folia habet inferius purpurea, superius uiridia, utrinq; tamen candicantibus maculis distincta, coliculos à radice rubentes, graciles breuesq; emittit, & in singulis singulos flores rosæ syluestri similes, minores tamen, & colore purpurascens, quibus parua succedunt uascula, & in his semina asari seminibus quadãtenus similia, coliculi adueniente seminum maturitate in spiram inuolutur, humiq; procumbunt. Radix subest rotundo rapo aut malo æqualis, in latitudinem se pandens, foris in ruffo colore nigra, intus candida, sapore ualdè acri & amarrescente.

ref. ente. nascitur editis montanis & stirpibus conferctis locis, solum amat luto-
sum, quemadmodum Asarum.

* Erdscheibe / Schweinsbror.

Cyclaminus. T. 1. 134. p. 906.

Gentiana. T. 1. 56. p. 174.




DE GENTIANA. CAP. XXXVII.

GENTIANA à radice capite quinq; sex, aut aliquando plura profert folia, ma-
iori plantagini similia, cum ad consistentiam peruenerint, aliquantulum rube-
scentia, è quorum singularis, grandis, concavus & in flauo colore nitens exit caulis
duorum & aliquando trium cubitorum longitudine, circa terram pollicis, aut medii
digiti crassitudine, superius uerò iuxta cacumen minimo digito gracilior, in nullos
omnino ramos uel adnata diuisus, à media sui parte, usq; ad summam geniculis
maioribus interuallis præcinctus, ex quibus singulis bina exeunt folia, inferioribus
multò minora, leniter per ambitum incisa, basi sua caulem amplectentia: è quorum
sinu plures & oblongi oriuntur caliculi, & ex his singuli stellati & luteo colore flo-
res, Amelli floribus similes, nisi oblongiores & graciliores haberent radios, semen
florum caliculis, in duas partes se aperientibus inuenitur numerosum, leniter ru-
bens, forma & quantitate Leucii simile semini, leuius tantum, nec ita carnosum. ra-
dicem habet duum plerumq; digitorum crassitudine, longitudine uerò pedali, in
c iiii

plures partes distractam, colore cum recens est sufflauo, cum uerò exaruit rufescen-
te: sapore ualdè amaro. Nascitur altissimis, umbrosis, humidisq; mōtibus, quamuis
aliquando etiam humilioribus quibusdam conuallibus gignatur. radix singulis an-
nis regerminat, cum uerò semine se propagat, rarò altero & uix tertio anno caulem
producit.

DE SISONNE siue Sifone. [Tragi Sifon, cuius iconem damus, cum hoc conferatur.]
CAP. XXXVIII.

T. 1. 154. p. 461.



Blucubitali ferè altitudine herba est, cau-
les habet circa radicem minimo digito
graciliores, crebris geniculis, breuib; in-
teruallis præcinctos, et in multos ramulos
diuisos. Folia circa radicem multa profert,
humiprostrata, eaq; non indiuidua simpli-
ciaq; sed in gracili & pede longiori pedicu-
lo utrinq; sena, quina, quaternauè, contra-
rio inuicem exortu, et ab inuicem distantia,
posteriore sui parte, (qua utrinq; profun-
diorcm habent incisuram) unciam latitudi-
ne excedentia, & digitum ferè longitudine
& quātia, in angustum cacumen fastigiata,
& undiq; aculeatis incisuris diuisa, in ante-
riore uerò pediculi parte, tria ab uno exor-
tu exeunt folia, quorum duo exteriora ad
latera uergunt, medium rectà extenditur,
quæ uerò sub ramulis & adnatis è genicu-
lis prodeunt folia, prædictis multo minora
sunt, paulatimq; decrescunt, quo ad cacumi-
na propius accesserint. Singula adnata exi-
guas ferunt umbellas, in quibus minimi &
candidi sunt flosculi, quos deinde parua sub
sequuntur colore nigro semina, petroselin-
i fatiui seminibus æqualia. Radice nititur di-
giti crassitudine, longitudine dodrantali,
candida, in fibras distracta, & postq; fructi-
ficauerit pereunte, semina gratam ceu aro-
mata resipiunt acrimoniā. radix semini-
bus imbecillior est, folia uerò radice. Serit-
ur apud nos in hortis, sed difficulter nostro
cœlo prius sata comprehendit.

DE IRIDE nostrate fatiua.

CAP. XXXIX.

IRI S quæ apud nos in hortis, uineis ac murorum coronis seritur, ab uno cespite
plura & erecta erigit cubito longiora folia, duū digitorum latitudine, rectiue-
nia, inferius in radicum capitibus coniuncta, ceu ex omnibus unum fiat, & sibi inui-
cem inserta, singulorum aperto & inciso uentre seu carina alterius dorsum excipien-
te, superius uerò alæ modo in latitudinem explicita, & in mucronem gladii figura
desinentia: quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, rectus, teres & glaber, ue-
lut cinereo polline conspersus, faciliè abstergentibus cedente, quinq; aut sex genicu-
lis inter-

Pingitur hæc herba etiam à Dodonæo: qui aliquos
pro Meo ea uti scribit.

T. 2. 51. p. 703.



lis interseptus, ex quibus singula exeūt sine pediculo caulem amplectentia folia, inferioribus eo minora, quo summitati propinquiore, flores in summitate post medium ueris per interualla erumpunt, primum conuolutis in turbinem membranis, paulatim se in nouem folia explicantibus: ex his tria inferiora digitali sunt longitudine, circa exortum angusta, reliqua sui parte uncia multò latiora, deorsum inflexæ, lingue figura, foris liuidi coloris in cinereo, & iuxta principium uiridia, intus uerò purpurea, latis & lacteis uenis se uiolaceo splendori miscentibus, maximè ubi uersus exortum gracilescent, adhæret iis in interiori sinu inferius lutei coloris & in longitudinem exporrecta lanugo, oblongis pilis, hirsutæ campæ aliquam similitudinem referens, in summa totum folium Iridis omnes colores representat, unde nomen inuenit, lanuginem cuiusq; folii aliud paruum obtegit folium in summitate in duas partes dissectum, ab utroque latere herbacei coloris, in medio liuido exstante dorso. reliqua tria folia, & ipsa lingue aut codearise formam habent, primis tamen latiora, & paulò breuiora existunt. & quemadmodum illa deorsum incuruata ascendunt, sic hæc sursum uersus reflexa iunguntur, color his est utrinque in cinereo liuidus, quæ uerò prioribus alterno positu adnectuntur purpureæ maculæ luteo colori insperguntur: durat ferè octiduum flos, deinde contrahitur, exicatur & decedit, inferius oblongum, ac sexangula

larem folliculum relinquens, intus in tria loculamenta interseptum, in quibus rotunda sunt et oblonga semina. Radicibus nititur multis, inuicem in latitudinem sibi adnatis, duum digitorum crassitudine, geniculatis in transuersum striatis, per superficiem terrae sparsis, foris modice in flauo rubentibus, intus autem candidis, ex inferiori parte longas, tenuesque fibras in terram agentibus, ex his aliquot, quae adhuc nascuntur lutei coloris in fine aut capite existunt. grauius tota herba, ut sambucus ferè dum teritur, spirat, praesertim radix, quae etiam gustata, coccognidii modo fauces exurit,

DE IRIDE syluestri.

CAP. XL.

SYLVESTRIS Iris satiuæ similis est, paucisque notis à satiuâ distinguitur, foliis minoribus & hyeme prorsus non apparentibus, cum satiuæ folia hyemis sauitiæ contumaciter resistent. caulem etiam quam satiuâ breuiorè fert, è quo flores ferè viginti diebus ante satiuæ flores erumpunt, colore magis purpureo, quibus defluentibus pollicari quantitate succedunt folliculi, sex lineis concauis in longitudinem striati, in maturitate tribus commissuris se aperientes, rotundo & cartilagineo semine pleni. Radicem habet digitali crassitudine, dodrante breuiorem, geniculatam, transuersam à posteriore parte singulis annis putredine tantum ferè amittentem, quantum ab anteriori parte æstatibus capiti restituitur, nec satiuæ in modum densum cespitem constituentem. Sapore & odore atque aliis qualitatibus satiuæ respondet. Nascitur editis & diuosis locis inter arbuta.

* *Lilium Scheyber hense bey Gelsctz, quod omnium primò floret.*

T. 2. 133. p. 904.



DE XIRIDE, [quæ uulgò spatula scetida dicitur.]

CAP. XLI.

XIRIS sylvestris Iridis species est, folia, caules, flores & radices satiuæ æqualia & similia producit, nisi aliquid impediret. nam flores magis saturata arident purpura, quibus succedunt sylvestris Iridis folliculis similes utriculi, sed paulò maiores & triquetri rotundo, rubroque semine pisti quantitate, pleni. Radicibus nititur magnū cespitem constituentibus, positu, figura & colore sylvestri Iridi similibus, sed paulò crassioribus, habent semina & radices grauem & sambuci ferè odorem, & gustata satiuæ modo, fauces scarificant, folia uerò supra modum scetent, unde etiam alio nomine spatula scetida recentioribus appellatur.

DE IRIDE tenuifolia, [quæ apud nos etiam non procul Tiguro nascitur.]

CAP. XLII.

TENUIFOLIA Iris prædictis omnibus tenuior est, foliis dodrantalibus aut pedalis, semunciam latitudine nunquam superantibus, plurimis à denso radicū cespite assurgentibus. Caules satiuæ Iridi similes profert, multò tamen graciliores, in apricis pratis cubitales, in frutetosius uerò proceriores, flores foliorum numero positi & forma satiuæ similes habet, nisi quod minores magisque purpurei sint & flaua erucae si-

mi-


mili lanugine careant, cuius uices occupant; iuxta singula tria inferiora & inflexa folia, totidem liuentis in purpura coloris stamina. Radices subsunt multæ, transuersæ, graciles, in superficie nigricantes, & propter uetustas foliorum reliquias uillosæ, intus candidæ, sibiipsis implicitæ, a quibus prædictarum Iridum modo exeunt fibræ & cirri, trita, recentis adhuc, folia medium inter syluestrem Iridem & gramen odorẽ spirant. Radices uerò præscriptarum more fauces exurunt. Nascitur in apricis planisq; pratis, & frutetosis achumentibus campis.

DE IRIDE lutea siue pseudoacoro.

CAP. XLIII.

PSEUDOacorus folia, caulem & radices satiuæ Iridi æquales & similes habet, præterquam quòd folia, utrinq; extrate dorso iuxta mucronem euanescente, ab aliarum Iridum foliis differant, flores item quantitate eiusdem, forma uerò tempore florendi & partibus, tenuifolia Iridis floribus respondentes, quibus singuli succedunt folliculi, longitudine & crassitudine pollicari, figura triquetri, intus trifido septo in tria loculamenta secundum longitudinem diuisi, latis, tenuibus, forisq; rubentibus, intus autem candicantibus & substantia cartilagineis seminibus pleni, sibiipsis pulchro ordine superpositis, & multò quā lentes maioribus. Radices propter foliorum uestigia & uenosas reliquias foris uillosæ nigrae q; sunt, intus uerò rubentes, substantia porosa, & ceu filis quibusdam uenosa, quæ gustatæ uehementer sine quauis alia qualitate adstringunt. Odorem tanta herba nullum spirat. nascitur ubiq; in palustribus.

* Gälbe schwerteln.

Iris pseudoacorus, T. 2, 49. p. 699.*Filix latifolia*, T. 1, 186. p. 543.

d ij


LATIFolia filix ab uno radicis cespite plures emittit pediculos bicubitales, iunco multò crassiores, inferius ab interiori parte canaliculatos & utrinq; binis angulis striatos, glabra & omnino leui superficie. ij iuxta terram præcisiluna nondum in globum tumentis figuram ostendunt: à quibus utrinq; ex intervallo usque ad summam alii erumpunt minores pediculi, non omnino in annexu sibi respondentes, longitudine dodrantes, qui uerò inferius & in summitate constituti sunt, mediis breuiiores existunt, exeunt ab iis tenera & glabra folia, duarum ferè unciarum longitudine, iuxta exortum semuncia paulò graciliora, paulatim in mucronem non adeo acutum fastigiata, tenuissimis & obliquis uenulis distincta, quina, octona, dena, undena aut duodena, ex utroq; pediculorum latere, breui admodum intervallo ut se contingant ferè, exeuntia. in fine pediculorum inter utrumq; ordinem unum rectè prominēt, parem numerum unitate in imparem permutans. tota herba filicis modo pennata, & in latitudinem explicata est, à medio eius cespite alii etiam eriguntur cubito maiores coliculi, ultra medium foliis prædictis similibus pinnati, ab ea uerò parte usq; ad cacumen, foliorum uice hirsutas, asperas, crassasq; habet diuisiones, colore in rubro flauas. Radicibus nititur tenuibus innumeris, uillo sis, ueluti cirris in magnum & inextricabilem nodum implicitis, in superficie nigris, intus uerò in uiridi pallidis, quæ in medio, ubi omnes coniunguntur, amissorum coeliculorum reliquias & uestigia retinent, Saporem diuersum diuersis habet tota herba partibus: superioribus enim & asperis incisionibus, præter exiccantem qualitatem, nulla alia inest: folia uerò uehementer amara sunt, pediculi autem quæ radicibus iunguntur glutinoso lentore & cucumeraceo sapore linguam edulcorant: reliqua sui parte aqueam præ se ferentes dulcedinem. radices postremo cum modica dulcedine adstringunt, Nascitur putridis, uliginosis, macris & humentibus locis, circa alnorum truncos.

DE BVGLOSSA *longifolia*. [Tragus Buglossam Italicam uocat.]

CAP. XLV.

BVGLOSSA *longifolia* à radicis capite plura emittit dodrante longiora folia, trium aut quatuor digitorum latitudine, utrinq; fastigiata, hirsuta et aspera, è quorum medio caules erumpunt plures bicubitales, plerumq; foliis asperiores & teretes, in plures ramulos diuisi, flores in summis ramulis profert (sole in Geminos eunte) singulos, paruos, purpureos, exiguis quinque foliolis, breui, concuæ, teretibus ueluti fistulæ annexis constantes, in medio tenuissima stamina ceu breues pappos habentes, facile dum trahuntur, à calice suo quinque constante, hirsutis & acuminatis foliolis recedentes, singulis floribus quaterna, terna, bina aut singula succedunt nigra semina, Buglossi quam Borraginem uocant similia, paulò tamen maiora & rugosiora, intus candidum nucleum habentia. Floret particulatim, ideoq; semen totis ramulis adnascitur, inferius maturius, superius uerò recentius. Radicibus nititur longis, teretibus, digitali crassitudine, foris nigris, intus candidis, glutinosis & mucilaginosi, tam gustu quàm tactu Symphyti radicibus similis & perennibus. herba ipsa cum floribus medium habet saporem, inter latifoliam Buglossam & Echion. Sparso eius semine prima quidem æstate caules fert, uerum breues, sequentibus autem annis ex eadem radice maiores emittit, Seritur apud nos in hortis, interim etiam sponte prouenit.

De

Euglossa longifolia. T. 1. 77. p. 232.DE ARGEMONE, [*Tragus papaver erraticum* Argemone facit, non recte.

Cordus hic similem herbam, nobis ignotam: luteo liquore acri & amaro manentem.]

CAP. XLVI.

ARGEMONE caulem habet ferè cubitalem, teretem, & hirsutum: circa què folia sunt inferius maiora, superius uerò minora, crebro profundis & obliquis incisuris diuisa, hirsutaq; minori Rhaadi similia. florem item, sole Geminos ingrediente, in summis furculis fert similem & æqualem, quo defluente oblongum capitulum remanet, papaueri Rhaadi simile, paulatim incrementum sumens, donec unciam longitudine superet, in summitate latum, inferius uerò angustum, in quo semen clauditur papauere minus, colore rufum. Radicem habet annuam, digito longiorem, gracilem, teretem & fibratam, colore flauam. Tota herba luteum liquorem incisa remittit, Chelidonio maioris modo, gustu acrem & amarum. Nas citur in editis uineis, glutinosis & pingui solo.

DE PÆONIA femina. CAP. XLVII.

PÆONIA femina primo uere rubentibus erumpit in purpura coliculis, unà cum foliis in summitate sibi inuicem inuolutis, clausarum in pugnum manuum & unguium figura, iuxta terram eiusdem coloris aperta quædam inuolucra,

d in



imbricibus similia, relinquentes, quibus nondum enata clauderantur germina. Cōliculi apertis foliis paulatim cubiti altitudine assurgunt, angulosisq; sunt, purpura se in uiriditatem dilutam immutante: habet adnata aliquot caules longitudine dodrantalia, quæ in ternos diuiduntur, & uni geniculo annexos pediculos in terna folia desinentes: ea profundius incisa, & smyrnii modo in partes dissecta sunt, longitudine duarum aut trium unciarum, latitudine uerò unius, superne uiridia, inferne cinerea, & ramosis uenis distincta, in summis caulibus, sole Taurum occupante, flores fert puniceos, papaueri similes, crassioribus tamen foliis constantes. in quorū medio bina eminent cornicula, luteis circumuallata staminibus, quæ sola, reliquis decidentibus florum partibus, remanent ac paulatim usq; ad sesquiunciale


longitudinem & uncialem ferè crassitudinem adoleſcentia, extrorsum reflexa & hirsuta lanuginosaq; superficie, ea in maturitate superius unica commissura aperta semina ostendunt, pisi maioris quantitate quinq; aut sex, foris nigro cortice, intus candido nucleo constantes: Radices habet numerosas, longitudine dodrantes, interdū digitales, nonnunquam etiam breuiores, crassitudine pollicari sibi ipsis angustis quibusdam ueluti isthmis coherentes, foris nigricantes, intus ex candido modicè ad rubedinem tendentes, & diuturnas in summa farciminum, sepius per interualla funiculo præstrictorum formam imitantur. Saporem habet radix dulcem, acrem, subamarum & nauseabundum, semen gustu radicibus respondet, non tamen adeo nauseam facit. Odorem uerò grauem, nec multum absimilem Sambuco tota herba spirat.

DE THYMO nostrate.

CAP. XLVIII.

THYMVS nostras qui in hortis colitur, frutex est paruus, ramosus, pede raro procerior, foliis uestitur totus minimis, modicè oblongis, acuminatis & hirsutis, breui interuallo geniculatim furculis circum adnata. in summis furculis capitula sunt, post medium ueris minimorum in candido modicè rubescentium florum & caliculis in labro serratis insidentium plena: quibus defluentibus semen in caliculis gignitur

Thymus nostras. T. 1. 12. p. 43.



gignitur, minimum in russo nigricans, quamvis Theophrastus & Plinius nullum esse Thymo semen asserant, contra rei ueritatem. Radice nititur lignea, in fibras distincta & inutili, habent folia teneriq; cum flore coliculi gratam in gustu acrimoniā & iucundum admodum odorem.

DE THYMO capitato.
CAP. XLIX.

QVI uerò ex Creta & oriente ad nos asseritur Thymus nostrati quidē similis est, sed hirsutioribus & asperioribus foliolis, capitulis in summo nostrati tenuioribus, sed densioribus, confertioribus, & ueluti in spicam turbinatis, acriore gustu et odore, magisq; aromatico.

DE ACHILLEA, [quam Tragus uidetur Millefolium uulgare nuncupare, hac eius iconē proposita.] CAP. L.


ACHILLEA dodrantes aut pedales quotannis à perenni radice caules emittit, numerosos, rectos, graciles, furculaceos, modicè angulosos & lanuginosos, à terræ breui spacio usq; ad summitatem sesquiunciali longitudine, & unciali ferè latitudine, foliis uestitos, in obliquas & crebro utrinq; minutim incisas partes, ex intervallo in utroq; latere diuisis: ea quamuis coriandrinis non dissimilia sint, testante idem Dioscoride, tamen maiorem habent cum Tanaceti foliis similitudinem nisi multò minora essent, sed eadem illis est forma & proportio, in cacumine cuiusq; caulis iuxta qualiter dispositi, furculi umbellam constituunt, minimis floribus in medio subluteis, per ambitum candidis, & nonnunq; purpurascentibus plenam, ea florere incipit sole in Geminis existente, usq; in æstatem durante flore. Radicibus nititur tenuibus, in fibras distractis, lignosis, ideoq; superuacuis. Tota herba terrestri striatiōi similima est, nisi latiores folia haberet. Saporem & odorem folia cum floribus medicamentosum nec ingratum habent Matricariæ similem, non tamen adeo grauem, neq; eo usq; amarum. Nascitur in quiescentibus, planisq; sed editis aruis, solum amat pingue & lutosum.

* Matthioli Millefolium minus nominat. Achilleam aliam facit.

Achillea. T. 1160. p. 476.



Ruta sativa. T. 1122. p. 68.



DERVTA sativa maiore siue latifolia.

CAP. LI.

R VTA sativa maior, frutex est caudice cubitali, aut altiore, crassitudine digiti, colore cinereo, in multos ramos diuisus. ex his ueris initio plures emittit longos, teretes, egregie uirides & flexiles furculos, in quorum summitate ueris exitu, & æstate inæquali ordine flores sunt Leucoio similes, minores tamen, quatuor aut interdum quinque luteis & coctlearis modo concavis foliolis constantes, sursum spectante eorum concauitate, in medio flore quadripartitum aut nonnunquam quinquepartitum est capitulum, colore uiride, exiguum quendam apicem habens, stamina ab ima eius parte exeunt lutea, octona aut dena in latitudinem resupinata: ex his medius numerus supra foliolorum concauitatem extenditur, reliqua autem quatuor foliolorum spaciis interposita sunt, semen in mediis florum capitulis fert paruum, in rotundo modice oblongum, colore nigrum, folia omnibus ramulis adnascuntur, in longis pediculis incerto ordine disposita, parua, in plures & inæquales partes secta, uirentia, mollia & pingua. ex his maxima pars semunciam longitudinem non excedit, latitudine multo minore. Radice nititur ex uno principio multifida, numerosa, capillamentis fibrata, colore flaua. uiret tota hyeme, non flaccescens, antequam nouo uere alia enascantur, quo tempore etiam furculi qui semen

men protulerunt, in summitate exarescunt: coma eius acrem, aromaticum, interimque grauem spirat odorem, eadem sapore amaro, seruido & tenui palatum excalescit, maxime uiridia adhuc florum capitula. Colitur in hortis,

DE RVTA *fatua tenuifolia.*

CAP. LII.

RUTA tenuifolia Latifoliae per omnia respondet, praeterquam quod multo minoribus constat omnibus partibus. folia siquidem fumo terrae modo in exiles partes diuisa habet, non tamen in tantam latitudinem diffunduntur. floribus & capitulis latifoliae similiter respondet. semen habet oblongum, nigrumque, gustu uehementer acre: reliquarum partium qualitas & sapor latifoliam aemulatur. Seriturque similiter ut illa in hortis, parce apud nos, sed frequentius in Italiae quibusdam locis ubi hanc tantum Rutam nouerunt,

DE LVPINO *fatuo.*

CAP. LIII.

T. 2. 15. p. 622



LVPINUS sativus legumen est recto, sef-
quicubitali, tereti, lanuginoso, con-
cauo, et singula assurgens caule. folia habet
quina, sena, & ut plurimum septena, dum
digitorum longitudine, latitudine fere uni-
us, utrinque fastigiata, superius glabra, infe-
rius lanuginosa, è summitate pediculorum,
ueluti ex uno centro radiorum modo ex-
euntia, interdum splendens sole erecta, no-
ctu uero omnino se demittentia. pediculi
quibus haec insident longi sunt et inaequa-
li ordine ex interuallo cauli adnascuntur.
in summo caule, & nonnunquam etiam in
adnatis deinceps dispositi flores, sole Ge-
minos occupant, erumpunt figura, papili-
onum, colore candidi, quibus defluetibus
succedunt digitali longitudine & latitudi-
ne siliquae, figura planae, lanuginosae, &
principio crassae carnosaeque, cum maturu-
erint, tenues & flauae. in quibus semina
sunt rotunda & plana, foris in flauo candi-
da, intus uero detracto cortice flaua, latitu-
dine semuncia paulo minora, ea qua anne-
sciebantur parte concauitatem exigua
ueluti umbilicum habentia, crepitaculi
modo in siliquis resonantia, cum arefacta
herba agris euellitur. radice nititur singu-
lari, tenui, lignosa, candida & superuacua,
paucis capillamentis fibrata, quibus non-
nunquam parua tubercula adnascuntur, sic-
ca tellure, subitaneis imbribus irrigata, ef-

ficacissimum semen est, ideoque solum in usu medicinae habetur propter amaritudi-
nem, medium enim saporem habet inter cicera & absinthium.

CORONOpus ab uno radicis capite folia emittit numerosa, longitudine ferè dodrantalia, graminis modo angusta, canaliculata, crassa, pinguis & in extremitatibus hirsuta, supra medium utrinque in partes ueluti ungues distracta, multoque magis diuisionibus suis ceruinis cornibus similia, propter copiam humi undique in orbem prostrata, inter quæ indiuidui coliculi ueris exitu erumpunt, longitudine dodrantales, teretes, subhirsuti & uehemèter graciles, in summitate singulas uelut spicas plantaginis modo ferentes: ex quibus stamina tenuissima exeunt, quæ flores eius sunt. semen in paleacea est spica, copiosum concepit minimum ac rubens, aliquantulum oblongum & compressum. Cum liberè nascitur hoc olus resupinatos erigit coliculos, densius autem satum rectos emittere cogitur. Radice nititur singulari, candida, tereti, dodrante breuiori & minimo digito graciliore: quæ gustu cum aquea dulcedine & modica acrimonia parum adstringit, folia saporem dulcem, & aliquantulum salum habent. Seritur apud nos in hortis, estque annuum & acetarium olus.

Coronopus. T. 1. 31. p. 99.

Rhodia radix. T. 2. 137. p. 913.



DERHODIA radice.

CAP. LV.

* imò
crassiores. **R**hodia radix ab una radice numerosos emittit coliculos longitudine dodrantis, imò
ceque gracilitatis, teretes et glabros, statim à terra usque ad summitatem, unciali longitudine
& se

et semūciali latitudine foliis undiq̃, inæquali ordine uestitos, in extremitate modice nec profundè incisīs, substantia crassi, carnosī & in uiridi cœruleis, in summa mediā am habent figuram folia, inter crassulæ maioris & portulacæ folia, in summis coliculis æstate parux erumpit umbellæ simile capitulum, paruis & in candido pallidis floribus plenum, semen fert exiguum. Radice nititur dodrante breuiore, crassitudi-
ne pollicari, ramosa, inæquali & tuberosa, cœsio, squamoso & facile recedente cortice uestita, intus uerò in candido rubente, fungosa & pondere leui. quæ trita & gustata ac naribus admota medio inter rosas & salicis flores sapore & odore percipitur. herba etiam cum amaritudine aliqua adstringit. Nascitur in alpibus Germaniæ non longè à Salisburgo.

* Adfertur ex Austria.

DE TORDYLO, [Nostri uocant Bärwurcz, aliqui pro Meo accipiunt.

Tragus Daucis adnumerat.]

CAP.

LVI.

T. i. 148. p. 445.

TORDYLO, quod ab aliquibus Sefeli Creticum appellatur, numerosos ab uno radices cespite pediculos emittit, longitudine dodrantes, graciles, ab interiore parte ex tereti figura in angulum desinentes, uenosos & iuxta terram in purpura nigricantes, à quorum medio usq̃ ad summam ex intervallo prodeunt minutissimè incisa folia breuissimorum capillamentorum figura, gracilibus furculis utrinq̃ in exortu sibi coniunctis circumposita, horum furculorum primi longissimi sunt, quibus reliqui paulatim longitudine cedunt, donec in summitate in turbinatam figuram desinat omnium soliorū coma, quæ per omnia foeniculi foliis similia sunt, præterquam quod multò breuiores huius Tordyli incisuræ sint. Caulem paulò post medium ueris unū atq̃ alterum producit, longitudine pedalem aut dodrantalem, gracilem et concauū, uno atq̃ altero in cacumine adnato, & in singulis paruum umbellam candidorum flosculorum plenam: quibus succedit oblongum, angulosum, duplexq̃ semen in fusco sufflauium, media inter cuminum satiuū & Sefeli figura & quantitate. Radicibus nititur multis, ab uno capite in diuersas partes distractis, longitudine dodrantalibus, minimo digito multò gracilioribus, foris nigricantibus, intus uerò candidis, quæ supra modū acri, suauī, aromatico & tamen graui



odore nares opplent, sapore uehementer tenui, aromatuū simili, & iucundo, minima quantitate: gustatè longo tempore gustum atq̃ olfactum obsidentes, folia mediam qualitatē inter radices & foeniculi folia tā gustu quā olfactu habent semen postremo predictis partibus qualitate responderet, nisi aliqua admixta amaritudine dilueretur. Nascitur excellis, planis & apricis latorū in cacumine montiuū cāpis, iisdemq̃ aliquantulum humentibus, ut iuxta claustrum Knibusium in nigra sylua, inter Dornstadiū & Lustenauium oppida, quæ ex Tubinga uersus Argentoratū itur.

T. 1. 141. p. 435.



LIGVsticum satiuum pediculos ab uno radiciscespite plures emittit cubito plerumque longiores, & minimi digiti crassitudine teretes, striatos, glabros & concauos; acuius medio per interualla usque ad cacumen bini minores exeunt pediculi, quorum inferiores longitudine pedali conspiciuntur, reliqui uerò breuiore, & ex his interstitiis discreta bina folia in geniculis coeuntia, glabra & nitentia, trium aut duum digitorum latitudine, longitudine paulo maiore, turbinata profundius in anterioribus lateribus apij modo incisa, è summis pediculis, unum rectè egreditur parem prædictorum numerum in imparem uertens. Caules erigit humana statura plerumque multo proceriores, pollicis aut digiti crassitudine, geniculis præcinctos: in quibus pediculi & folia sunt præscriptis similia, minora tamen pedali pediculo, geniculatim utrinque enascentia, in terna aut quaterna plerumque paria diuisa, adnata omnibus caulium geniculis singula egrediuntur, in quorum summitate umbellæ sunt fœniculo similes & æquales, luteis & paruis floribus, æstatis initio plenæ, quibus succedunt oblonga, angulosa, duplicia & fœniculo similia semina tam figura quàm colore, maiora tamen. Radices habet superius crassas, in multas partes digitali crassitudine distractas, nonnunquam cubiti profunditate aut maiore descendentes, colore candicantes. quæ incisæ flauum colorem ex se remittunt. Saporem habet tota herba modicè acrem, tenuem & aromaticum; odorem uerò apio multo acriorem & grauiorem, non tamen iniucundum. Radici recenti efficaciores sunt, quàm reliquis partibus qualitates præsertim liquore, sed propter excrementosam humiditatem faciliè teredinibus corroduntur aut alioquin corrumpuntur. Semen uerò quia siccius est, in multos annos prorogatur. Colitur in hortis: amat terram pinguem & locum umbrosam desiderat: ideoque felicius iuxta macerias prouenit.

DE MILLEFOLIO terrestri maiore: [*Tragus Millefolium nobile nuncupare uidetur.*] CAP. LVIII.

T. 1160. p. 476.



STRATIOTES terrestris maior, quem aliqui Millefolium terrestre uocant, multa ab una radice folia emittit digito longioribus pediculis utrinque breui interuallo adnascencia, semunciae longitudine se ipsa inuicem contingencia, plurimis, capillatis, breuibusque incisuris diuisa. Tota cum pediculis folia magnam habent cum auricularum pennis similitudinem, caules emittit rectos, longitudine plerumque digitali, teretes, furculosos & indiuiduos, ab ima parte usque ad cacumen inaequaliter dispositis foliis plenos praedictis similibus, breuioribus tamen. In summis caulibus latum est capitulum, comae rymbi aut umbellae figura (si omnes eius furculi ab uno principio exirent) paruis, candicantibus & in medio luteis flosculis plenum, candida florum foliola quae luteo tuberculo circumponuntur, quibusdam locis purpurascente colore conspiciuntur. floret diu, incipit enim sole in Geminos transiente usque, post solstitium durante flore, cui semen paleaceum & acerosum succedit. Radice nititur perenni, gracili, fibrata, lignosa & inutili. Saporem habent folia & flores subamarum et subacrem, odorem uero acrem, abrotono albo non dissimilem, estque hic non iniucundus, praesertim florum si terantur. nascitur secus uias, fossas, et in aggeribus solo plerumque aspero & aprico.

DE STRATIOTE siue Millefolio terrestri minore.

CAP. LIX.

STRATIOTES terrestris minor, maiori in cunctis similis, multo tamen minor, raro enim dodrante altioribus caulibus assurgit, tenuissimisque foliorum incisuris constat, odore magis acris, in attritu uehementi & aromatum modo iucundo, saporem habet maiori multo acriorem, amariorem, magisque tenuibus partibus constantem, alioquin tam similes inuicem sunt, ut non facile a quouis dignoscantur; nec credendum est, has duas herbas unam eandemque esse, & natalibus tantum differre. nam minor haec in apricis tumulis ex pingui terra congestis, & in pinguium editorumque aruorum marginibus, iisdemque diu non cultis prouenit: maior autem illa in asperis & macris tantum. Cum itaque omnia in asperis & macris nascencia, eiusdem speciei in foecundo solo, genitis acriora, efficacioraque sint, necesse esset, maiorem stratiotem in macris nascentem, in pingui, letoque solo exeunti, acriorem & efficacioram fieri, sed in lato solo nata, in macro natali genita multo efficacior existit, tam gustu quam odore, ergo rationi minime repugnat, minorem stratiote m

diuersum à maiore, & proprium genus habere. Prouenit autem copiosissima inter Halam Saxoniam & Merseburgum, inter Halam & Eyslebium, & in tumulis olim congestis circa montem Petri & uicinis locis.

DE HEMEROCALLE rubente, [quod Italorum Martagon uidetur, quod pro Asphodelo imperiti quidam hactenus abusi sunt.] CAP. LX.

T. 2. 85. p. 787.



HEMEROCALLIS rubens siue lilium syluestre, caulem erigit plerumque bicubitalem, teretem, gracilem: uiridem, solidum, & inferius purpurascens maculis conspersum, foliis quincuncialibus, longitudine & duarum unciarum latitudine, glabris ex rotundo turbinatis & pinguibus uestitum, iisque iuxta annexum angustioribus, superne nigricantibus, inferne autem uiridibus, eminentibus, ramamosisque à tergo & in mucrone coeuntibus, uenis. Flores estatis initio proni summo cauli adnascuntur lilio figura similes, multo tamen minores. Nam senis uncialibus constant foliis mediis digiti latitudine, sursum reflexis, colore in pallido rubentibus, intusque purpureis maculis conspersis, substantia pinguibus, carnosiss & glutinosis. Stamina ferunt singuli flores sena foliis numero respondentia, in quorum extremitate oblongum & transversum quiddam est, colore in rufum purpureum, rubiginoso, puluisculo, statimque pereunte conspersum, è medio staminum prodit incuruus apex in triquetrum rubensque capitulum desinens, uiridi & triquetro folliculo insidens qui defluentibus florum partibus solus remanet, & resupinus sursum incuruiatur, paulatimque increfcit, donec uncia longior & semuncia latior fiat, qui inferius angustior existit, idem sex eminentibus angulis totidemque lateribus constat, intus autem tribus

membranis seu parietibus in tres camerulas per longitudinem diuiditur, in quibus bini contigui, paruorum, latorum, planorum, leuium sibi inuicem superiacentium & flauorum seminum ordines continentur. Radicem habet bulbosam, diuturnam, iuglandis quantitate, pinguibus, crassiss, acuminatis & flauis aut luteis squamis, ueluti nucamentis sursum spectantibus compositam: à qua alii exigui prodeunt bulbi, quibus se propagat. Saporem habet lentum, glutinosum & nauseosum, tam flores quam radices, lilii saporis respondentem. Nasctur in syluis & frutetosis locis, tam editis quam planis.

DE SONCHO syluestri lata radice. [Nos talem serè quandam Lactucam syluaticam habemus, sed multo proceriorem plerumque, duorum generum: unum luteis, alterum purpureis floribus.] CAP. LXI.

SYLVESTRIS Sonchus caulem habet cubito proceriorem, foliis per ambitum diuisis, sinuosis et ueluti circumrosis amplexum, Sonchi foliis similibus, minoribus

bus tamen. Flores fert in summis uirgis paruos, capillatos & luteos: in pappo canescentes, & unâ cum oblongo nigroq; semine auolantes. Radice nititur semestri, breui, sesquiunciali, lata, in partes duas aut tres diuisa, foris flaua, intus candida. Tota herba copiosum & lacteum incisâ liquorem remittit, gustu amarum & subacrem. Nascitur frutetosus locis, plurimumq; circa montem Petri.

Lactuca syluatica.



Aster Atticus. T. 1. 48 p. 152.



DE ASTERE Attico, [radiculis odoratis. Videtur eadem, prima species herbe: quam Florem tinctorium Tragus uocat, Germanicè Scharten Fraut. Fuchsius quidem suo Asteri duos à radice caules producit, Matthiolus quatuor.]
CAP. LXII.


ASTER Atticus caulem unum atq; alterum cubitalem erigit, solidum, lignosum, nigricantem, & in ramulos diuisum: circa quem oblonga & utrinq; acuminata folia sunt, duabus uncis longiora, dimidia uncia latiora, nigricantia, hirsuta & aspera, atq; propè terram, folia è caule exeunt maiora sunt, quæ uerò in summitate minora, flores æstatis exitu in summis uirgis fert Chamæmeli floribus similes. in medio enim luteum habent capitulum, quod instar stellæ undiq; oblongis & angustis foliolis ueluti radiis circumdatur: quibus flaccescentibus luteum capitulum in pappo resoluitur, & unâ cum oblongo semine auolat. Radice nititur in partes & fibras distracta, eaq; perenni. saporè folia habent modicè amarescentem, radices uerò caryophyllatæ aliquem odorem adiunctum habent. Nascitur montanis, lapidosis & herbosis locis: plurimâq; circa Ienam & Tubingam.

DE OXYCOCCO, [ut Cordo uocari placuit. Latine Acinum uel Acinariam
palustrem dixeris.] CAP. LXIII.

OX Ycoccum coliculos per terram spargit do drantales plerumq̃, setarū modo
tenues, et in flauo rubentes: paruis & thymo similibus, supernè uiridibus, infer
nè autē candicantibus aut rubescētibus, singulisq̃ foliolis breui interuallo uestitos,
flores in extremis et capilli instar gracilibus furculis fert admodū paruos, colore pro
pmodū puniceo: quibus æstate singulæ succedunt baccae pisi quantitate, figura ro
tundæ & cordis modo inferius iuxta annexum turbinatæ, superius uerò exiguo &
quadripartito umbilico ueluti coronatæ, colore foris primum candicantes: mox pu
niceæ & purpureis contiguiscq̃ maculis et punctis conspersæ: intus uerò in candido
modicè rubentes, & quatuor exiguis cauitatibus parua & ueluti abortiua semina
claudentes. eæ unā cum coliculis humi procumbunt, nonnunq̃ etiam in musco tan
quam absconditæ latent. Radicibus nititur breuib, capilli modo tenuissimis &
flatis, saporem coliculi & folia habent adstringentem: baccae uerò egregiè & simpli
citer acetosum. Nascitur incultis, macris, humidis, putridis, uliginosis, muscosisq̃ lo
cis, ac frequenter iuxta Salsioram, plurimūq̃ propè Vuittembergam.

* Heluetijs Moßbeet, id est, acini palustres, nascuntur enim muscosis et humenibus locis.

*Oxycoccum. Aliter uel alia species
pingitur à Dodonæo.*



Ricinus. T. 1. 98. p. 288.



RICINUS caulem ex uno semine erigit singularem, trium plerumq; cubitorum altitudine, aut proceriorem, pollice crassio rem, arundinis modo geniculatum & concavum, glabrum & uelut in purpura cinereo puluere confpersum, duobus, tribus aut quatuor adnatis ramosum. folia habet dodrantis aut pedis latitudine, in septem, octo aut nouem, nonnunquam etiam plures partes incisa, & per ambitum serrata, glabra, mollia & aceri arbori similia, longis, crassis & teretibus pediculis insidentia: ea ubi pediculo iunguntur, nervos ueluti e centro per medias foliorum partes a tergo emittunt. flores æstate fert pediculis instar longi racemi circumpositos, eosq; duplicis generis, inferiores enim ante quam aperiantur ferè pili rotunditatem & quantitatem habent, apertis autem caliculis muscoli & palidi corymbis speciem acquirunt, graciliq; pediculo adherent: qui in medio iuncturam quandam habet, à qua ipse flos, postquam flaccescere incipit, recedit & decidit, nulla spe secuturi seminis aut fructus post se relicta, steriles enim omnino inferiores hi flores sunt, & tantum rudimenta ac præludia quædam. Alterum uerò floris genus à molliter aculeatis capisulis procedit, singulaq; capitula terna, hirsuta, furcata & rubentia stamina proferunt, quæ floris uicem explent: hisce ærescentibus capitula accrescunt, donec parvæ castaneæ quantitatem consecuta fuerint, ea intres (ut plurimum) partes ceu utriculos diuiduntur, nonnunquam etiam in quatuor, semina in utriculis singula habet Ricino animali forma & quantitate æqualia, foris liuido aut maculoso cortice, intus autem candida medulla constantia, lignoso utriculi cortici inclusa. quo propter siccitatem in maturitate repentè fisso & contracto, ipsa semina cum impetu & crepitu ueluti tormento aliquo emissâ, longius prosiliunt. Radice nititur pedali, multifida, candida & semestri, seminis tantum usus est, quod gustu fauces exasperat nauseam & uomitum ciens, intra corpus uerò grana aliquot sumpta cum anxietate maxima utrinq; purgant. herba ipsa, cum teritur, grauem habet odorem. Seritur in hortis,

CUCUMIS anguinus, qui etiam asininus appellatur, uiticulos per terram spargit bicubitales, minimi digiti crassitudine, teretes, breuib; aculeis exasperatos, solidos, & anguium modo inflexos. folia fert longis, crassis & aculeatis pediculis insidentia, sex unciarum longitudine, posteriori parte quatuor aut quinque unciarum latitudine, in obtusum mucronem desinentia, superius uiridia, inferius autem pallidiora & crebris, intricatisq; uenis rugosa, utrinque tamen aspera. flores ex foliorum alis tota æstate profert, quinque latis acuminatis & flauis foliolis, uncia paulò breuioribus constantes, in quorum medio ternæ hirsutæ & flauæ furculæ staminum uicem explent: retro flores hirsutum & oblongum extuberat capitulum, quod flaccescente flore, paulatim unâ cum suo pediculo accrescit, donec maxime glandis quantitatem superauerit, hoc undiq; breuib; aculeis armatur, & in maturitate cum splendere, gliscere & candicare inceperit, sponte sua aut leuiter tactum à pediculo recedit, & cum impetu ueluti tormentum aliquod oblonga foris nigra, intusq; candida semina unâ cum aqueo succo eiacularur, producit etiam alios adulterinos & steriles flores, quos nulli fructus sequuntur, eos à genuinis & fœcundis dignoscas, quod intus terna, trifida ueluti complicata, & per ambitum crocea, nec hirsuta stamina contineant, nullumq; à posteriori parte capitulum producant, quod secuturi fructus rudimentum existat. Radice nititur dodrantali, crassitudine sua manum ferè complente, candida, carnosa & semestri,

oblongo rapo simili. Tota planta uehementer amara est, sine aliqua alia qualitate, solius seminis medulla dulcedinem habet, quæ etiam mures alliceat, quapropter miror Galenum huic semini amarum saporem adscribere libro de facultatibus simplicium, fortè superficiem tantum gustauit, quæ amara est, non ipsum nucleum, qui propriè seminis appellatione uenit: purgat egregiè aluum succus totius herbæ. Nasçitur asperis locis, circa pagos & rudera. cum uerò feritur, multò maiora folia producit,

Cucumis anguinus. T. 2. 99. p. 832.*Cichorium. T. 1. 91. p. 272.*

DECICHORIO.

CAP. LXVI.


CICHORIUM siue agreste Intybum, caules erigit cubito proceriores, inferius teretes & hirsutos, superius autem angulis striatos, pluribusq; adnatis ramis, angusta cauitate peruios, donec uiret lentos & infragiles: folia habet circa imam caulium partem dodrantalia ferè per ambitum inæqualiter diuisa, sinuosa, hirsuta, trium plerumq; digitorum latitudine, & in mucronem desinentia, maxime summis uirgis excurrentia, quæ minora etiam sunt, & paucioribus incisuris diuisa, folia uerò quæ ante caulium productionem à radicis capite exeunt, & per terram sternuntur, multò maiora existunt & obtusiora. flores à ueris exitu in foliosis caliculis proferre incipit usq; ad autumnum, rotæ modo in orbem circumpositis foliolis constantes, colore cœruleis, uncia breuioribus, & in extremitate serratis, stamina
in me=

in medio flore sunt eiusdem coloris, singuli autem flores unum tantum durant diem: manè enim prodeunt, uespere uerò flaccescunt. semina post flores in iisdem caliculis fert oblonga et angulosa, sine pappis hyeme excidentia. Radice nititur perenni, cubitali, bifida plerumq, superius minimi digiti crassitudine, carnosæ & candida, per quam lignosus transit neruus, folia incisa pauco lacte manant. tota herba amarum habet saporem, non tamen usq, adeò uehementem. Nascitur campestribus & asperis locis, circa regias uias & arua.

DE CICHORIO *fatiyo.*

CAP. LXVII.

CICHORIUM *fatiuum*, quod ab Italis etim *Endiuiæ hortensis* seu simpliciter *Endiuiæ* uocatur, agrestis figura & florum colore similitum existit, folia tantum maiora minusq, incisa habet, pauloq, minores flores maioribus foliosioribus hirsutioribusq, caliculis insidentes. Radice nititur dodrantali, lignosa, multis capillamentis fibrata, hyeme unà cum herba pereunte. Sapore agreste *Cichorium æmulum* latur, quamuis minus amarescat. Seritur acetariorum causa in hortis Italiæ frequentius quam Germaniæ.

Cichorium fatiuum. T. 1. 91. p. 273.*Helenium maius*. T. 1. 55. p. 170.

Helenium maius, quod ab alio nomine Inula siue Inula cāpana uocatur, grādia à radice emittit folia, pedali & cubitali plerumq; longitudine, latitudine interdum do drantali in mucronem desinentia, per ambitum modicè & inæqualiter serrata, superius in uiridi pallentia, inferius autem candicantia, hirsuta & uenis obliquis distincta, uerbaſci foliis similia, caulem alternis (ut plurimum) annis fert tricubitalē, digiti crassitudine, nigricātem, in tereti striatum, solidum et singulis foliis (quā inferiora sunt) paulò minoribus ex interuallo uestitum, & in cacumine in adnata ali quot diuisum: à quibus magni & orbiculati flores æstate prodeunt, foliaceis caliculis insidentes trium unciarum latitudine, inæqualibus partibus constantes. in medio enim numerosa, breuia & lutea stamina densum capitulum cōstituunt, quod undiq; longi, angustiq; & eiusdem coloris foliolis radiorum modo circumdatur: hisce flaccescentibus interiora stamina in tenues pappos soluuntur, & unā cum oblongo, gracili, nigro semine auolant. Caulem quibusdam locis non fert, aut rarò. Radice nititur perenni, grandi, crassitudine sua manum implente, in pedales partes distracta, foris subruſſa, intus autem candida & carnosā, à qua ueluti oculi alia germina exeūt, quibus auulsis & positis propagatur, intus in ipsa radice liquor flauus guttatim disperſus continetur. Saporem radix habet feruidum, tenuem & amarum, flores & folia cum parua acrimonia amareſcunt, semen foliis acrius est, & nihil ferè amaritudinis obtinet. Nascitur pinguibus & fecundis campis, à quibusdam etiam in hortis colitur.

DE CHONDRILLA tenera, [Cichorio simili, floribus è cœruleo modicè in purpureum uergentibus, etc.] CAP. LXIX.

CHONdrilla tenera, Cichorio, id est, agresti Intybo similia habet circa terram folia, non tamen hirsuta, sed admodum glabra & tenera: è quorum medio cubitalis, tenerq; exit caulis, superius in adnata diuisus, in quibus flores sunt Cichorio similes, modicè in purpuram ex cœruleo uergentes, semen habet oblongum, * Radice nititur perenni, pedali, cubitali aut longiore, digitali crassitudine: foris tenui, squamoso & nigro cortice uestita, intus candida, carnosā, tenera & admodum fragili. Tota herba lacteo turget liquore, & gustu dulcis est. Nascitur editis apicisq; uincis & montibus. solum amat albicans, pingue & calcario lapidi mixtum: lenæ itaq; copiosissima nascitur.

DE MILIO (uel Panico) Indico, quod semestris est frumentum. [uulgo Sorgi appellant.] CAP. LXX.

MILIVM Indicum tres aut quatuor prægrandes, ex uno grano emittit culmos, septem, decem aut nonnunq; tredecim pedum longitudine, crassitudine digiti, nouenis ut plurimum geniculis interceptos, solidos & matureſcente semine rubentes. folia è geniculis singula profert cubito longiora, trium aut quatuor digitorum longitudine, tritico Baſtriano similia, per ambitum minutissimis sed acutis dentibus armata: qui si deorsum mulceantur, teneros digitos etiam uulnerant. è summis uirgis singulæ erectæ spicæ erumpunt foliis inuolutæ, do-drante plerumque longiores, quatuor aut quinque unciarum latitudine, plurimis paniculis constantes, & commodo in mucronem desinentes. hæc postquam omnino ex inuolucris æstate prodierunt, flores proferunt exiguos, oblongos, flauos & pendulos, quibus defluentibus spicæ rubescere incipiunt. autumno

tumno uerò cum ad maturitatem peruenerunt, nigricant & granis in ruffo nigricantibus, uulgariq; Milio multò maioribus turgēt. Radicibus nititur multis, obliquis & satis firmis, iis tamen contentum non est. nam increfcente culmo, & in folijs turgente spica, ex inferioribus geniculis undiq; demittit fulcra quædam, quæ ubi in terram descenderint, radices & fibras agunt. hisce fulcris diuina prouidentia proceris culmis consulit, quo facilius uento resistent, ipsum semen cum lacte coctum rufefcit; & simul milii acorizæ saporem æmulatur, solum amat pingue & humidum.

Milium Indicum. T. 2. 30. p. 660.

Allium campestre. T. 2. 69. p. 748.



DE ALLIO campestri. [Tragus Allia syluestria tria simul depicta exhibet, uti hic ponimus. è quibus medium syluaticum est, & Germanis nominatur Waldknoblauch/ Rainsen/ Gerinsel, hoc Dioscoridis Ophioscorodon esse putat: aliqui ursinum cognominant. Extremorum alterum quod binis folijs pingitur, Caninum uulgo cognominari ait à fetore, Hundsknoblauch, in uineis & locis cultis nasci, unde Ampeloprason esse coniicit. Fuchsius syluestre allium uocat. Wilder Knoblauch. Alterum quoq; Allij canini speciem facit, sed non describit, hoc an allium campestre Cordi sit, inquirendum. (Id autem esse uidetur, quonià Fuchsius Germanicum eius nomen prodit. Seldknoblauch, hoc est, Allium campestre.) Meminit præterea Allij canini minoris, quod alibi depingens Hyacinthum secundum facit.]

CAP. LXXI.

ALLium campestre, ab uno cespite plures erigit indiuiduosq; caules, longiturdine plerumq; cubitales, iunceos, solidos & angulosos. Folia circa terram tantum habet dodratalia, ualde angusta, & modicè canaliculata. in summis caulibus sin

guli erecti sunt corymbi, purpurascensibus flosculis aestate pleni: singulis floribus triquetri, nigricantes & exigui folliculi, qui aperti senu, oblonga, nigraque ostendunt semina, succedunt, semina uni pediculo annexa. Radicibus nititur multis, exiguis, bulbosis, fibratis & inferius crasso uinculo connexis, ita tamen, ut singuli bulbi singulos ferant caules. saporem & odorem Allii habet. Nasclitur in campis et pratis, maxime fluviorum inundationi obnoxiiis lutofo solo.

DE MENTHA corymbifera minore, Equam Itali herbam Iuliam uocant, aliqui Eupatorium Mesue: cuius qualemcumque ex Tragilibris Iconem adiunximus. acuratiorem dedit Matthiolus, Maiorem describit infra, cap. 117.] CAP. LXXII.

MENTHA corymbifera minor, plures ab una radice emittit uirgas, longitudine (ut plurimum) cubitales, admodum graciles & solidas, sesquiuncialibus longitudine, & semuncialibus latitudine foliis per ambitum serrae instar incisiss, uestitas. In summis uirgarum furculis, corymbi estate se proferunt, sole Leonem occupante, exiguis luteisq; floribus diu durantibus pleni: quibus exigua, oblonga & palacea succedunt semina. Radice nititur exigua, fibrata, candida & semestri: quae gustata pyrethri feruorem habet, quo saluam proliciat. Colliculi uero folia, flores & semina iucundum spirant & uehementem odorem, Menthae corymbiferae maiori et Tanacetosimilem. saporem eadem partes amarum, & cum acrimonia tenuem habent. Nasclitur in montibus Vuirciburgi. feritur a quibusdam etiam in hortis odoris causa.

Mentha corymbifera minor. T. 1. 175. p. 515.

Sanguisorba maior. T. 1. 157. p. 470.



DE SANGVISORBA maiore.

CAP. LXXIII.

SANGVISORBA maior, caules erigit cubitales, graciles, angulosos, solidos & ramosos: folia iuxta terram se proferunt, longitudine sesquiunciali, unius latitudinis, per ambitum ferræ modo incisa, ut plurimum canalis instar complicata, superius uiridia, inferius cineracea, à dodrantali angulo sèpè pediculo exeuntia, ex utroq; latere quina, sena aut plura, in extremitate pediculi unum inter utrumq; ordinem intercedens recta prominet, in summis caulium furculis circa ueris medium capitula profert oblonga, anteriori medii digiti articulo æqualia rubentibus & palaceis floribus plena, quibus defluentibus semina succedunt angulosa, exiguaq;. Radice nititur perenni, minimi digiti crassitudine, obliqua, foris nigricante, intus rubescente, in plures partes distracta, quæ gustata adstringit, folia & reliquæ herbæ partes glutinosum & dulcem saporem habent, odorem uerò cucumeris. Nascitur in lutosiis pratibus, fluuiorum inundationi obnoxiiis, plurimâq; Lipsiæ, Halæ, Merseburgi, etc.

DE SANGVISORBA minore.

CAP. LXXIIII.

SANGVISORBA minor maiori similis, folia tamen & capitula minora fert, flores quoque non palaceos, sed lanugineos producit, alibi in ruffo candidantes, alibi rubentes, tantum semen maiori æquale habet, & triquetrum aspera superficie. Radice nititur perenni, minimi digiti crassitudine, dodrantali aut pedali, non obliqua sed recta descendente (nisi quid impediât) saporem & odorem maiori similes habet. Nascitur lutosiis, calculosis apricisq; collibus, & secus uias.

DE DAVCO tenuifolio, folijs pastinacæ sylvestris, multò minoribus, glabris, etc. [Querendum an hæc sit *Caucalis* Matthioli.] CAP. LXXV.


DAVCVS tenuifolius primo anno, quo è semine prodiit, folia tantum profert, sylvestri pastinacæ similia, multò tamen minora, glabra & per terram strata. Sequenti postea anno caulem erigit pede proceriorem, teretem & folijs circa genicula præcinctum singulis, iis quæ circa terram sunt minoribus, umbellam in summo caule æstate unam atq; alteram fert, minimis candidisq; flosculis plenâ: quibus singula succedunt duplicia semina ante maturitatem superius rubentia, satiuo petroselinò æqualia. Radice nititur annua, admodum gracili & sufflaua, quæ gustu aliquantulum acris est. folia sylvestri pastinacæ similem saporem habent. semen uerò feruore cæteras partes uincit. Nascitur asperis, apricis & editis locis, plurimumq; quæ ex Hildesheymia Hanoueram itur, unius miliaris germanici spacio ab Hildesheymia.

DE ALLIO satiuo multifido.

CAP. LXXVI.

ALLII satiuo duo sunt apud nos discrimina. unum enim capite grandi constat, pluribus nucleis coactū, huius superficies candidis tenuissimisq; uestitur membranis, quæ in uniuersum detrahantur, nucleis adhuc separatim uestitis, folia hoc habet cubitalia, uenosa & canaliculata, sibi ipsis inserta ita, ut caulis figuram ubi omnia coniunguntur exprimant, primo cum deponitur anno neq; caulem, neq; semen fert, an uerò altero serat uidendum.

Allium sativum multifidum. T. 2. 68. p. 745. Ex duabus his *Alliorum* formis à Trago exhibitis, altera vulgaris *Allij* est, capite multifido. alterum *Scorodoprasum* nominat, ac describit postea cap. 70. libri eiusdem, id est, secundum. Medio matrices mulierculæ (inquit) in hortis *Allij* genus, etc.



DE ALLIO simplici utroq[ue]. [Lege que scripsimus supra cum effigie *Allij* sativi multifidi.]

CAP. LXXXVIII.

DE ALLIO sativo amphicarpo, [quod ita cognominat, quod & radicem nucleis feratur, & seminibus quæ nucleos similitudine referunt.]
CAP. LXXXVII.

ALTERum sativi *Allij* genus, quod amphicarpon appello siue semine, siue nucleis ponatur, caput non adeo grande acquirit, membrana tenuissima & purpura scente circumdatum, quæ sponte etiam ruptur. Nucleos habet non separatim, ut primum genus uestitos, sed nudos ferè, numeroq[ue] pauciores, indiuiduos & caulis basi circumpositos. Caulem emittit prima æstate, utroq[ue] modo satum, cubito proceriorem, teretem & glabrum, ab ima parte canaliculatis foliis uestitum, priori *Allio* similibus, paulò tamen minoribus. In summis caulibus utriculus candicans enascitur, in longum & acuminatum cacumen desinens: quo in crescente caulis sub ipso utriculo bis intorquetur ueluti in spiram, nec rursus in rectum diducitur, antequam utriculus quantitate caput in terra retentum magnitudine ferè æquauerit, & rupta æstate membrana iam mature scentia semina ostenderit, quæ globuli figuram habent, & magnitudine anteriorem partem minimi aut annularis digitum æquant, (colore foris purpureo, intus autem candido,) racemi modo confecta, & substantia acrimoniaq[ue] nihil à capitum nucleis differentia: inter quæ intortæ ueluti caudæ se proferunt rudimentum quoddam futuri floris, sed frustra ostendentes. Vtriusque *Allium* sapore acerrimum est, & fumo so odore caput tentat.

ALLium simplex, indiuiduumq[ue], quale in Aegypto nasci scribit Dioscorides, utrum suum peculiare & diuersum à prædictis genus habeat, non ausim affirmare: siquidem apud nos huiusmodi *Allium* frequenter nascitur, ex utroq[ue] *Allij* genere, cum nucleus aut semen ponitur, quod in nullos nucleos diuidi aptum sit. Præstat ita utriusq[ue] huius *Allij* simplicis differentiam ostendere: simplex itaq[ue] *Allium* quod ex indiuiduo maioris *Allij* nucleo natum fuerit, oblongum est & utrinq[ue] acuminatum, pluribusq[ue] ac candidis membranis uestitur. Quod uero ex amphicarpo *Allio* nascitur, è nucleis non gignitur sed semine, non tamen quouis, uerum eo tantum, quod simplicissimum natura sit, & in nullas partes distrahi natum. cum adoleuit, porri caput magnitudine æquat & globuli rotunditatem habet, unaq[ue] aut altera

tera purpurea uelatur membrana, hoc autem omnino Aegyptiaci Allij descriptio-
nem repræsentat, utrumq; autem caule & semine caret, ueluti imperfectum sit, &
quamuis simplex Allium quod oblongum est, altero anno ponatur, non tamen cau-
tem fert, quantumuis adolescat, & in nucleos diuidatur in terra caput. an itaq; sim-
plex Allium quod rotundum est, & purpureum similiter in nucleos diuidatur, &
caule caret animaduertendum.

DE LYCOCTONO satiuo tricarpo, sic enim à triplici siliquarum ordine
nominamus. [Hic fortè Napellus est, qui apud nos in hortis colitur. flori-
bus cœruleis, alicubi purpureis: cuius iconem Tragus hanc dedit.]
CAP. LXXIX.

Lycotium satiuum tricarpum. T. 1. 82. p. 248.



LYCOCTONum satiuum, quod à tri-
geminis folliculis tricarpon uocatur,
caules, folia, flores, folliculos & semina syl-
uestri similia fert: suas tamen habet, quibus
ab hoc dignoscitur, differentias. folio est
profundius usq; ad pediculū inciso, nigrio-
re, glabro & inferius supra modum splen-
dente. floribus capacioribus, colore purpu-
reis, folliculisq; in summitate sibi annuen-
tibus, ut plurimum, ternis: in quibus nigra
sunt semina. Radicem habet crassam, mul-
tis nigricantibus cirris fibratam, secus quā
aliæ enascuntur, ueluti oculi aut bulbi, se-
quenti anno caulem producturæ, raro au-
tem una tantum inuenitur radix, cum enim
nō transfertur, in terra se propagat, quo fit,
ut unius cespes multis constet radicibus, si-
bi inuicem cohærentibus. Saporem ✱

DE LYCOCTONO satiuo pentacarpo, [quod
à quintuplici siliquarum ordine sic nominat Cor-
dus. Flores quā superius maiores habet, colore
in purpura cœruleos, & candicantes: eiusdē alio-
qui generis proximi, ut apparet.] CAP.
LXXX.

LYCOCTONum satiuum pentacar-
pon, prædicto simile est, non tamen
adeo profundè sectæ foliorum partes sunt,
nec adeo splendidæ: flores quoq; maiores
fert, colore in purpura cœruleos, & candi-
cantes, quibus siliquæ succedunt quinæ, prædicti siliculis longiores, semine nigro
plenæ. Radicibus nititur tricarpo æqualibus & similibus.

DE ABSYNTHIO.

CAP. LXXXI.

ABSYNthium uirgas cubito proceriores emittit, mínimo digito paulò gra-
uiores, striatos, admodum breui lanugine canos & solidos, quibus toris usq;
ad summitatem ramuli adnascuntur semine exiguo, fursuraceo, in nutantibus ueluti

Absynthium. T. 1. 110. p. 335.



racemulis contento flauoq̃ onusti : quod tantilli æstate præcedunt flosculi, colore lutei, qui concussis uirgis instar pulueris decidunt. folia antequam caules proferat circa radicem habet in latitudinem explicata, et in minimas partes rut̃ modo diuisa, ab utraq̃ parte breui, & cinericea lanugine candicantia. quæ uerò in summis uirgis sunt folia, paucioribus partibus constant. Radice nititur digitali crassitudine, fibrata, lignosa & perenni: saporem habet uehementer amarum, tenuem & aliquantulum adstringentem : odorem uerò admodum grauem & acrem: semen cæteris partibus tenuius amariùsq̃ existit, caput tam gustu quàm olfactu in saporem trahit & aggrauat. Nascitur asperis locis, circa uias, pagos & arces.

DE ABSYNTHIO dulci. CAP. LXXXII.

ABSYNthium dulce Artemisiam sapore æmulatur, figura uerò absynthium. Radice nititur similiter ut Absynthium perenni.

DE ARTEMISIA maiore. CAP. LXXXIII.

ARTEmisia maior Absynthio similior. differentia in colore & sapore consistit. caules enim purpurei et spadicei sunt coloris, folia superius uiridia sunt, inferius uerò incana. seminum quoq̃ capitula magnitudine absynthio cedunt, magisq̃ rubent. Radice nititur perenni, saporem habet tenuem & iucundum odorem. Nascitur iuxta sepes & profluentes.

DE SATVREIA. CAP. LXXXIII.

SATVreia siue Thymbra satia, pedalis & interdū cubitalis est herba, caulem ab ima parte satis crassum, solidum, hirtum & nigricantem habet. Tota herba numerosis geniculis præcingitur, & in plures uirgas diuiditur, ita ut à singulis geniculis bini ramuli alterno positu exeant. folia sub ramulis uncialia plerumq̃ habet, cæq̃ angusta & acuminata, superius modicè hirta, inferius ueluti punctis quibusdam distincta. flores æstate in summis surculis fert exiguos, & in candido rubentes, in capitibus ceu breuibus spicis contentos, foliis permixtos: quibus nigra succedunt semina caliculis insidentia. Radicibus nititur lignosis, fibratis, semestribus & inutilibus. folia & flores gustu acria sunt non sine gratia aliqua, odorem habet acrem, & iucundum. Seritur in hortis.

De


*Artemisia maior. T. 1. 113. p. 344.**Satureia. T. 1. 13. p. 45.*DE THYMBRA, [id est, *satureia sylvestris*, quæ à Creta affertur.] CAP. LXXXV.

THYMBRA, quæ sylvestris *satureia* est, sativæ *satureiæ* in cunctis similis existit, durioribus tamen & magis hirtis foliis constat. saporem & odorem acriores habet, si uerò nimium gustetur uomitum minatur. Nascitur asperis & saxosis locis, in Creta & uicinis regionibus: unde ad nos affertur. Quæ uerò circa eam nascitur *Cuscuta* Paulo *Aeginetæ* & reliquis Græcis, *epithymbrum* uocatur.

DE STACHY. CAP. LXXXVI.

STACHY Spures erigit uirgas, longitudine cubitales, & quadrangulas, è quibus per interualla bini, alterno positu exeunt ramuli. folia habet *Marrubio* æqualia, oblongiora tamen. flores æstate circa summas uirgas profert paruos, candidos, hiantes & in quinas partes sectos, denticulatis caliculis (exigui & rari uerticilli modo) coniunctis insidentes: quibus exigua nigraque succedunt semina, uestitur tota herba tenui, candidaque lanugine. Radice nititur fibrata, lignosa & perenni, sapore & odore *Marrubium* emulatur, saporem tamè *Marrubio* habet paulò acriorem, odorem uerò imbecillio rem. Nascitur asperis, & aliquantulum editis locis circa pagos, ut inter *Seburgum* & *Eyslebiu*.

* *Secundum. Rara Germaniæ herba.*

Stachys. T. 1. 2. p. 9.*Scolymus*. T. 2. 115. p. 866.

DE SCOLYMO, [quem uulgò Artischock uocant.]

CAP. LXXXVII.

SCOLYmus Carduus est fatuus, & in cibis receptus, prima qua scribitur æstate, grandia profert folia, crassa, angulosa & canaliculata spina. utrinque in dodrantales, rugosas, & in cinericeo colore cauas partes usque ad ipsam spinam secta: quæ & ipsæ suas peculiare diuisuras habent, singulis aculeis armatas. ea hyeme sub niue latent, sequenti uero æstate caulem emittit sesquicubitalem, striatum & incuruū: in cuius cacumine grande est caput, conici & pinæ nucis figura, aculeatis carnosissimæ squamis circumuallatum, quod in summitate aperitur circa solstitium, latam comam ostendens, purpureis & capillatis floribus plenam & confertam: quibus semina succedunt Cnico similia, non adeo tamen angulosa, pauloque minora, colore cæsia & interdum maculis conspersa. Radice nititur cubitali aut pedali, crassitudine sua manum implente, foris nigra, intus candida, & antequam fructificet carnosissima. postea uero lignosa & pereunte: quæ gustu amarescit: folia quoque amarum saporem habent. Scribitur in hortis capitis causa luxuriosis Italici, nobis tantum spectaculi uice colitur.

De

DE HIPPOSELINO, [quod uulgò *Petroselinum Macedonicum* uocant.]
CAP. LXXXVIII.

T. 1. 145. p. 436.



HIPPOSELINUM prima æstate cum è semine prodierit, folia tantum profert Apio similia, multò tamen maiora, sequenti uerò anno caulem emittit bicubitalem, angulis striatum, modicè concavum, & in adnata seu ramulos diuisum, in quorum summitate umbellæ sunt latæ Libanotidis figura, antequam diuidantur conferetorum corymborum formam referentes, luteis flosculis plenæ: quibus duplicia, grandia, angulosa, nigra cartilaginea quæ succedunt semina. Radice nititur perenni, dodrantali aut pedali, pollice crassiore, pastinacæ satiuæ modo indiuidua, foris nigricante, intus candida & carnosa. quæ gustu acris, subamara, odorata & aliquantulum fenuida existit. Semen acrius amariuscque est, & aromatum præsertim myrrhæ odorem habet. folia similes habent qualitates, sed aqueo humore dilutas. Nascitur umbrosis & humentibus locis. In Germania tamen parcius, interim etiam colitur apud nos in hortis.

DE BRASSICA agrestis quadratis siliquis,
floribus candidis, &c. CAP.
LXXXIX.

BRASSICÆ agrestis una species cubitalem habet caulem, teretem, glabrum, aliquantulum concavum, & in ramulos diuisum, folia ex interuallo singula profert se-

cus ramulorum eruptiones, trium aut quatuor unciarum longitudine, paulò angustiora, subrotunda, glabra & Brassicæ modo carnosa: flores ueris exitu candidos & oblongos fert, quibus singulæ succedunt siliculæ, digito longiores, angustæ, & quadrangulares, oblongo, nigroque semine plenæ. Radice nititur exigua, lignosa, semestri & inutili. Folia Brassicam gustu imitantur: semen uerò amariuscque est, & aliquantulum acre. Nascitur pinguibus agris, lento & glutinoso solo.

DE OCIMONabathæo. CAP. XC.

OCIMVM Nabathæum, uulgari ocimone quale & simile est, candidioribus tamen uirgis & foliis constat; nec adeò grauem, sed iucundiorẽ odorem spirat. Seritur in hortis.

DE OCIMO caryophyllato. [Videtur de eo sentire, quod inter Ocimigenera
minimum est.] CAP. XCI.

OCIMVM caryophyllatum, prædictis quidem simile est, sed multò minoribus uirgis assurgit, minoribulq; foliis constat, iisdemq; candicantibus. odorem habet inter utrumq; Ocimum & Caryophyllas medium, unde nomen inuenit, Seritur in hortis.

Ocimum caryophyllatum. T. 1. 8. p. 30.



Drosium. T. 1. 174. p. 311.



DE DROSIO, id est, Alchimilla. [Nomen è Germanico finxit.]


CAP. XCII.

Δροσά seu Δρόσιον, siue *νιάδριον*, quam uulgò Alchimillam uocant, dodrantes plerumq; emittit pediculos, eosq; iunceos, propemodum teretes & leniter hirtos, in summitate singula folia ferentes, superius uiridia, inferius pallida, & antequàm explicentur tunicae modo complicata, cum uerò se explicuerint, quinque unciarum quoquo uersus latitudinem acquirunt, rotundaq; fiunt, præterquam quod per ambitum plerumq; octonis profundis incisuris diuisa sint, & quæ inter eas partes seu spacia sunt, semicirculum expriment, & serræ modo incisa sunt. præter eas sectiones sinum adhuc habent usq; ad pediculum recedentem, à pediculo singuli nerui ad arti-

partium extremitates transeunt, iplis foliis ros in guttas coactus continetur, nonnunq̃ etiam singulis incisuris ros Margaritarum modo insidet, unde etiam Græcū & Germanicū nomen accepit. Coliculos ueris medio dodrantes, iunceos, teretes hirtosq̃ emittit, exiguis foliis interceptos & in plura breuia adnata & furculos diuisos, in quorū summitate minimi luteiq̃ flores sunt, substantia muscosi, & post hos cāilla semina, quæ uix uisu percipi & dignosci queant. Radice nititur minimi digiti crassitudine, foris nigricante, intus autem flaua, ferè lignosa & perenni, à qua undiq̃que numerosæ exeunt fibræ. tota herba adstringit, maximè autem radix. Nascitur pinguibus, herbosis, frutetosis & editis locis.

DE SAMSVCHO. CAP. XCIII.

T. 1. p. 33.



SAMSVchus quæ Latinis Maiorana uocatur, odoratus frutex est caudice breui, minimi digiti plerumq̃ crassitudine, multis dodrantalibus ramulis, iisdemq̃ in latitudinem expansis fruticosus, foliis uersutitur totus, in rotundo oblongis, tenuifolia Nèpetæ similibus & æqualibus, mollibus, leniter hirtis, & hyeme uirentibus. flores æstate fert in summis furculis admodū exiguos, muscosos & candidos, ab exiguis squamosis hirtisq̃ capitulis prodeuntes: semen iisdem capitulis continetur admodū paruum, colore spadiceum. Radice nititur multifida, lignosa & perenni. semine satum eadem æstate fructificat, & binos è singulis geniculis ramulos profert, postquam uerò adoleuerit incertus sit ramulorum ordo: odorem habet fragrantem, admodū iucundum & suauem, saporem uerò tenuem, & subacrem. Caput tam gustu quàm olfactu ueluti futuro somno mulcet & mitigat, Colitur apud nos in hortis.

DE ROSMARINO syluestri seu matore. CAP. XCIIII.

ROSmarinus syluestris seu maior, odoratus est frutex, caudice assurgit digita li aut pollicari crassitudine, pluribus cubitalibus bicubitalibusq̃ uirgis ramosus. folia circa uirgas breui interuallo fert scsquiccia

lia, angusta, superius uiridia, inferius autem canescentia, modicū ab utroq̃ latere in flexa & Chamæpeucæ similia, quæ hyeme non amittit. flores uere in uirgis secus folia profert paruos, hiantes, colore in cœruleo candicantes, denticulatis caliculis insidentes, pauca stamina exerentes, quibus exigua nigraq̃ succedunt semina, (quamuis Plinius illi falso semen neget.) Radice nititur lignosa, in plurimas fibras distracta & perenni. Odorem habet suauem, iucundum, simulq̃ grauem, saporem uerò tenuem, modicè feruidum, subamarum & saluam elicientem. Nascitur in Narbonensi Gallia.

Rosmarinus minor. T. 1. 17. p. 55.



ROSMARINUS minor seu tenuifolius, uirgis, foliis, floribus, semine & reliquis facultatibus maiori similis est: præterquam quod minoribus cõstet hisce partibus, odorem etiam suauiore nec adeo grauẽ spirat. Colitur apud nos in hortis.

DE PITYOSPERMO. [Finxit hoc nomen Cordus à resinaceo seminis odore saporisq;. Memini hanc herbam locis Helueticum montanis inuenisse, & in horto plantasse, folijs cicutæ, semine oblongo, etc.]
CAP. XCVI.

PITYOSPERMON caules emittit cubito multo proceriores, geniculatos & striatos. folia à radice proferi longis pediculis in latitudinem diuisa, cicutæ similia, præterquam quod hirsuta sint, et paulo maiora. umbellas in summis caulium uirgis fert ammio æquales, ueris exitu exiguo cãdidoq; fibre plenas: quibus duplicia succedunt semina, cumino multo longiora, angulis striata, nigricantia, & substantiæ artilaginea. Radices habet perennes, ab uno cespite in plures dodrantes aut pedales partes distractas, minimi digiti crassitudine, colore candidas, fibratas & interdum foris nigricantes. à quarum capite alię exeunt radices geniculis præinctæ, sub terræ superficie sparsæ, quibus se propagat. Ra-

dix gustu serè Gallicam pastinacam imitatur. Semen resinaceum habet tum saporis tum odorem, & radice efficacius est. Nascitur umbrosis, lapidosis, humentibusq; locis, solo subpingui iuxta gelidos riuiolos, opacis montibus & syluis delabentes.

DE MALVA syluestri supina, [aliq; minorem uel pumilam cognominant. est autem uulgarior, & ubiq; obuia.] CAP. XCVII.

MALVA syluestris supina caules per terram spargit cubitales, teretes, uirides & solidos, in quibus folia sunt longis pediculis trium unciarum latitudine (nonnunquam etiam maiora) per ambitum serrata rotundaq; præterquam quod ab una parte in profundum sinum recedant usq; ad pediculi annexum. Flores secus folia fert paruos quinquefolios, alteri syluestri Maluę similes, minores tamẽ, in candido rubentes, quibus exigua succedunt semina in orbem disposita. Radice nititur (uide an perenni) longa, neruosa et cãdida, folia, caules, et semina gustu glutinosum lentorem remittunt. Nascitur circa hortos, sepes, pagos & rudera.

De

Malva sylvestris supina. T. 1. 120. p. 369.

DE OLSENICHIO. CAP. XCVIII.

HERBA quam Germani Olsenichappellant, folia à radice profert in latitudinem explicita, media inter cicutæ & pastinacæ foliorum figura et magnitudine; e quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, non adeò crassus, angulis striatus et geniculatus. folia in geniculis singula ferens, inferioribus minora. umbellasestate in summis ramulis fert anetho similes, candido exiguoq; flore plenas, quos Anetho similia & duplicia semina sequuntur, minora tamen. Radice nititur perenni, foris subnigra, intus candida, ab uno capite minimi digiti crassitudine, in obliquas, tenues & do drante paulò breuiores partes distracta: quæ gustu feruida, tenuis & subamara existit, semen similes habet qualitates. Nascitur uliginosis, putridis palustribusq; locis, iuxta Alnorum truncos, nonnunq; etiam in eorum musco.

DE SANTONICO maiore, [quod serè magnitudine tantum à sequenti differt.] CAP. XCIX.

SANTONicum maius Absynthio cognatus & odoratus frutex est, caudicem habet pollicari crassitudine numerosas, cubitalesq; uirgas emittentem, tenera canaq; lanugine obductas, uncia longioribus, canis & Ericæ modo in breuissimas carnosasq; partes diuisis, & hyeme durantibus foliis undiq; uestitas. In summis uir-

gis flores lutei sunt, breuibus staminibus in paruum orbem dispositis farcti: semine habet tenue & furfuraceum, Radice nititur lignosa, in plurimas fibras distracta, Saporem folia, flores & semina leniter amarum tenuemque possident, odorem uero iucundum & aromaticum, Colitur apud nos in hortis, in Narbonensi uero Gallia sponte nasci fertur, si Dioscoridi & iis, qui nostra ætate ibidem genitam uiderunt, credimus.

DE SANTONICO minore, [Id est, Chamæcyparisso uulgaris.]

CAP. C.

SANTONICUM minus, quod à Plinio Chamæcyparissus uocatur, maiori in cunctis simile est: paulò tamen minoribus uirgis & foliis constat, remissioresque habet cum saporem tum odorem. Colitur similiter apud nos in hortis cypressi nomine, quamuis Cyparissus siue Cupressus procera sit arbor: à qua hoc nomen ad hunc odoratum fruticem translatum est, ob aliquam foliorum (quam cum arbore habet) similitudinem, Nascitur & hoc copiosissime in Narbonensi Gallia.

Santonicum minus, T. 1. 24. p. 77.



Hyacinthus sylvestris, T. 2. 79. p. 772.



DE HYACINTHO sylvestri. [Idem est, ni fallor, aut planè cognatus, Hyacinthus maior Tragi et Fuchsij, cuius iconem addimus: quamquam cœruleis floribus, cum Corâs suo purpureos tribuat.]

CAP. CI.

HYACINTHUS sylvestris, folia statim à radice profert dodrantalia, nonnunquã etiam longiora, latitudine ferè semunciali, recti uenia, canaliculata, & in teram incli-

inclinata: è quorum medio caulis assurgit, do drante (ut plurimum) procerior, sine foliis teres, uiridis, crassitudine culmi, & inferius rubentibus maculis conspersus: in cuius summo coma est purpureorum * & deorsum procumbentium florum * in cira ruleo. plena, singuli autem flores oblongi, teretes atq; ab ima parte latiores, concavi, præclusi q; sunt: sub ipsa coma alii flores sunt prædictis similes, sed latiores, pallidiores, & positi rariores: quibus singuli triquetri & exigui succedunt folliculi, neq; deorsum nutantes, neq; sursum erecti, sed cauli, pediculo breui ueluti inserti, & rectè eminentes: qui in maturitate tribus commissuris aperti, terna semina figura omnino rotunda, nigra, & substantia cartilaginea, ostendunt. Radicè habet perennem, bulbosam, mediocris iuglandis quantitate, tenui nigricanteq; membrana uestitam, intus candidam carnosissq; tunicis compositam: inferius tenuibus candidissq; capillamentis terræ inhaerentem. Tota herba lentum, glutinosum & aqueum saporem habet: semen uerò gustu subamarum & modicè acre est. Abrupti folliculi, caules teneri & folia lentum in trahendo sequacem & clarum humorem remittunt. Nascitur apricis tumulis mediocri solo.

* Verus est Hyacinthus medicorum. Nascitur autem Schenberge bey Herssteth: ubi propter floris colorem Breünling appellat.

DE LIMNOPEUCE: [fictum est nomen ab eo, quod in stagnis nascatur, folijs Tædæ seu Piceæ.] CAP. CIL.

LIMNOPEUCE singulares erigit caules, iunco multò crassiores, in tenuitatem desinentes: è quibus breui admodum interuallo folia exeunt Tædæ similia, breviora tamen, mollioraq;: quibus singula adnascuntur ceu grana milio minora. Radicibus nititur perennibus, transuersis, nigricantibus: plurimis capillamentis fibratis, & in limo hærentibus, quibus se propagat. Herba ipsa insipida est, & modicè styptica. Nascitur in lacubus & stagnis, inter Eislebium & Seburgum.

DE PHYLLITIDE lacustris. [Potamogetoni cognata est herba, folijs Phyllitidis, nascitur & in nostro Felium lacu, si bene memini.] CAP. CIIL.

PHYLLITIS lacustris, ex limo sub aqua uiticulam profert, longam, teretem, olorinæ pennæ crassitudine, foris Tiphæ modo asperam, hirsutam & fuscam: intus autem uiridem, & concavam, è qua raro interuallo alię oriuntur uiticulæ, iuncea gracilitatis, foris uirides & glabræ, intus autem concavae, quæ ubi supra aquam emerferint, folia ferunt Betæ aut Phyllitidi similia: minora tamen, colore in uiridi pallida. Tota herba gustu dstringit. Nascitur in lacubus, copiosissimaq; in lacu qui est inter Seburgum & Eislebium.

DE TESTICVLO bifolio. CAP. CIIIL.


TESTICVLUS bifolius, duo à terra profert folia, Lilio similia, latiora tamen: è quorū medio caulis assurgit cubitalis, tenuis et angulosus, minimis singulisq; foliis ex interuallo uestitus in summo caule ex foliorum alis candidi flores auiculæ uolantis figura, prodeunt: è quibus à tergo unciali longitudine exeunt caudæ tenues concavae q; in fundo melleum succum continentes, per caudas ueluti per uitrum transparentem. Radicibus nititur geminis maturæ oliuæ aut cære oblongisq; pruniferae magnitudine, iisdemq; oblongis & caudatis: supra quas aliæ tenuiores exeunt, Da mafonii radicibus æquales. Sapore pratensem Palmam imitatur. Nascitur pingui, herbosoq; solo raris arbutis obfesso.

PALMA montana Hyacintho similia è terra profert folia, paulò tamen maiora, è quorum medio caulis exit Bifolio testiculo similis, similiterq; foliolis uestitus, non tamen angulosus, sed teres. Flores etiam fert similes, numerosiores tamen & minores, colore purpureos. Radices habet geminas, pratenfi Palmæ similes, maiores tamen: quæ gustu reliquas Testiculorum species æmulantur. Nascitur in montibus pingui solo.

DE LILIAGINE. [Phalangium aut Phalangium in hanc aliqui putant: quòd hæc ferè apud nos effigie nascitur.] CAP. CVI.

LILAGO statim à radice folia profert Hyacintho similia, angustiora tamen, è quorum medio caulis assurgit cubitalis, aut aliquando maior, tenuis, teresq; superius uno atq; altero interuallo singula habens folia, prædictis multò minora. in summo caule et adnatis flores producit sex, oblongis uncialibusq; foliolis constâtes, è mediis floribus, luteis apicibus, stamina prominent, in summa Lilio † similes flores sunt, multò tamè minores, nec ita resupinatis partibus repãdi. Radicibus niti-
 † uel potius Asphodelo uero
 † ut etiam in Asphodelo.
 † Nos Asphodelum Germanicam uocamus, propter radicem & florum similitudinem, seminũq; formam & colorem conuenientem.

Phalangium



Alisma quorundam



DE DAMASONIO tenuifolio. [Id uidetur hæc quam exhibemus, aut proxima genere herba, syluis & montibus nostris non infrequens. Dux aut tres eius species, magnitudine colorisq; florum præcipue differunt. Sed flores in nostro non uidetur foliacei: quamobrem accuratius perpen. tendum fuerit.] CAP. CVII.

DAMASONIUM tenuifolium caulem habet dodrantalem aut pedalem, teretem acliniter striatum, per interualla acuminata, & liliacea folia proferentem: tenuiora tamen & uenis durioribus striata, ipsum caulem quæ ab eo exeunt amplectentia: super folia usq; ad caulis summitem, ueris exitu flores se proferunt candidi, foliacei, nullos apices habentes, quorum media pars ceu luteum labrum exerit. Semen * Radicibus nititur tenuibus, perennibus, forma & substantia syluestri Damasonio similibus. Saporem habet amarum, glutinosumq;. Nascitur editis & opacis locis, solo pingui.

* Helleborine Dodonei.

DE DAMASONIO Calliphyllo, [altera specie superioris.] CAP. CVIII.

DAMASONIUM calliphyllo, tenuifolio Damasonio floribus, semine, caule & radice simile est: caulis tamen paulò crassior est: folia uerò multò speciosiora habet, media inter syluestre Damasonium & Polygonatum figura, paulò tamen minora pulchrioraq;. Nascitur pingui nigroq; solo, Alabastrite aut Gypfarium saxum obtegente, plurimumq; iuxta Northusium, ad Hercyniam syluam.

T. I. 40 p. 118.

DE ANEMONE tenuifolia. CAP. CIX.



ANEMONE tenuifolia caulem erigit cubitalē, teretem, striatū, solidumq;, statim à terra ex interuallo folia proferentem, Nigellæ aut Chamæmelo æqualia, & in adnata se diuidentem: in quorum summitate singuli sunt flores minoris Helleborinæ aut Chamæmeli floris figura, quorum medium in purpura nigricat, reliqua pars uerò puniceo colore fulget: in medio flore incitum est capitulum pineo cono simile, paruis nigrisq; staminibus cinctum. decidentibus ueris exitu florum foliolis capitulum increfcit, donec sesquiunciale consequatur longitudinem, totumq; horreat aculeatis seminibus, obliquo ordine circumuolutis. Radice nititur minimo digito graciliore, fibrata, lignosa & semestri. fœtent aliquo modo triti flores & gustu ferè insipidi sunt, nisi tantillam possiderent amaritudinem. Nascitur pinguibus aruis in segete.

* Non est hæc Anemone, ut neq; sequens: sed Chamæmalum Eranthemum Dioscoridis: cuius semina ad frangendum calculum efficacissima sunt: Turingi uocant Teuffels auge / propter colorem florum, prunæ non absimilem, quasiq; ardentem. Acrimoniam nullam habet, quæ propria est Anemone.

DE ANEMONE tenuifolia altera, [colore tantum floris alio. Vide scripta cum præcedenti.] CAP. CX.

ANEMONE tenuifolia altera, iam descriptæ in cunctis similis est, præterq; quòd flores pallidos habet, in medio tamen similiter nigricantes. Nascitur iisdē, quibus prior locis, cui gustu etiam respondet.

DE CORALLOIDE, [cui nomen finxit à radice albo Corallio simili. Aliqui,
ni fallor, Saniculam albam uocant. alij temerè aconitis adnumerant, nos Iconem
à Ioanne Kentmano acceptam apposuimus.] CAP. CXI.

Coralloides.

Coralloidis alia species.



CORALLOides caulem emittit cubitalem, iuncæ gracilitatis, inferius nigricantem. folia propè terram habet sex aut septem, ab uno pediculo prodeuntia, aliquatenus Cannabi similia: in summo caule uerò multò minora paucioraq; in quorum alis parvæ uelutibacæ hærent, colore in purpura nigricantes, & in partes modicè incisæ: an aliud quocq; semen habeat uidendum. Radice nititur perenni, tras uersa, adnatis inæ quali, candida & dum eruitur splendenti, albo Corallio simili, unde nomen inuenit: quæ gustu acrem & subamarum habet saporem, ceu Raphani aut Rapi cortices. Nascitur umbrosis mōtibus, solo pingui faxa regenti: plurimāq; inter Stolbergum et Northusium ad Hercyniam syluam.

* Aliqui consolidam Sarracenicam nominant. Est autem Aconiti species, baccata sub folijs & non flore, quæ fert puniceum. Sapor radiceis est nasurtij.

DE ACONITO monococco. [Solani non Aconiti generibus adnumerari hæc herba debet: quoniam refrigerat, & acinos habet cæteris Solanis similiter.] CAP. CXII.

ACONitum seu Pardalianches monococcon, caulem erigit teretem, singularem & iudiuiduum, longitudine dodrantalem aut maiorem, in cuius summitate

tate folia sunt plerumq̃ quatuor, rarissimè autem plura, Parietariæ & Cyclaminis aut Hederæ figura, paulò tamen maiora, utrinq̃ in acumen fastigiata, sed anteriori parte obtusiora, æqualiter ab invicè distantia, & sibiipsis in uno centro iuncta. è medio foliorum brevis & gracilis oritur pediculus, similiter quatuor oblongis, parvis acuminatisq̃ foliolis circumdatus, è quorum intervallis alia quatuor multò minora tenuioraq̃ erumpunt, & ex illorum medio rursus octo prodeunt stamina, luteo polline conspersa, quæ paruum, purpureum, concavum, cubòq̃ obtusis angulis similem florem, eundemq̃ singularem circumdant, quatuor apices plerumq̃ eiusdem coloris habentem, ex quo paulatim rotunda nigraq̃ bacca gignitur. Radice nititur lōga, gracili, geniculata, foris subfusca, splendente, è geniculis laterales sub terra viticulas spargente, transversa & perenni: quæ gustu cum amaritudine adstringit, si mulq̃ insipida ingrataq̃ dulcedine & tenuitate nauseosa palatum afficit. Nascitur umbrosis locis, solo, ut plurimum, pingui.

* Germanice, Eynbeer.

Aconitum monococcum. T. 1. 102. p. 308.

Dracunculus primus. T. 2. 81. p. 777.



DE DRACUNCULO primo siue Polyphylo.

CAP. CXIII.

DRACVNeulus primus siue polyphyllus, quem recentiores Loph crispum ab incisilis foliis appellant, caulem erigit rectum, tripedalem, crassitudine digitali, teretem, glabrum leuèmq̃, versicoloribus maculis, maxime purpureis conspersum & varium, serpenti adeo similem, ut etiam cauto ex improviso oblatus serpens

h iij

esse credatur. folia habet dodrātia, acuto rumici similia, quina, sena aut septena, in uno pediculo simul coniuncta. in summo caule ueris medio inuolucrū foliaceū fert lōgitudine dodrātia, quo aperto pistillus pro dīt aro similis, multō tamē maior et post hūc oblongus racemus, primū uiridibus, in maturitate autē puniceis baccis fardus; in quibus crocati sunt duricq; nuclei. Radice nititur perēni, crassa, rotunda, bulbosa, candida, tenui cortice uestita, magnitudine mediocris mali, multis candidisq; capil lamentis fibrata, cui oculi ceu exigui bulbi adnascuntur, quibus in terra se propa gat. Tota herba Aro nostrati gustu & reliquis facultatibus respondet, paulō tamen efficacior existit. Colitur apud nos in hortis, in calidioribus uerō locis sponte um brosis locis, & iuxta scpes prouenit. In comparatione saporis cum Aro hoc sciendū est, quōd Aron in calidioribus regionibus minimē acris sit, apud nos uerō acerrī mum, & facultate Dracunculo proximum.

DE DRACUNCULO altero seu henicophyllo, [folijs Ari, maioribus, & maculis candidis conspersis. Matthiolus hunc Dracunculum maiorem uocat & pingit.] CAP. CXIII.

DRACUNCULUS alter seu henicophyllos, quem recentiores Loph planum appel lant, priori per omnia similimus est, pręterquam quod folia habeat minimē in partes secta, sed Aro similia, maiora tamen, & candidis maculis conspersa: quę ante hyemale solstitium illi apud nos rarō decidant. easdem habet quas prior facultates, nascitur iisdem natalibus, apud nos uerō in hortis colitur.

* Aron maculosum.

Dracunculus maior.

Hepatica alba.



HEPATICA alba coliculum emittit dodrantalem, indiuiduum, gracilem & angulosum, infra cuius medium unicum duntaxat est folium, longitudine fer   unciali, subrotundum, modic   turbinatum, & figura hederaceum, sine pediculo coliculum amplectens, & in sinum recedens: in summitate singularem fert florem, quinque candidis & subrotundis foliis constantem, in cuius medio turbinatum & c   dicans eminet capitulum, quinque oblongis candidisq   radiis circumuallatum:    quo rum interuallis tenuissimi prodeunt apices, luteum quiddam in apice ferentes. sub ipso flore quinque exigua sunt foliola, quibus flos antequam aperiretur, claudebatur, defluentibus autem floris foliis capitulum increfcit, donec parua auellanae magnitudinem assequatur. hoc in maturitate apertum, parua, oblonga & flaua, aut rubentia semina ostendit. Radice nititur admodum parua & nigricante, tenuissimis capillamentis fibrata. tota herba subamarum, leniter acrem & modic   adstringentem saporem habet. Nascitur macris & putridis pratis, qu   nunquam omnino exsiccantur.

* Gramen Parnasi quibusdam.

DE VERBASCO leptophyllo, [Ea uidetur quam Germani Gold  n  pfle uocant, Rheni accolae Schabenfraut, Mottenfraut, Tragus Blattaria facit.]

CAP. CXVI.

Verbasum leptophyllum. T. 2. 146. p. 925.



VERBASUM leptophyllum singularem erigit caulem, longitudine bicubitalem, teretem, intusq   fungosum, statim a terra usque ad medi   foliis uestitum, longitudine quadrantali, latitudine sesquiunciali, iuxta annexum angustis & leniter perambitum ferratis: h  c quo summitati propiora fuerint, eo breuiora euadunt. supra folia flores   state lutei, foliacei, in medio croceum quiddam habentes, cauli usque ad summitatem adnascuntur: quibus singuli succedunt ueluti globuli pisi quantitate, colore fusci, exiguo, fusco, anguloso, & papauere minori semine pleni. Radice nititur dodrante breuiori, in multas fibras distracta, candida, lignosa & semestri. Folia gustu subamara sunt, quemadmodum & flores: semen fer   insipidum est. Nascitur circa oppida & in lutosi aggeribus.

* Verbasum tenuifolium, forte Blattaria, Gold  n  pfle.

DE MENTHA corymbifera maiore, id est, M  ntha Sarracenica. [Aliqui Coflum bortensem, alij Mentham Grecam appellant. Minorem descripsit si pr  , cap. 72.] CAP. CXVII.



MENTHA corymbifera maior, quam uulgo Mentham Sarracenicam appellant, multos ab uno radicum cespite cau

les emittit longitudine bicubitales, angulosos & solidos. folia longis pediculis (antequam caules erumpant) numerosa ab radice erigit quinque unciarum longitudine, latitudine uero duarum cum dimidia in obtusum mucronem desinentia, utrinque ueluti impressis punctis quibusdam distincta, subtus modica tenuique lanugine pubescentia, & per ambitum ferrata. quæ uero in caulibus & ramulis sunt folia, inferioribus multo minora existunt, ac sine pediculis uirgas amplectuntur, & iuxta annexum utrinque profundius secta sunt. caules in plures ramos distrahuntur, qui & ipsi in summitate in numerosos tenuesque pediculos diuiduntur: in quorum cacumine æstate aurei coloris flores sunt, densis ueluti paleis facti, qui autumnino in fuscum acerosumque semen transeunt. Radicibus nititur minimo digito paulò gracilioribus, nigricantibus, lignosis atque perennibus, per terræ superficiem sparsis, multa lateraliter germina propagationis causa emittentibus; à quibus aliæ tenuiores radiculae substantia carnosæ, foris fuscae & hellebori fibris æquales in terram descendunt. flores & folia amarum, feruentem tenuemque saporem habent, ueluti si quis simul Mentham & Abrotonum gustet, odore etiam tam Abrotonum quam Mentham æmulatur, estque hic non sine gratia acerrimus. Colitur in hortis.

* Marien Münze.

Mentha corymbifera. T. 1. 53. p. 163.

Lingula uulneraria. T. 1. 106. p. 323.



DE LINGULA uulneraria. [Huic Euchsus Ophioglossi nomen finxit, aliqui Lanceam Christi uocant.] CAP. CXVIII.

LINGula uulneraria, singularem emittit colicolum, longitudine dodrantalem aut proceriorē, gracilem, glabrum & mollem: à quo triū aut quatuor unciarum à terra

à terra altitudine folium exit singulare, sine pediculo coliculus amplectens, trium ferè unciarum longitudine, latitudine uerò unam excedens, ac in mucronem non adeo acutum desinens, nulla spina nullisq; uenis distinctum. In summo coliculo insecto, aut uermiculo cuidam aliquid simile est, uncialem habens longitudinem, crebro utrinq; à lateribus incisum. Radicem habet exiguam admodum, tenuibus fibris capillatam. Neq; florem neq; semen fert. Saporem habet herba subdulcem, modicè tenuem & aliquantulum glutinosum. Radix paululum amarescit & subacris est. Nascitur montanis locis, plurimàq; Ambergi atq; Oeniponti.

DE PSYLLIO. CAP. CXIX.

T. 154. p. 167.



PSYLLIUM furculosa est herba, coliculo assurgit dodrantali aut pedali, solido, anguloso, hirsuto & geniculato. folia à geniculis utrinq; prodeunt oblonga, angusta & modicè hirta, longitudine bellis, latitudine uerò quintam unciae partem non excedentia. Rantuli è foliorum sinu enascuntur tenues, in quorum summitate & coliculi cacumine oblonga & paleacea sustentur capitula, quantitate nucis auellanae, minimis, pendulis, pallidis & tritici similibus flosculis circumdata, à paleaceis caliculis propendentes: quibus singulis bina succedunt duràq; semina, quae sibi inuicem coniunguntur, modicè canaliculata, quantitate & colore pulicum, (unde nomen inuenit) aqua maceratum lentam mucilaginem superficie tenuis remittens. intus uerò candida est, seminis substantia, capitula quoq; foliolis circumuallantur, praedictis minoribus. plerumq; recta assurgit psyllium: spargitur tamen nonnunq; etiam humi, à radicis capite emissis ramulis, acciditq; hoc frequenter cum rectus ille coliculus decerptus fuerit. Radice nititur oblonga, gracili, candida, lignosa & semestri: semen æstatis ferè exitu excidit, quo sparso recens enascitur herba usq; in autumnum uirens, principio cum prodit numerosa profert à radicis capite folia, humi procumbentia: quae enato caule exarescunt, saporem folia habent amarum, seminis uerò mucilago dulcis est; odorem, donec uiret, tota herba grauem spirat. Nascitur asperis, sabulosis densioreq; arena constantibus locis, secus agros, plurimùmq; Vuittembergæ, Sidæ, & Guterboci.

DE TANACETO. CAP. CXX.

TANACEUM primo uere numerosa folia ab uno radicis cespite emittit, non indiuidua, sed multis partibus composita, & filicis modo alata, siquidem à dodrantalibus purpureisq; (æstate) pediculis utrinq; exeunt foliola, longitudine ses-

quiuunciali, latitudine uerò semunciali, ab utraq; parte ex obliquo profundius incisa: quibus enatis caules assurgunt ab eodem cespite plures, longitudine sesquicubitarum frequenter excedentes, teretes, trientis aut beßis interuallo geniculati, minutissimè striati, colore in purpura nigricantes, & solidi, quos geniculatim singula uestiunt folia, prædictis similia, sed breuioribus pediculis insidentia. folia quæ circa terram sunt adultis caulibus exarescunt, ipsique caules in summitate in numerosos ramulos diuiduntur, quorum cacuminibus exigua orbiculataq; insident æstate capitula, latitudine tertiam uncie partem æquantia, breuib; paleaceis atq; aurei coloris flosculis dense compactis constantia, corymborum modo coaceruata erectaq; quæ tota æstatis exitu in cæsia & paleacea semina Santonico aut Absynthio similia conuertuntur. Radice nititur breui, crassitudine digitali, lignosa & perenni, plurimis cirris, & capillamentis fibrata. à qua etiam aliæ exeunt radiculæ, uiticulis similes et geniculatim sub terræ superficie, donec in Germen erumpant repentes. Saporem folia & semina habent amarum, tenue, subacrem & Seriphii semini omnino similem, odorem uerò acrem, grauem & cum eodem Seriphio certantem. semen tamen foliis multò acrius est tam gustu quàm odore. Nasçitur in aggeribus, & iuxta agrorum fossas, solo mediocri, subaspero aut arenoso, omnino autem pingui terra nunquam uidi prouenire.

Tanacetum. T. 1. 51. p. 158.



Daucus Selinoides. T. 1. 156 p. 466.



DE DAVCO Selinoide, [Apio simili folijs, acerrimo, ulcerante. (infra cap. 141. meminit latini folij Selinoidis Dauci.) Est autem hæc fortè Saxifraga minor, Pimpinellæ similis, cuius Iconem Tragus dedit huiusmodi.] CAP. CXXI.

DA Vcus Selinoides, folia à radicis capite emittit utrinque à pediculis exeuntia, Apio similia, paulò tamen oblongiora, nec ita splendida & glabra, sed aliquantulù rugosa, ambitu inciso, & per terrā sparsa: è quorum medio caulis assurgit cubitalis, gracilis, striatus & geniculatus, singulis folijs geniculatim uestitus, prioribus multò tenuius incisis, habet adnata & ramulos aliquot caulis, in quorum summitate parvæ sunt umbellæ, æstate candidis flosculis plenæ: quibus succedunt exigua, oblonga, & in fusco rubentia semina, singulisq; flosculis bina & sibi inuicem coniuncta. Radice nititur duorum plerumq; dodrantum longitudine, minimo digito paulò graciliore, terete, colore candida & perenni. Nascitur campestribus lutoisq; locis ac pratis. Radix gustu acris & feruida est, quæ si diutius (cum recens adhuc est) atrectetur, manûsq; ad os & nares ferantur, eas partes quibus admotæ sunt manus leniter exulcerat, idem efficit decoctæ uapor & halitus, insuper etiam capitis grauedinem, attractoria uii, quam efficacem habet, facit. odorem spirat similiter acrem, semen utraq; facultate radici respondet.

DE DAVCO Cyanopo. [Sic autem cognominat à cœruleo radicis liquore prædicto similem, sed minorem facit. Querendum an hæc sit Pimpinellæ (melius Saxifragæ) Tragi tertia & minima species.] CAP. CXXII.

DA Vcus Cyanopus folijs, caulibus, umbellis, earumq; colore seminibusq; Selinoidi similis est, præterquam quod caulis breuior & magis teres sit, & uix euidenter striis, sulcetur: lanugine etiam tam caulis quam folia tenui breuiq; uestiuntur. Radice nititur perenni, paulò minore quàm Selinoides daucus, foris nigra & aliquantulum tuberosa, intus autem candida, quæ præcisa, aut abrupta omnino cœruleum liquorem remittit. Sapore & odore daucum Selinoidem emulatur, sed paulò imbecillior existit. Nascitur asperis, arenosis, sabulosis & aliquantulum editis locis, congestisq; arena tumulis, & aggeribus, plurimusq; Vuittembergæ.

DE DAVCO coriophyllo, [cui folia ferè coriandri, radix oblonga, acerrima, &c.] CAP. CXXIII.

DA Vcus coriophyllus, folia circa radicis caput profert, partim coriandro, partimq; pastinacæ similia, per terram strata, à quorum medio caulis exit pedalis, aut nonnunq; cubitalis, gracilis, teres, solidus, geniculatus, subtilibus striis sulcatus, & in purpura (cum in consistentia est) rubens, umbellis, flosculis, eorumq; colore & semine, Dauco cyanopo similis existit. Radicem habet pedis, aut nonnunquam duorum dodrantum longitudine, Selinoide graciliorem, teretem, candidam & perennem. Sapore & odore exulcerante. acrimonia tota herba Selinoidi dauco respondet. nascitur ubiq; in cultis campis & secus uias, solo qualicunq;.

DE DAVCO coniophyllo, [id est, Cicutam folijs referente, &c.] CAP. CXXIIII.

DA Vcus coniophyllus caulem habet Dauco Selinoidi similem: folia uerò in brachiatis utrinque pediculis producit in latitudinem explicita, & cicutæ modo in tenues partes incisa. adnata caulis à geniculis emittit longa, in cacumine latiusculas umbellas candidis flosculis ferentia: quibus semina succedunt Selinoidi similia. Radice nititur candida, coriophyllo dauco æquali, aut nonnunquam maiori, & perenni, facultatibus Selinoidi respondet. Nascitur umbrosis, herbosis atq; editis locis, solo pingui.

DE POLYCHRESTO, Umbellifera herba, liquore radicis lacteo. Nomen unde indiderit Cordus, ex descriptione non uideo. Nam si nomen fingendum sit, à foliorum crebris incisuris, aut furculorum, qui umbellam constituunt diuisiombus, Polyetum fuerit dicendum, non polychrestum. j CAP. CXXV.

POLYchrestum foliosam à radicis capite emittit comam, undique per terram sparsam. ipsa autem folia non simplicia atq; indiuidua, sed multifida, omnium ferè umbelliferarum modo: siquidem pediculi tenues à radice exeunt, crebrò articulis intercepti, qui in singulis articulis in ternos furculos sapius & multis uicibus subdividuntur. ultimis, extremis minimisq; pediculis folia insidēt exigua, in multas tenues partes secta, & crebris incisuris partim coriandro, partim satiuo petroselino similia, cum fructificare inceperit arescentia. Caulem è media foliorum coma erigit unum atq; alterum, (aut nonnunq; plures secundum radicis ætatem) cubito plerumq; proceriores, teretem, modice striatum, longo intervallo geniculatū, intus fungosum, atq; per omnia Anetho similem, paulò tamen tenuiorem, folia è geniculis proferentem, inferioribus similia, sed multò pauciora minoraq;: in cuius summitate umbella expanditur lata, quinq; aut sex unciarum latitudine, quadrantalibus plerumq; furculis constans, candicantibus flosculis plena. siquidem singuli umbellæ furculi, in plures tenuiores furculos subdividuntur, minoris umbellæ speciem referentes. semina singulis floribus succedunt bina, coniunctaq; tanquam unū sint, anetho latiora crassioraq;, colore subfusca, sub ipsa umbella tenuia oblongaq; exeruntur ceu folia. Radice nititur † tricubitali, aut nonnunquam pro ætate longiore breuiorēue, superius crassitudine digitali, candida, carnosa et perenni, quæ præcisa, lacteum remittit liquorem. saporem radix habet Pastinacæ satiuæ similem, si mulq; amarum & subacrem. semen gustu radici responder. Lacteus uerò liquor ceteris partibus efficacior est: folia imbecilliora sunt: flores postremo medium tenent inter folia & radicem temperiem. Nascitur asperis, sabulosis, arenosis campis, tumulis & aruis, plurimumq; in Vuittembergenſi electoratu.

† Mirum
hoc cum
caulem di-
xerit uno
cubito dun-
taxat, ple-
rumq; pro-
ceriorem
esse.

* Fortè Vielgutha, id est, ualdè bona: etsi alia uidetur ualdè bona Italarum: & Toute bone, id est, Tota bona Gallorum.

DE HIRCIBARBA.

CAP. CXXVI.

HIRCIBarba, folia à radicis capite profert, dodrante plerumq; longiora, angusta, croco similia, paulò tamen latiora. nam semunciam ima sui parte aliquando attingunt, ad terram inclinata: è quorum medio caulis assurgit, in statu durus ex intervallo foliis, sine pediculo amplexus prædictis breuioribus, cui successiue per totum uerget ætatem ramuli adnascuntur breuioribus foliis amplexi. flores toto uere usq; post medium ætatis in summis ramulis profert, sibi inuicem succedentes, orbiculatos, luteos, staminibus dense stipatis constantes, oblongo calici insidentes, sub calice uerò caulis & ramuli in oblongam cavitatem & in summo latam desinūt, quod euidentius in primis floribus circa ueris medium apparet. flores in oblongos pappos resolvuntur, unà cum longo striato & fusco semine, inferius annexi in aurā abituri, semen intus candidum dulcemq; nucleum complectitur, atque dum adhuc cum pappis in calicibus continetur, quam hircinæ barbæ speciem præ se fert, unde nomen apud Græcos, Latinos & Germanos inuenit. Radice nititur oblonga, mini mi digiti crassitudine, candida, antequam fructificet carnosa & gustu suauis, postea uerò arescente. Saporem teneri coliculi antequam semen ferant admodum dulcem & suauem habent. abundat tota herba copioso & lacteo liquore. Nascitur in montibus, campis & pratis.

De

Hircibarba T. 194. p. 280.



DE PORTULACA agrestis, [à qua satiua cultu tantum differt. Pingitur à
Fuchsio.] CAP. CXXVII.

PORTULACA sponte nascens, statim à radice in plures crassos, pingues, carnosos, teneros, rubentes & undiq; per terram sparso diuiditur coliculos : qui & ipsi in numerosiores subdividuntur ramulos, totius autem herbæ in terra iacentis quantitas dodrantis aut pedis spacium occupat. folia habet numerosa, crassa, pingua nitidaq;, longitudine ferè uncialia, anteriore parte rotunda, pauloq; quam posteriore latiora, semunciam latitudine rarò excedentia, secus qua flores sunt exigui colore lutei, quibus succedūt oblongi, acuminati atq; hordeo equales & similes utriculi, per transversum commissuram habentes, à qua superior lolliculi pars recedit, nam pileoli modo auferri potest, saluo adhuc seminis receptaculo, quod & ipsum in transversa commissura aperitur, minima nigerrimaq; semina ostendens. Radice nititur oblonga, fibrata, carnosà, subrubente & semestri. Saporem coliculi & folia habent glutinosum & modicè acetosum. semen paruum respicit dulcedinem. Radix postremo iniucundo sapore ferè nauseam mouet. Nascitur in vineis tam pinguibus quam arenosis, nascitur etiam in arenosis sabulosisq; fossarum aggeribus, circa pagos & arua.

Portulaca fatua. T. 1. 125. p. 382.

PORTVLACA *fatua*, solo cultu ab agresti differt, hinc est quod in hortis facta, ob alimenti copiam maioribus & speciosioribus foliis exeat, atque propter saporis gratiam & succi bonitatem magis quam agrestis edendo sit.

DE GAROSMO, id est, uulvaria, [obsceno generi odore herba, unde nomen confixit Cordus. est autem Atriplicis agrestis minima species.] CAP. CXXIX.

GAROSMUM agrestis Atriplicis minima species est, coliculos per terram spargit iunceos, longitudine didrantes, aut nonnunquam pedales, in quibus oblonga sunt folia, uncia breviora, flosculos, racemulos producit paruos, & in his uix euidentes flosculos: quibus rotunda & papaueri æqualia semina iisdem racemulis contenta. Radice nititur tenui atque semestri. Tota herba uehementer foetet instar putridi halecum gari, eadem manibus tractata, foetore eas adeò inficit ut integrum diem oleant, sapore quoque garo non est dissimilis. Nascitur asperis locis circa macerias, sepes et itinera.

DE MENTASTRO.

CAP. CXXX.

MENTASTRUM caules erigit cubitales, quadrangulares & hirsutos, folia ex interuallo in contrariis lateribus, alterno ordine & cruciformi positu proferentia, longitudine besis, latitudine autem unciam quarta aut tertia parte excedentia, rugosa atque lanuginosa pube obducta. Ramulos supra medium plerumque caulis est foliorum sinu producit, uere & æstate numerosis undique floribus in candido rubentibus & hiantibus, denticulatis calicibus insidentibus, & positu quandam spicæ imaginem referentibus circumdati: quibus exiguum nigrumque semen succedit. Radice nititur multis capillamentis fibrata, laterales uiticulas propagationis causa in terra spargente & perenni. Saporem habet amarum, acrem & adstringentem, odorem uero grauem & acrem, *fatua* Mentha multò iniucundior. Nascitur secus gelidos riuulos, solo pingui, interimque saxoso, arenoso autem nunquam enatum uidi.

De

Mentastrium. T. 1. 5. p. 20.



DE SONCHO *Leui.* [*Sonchum* utrumq; aliter *Matthiolus*, aliter *Fuchsius* pingunt, cognatas tamē herbas. ad quas etiam *Lactuca sylvestris* Tragi pertinet. *Fuchsius asperum* Germanicē *Genßdistel*, *leuem* *Basenßdl* interpretatur. *Tragus asperi* *Sonchi* genera duo describit 1. 90. Iconibus omisits.] CAP. CXXXI.

LENIS aut levis *Sonchus* caulem erigit singularem, cubito plerumq; procerior, minimo digito paulō graciliorem, angulosum, glabrum, rubentem, tenerum & concavum, folia ex intervallo proferentem, longitudine dodrantali (aut maiora) latitudine uerō quadrantalia aut quincuncialia, mollia, tenera & utrinq; profundius usq; ad spinam in quaternas plerumq; partes secta. inter utrumq; latus anteriori parte singularis folii portio intercedit, rectāq; exporrigitur. Ramulos in summo caule ē foliorum sinu emittit paucos, in quorum summitate lutei orbiculatīq; flores toto uere & æstate usq; in autumnum se proferunt, latitudine unciali, capillamentis dense stipatis cōstantes, quæ in pappos resoluta, unācū paruo oblongo & in fusco rubente semine auolant. Radice nititur oblonga, candida, fibrata & leuissimi. abundat lacteo liquore tota herba. Saporem caules et folia habent amarum, aliqua aquea dulcedine mixtum. Semen dulce est, odore herba papauer æmulatur. Nascur sponte in hortis & fossis.

DE SONCHO aspero maiore. [Lege quæ ad præcedentis capitis Lemma annotauimus.] CAP. CXXXII.


SONchus asper maior, caule, ramulis, flore, semine & radice, lacteo liquore leni Soncho similis est, foliis tantum differt, quæ longitudine quincuncem interdum excedunt, latitudine uerò posteriori parte trientem æquant, antèrius uerò in mucronem fastigiantur. eadem sine pediculis caulem amplectuntur, nec in partes scissa sunt, sed per ambitum inæqualia, & breuibus, nec adeò duris aculeis horrida. Saporem amaritudinem lenem sonchum aliquantulum superat, nasciturq; iisdem locis.

DE SONCHO aspero minore. [Vide annotata cum capite 131.] CAP. CXXXIII.

SONchus asper minor, maiori per omnia ferè similis est, sed multò minore existit. Caulem enim producit pedalem, duos dodrantes raro longitudine excedentem, aliquantulum teretem, nec adeò tenerum, sed solidiorem foliis uestitum, triente breuioribus, per ambitum maioris modo spinulis horridum, Saporem habet amarum. Nascitur circa sepes, aspero & arenoso solo.

DE LACTUCA agrestis, quam hodie salso apud nos Endiuia uocant. CAP. CXXXIII.

T. 1. 89. p. 268.



LACTUCA agrestis Galeni tempore Grecis thridacine appellata, & quam hodie ubiq; in Germania à ueritate aberrantes, Intybum & Endiuia tam Medici quàm pharmacopole uocant, primo uere ab erumpente semine folia emittit oblonga, tenera, modicè per ambitum sinuosa: è quorum medio caulis exit singularis, sesquicubitalis aut interdum bicubitalis, teres, uiridis, glaber & solidus, statim à terra ferè usq; ad cacumen folia proferens, longitudine propemodum dodrantalia, latitudine bessem (ut plurimum) excedentia, utrinq; in profundos breuibusq; spinulis inæquales & ferratos sinus excauata, colore in uiridi cinerea, à tergo, id est, inferius, oblongis fragilibusq; aculeis horridum & spinosum dorsum habentia. anterior folii pars in mucronem desinit. At Brema in Saxonia ea folii portio non turbinè fastigiatur, sed in rotunditatem

ditatem exit, ramulos caulis supra sui medium producit numerosos, in quorum summitate copiosi, parui luteiq; flores capillamentis stipati, ueris exitu se proferunt, ob longis caliculis contenti, qui in pappos resoluti una cum olongo, & in fusco casio se mine auolant. Radice nititur semestri, oblonga, foris in consistencia fusca, intus autem candida, antequam caulem edat tenera, postea uerò lignosa. abundat tota herba copioso, lacteo & crasso liquore. saporem habet uehementer amarum & euidenter acrem, odore papauer imitatur. Nascitur incultis asperisq; locis, aggeribus, rudertibus, muris, & iuxta sepes.

DE SMYRNIO, seu Angelica uulgò dicta.

CAP. CXXXV.

T. 1146. p. 411.



cili polline ueluti conspersus, & concavus, geniculatim foliis ornatus, prædictis multò minoribus. habet ramulos & adnata aliquot caulis, in quorum summitate magnæ sunt umbellæ, quinque aut sex unciarum latitudine, forma conuexæ, candidibus flosculis plenæ, quibus bina succedunt semina, inuicem coniuncta, oblonga, angulosa, paleacea et in candido cinerea: oblongum, planum, foris nigrum, intus candicantem & cartilagineum nucleum paleaceo & anguloso cortice claudentia, umbellæ antequam enascantur, in posteriori foliorum parte instar utriculi tumida continentur, quæ intra ipsum utriculum auctè, rupto utriculo, erumpunt, quandam confercti racemi speciem referentes, donec in eam quam descripsimus formam ad-

SMYRNium, quod hodie ab omnibus ferè Europæ Medicis & Pharmacopolis Angelica nominatur, primo anno cum è semine prodierit, pediculos emittit cubitales, crassitudine digitales, teretes. teneri, glabri & in terrâ repandi, utrinque in binos, ternos, aut nonnunquam quaternos, minores pediculos ceu brachia diuisi & expansi, in quorum extremitate folia sunt figura Apii foliis similia, sed multò maiora, in ternas plerumque turbinatas partes antrosum spectantes secta, propius ad acris Cinereæ folia accedentia, interdum ad dodrantem tam longitudine quam latitudine accedentia, & tota hyeme uirentia: sequenti aut tertio anno caulis è medio foliorum asurgit, dum aut nonnunquam cubitorum altitudine, crassitudine pollicem plerumque superans, teres, geniculatus, glaber, in candido liuente & absterfu fa-

lescant. Radice nititur antequam caulis enascatur crassitudine plerumque manum complente, nonnunquam etiam crassiore, oblonga, in multas dodrantes aut pedales partes distracta, foris nigricante, intus candida, carnosa, molli, succosaque: quæ præcisâ flauum liquorem seu lachrymam, ab interiori corticis parte remittit, cui similis liquor etiam in foliorum uenis continetur, sed aquosior. Cum uero caulis maturus semine perit, ipsa quoque radix putrescit. eadem etiam quamuis tempestiue effoditur, ob excrementi humoris copiam facile ab innascentibus uermiculis perfunditur. Saporẽ radix semen & folia habent acrem, fauces scarificantem, subamarum, tenuẽ & aromaticum: odorem uero similiter acrem, uehementem, medicatum atque aromaticum similem. Efficacissimus omnium partium liquor est, mox semen, deinde radix: flores & folia postremum locum tenent. Nascitur umbrosis, humentibus, uliginosis, palustribus, petrosisque, tam editis, quam in planis locis, plurimumque in Pomeraniæ palustribus atque Noriuegiæ montibus. Interim etiam feritur Friburgi in Brisgoia, quæ Pomeranicam bonitate uincit, siccioribus locis enascens, ideoque non tam facile teredinem sentit, ut illa.

DE SOLANO nigro, uulgar.

CAP. CXXXVL

SOLANum nigrum cubitalis herba est, multis angulosis, inæqualibus et subscabra, in mucronem turbinata, per ambitum incisuris diuisa, & tactu mollia. Flores tota æstate, contra quam aliæ plantæ ex mediis foliorum internodiis profert paruos, in singulis pediculis ternos, quaternos, quinos aut senos, quinis exiguis oblongis, acuminatis & candidis foliolis, instar stellæ radiorum, dispositis constantes: in quorũ medio lutei minimique apices, in unum coniuncti eminent, floribus, singuli succedunt acini quantitate pisi, figura rotundi, substantia molles, primum uirides, in maturitate uero nigri, intus subuירidi, glutinososque succo atque paruis flauentibus compressisque seminibus pleni, ab uno pediculo, instar corymbi aut parui racemi dependentes, & in terram annuentes. Radice nititur oblonga, fibrata, candida, semestris atque inutili, saporem folia habent aqueum, simulque adstringentem. acini uero glutinosum & aliquantulum uinosum, odorem spirat grauem & foetidum. Nascitur ubique in urbium hortis, iuxta macerias, muros, rudera & sepes, tam cultis quam incultis locis, umbrosis natalibus, mirè frondium magnitudine & temeritate luxuriat, iisdemque frequentius & felicius prouenit.

* Vulgò Viciafraxad.

DE SOLANO puniceo, [altera species præcedentis, ita ut colore ferè solium differat.]

CAP. CXXXVII.

SOLANum puniceum, ramulis, foliis, floribus acinorum, figura & quantitate, radice, sapore, odore & natalibus nigro Solano simile est: differt tamen, quod paulò asperioribus constet ramulis, acinosque in croceo colore puniceos producat, quæ quæ ut nigri bæccæ ante maturitatem uirent.

DE XANTHIO.

CAP. CXXXVIII.

XANTHion caulem habet cubitalem, circa terram digiti crassitudine inæqualem, & aliquantulum angulosum, subuירidem, solidum & nigris in purpura maculis conspersum, longis, crassis et caulis similibus adnatis, statim à terra usque ad summam incondito ordine exeuntibus ramosum: in quibus folia sunt longis pediculis insidentia, longitudine trientem plerumque excedentia, posteriore sui parte triente raro angustiora, in mucronem fastigiata, per ambitum inæqualiter incisa, in summa triplici similia, à quorum sinu ueris medio atque exitu oblonga exeunt capitula, corni aut oliuæ nucleo similia & æqualia, in candido purpurascens, breui-

bus

bus stipatisq; ceu apicibus obsita, quæ flores eius sunt; eadem paulatim castanearum modo aculeis armatam duramq; superficiem acquirunt, binosq; intra se autumnò, cum maturuerint et induruerint, nucleos claudunt, colore candidos, nigricante tenuique membrana uelata. Radice nititur oblonga, multis capillamentis fibrata, candida & semestri. Saporem exterior fructuum pars acrem habet; nucleis uero dulcem & gratum. odore partim Solanum, partim Nasturtium herba æmulatur. Nasceitur iuxta urbes et pagos, planis humectibusq; locis, ubi hybernas aquas æstas exiccauit,

Xanthion T. 2. 101. p. 839.

Hippia minor. T. 1. 126. p. 385.



DE HIPPIA minore, [quam uulgò Morsum Gallinæ, eruditi pleriq; Alsinen uocant.] CAP. CXXXIX.

HIPPIA minor, egregie teneritudinis herba est, coliculos per terram spargit numerosos, pedales aut do drantales, admodum graciles, teretes, teneros, glabros, uirides & geniculatos, folia in singulis geniculis bina profert, uncia plerumq; multò breuiora, posteriori parte rotunda, anteriori uero modicè acuminata atque Anagallidi similia, molliora tamen. flosculi è foliorum sinu exeunt minimi, colore candidi, stellæ modo radiati: quos per exiguum subsequitur utriculus, pauca semina intra se continens, papaueri similia. Radiculis nititur semestribus, capilli modo tenuibus, euulsu tamen in runcando difficilibus, quantum uis gracilibus. Sapo-

rem tota herba aqueum & ferè inſipidum habet, aliquantulum tamen Betæ ſimilè, nitroſa ſucci qualitate. Gallinæ huius herbæ paſtu delectantur. Naſcitur cultis horarum arcis.

DE CALCATRIPPA candida.

CAP. CXL.

Calcatrippa candida. T. 1. 195. p. 659.



CALCATRIPPA candida, caule, ramulis, foliis, florum figura & ſemine, in arvis naſcenti ſimilis exiſtit. flores colore differunt, qui illis in candido eſt rubens. Colitur coronarum cauſa in hortis.

* Vulgò Ritterspoien, id eſt, Conſolidaregalin.
Vide ſuprà lib. 1. cap. 16.

DE DAVCOIDE maiore, [folijs hirsutis, &c.] CAP. CXLI.

DAVCOLDES maius folia habet per terrā ſtrata, apio aut Latifolio, id eſt, Selinoidi Dauco ſimilia, hirsuta & per terram ſtrata: e quorum medio caulis exit ſequicubitalis, aut aliquando maior, aliquantulum aſper & geniculatim foliis veſtitus, iis quæ inferius ſunt minoribus, in ſummo caule umbellæ ſuſtinentur æſtate in candido rubentibus floſculis plenæ: quibus ſingulis bina, ſubrotunda, craſſiuſcula & lapparum modo aſpera, & prætereuntium veſtibus adhærentia, ſemina ſuccedunt. Radice nititur oblonga, candida, tenuiſq, antequam caulem proferat, carnoſa, guſtūque cum acrimonia ſubamara, quæ maturo ſemine perit. Semen tritum odore cimices et Bupreſtides imitatur, guſtūq, admodum ingrato eſt. Naſcitur decliuibus, campeſtribus locis, inter fruteta.

DE DAVCOIDE minore. CAP. CXLI.


DAVCOLDES minus, caulem maiore tenuiorem producit, in ſummo adnata & ramulos proferentem. folia geniculatim exeunt, in latitudinem explicita, & in tenues partes ſecta, partim paſtinacæ ſylueſtri, partim cicutæ ſimilia, minora tantum & aliquantulum hirta. floſculos æſtate in parvis umbellis fert, in candido rubentes, quibus ſemina ſuccedunt in maturitate candicantia, Anifo ſimilia, ſed paulò minora, aſpera & lapparum inſtar prætereuntium veſtibus adhærentia. Radice nititur tenui, lignoſa & ſemestri, guſtu maiorem imitatur, non tamen adeo ingratum & aſperum ſaporem habet. Naſcitur frutetoſis locis, ſecus uias.

DE CONYZA sylvestris hirsuta, [Conyza Tragi, quam hic exhibemus, ut cum Cordi Conyzis cōferatur, uidetur conyza minor Matthioli. Videtur et illa species conyze, quæ quinq; aut plures ab una radice transversa caules producit, communi herbæ uulnerariæ nomine ab eo uocata.] CAP. CXLIII.

T. 1. 54. p. 166.



T. 1. 164. p. 488.



CONYZA sylvestris hirsuta caules emittit pedis aut duûm dodrantum altitudi-
 ne, rectos, graciles, solidos & subhirsutos, oblongis, hirsutis, mucronatisq; so-
 liis, besse interdum longioribus, uncia uerò paulò angustioribus. in summis cauli-
 bus capitula sunt singula & subtus aspera. in quibus æstate & ueris exitu flores lu-
 rei sunt, figura orbiculati, campestri conyze similes, longioribus tamen, per ambitû
 capillamentis stipati & radiati, quæ in pappos resoluta, unâ cum oblongo fuscoq;
 semine auolant. Radice nititur lignosa, fibrata, nigricante & perenni. Saporem flo-
 res habent amarum & acrem. folia gustu mitiora sunt, odorem spirat grauem, suba-
 crem, præsertim flores. Nascitur incultis, montanis & frutetosiss locis.

* Est Conyza montana, odorata.

DE CONYZA sylvestris, glabra.

CAP. CXLIIII.

CONYZA sylvestris glabra, caulibus, capitulis, floribus, semine & radice, hir-
 sutæ sylvestris similis est, caules tamen glabros, nec adeo aspera & hirsuta ca-
 k. iiii

pitula producit. folia habet longiora, paulò latioraq̃, superficie leui & glabra, per ambitum tamen tenuibus incisuris, aspera, sapore & odore hirsuta imbecillioribus constat. Nascitur montanis, herbosis & frutetosis locis.

DE CONYZA *Heleniide.*

CAP. CXLV.


CONYZA *Helenitis*, foliis, caulibus, flore & sapore *Helenio*, id est, *Inulæ* similis est: multò tamen minor. Primo anno, cum è semine prodierit, folia tantum profert longitudine trientalia, quadrantaliàue, latitudine uncialia, in mucronem acuminata, subius tenui lanugine hirsuta, & in terram refracta. altero deinde anno caulem profert plerumq̃ cubitalem, nonnunq̃ ab eadem radice plures, graciles, teretes, solidos, foliis iam dictis minoribus uestitos, interdum in adnata diuisos: in quorum summitate singula sunt capitula, à quibus lutea exeunt stamina, florem constituentia, longitudine plerumq̃ unciali, undiq̃ in orbem radiorum instar explicata: in quorum medio breuiora eiusdémq̃ coloris stamina sunt, densius stipata. quæ in pappos resoluta, unà cum oblongo fuscoq̃ semine auolant. In summa *Inulæ* speciem capitula, flores & semina referunt, nisi minora essent. Radice nititur ferè lignosa, fibrata, & † Saporem folia & flores amarum habent, atq̃ fauces scarificantē. Nascitur campestribus, lutosis locis, quos fluuiorum inundationes hyeme & uere operiunt,

† Vide an
perenni.

Conyza Helenitis. Eadem aut similima uideatur Matthioli conyza maior.



Chameclema. T. 2. 8. p. 797.



De

DE CHAMAECLEMATE, [quod nomen author confinxit, uulgus Hederam
terrestrem uocat.] CAP. CXLVI.

CHAMAECLEma, quam ubiq; in Germania falsò Hederam terrestrem, Germani uerò Gundelreben proprio nomine appellant, uiticulas per terram spargit numerosas, iunco graciliores, modicè angulosos, teneros, glabros & geniculatos, longitudinis incertæ, siquidem interdum & frequenter orgiam excedunt. folia à singulis geniculis binaprodeunt, longis pediculis insidentia, rotunda, per ambitum incisà, non tamen serrata. nam incisurarum interualla rotunda sunt, uenis cor rugata, superius uiridia, inferius autem pallidiora, & iuxta pediculum in sinum excavatà, latitudo iis est plerumq; unciarum duarum. flores secus folia fert oblongos, hiantes, chamædryos aut Galiopsios floribus similes, colore in purpura cœruleos, quibus exigua nigrâq; succedunt semina, ueluti Chamædryi. Radice nititur tenui, fibrata, quinetiam à singulis geniculis in terra radices demittit. saporem folia & flores subamarum & modicè acrem habent, odorem grauem, non tamen iniucundum spirat, uiret tota hyeme, coquitur cum carnibus. Nascitur iuxta macerías, sepes & incultis locis.

* Gundelreben.

DE PARTHENIO, [Matricaria uulgò dicta.]

CAP. CXLVII.

T. 1. 50. p. 156.



PARTHENium, quod hodie ubiq; per totam Europam Matricaria nominatur, folia circa terram numerosa fert, utriusque in partes longitudine unciales, latitudine uncia angustiores, crebrò ex oblique incisas diuisa, partim Coriandri, partim etiam Tanacetii foliis similia. è quorum medio caules plerumq; plures assurgunt, pede frequenter proceriores, graciles, angulosi, adnatis ramosi, & sub horum exortu singulis uestiti foliis, quibus eadem est inferioribus figura. flores in ramulorum summitatibus fert orbiculatos, latitudine semunciales, in medio luteis breuibûsq; staminibus dense stipatis, uittello simile capitulum constituentibus, quod utriusque breuibûs, exiguis, numerosis, candidisq; foliolis circûuallatur. media est lutea pars florum mutato colore in seminata = naceto similia permutatur. Radice nititur plurimis candidisq; capillamentis fibrata, atq; † perennî. Saporem tota herba amarû, & cum tenuitate acrem habet, odorem uerò acrem & ualde grauem, ueluti Tanacetum, sed acriorem, cui gustu etiam respondet. Nascitur in antiquis urbium muris, iisque aliquantulum humentibus, & petris quibusdam urbibus uicinis, plurimùmq; Marpurgi in Hestia, Freiburgi & Rochlicii in Misnia, pluribûsq; aliis regionibus: iis uero locis quibus sponte nò prouenit, in hortis colitur, arenosis minime sponte exit.

† Vide iis
Trago.

T. 2. 103. p. 841.



glabra & nitida est, inferior uerò & aquis contigua, subhirsuta, eminentibus uenis distincta, & adhærentibus diuersi generis animalculis mucosa & sordida existit. Flores æstate sub foliis circa clauam fert paruos, candidos & aqua submersos: quibus singuli succedunt fructus, lōgitudine et latitudine unciam excedentes, angulosi, quatuor oblongis, duris, ad pungēdum paratis, et modicè reflexis aculeis armati, atq; inisdē aculeis, ceu cornibus taurini capitis formā exprimentes, & lignoso infragiliq; cortice candidum nucleum complectentes: cum recens est, mollem & lacteo succo, si exprimatur, manantem, gustu dulcem, & ad insipidum saporem simul uergentem. qui cum aruerit, omni carens succo tam aqueo quā oleoso, durus euadit, atq; substantia ad frumentaceorum seminum naturam accedit, adeo ut etiam panis ex eo pinxi queat. Cum fructus deciderint, ipsa claua eorum nigricantibus uestigiis inequalis redditur. Radices, supra fructum etiam matura & iam flaccescente herba adhuc in limo hærentem, habet numerosas, fibratas & nigricantes: quarum maxima plerumq; pars, non ē limo, sed ē circumfusa aqua nutrimentum trahit. pauca siquidem ex his limo insident, nisi casualiquo eo operiantur, ipsa quoq; capillamenta spicis similia radicum uicem supplēt, superioribus partibus alimentum suggerendo. Caules & folia manifestam adstringendi uim habent, uerum caules multo foliis efficaciores. Nascitur stagnantibus fluuiorum partibus, lutosis lacubus et urbium

bium fossis, quibus omnibus limosus sit fundus. Plurimus Vuittembergæ & Torgæ, ex Albi fluuio emissis lacubus, atq; Lipsiæ in stagnantibus Elistri partibus, lutosissq; lacubus.

* Vulgo Wassernuß, uel Stachelnuß.

DE CICUTA maiore.

CAP. CXLIX.

T. 159. p. 474.



CICUTA maior folia circa terram primo anno habet, in anguloso, brachiato et in binos minores pediculos aliquoties diuisis pediculis crebrò in tenues partes incisa, & in latitudinem explicita: è quorum medio sequenti uere caulis assurgit procerus, duum, trium aut nonnunq; quatuor cubitorum altitudine, & digiti uel pollicis crassitudine, glabrum, teretè, geniculatum, liuidis, fuscis atque subrubentibus maculis conspersum, intus fistulæ modo concauum, folia geniculatim inferioribus similia proferentem, superius adnatis pluribus ramosum: in quorum summitate umbellæ sunt modicè conuexæ, candicantibus æstate flosculis plenæ: quibus semina succedunt Aniso similia & æqualia, in maturitate tamen candidiora, atque in binas partes dilabentia. Radice nititur dodrantali aut pedali, crassitudine digitali, tereti, candida, antequam caulem proferat carnosæ, cum uerò fructificauerit lignosa fit, peritq;. Saporem radix Gallicæ Pastinacæ non dissimilem habet sed crasso uenosoque halitu uitalia tentantem, semina gustu iniucunda sunt quemadmodum & folia, quæ etiam grauem admodum, foetidum atq; horribilem odorem spirant. Nascitur umbrosis pinguibusq; locis, circa fossas, sepes, & templorum umbra septentrionem uersus.

DE CICUTA minore, [Tragus scribit hoc uitium Petroselinum esse, & aliquo modo ad cicutam pertinere. Germani uocant Gleyß/Glyssen.]

CAP. CL.

CICUTA minor caulem erigit pedalem aut cubitalem, gracilem, geniculatū, teretem & nitidum, foliis geniculatim uestitum, maiori Cicutæ similibus, sed uehementer nitidis & splendidis umbellas, flores & semina maiori similia profert. Radice nititur tenui, candida ac semestri: odore, sapore, & facultatibus maiorem æmulatur. Nascitur cultis hortorum areis, plerumque inter satium petroselinum decerpentes fallens. nam pro Petroselino, aut unā cum illo relectum cibisq; inspersum uescientium mentes graui periculo turbat; ideoq; cautos esse hortulanos oportet, atque noxiam hanc herbam splendore à Petroselino distinguere, alioquin foliorum incisuris & forma illi non dissimilem.

DE PNEVMONANTE, id est, Lungenblume. [Gentianæ minoris speciem esse apparet,
qualem hic exhibeo, aut simillimam.] CAP. CL.



PNEVMONAN-
thes caulem qui
hufdam in locis pro
ducit fingularem &
indiuuū, quibuf-
dam uerò in binos
fibi contrarios et al-
terno politu exeun-
tes ramulos diui-
fum, gracilem, foli-
dum, in uiridi pur-
purâq; nigrantē,
folia fub ramulis
proferentem fefqui-
uncialia, femuncia
latiora, coloreq; ni-
gricantia: quæ ue-
rò in fummis fur-
culis funt prædictis
magnitudine cedūt;
flores æftate in fur-
culorum cacumine
fert, Modelgeræ fi-
miles, fed maiores. fi
fingularis fit caulis,
unum atq; alterum,
in ramento uerò mul-
tos, erectos, conca-
uos, oblongos, infe-
rius anguftos, fupē-
rius latiusculos, pro-

fundius in quinas plerumq; partes fectos, intus hirsutos, colore in purpura cœrule-
os, quinis, ut plurimum, intus oblongum uiridemq; apicem fupantibus. flaccescen-
te flore apex paulatim in uncialem utriculum excrefcit papaueracco femine plenū.
Radice nititur tenui, lignofa, fefestri atq; inutili. Flores amarum tenuemq; fapōrē
habent, folia uerò his multò imbecilliorum. Nafcitur campeftribus uliginofisq; lo-
cis. nafcitur etiam excelforum montium, fyluis carentium, opacis atq; meridiano
fole non illuftratis partibus, plurimumq; lenæ in Hausbergo.


* Dodonæus Violam calathianam uocat, propter floris figuram. Videtur ad Gentianæ fpecies pertinere. eſt
enim radix lutea & amara gultu.

DE COLCHICO nigro, [cuius radix ficcata, foris nigrat.]

CAP. CLII.

COLCHICI (quod hodie Hermodactylum uocant) tres funt fpecies. primū
enim cum ficcatum fuerit, foris nigrum, intusq; fufcum in candido colorem
habet. Alterum in flauo fubrubentem, tertium uerò candidum. Ex his nigrum, pau-
lò ante autumnale æquinoctium florere incipit, ufq; requo fuperueniens gelu, fub
ipfis pruinis fuperbientes flores opprimat. Coliculum itaq; autumnò edit quincun-
cialem, nonnunq; etiam dodrantalem, gracilem, glabrum, candicantem atq; egregie
teneria

T. 76. p. 759.



teneritudinis, in cuius summitate flos est Lilio non dissimilis, sed minimè repandis & re flexis deorsum foliis. sex ut plurimum foliis longitudine sesquiunciam aut bellem æquã tibus. latitudine uerò uncia paulò angustioribus, utrinq; acuminatis, glabris, nitidis, pinguibus, in attritu glutinolis, primū clau lis & conuolutis postea se explicantibus constans, colore in subrubente purpura alba bicans, in medio luteo colore stamina, numero ipsa floris folia non excedentia continens, qui postquam unum atque alterum diem durauerint flaccescunt. deinde paulopost sequentis ueris initium folia profert longi tudine dodrantali, latitudine uerò uncie aut sesquiuncie, acuminata, crassa, Liliaceis forma & substantiæ lentore similia, sed longiora, sub terra coeuntia, & teretem, tenerum candicantemq; pediculum constituentia: in quorū medio prope terram utriculus extuberat acuminatus, triquetrus, longitudine sesquiunciam plerumq; accedens, latitudine uerò unciam ut plurimum æquans, rotundus, milioq; maiori, primū candido, æstate deinde post solstitium maturescens & ad rufum in nigro colorem transeunte semine plenus, quo sparso folia flaccescunt. Inueniuntur nonnunquam duo aut tres utriculi simul coniuncti & ab una radice prodeuntes, cum eadem radix totidem flores produxerit, sed unus tantum ex his magnitudinem præstat, alii ueluti abortiui sunt. Radice nititur longitudine sesquiunciali, modicè in planū compressa, latitudine unciam plerūq; quarta eius parte excedente, superius turbinata, inferius autem latiuscula parte ueluti in paruum unguem desinente, & candidas fibras in terram demittente, & paruis bulbis circa latera enatis se propagante: foris multis in ruffo nigris tunicis uestita: ex quorum numero eius ætatem cognoscere potes. singulis enim annis singulas superinduit tunicas, quibus detrahit reliqua radice pars carnosæ, totaq; candida & lacteo succe plena est, eadem ab una parte rimā ueluti sulcum habet, per quā floris coliculus transiit, hunc enim non è superiori & acuminata parte maioris radiceis autumnopromit, sed ab inferiori flaccescens unguis & latiore, contra reliquorum bulboforum morem. ea uerò radix à cuius mucrone flos & folia emittuntur, sulco caret, usq; in autumnum, donec subnascens paruula alia emissio flore priorem sulcet. Hinc est quod radices, quibus uere & æstatis principio folia insident, canaliculatum istum sulcum non habeant. Folia cum exaruerint, uestigium quoddam turbini impressum relinquunt. Eadem radix quæ priore anno germinauit, sequenti anno flaccescit, autumnoprocudit alia admodum parua, inferius adnascens, à cuius superiori parte autumnoflos prodit. nam hic minime à maiore exit, minor hæc radix unā cum flore adolescit, in uere autem & æstate sequenti simul cum semine ad iustam magnitudinem peruenit, quo tempore prior omnino perit. Siccata radix tam foris quàm intus fusca fit. Saporem radicis habet dulcem simulq; amarum, tenuem, saluam prouocantem, & aliquantulum nau-

stat, alii ueluti abortiui sunt. Radice nititur longitudine sesquiunciali, modicè in planū compressa, latitudine unciam plerūq; quarta eius parte excedente, superius turbinata, inferius autem latiuscula parte ueluti in paruum unguem desinente, & candidas fibras in terram demittente, & paruis bulbis circa latera enatis se propagante: foris multis in ruffo nigris tunicis uestita: ex quorum numero eius ætatem cognoscere potes. singulis enim annis singulas superinduit tunicas, quibus detrahit reliqua radice pars carnosæ, totaq; candida & lacteo succe plena est, eadem ab una parte rimā ueluti sulcum habet, per quā floris coliculus transiit, hunc enim non è superiori & acuminata parte maioris radiceis autumnopromit, sed ab inferiori flaccescens unguis & latiore, contra reliquorum bulboforum morem. ea uerò radix à cuius mucrone flos & folia emittuntur, sulco caret, usq; in autumnum, donec subnascens paruula alia emissio flore priorem sulcet. Hinc est quod radices, quibus uere & æstatis principio folia insident, canaliculatum istum sulcum non habeant. Folia cum exaruerint, uestigium quoddam turbini impressum relinquunt. Eadem radix quæ priore anno germinauit, sequenti anno flaccescit, autumnoprocudit alia admodum parua, inferius adnascens, à cuius superiori parte autumnoflos prodit. nam hic minime à maiore exit, minor hæc radix unā cum flore adolescit, in uere autem & æstate sequenti simul cum semine ad iustam magnitudinem peruenit, quo tempore prior omnino perit. Siccata radix tam foris quàm intus fusca fit. Saporem radicis habet dulcem simulq; amarum, tenuem, saluam prouocantem, & aliquantulum nau-

seosum. Odorem uerò omnes herbae huius partes, grauem & nauseabundum spirant. Nascitur in pratis tam planis quàm montanis solo pingui, plurimumq; in Vuirtembergensi Sueuia, ubi autumnò omnium ferè montium decliua, campi & prata his floribus albicant.

DE COLCHICO *subrubente*, [quod à colore radice siccatæ ita cognominat.]

CAP. CLIII.

COLCHicum subrubens, nigro in omnibus notis & proprietatibus assimilatur, præterquam quòd siccata eius radix, quamuis excorticata, rubescat. Sapore quoq; & odorem nigro similem habet, nasciturq; eiusdem naturæ natalibus: rarissimè tamen iuxta se simul nascuntur.

DE COLCHICO albo, [cuius radix etiam siccata albicat, tum foris, tum magis intus.] CAP. CLIIII.

COLCHicum album flore, foliis, semine & radice prædictis simile est, qualitate tantum ab illis differt. siquidem radix etiam cum siccata fuerit foris albicat, quanquam interdum flauescat cum inueterascit, intus uerò candidissima, tenera, in tundendo mitis, mollis & tractabilis existit: quæ tusa farinam triticeam aspectu refert. Saporem habet dulcem & ualdè suauem, nulla amaritudine mixtum. Sponte in Germania nascentem nondum uidi, sed cultam tantum & è longinquis allatam locis.

DE CROCO.

CAP. CLV.


T. 2. 77 p. 763.



CROCVS autumnò initio, cum Sol in libram ingressus est germinat. primum folia multa protrudit oblonga, ualdè angusta, acuminata et uenosa, prope terram atq; in ipsa terra coniuncta fasciculorum aut scoparum instar, ac membrana tenui inuoluta. e quorum medio coliculus erumpit quincuncialis, gracilis, tener, glaber & nitidus, in cuius summo flos est sex foliis, besis longitudine, uncia paulò angustioribus utrinq; acuminatis, & inferius ubi coniunguntur omnino purpureis constans, intus sex staminibus ornat. ex his tria, breuia, angusta, colore lutea, positu erecta & superficie pulueracea sunt, reliqua tria longitudine ipsa floris folia paulò excedunt, cum etiam ex clauso conuolutoq; flore iam iam ex terra prodeunte, exertis capitibus proficiant: eadem inferius angusta, superius uerò latiuscula existunt et subtilissimis crenis, nonnullorum oculos subterfugientibus. incisa color is est in ruffo puniceus. ea collecta, aroma celebre constituunt, ab omnibus crocum aut crocus appellatum, gustu amariuscule, subacre & aromatum simile, odore iucundo, acri, late spirante, oculos aliquantulum mordicante, lachrymas profundere cogente, & modice cum suauitate non ingrata caput aggrauante, somnumq; conciliante. eius tam triti quàm integri parua portio magnam aquæ aut uini quantitatem, luteo aut citrino colore, & ad puni-

ad puniceum inclinante, tingit. Flores unum atq; alterum tantum diem, postquam aperti fuerint, durant, in summa Colchico similitum florem habet, præterquam quod croci floris color magis ad purpuram uergit, & quod Colchicum tria illa longa, punicea q; stamina, quæ crocum sunt, minimè habeat. Floret etiam cum Colchico aut paulò post, cum ultimis Colchici floribus. Folia quæ cum flore Crocus protulit, hyeme non flaccescunt, sed sub ipsa niue uirent, proximoq; uere incrementum capiunt, donec æstate ad iustum statum perueniant: in quo longitudinem habent pedalem, latitudine autem quartam uncie partem non excedunt, eadem substantia uenosa, id est, recti uenia sunt, & ab una parte angustis admodum canaliculis striata, ab altera uero sulcum habent minimè profundum, modicè candicantem, & per eorum medium usq; ad mucronem transeuntem. Radice nititur rotunda, bulbosa, cum floret autem in latitudinem uncialem aut maiorem compressa, multis tenuibus, capillis fereq; reticulatis tunicis uictorialis modo inuoluta. detractis tunicis tam foris quam intus candida carnosâ succosaq; in superficie multis circulis cincta: à quibus ipsæ tunice initium sumunt: autumno cum floret singulari, sequenti autem uere & æstate duplici atq; altera, alteri superius insidente. Cum enim ueris initio folia increscunt, superior radice pars, à qua folia exeunt increscit, donec æstate parentem sub se retentam quantitate æquet: hac itaq; uigentem, solidam succosamq; constitutionem nacta, ipsa parens languida et flaccida redditur, atq; autumno tota euanescit. Propagatur se bulbosis oculis, ipsi radici adnatis: fibras ab inferiori parte in terra agit tenues candidasq; nutrimentum attrahentes. Saporem radicis habet dulcem, aliquantulum nauseosum & tenuem, ideoq; saluam modicè elicientem. Colitur apud nos in agris.

T. 1. 150. p. 935.

DE GLYCYRRHIZA.
CAP. CLVI.

GLYCYRRHIZA, ab uno radice capite caules altheæ uirgis similes emittit, secundum radice gratem plures, duum aut trium cubitorum altitudine, iuxta terram minimi fere digiti crassitudine, teretes, solidos, lignosos, in uiridi suffluuos, intus fungosa medulla plenos, atq; inferius tactu asperos, ex interuallo inæquali ordine folia proferentes: è quorum sinu ramuli enascuntur singuli. folia inferius maiora q; superius habet, a latam figuram referentia, nã dodrantalibus pediculis utrinq; quina, sena, et nonnunquã septena parti fere interstitio distantia adnascuntur, ea ratione, ut bina semper in uno exortu coniungantur, atq; breuibus admodum pediculis ex aduerso opponantur, in summitate surculi, à

quo omnia folia exeunt: unum rectâ prominet inter utrumque ordinem, parem foliorum numerum unitate imparem commutans, singula sesquiunciale aut bescis longitudinem habent, latitudinē uncia minorem aut uncialem, quamuis sæpius etiam multo maiora fiant. eadem subcrassa & aliquantulum pingua sunt glutinosamque & splendentem habent pinguedinem, utrinque superficiei insident: ideoque tacta digitis contumaciter adherent. est præterea iis peculiaris quædam natura quam cum paucissimis communem habent. Oriente sole singula folia in latitudinem primum æqualiter explicantur, mox unâ cum ascendente sole eriguntur & ipsa, atque interdum omnino sursum rigent atque unâ cum pediculo cymbicam, aut nauium carinam formam referunt: occidente uerò eodem sidere, rursum se dimittunt, nocturneque intus demissa dependent, donec rursum ascendente sole eleuentur. quinetiam aeris constitutionibus reguntur. nam si dies sereni fuerint interdum eo modo quo dictum est erecta sunt, pluuiosis uerò, nubilis, tristibus & frigidioribus diebus etiam æstate atque ipso meridie se deorsum submittunt. atque hæc de foliis tantum intelligenda sunt et non simul de eorum pediculis: horum enim positus, neque solis cursu, neque coeli constitutione mutatur. è summis caulium alis oblonga quædam, dissecta & uelut aculeata prodeunt capitula, (quæ Dioscorides pilulis Platani comparat, fructus improprie appellando,) ea se paulatim in quadrantalem & nonnunquam quicuncialem pediculum extendunt, undique usque ad summam paruis, oblongis, papilionaceis & colore in candido cœruleoque purpurascensibus floribus circumdatum, atque eorum positu comam hyacinthi florum referentem. flores omnes ferè caduci sunt, paucissimis exceptis: è quibus uncialis, gracilis, subrubens atque in latitudinem compressa prodit silicula, tribus aut quatuor oblongis feminibus grauida. diu hæc herba uiuet antequam folia amittat, quæ postea, ubi foliorum defluuii tempus aduenierit, non sigillatim sed uniuersa simul unâ cum pediculo decidunt, cui etiam postquam deciderit adhuc adherent. Radice nititur superius trunco simili, quò uetustior fuerit eò crassiore, plerumque crassitudine pollicari, inferius in multas longissimas radices undique in obliquum exeuntes distracta, quæ arenosum solum aut arenam tantum nactæ, duarum orgiarum longitudinem excedunt. substantia eis est neruosa, flexilis, distractu difficilis: ideo cum inter effodiendum extrahuntur raro abruptuntur, maxime solo arenoso. colorem habent foris in spadiceo aut subruffo pallentem, intus uerò buxum. Superior radice pars à qua iam dictæ exeunt, & quæ uelut truncus seu caput earum est, peculiare & à prioribus diuersas emittit radices, minimi digiti crassitudine, omnino transuersas, asparagis similes, sub terre superficie quoque uersus serpentes, quæ cum cubitale, bicubitale & interdum longius spacium progressæ fuerint, acuminato germine è terra emicant, cauleque producunt, qui sequenti anno deorsum obliquas demittunt radices, quales antea descripsimus, flaccescentibus postea, & pereuntibus, à quibus ortæ sunt, transuersis radicibus, quibus in uere in candido pallidus est color, substantia autem tenera, succosa fragilisque ab æstate, deinde usque in autumnum superficies earum in fungosum corticem mutatur, interior uerò pars, obliquarum radicum modo in neruosam, minus tamen firmam aut lentam, & colore buxeam substantiam transit. Saporem radices habent ualde dulcem, modice adstringentem & subacre, cui etiam iuncta est minima quædam amaritudo, qualis leguminibus inest. nam hæc quoque planta æquæ ad siliquiferum genus referenda est, quam ipsa legumina, quapropter minime absurdum uidebitur, quòd unam ei ex leguminum qualitatibus tribuimus, quam fortasse non quicuis gustu percipere & diuindicare queat. Colitur in Germania lucricausa, præsertim Bambergi in Franconia, ubi maximus eius est prouentus.

* Læferise/ Süßholz.

DE VETONICA CAP. CLVII

VETONICA à radice capite folia emittit plura, longitudine quadrantalia, posteriore sui parte bessem latitudine attingentia, nonnunquam etiā maiora, in obtusum

obtusum mucronem atque subrotundum desinentia, per ambitum incisa: (partes autem incisurarum eminentes, non acutæ, sed obtusæ sunt.) crebris & tortuosis uenis in rugas contracta, trientalibus aut longioribus hirtisq; pediculis, sinu eorum immissis annexa, partim humi prostrata, partim erecta, partim obliquo posito erigentium se speciem referentia: e quorū medio caulis assurgit erectus, cubitalis, quadrangularis, indiuiduus & hirsutus, uno atq; altero interuallo bina folia e contrariis duobus lateribus proferens, in exortu breuibus sibi inuicem pediculis aduersa, & iis quæ prope terram sunt multo minora. in summo caule oblonga & spicata coma est æstatis initio, Galio pl non dissimilibus, atq; in ruffo modicè purpurascens floribus plena: quibus quaterna plerumq; succedunt paruaq; & colore nigra semina. Radice nititur perenni, minimo digito graciliori, breui, fusca, in multas tenues nigricantesq; fibras distracta. Saporem folia & flores amariuscule & subacrem habent, à quibus radices quoque gustu non multum differunt. Nascitur in pratis, frutetosis & herbosis locis, solo ferè qualicunq;.

Vetonica. T. 1. 65. p. 196.

Elleborus albus. T. 1. 136. p. 409.



DE ELLEBORO albo. CAP. CLVIII.

ELLEBORUS albus cū primū prodiit, conuolutis foliis, enascentis Polygoni formam imitatur, caulem paulatim producit, quem ē conuolutis foliis ex-

m

plicat, longitudine plerumq; pedalem, minimo digito multò graciliorem, foliis ex intervallo singulis uestitum, longitudine quadrantem plerumq; excedentibus, latitudine uerò bessem cum semuncia æquantibus, utrinq; in obtusum mucronem desinentibus, incuruis liris ab uno mucrone ad alterū transeuntibus, tam superius quàm inferius fulcatis, tactu rigidis, atque sine pediculo, caulem, ceu tibiali usq; ad proximum folium demisso amplexantibus, hinc est quòd arefcens caulis, cortices, ceutunicas (ut Dioscorides scribit) demittat. Flores

*

Radice nititur longitudine bessem excedente, superius unciam latitudine frequenter superante, inferius autem in turbinem seu mucronem, coniformiter desinente, foris fusca, intus uerò candida, è qua circumquaq; aliæ exeunt radiculae quinque, sex aut septem unciarum longitudine, quinta aut quarta uncia parte rarò latiores, teretes, paucis capillamentis fibratae, & tam foris quàm intus candidæ, intus gracilem neruū, per totam earum longitudinem transeuntē habentes: quibus sapor est primum modicè glutinosus, mox acris, & pyretri modo saluam ciens. Semen præter acrimoniam etiam amariusculum est. Tritæ radices grauem atque aliquantulum foetidum odorem habent. Nasctur in montibus frutetosis, solo plerumq; pingui, plurimumq; in Vuirtembergensis Sueuiæ finibus circa Aurachum, atq; uicinis montibus.

DE VETONICA alba, [solo colore diuersa à præcedente.] CAP. CLIX.

VETONICA alba genere à rubea non differt, habet tamen suam propriam & ab illa solo colore diuersam speciem, folia siquidē, caules, spicatum florum comam, semen acradices rubæ Vetonicæ similinē sunt, flores habet candidos, quorum colore ab illo dignoscitur. Qualitates rubenti easdem possidet, nasciturq; iisdem natalibus, inuentu tamen rarior est.

DE VESICARIO SOLANO. CAP. CLX.

HALICACABUS, siue Vesicaria caules emittit uiticulis non dissimiles, longitudine cubitales & plerumque maiores, aliquantulum angulosos, geniculatos, subhirsutos, plerumque in diuiduos, & ad terram inclinos. Folia è singulis geniculis bina profert, Solano similia, maiora tamen & oblongiora, nonnunquam sex unciarum longitudine, latitudine uerò quinque unciarum, longis pediculis insidentia, maximè umbrosis locis. Flores secus folia singulos habet tota æstate quinque semuncialibus, & in candido pallidis foliolis constantes, quinquepartito caliculo insidentes, ac in medio exiguum capitulum continentes, dilabentibus florum foliolis, caliculus rotundam cauitatem adipiscitur, intra prædictum illud exiguum capitulum claudens. cum quo paulatim increfcit, donec æstatis exitu atque autumni initio, ipse inflati folliculi aut Vesicæ speciem referat, & sesquiunciale latitudinem consequatur, quo tempore etiam capitulum folliculo inclusum Cerasi acinum rotunditate, & magnitudine æquat, qui unā cum folliculo principio uiuent, in maturitate uerò medium habent inter croceum & puniceum colorem, acini intus candidis, planis, exquisitè seminibus, & uinoso succo pleni sunt: folliculi uerò ubi turbinem desinunt foramen habent, quod ambiunt quinque acuminati ueluti apices. radicibus nititur longis, tenuibus ueluti uiticulis, partim rectè descendentibus, partim intransuersum propagationis causa reptantibus, candidis, ex intervallo paucis tenuibusq; fibris capillatis, gustuq; amaris. acini in uescis contenti, uinosum, amarum & tenue, id est, penetrantem saporem habent, quorum tantum usus inualuit.

Nascitur

Nascitur editis uineis, quâuis etiam planis & humentibus locis iuxta sepes enatum lenæ uiderim: ubi maxima eius est in uinetis copia, solum amat pingue & densum, iis uerò locis quibus sponte non prouenit, in hortis colitur.

Vesicarium Solanum. T. 1. 101. p. 102.

Cnicus Supinus. T. 2. 114. p. 862.



DE CNICO *Supino.* CAP. CLXI.

CNICVS *supinus*, qui hodie per totam Germaniam *Carduibendicti* nominis cognoscitur, caules aliquot ab una radice profert pedales, & aliquando cubitales, rubentes, hirsutos, intus fungosos & modicè concauos, cum locum & spacium nacti fuerint per terram se spargentes. folia prope terram ac circa caulem habet quinque, sex, aut septem, unciarum longitudine, latitudine uerò besis, hirsuta, modicè pingua, mollia, per ambitum sinuosa, inæqualiter dissecta, & teneris aculeis non adeo pungentibus armata. Ramuli à caulibus exeunt plures, foliis inferioribus multo minoribus uestiti, in quorum summitate, acanacea sunt capitula, foliis paruis & maxime hirsutis circumdata, longitudine unciam excedentia, crassitudine digitalia, superius turbinata, squamis acuminatis composita: è quarum mucronibus graciles uncialesq; oriuntur aculei, utrinq; minoribus transversisq; aculeis aucti, ob teneritudinem inter pungendum fragiles, atque capitulorum mucronem circumuallantes. Flores è capitulorum mucrone per medium aculeorum emittit Cni-

ci & reliquorum carduorū modo capillatos, colore in croceo flauos. Semina habet oblonga, striata, teretia, colore cœsia: quibus superius pappi barbe similes sunt. Radice nititur semestri, lōga, gracili, primum carnosā, autumnī uerō initio lignosa trāfueris fibris brachiata & inutīli, tota herba, tenera, pingui & tactu aliquantulum glutinosa lanugine uestitur, maximē ea pars quæ inter capitula & his circumdata folia est. Folia, flores & semina amarum saporem habent, nullius alterius qualitatis, quæ quidem gustu percipi & distinguī possit participem. Seritur apud nos in hortis.

* Cardobenedictin.

DE FABA uulgarī. CAP. CLXII.

T. 2. 14. p. 618.



FABA uulgaris sata, terram non egreditur ut Lupinus, caulem erigit singularem, indiuiduū, longitudine sesquicubitali, & nonnunquam crassitudine minimi digiti proceriori, quadrangularem, glabrū, intus concauum, erectum, & capreolis carentē. Folia ex interuallo habet bina, terna, aut quaterna in uno pediculo, oblonga, plerumq; subrotunda, subpinguia & glabra, longitudine trientalia aut interdum quadrātalīa, latitudine uerō bessem equantia, aut nōnunquam excedentia, secus quæ numerosi exeunt flores, non tamen omnes simul, sed successiue florentes, forma papilionacei & oblongi, colore cādidi, quadam tamen sui parte nigri & longitudine uncia plerumq; superantes: ex his primū florēt inferiores deinde superiores, siliquæ ē floribus singulæ prodeunt cum ad iustam magnitudinem peruenierint, lōgitudine quadrantales crassæ & carnosæ, intus quina, sena, septena aut octona semina claudentes, quæ unā cum siliquis siccata longitudine sunt semuncialia, latitudine uerō paulō minora, aliquantulum cōpressa, & ab una parte uelut sima aspectu, foris in candido pallescente cortice, intus autem flaua, solida atq; arida carne constantia. Radice nititur oblonga, subfusca, fibrata & semestri. Saporē recentes fabæ habent dulcem, siccata uerō modice etiam amarum dulcedini mixtum. Colitur in aruis.

DE FABA nigra minore, [quæ à uulgarī Fabā solo colore differt.]

CAP. CLXIII.

FABA nigra minor, caule, foliis, floribus, siliquis, semine, atq; omnium partium magnitudine uulgarī similis est, solo seminum colore differt, qui illis in nigro purpureus est. Saporem fabæ uulgarī similē habet, sed paulō dulciorem. Seritur in hortis.

DE FABA nigra maiore, [quæ magnitudine solum à precedenti differt.]

CAP. CLXIII.

FABA nigra maior, minori incunctis similis est, omnes tamen partes maiores produ-

producit, semina eius, quæ fabæ appellantur interdum uncialem non tantum consequuntur, uerum etiam excedunt longitudinem, latitudine uerò tertia parte minoræ existunt. eodem quàm prædictæ fabæ magis planæ & compressæ sunt, colorem (ut parua) in nigro purpureum habent: quibus etiam sapore respondent, coluntur in hortis.

DE SYMPHYTO maiore, candidis floribus: Cuius descriptio duobus etiam sequentibus
Symphytis, excepto florum colore, conuenit.] CAP. CLXV.

T. 1. 79. p. 240.



SYMPHYTON maius, caules emittit plerumque sesquicubitales, et bicubitales, nonnunquam etiam longiores, in ramulos adnata & alas diuisos, crassos, angulosos, hirsutos, intus sonchi modò concavos, circa quos ex intervallo singula sunt folia, longitudine dodrantalia, latitudine bessem æquantia, utrinque in mucronem desinentia, hirsuta, longis pediculis adhærentia, atque per omnia maiori & longioris Buglosso similia, quæ autem in ramulis superius sunt, multo minora existunt. ea uerò quæ à radice unicum caulibus prodeunt prædictis multo maiora sunt, siquidem non raro sedecim uncias, frequenter etiam uiginti, atque interdum bipedem longitudine consequuntur, (preter pediculum, qui & ipse dodrantem excedit.) latitudine uerò sæpe sex aut septem uncias excedunt. Flores in ramulorum cacumine fert numero

fos, successiue per totam æstatem, à medio uere florentes. longitudine unciales, angustos, concavos, apices intus habentes, ab hirsutis & quinquepartitis calicibus prominentes, et in terram plerumque antuentes, colore in cædido modicè pallescentes. quibus singula bina, terna, aut quaterna semina succedunt grano tritici minora, acuminata, foris nigro nitidoque cortice, intus candido nucleo constantia, magnitudine & figura, Borraginis semini similia, æque enim collo tenus resecti serpentini capitis formam præferunt ac Echios, Borraginis, atque reliquarum Buglossarum semina. Radicibus nititur perennibus longitudine pedem excedentibus, crassitudine digitalibus, ab uno trunco in diuersas partes distractis, foris nigris intus candidis, carnosiss, teneris, inter effodiendum fragilibus minimeque nervosis. gustu & tactu glutinoso lentore mollibus & dulcibus, quæ siccata taurini ferè glutinis duris

ciem acquirunt. Horrēt caules, ramuli & folia aspera & teneris aculeis simili lanugine tactu pruritus excitante, eadem partes dulcem habent saporem & aliquantulum lentum succum ueluti Borrugo, atque reliquę Buglosæ species. Nascitur humentibus, pinguibus lutosisq; locis, pinguibus & humentibus fossis, atq; putri arenosoq; solo, ut Vuittembergē, ubi omnium natalium eius qualitatem cernere licet.

DE SYMPHYTO maiore rubente, [quod à præcedente florum colore tantum differt.] CAP. CLXVI.

SYMPHYTON maius rubens, prædicto candido, caulibus, foliis, florum figura, semine, radicibus, partium magnitudine & qualitatibus omnibus simile est, solo florum colore differt, quem rubeum habet, nasciturq; iisdem natalibus.

DE SYMPHYTO maiore [purpureis floribus, nec aliter à prædictis differente.] CAP. CLXVII.

SYMPHYTON maius purpureum, per omnia simile est prædictis duobus, præterquam quod flores purpureos habeat. Nos autem libenter has tres Symphyti species ab inuicem distinximus, et separatim descripsimus, unicuiq; suum proprium caput tribuentes: quoniam ista coloris in floribus uarietas non ex diuersorum natalium natura oritur, cum omnes illæ tres species non raro iisdem natalibus exeant, & quamuis aliò in diuersæ qualitatis solum transferantur, suum tamen colorem quælibet earum retinet, quemadmodum pleræq; eiusmodi herbæ.

DE CNICO satiuo. CAP. CLXVIII.

T. 2. 105. p. 845.




CNICUS satiuus, qui ab omnibus hodie Carthamus appellatur, ab uno semine singularem emittit caulem, longitudine sesquicubitalem, aut nonnunquam maiorem, teretem, rectum, colore caesium, solidum, durum, lignosum, ac superius in multos rectos, indiuiduos dodrantes, longioresue ramulos diuisum, circa quem singula sunt folia, non magnis interuallis distantia, longitudine fere trientalia, latitudine unciam excedentia, posteriore sui parte in obtusum, mucronem desinentia, anteriore uero, in oblongum acumen, præfixo breui & infirmo aculeo fastigiata, colore uiridia, glabra, per ambitum plerumq; minimis, innocentibusq; aculeis horridula, & sine pediculis à caule exeuntia, quę autem ramulos uestiunt folia, his similia sunt, sed minora. Capitula, ramulorū summitatibus singula insident, figura rotunda, & acanacea, in latum turbinē fastigiata, latitudine uncialia, oblongis, acuminatis & aculeatis squamis composita, undique paruis acuminatisq; foliis, partim in obliquū erectis, partim, recta in transversum acuminatam cuspidem prætendētib; partim etiam demissis circumuallata, ex his maiora sunt sub capitulis orta ac demissa, minora uerò subrecta, quę superiorem locum tenent, & Rusci foliorū quantitatem & figuram habent. Flores æstate è capitulorū mucrone erumpūt graciles, capillacei, numero si &

si & dense stipati colore lutei aut citrini, puniceis croci staminibus, id est, croco ar-
mati similes: quibus collectis fullones luteo colore lanas tingunt, ipsum crocum æ-
mulantes. inferior florum pars, capitulis inclusa, in paruos resoluitur pappos. sub
quibus sunt semina angulosa, modicè acuminata, candida, nitida atq; hordeo ferè si-
milis, paulò tamen maiora, foris duro lignosoq; cortice, intus candido pinguiq; nu-
cleo, gustu dulci, subtenui & aliquantulum nauseoso constantia. flores saporem a-
mariuscule & modicè tenuem habent. Radice nititur, semestri oblonga, gracili,
fibrata & inutili. seritur in aruis ac hortis, plurimusq; Brunsvici & Magdeburgi in
Saxonia, multisq; Turingiæ locis.

DE AMARANTO purpureo. [Nostris vocant Rose Bôble, alij Tausent-
schon.] CAP. CLXIX.

T. 1. 199. p. 179.



est adhibenda. Seritur coronarum causa in hortis.

DE APIO fatiua. [Sic nominat Apium vulgò dictum, non Petroselinum uul-
gare ut pleriq; cruditi hodie.] CAP. CLXX.

APIVM fatium dodrantes, pedales, & nonnunquam longiores pediculos
ab uno radicis cespite emittit, eosque angulosos, teneros, concauos & undi-
m iiii



que per terram sparsos : quibus utrinque tria
na aut quaterna adnascuntur folia , spaciis
disiuncta, eo ordine disposita , ut bina se con
trariis pediculis in exortu cōtingāt. in extre
mo pediculo unum rectā prominet, parem
numerum in imparē commutans. color iis
est superius uiridis in nigro splendidusq̃,
inferius autem pallidus. quodlibet eorum
duabus profundis incisuris in tres ambitu
ferratas partes unipediculo insidentes, diuis
sum est , (præsertim posteriora et extremū)
quarum media, utrinque adnatas magnitudi
ne uincit, cūm besis plerumque longitudinē
æquet ac interdum excedat, latitudine uerō
bellem attingat. Caules ē pediculorum, (qui
bus folia adhærent) medio erigit, secundum
radicum magnitudinem et ætatem, singula
res, duos, tres, aut plures, sesquicubitales,
angulis striatos, concauos & adnatis ramo
sis, circa quem folia sunt prædictis similia,
sed multo minora. umbellas ex intervallo
paruas & numerosas fert, ramulis adnatas,
æstate primum candidis minimisque floscu
lis, mox ualde paruis, angulosis, duplicibus
cartilagineisque seminibus plenas. porro quā
uis umbellæ ramulis adnatæ sint, tamen ex
ipsis umbellis etiam ramuli non raro exeūt
suas proprias umbellas habentes. Radice ni
titur superius digiti interdum crassitudine,
inferius in plurimas, candidas, fibratas & ca
pillatas partes distracta. Semen gustu ser
uidum, tenue, amariuscule, & aromatum

modo odoratum est. Folia subamara quidem existunt, sed seruire & tenuitate se
minibus cedunt, radices easdem serē qualitates habent, quas semen et folia, odore ta
men & aromatico seruire, à semine superantur. Colitur in hortis.

DE APIO *agrestis*, [à quo *superius cultu duntaxat differt.*]

CAP. CLXXI.

AGRESTE Apium neque forma neque specie neque qualitatibus à satiuo differt,
præterquam quod non colatur. nascitur humentibus sosis & circa pigros
riuiolos solo pingui, Halæ, Seburgi, Merseburgi & uicinis locis.

DE EVPATORIO, [id est, *Agrimonia uulgo dicta.*] CAP. CLXXII.

EVPATORIVM quod hodie Agrimonia ab omnibus ferē, tam Medicis
quàm Pharmacopolis appellatur, ab una radice singularem plerumque erigit
caulem, longitudine cubitalem aut aliquando proceriorem, teretem, hirsutum sub
rubentem, solidum lignosum, fractu contumacem, & nonnunquam in unum atque
alterum ramulos diuisum. Folia iuxta terram habet septuncialibus pilosisque pedi
culis

Eupatorium. T. 1. 175. p. 514.



culis breui admodum intervallo adnascentia, utrinque bina, sena, septenarius longitudine ut plurimum sextantali, latitudine autem unciali, hirsuta, per ambitum serrata, singulis pentaphylli foliis similia, una cum pediculis per terram strata & circumfusa, in extremis pediculis unum folium recta prominens, inter utrumque foliorum ordinem intercedens. Flores æstate, cauli à media eius parte usque ad summam, deinceps adnascuntur parui, foliacei, colore lutei: quibus singulae succedunt lappulae, cum ad iustam magnitudinem & statum pervenerint, pronae & in terram annuentes, adeo asperae hirsutaeque ut siccatæ prætereuntium vestibus adhaereant. Radice nititur lignosa, in partes distracta, fibrata, in fusco rubente atque perenni. odorem tota herba bonum & Vetonicae non dissimilem habet. Saporem uero modice acrem, tenuem & aliquantulum adstringentem. Nascentur siccioribus campis, montibusque prope fruteta.

DE EUPATORIO altero, [cognato superioris, sed raro inuentum.] CAP.
CLXXIII.

EUPATORIUM alterum, ab uno radicis capite, duos aut tres emittit caules, longitudine cubitales, teretes, conca-

uos et tamen satis duros, prædicto Eupatorio pilosiores, in russo nigricantes, rectos, minimè ramosos, sed indiuiduos, circa quos ex intervallo folia sunt quina septenarius, longo, gracili hirsutoque pediculo in summitate insidentia, non deinceps disposita, & ab inuicem distantia, sed uno eodemque loco ueluti centro simul coniuncta. prædicti Eupatorii foliis omnino similia, longioribus tamen pilis obsita, positu ac forma ad Cannabis folia, aut potius ad Quinquefolii accedentia. Flores in summis caulibus, ueris medio numerosos fert, priori Eupatorio forma & colore similes, corymborum modo coaceruatos: sub quibus parua sunt foliola, prædictis multò minora. Semen floribus succedit *

Radice nititur lignosa, in tenues partes distracta, nigra, perenni & gustu uehementer adstringente. herba uero glutinosum & subdulcem habet odorem. Nascentur circa fruteta solo mediocri, ut prope Lipsiam, qua itur uersus Halam, & in Ceiciano agro. inuentur rara est hæc herba, non enim temerè nec ubique nascitur.

DE FILICE mascula, [quæ plures ab una radice pediculos emittit. quæ mihi quidem non mas, sed scemina filix uidetur, ex Theophrasti & Dioscoridis uerbis. etsi plerique hodie (Tragum excipio) marem eundem faciunt, quem hic Cordus errore ueluti per manus tradito.] CAP.
CLXXIII.

FILIX mascula, ab uno cespite secundum radicis ætatem numerosos gracilesque

T. 1. 187. p. 445.



emittit pediculos, longitudine cubitales aut proceriores, utrinque oblonga, acuminata, incisa folia proferentes, breui intervallo disiuncta, sibiipsis ferè contigua, & in latitudinem explicata, ita ut tota foliorum pennata & diffusa facies, una cum pediculis auium alas pennasque figura æmuletur. omnibus foliis non est eadem magnitudo, inferiora enim minora sunt, quemadmodum etiam superiora: nam alata illa foliorum series, paulatim in fastigium desinit, quæ uerò à mediis pediculis aut paulo inferius exeunt, quadrantalem habent aut maiorem longitudinem, latitudinem autem posteriore sui parte, qua immediati sine ullo pediculo pediculis annectuntur, uncialem aut digitalem, à qua paulatim in fastigium acuminantur. uariant tamè magnitudinem, secundum radicum ætatem, uetustiori cespiti & in statu existente, enata folia à tergo flauam,

subrubentem, breuem, densam, in puncta latiuscula diuisam, & ueluti asperam lanuginem habent. Radice nititur longa, tenuibus capillamentis denseque fæctis cirris uillofa, secundum ætatem magna, & in plures partes seu capita diuisa, perenni, multis oblongis, hirsutis, nigricantibus & sursum crectis ceu squamis, quæ priorum foliorum præteritis annis exaruerunt reliquæ sunt, composita colore, intus in candido uiridi, gustu adstringente. Folia paulò minus quàm radices adstringunt, & grauem odorem spirant. Nascitur montanis, saxosis & umbrosis locis, copiosaque etiam in planis uliginosisque locis, iuxta aquas ac profluentes Alnorum, reliquarumque arborum truncis & radicibus adnascens: raro unus tantum aut pauci eius cespites iisdem natalibus proueniunt, sed plures: quamuis neque caulem, neque flores, neque semen ferat, propagat se tamen disperso uentis, hirsuto flauoque puluere, foliis à tergo adhærente, ceu reliquæ omnes eius mox secutura species.

DE PTERIDIO masculino, [id est, Filice exiguo mascula, uel potius semina, ut supra. Cognata huic uel eadem potius est Filicula palustribus pratis circa lacum silium nostrum frequens.] CAP. CLXXV.

PTERIDION masculum, Filici masculæ iam descriptæ, per omnia similis est, cōcinniores tamen incisuras habet, multoque minor existit, raro enim bessem & draconem

drantem excedit, folia eius decerpta & confricata manibus obstreperunt, neque caulē, neque florem, neque semen fert. Saporem habet masculæ filici similem, sed tenuiorem, odorem uerò grauiusculum. Nascitur montanis, muscosis roscidisq; collibus, arbustorum umbra à folis æstu protectis, solo plerumq; pingui, copiosumq; circa Northusium, in Hercyniæ iugis.

DE PTERIADIO, [quod apud nos etiam prouenire puto in muris, sed rarius: frequens autem Bada in colle iuxta Limagum, mox infra thermas: ubi et Dryopteris nascitur: quæ cum ne quis confundat cauendum. Pteridion quidem hac forma dici non probo: neq; enim talis forma diminuendi recepta est. Sed à Pteris rectè fit Pteridium, ab hoc Pteridarium, quod Pteridio minus est.] CAP. CLXXVI.

PTERIADion, masculo Pteridio undiquaq; simile est, sed plerumq; paulò minus: coliculos habet nigricantes & aliquantulum splendentes, foliorum incisuræ mediam habent inter Pteridii & Adianti candidi folia, formam & figuram, gustu quoque utrumq; imitatur. Nascitur umbrosis, muscosis, roscidisq; petris, nec caulem, nec flores, nec semina ferens.

DE TRICHOMANE.

CAP. CLXXVII.

Trichomanes. T. 1. 182. p. 530.

TRICHOManes, ab uno cespite plures emittit coliculos, quinque, sex, septem aut octo unciarum longitudine, setarum modo graciles, aridos, in purpura nigro & pulchro splendore nitentes, quibus ab utraq; parte tenuia, parua, orbiculata, minutissime per ambitum incisa, & lentibus latitudine æqualia, adnascuntur foliola, breui admodum intervallo, deinceps usque ad coliculorum summitatem disposita, sibi inuicem in exortu aduersa, sine pediculis adhærentia, interiore sui parte uiridia & glabra, exteriori uerò flauo, subrufo hirsutoq; puluisculo punctatim disperso, filicis instar, ceu conserpta. quæ tota hyeme uirent, nec decidunt antequam in uere noua flaccescentibus succedant. Radicibus nititur tenuissimis, numerosis, capillatis, circosis, nigris, implicitis, intricatis & perennibus, cuius superiores partes, ex qua germen exit, gustatæ subacerbæ sunt, folia quoq; non parum adstringunt, & sensibilem habent gustu partium tenuitatem. Nascitur copiose umbrosis roscidisq; petris, quamuis neque caulem, neque florem, neque semen producat, propagat se tamen foliis à tergo inhaerente puluisculo, quemadmodum omnes filicis species, quod semel atq; iterum dixisse satis sit, Magnus eius est in Hercynia prouentus.

* Duae eiconas, lector, hic, cum separare non possemus, necessariò adiunximus: quarum prior ad hoc caput propriè pertinet, altera uerò ad CLXXVIII spectat: ubi idem facere cogemur.



DE PTERIDIO *scæmina*: [quæ fortè *Dryopteris* quorundam fuerit, cuius *Tragus* picturam dedit hanc.] CAP. CLXXVIII.

† sic uo=
cat mono=
elonon, id
est, uno pe=
tiolo surgē
tem : quæ
potius mas
est.

PTERIDION *scæmina*, *Thelypteridi*, id est, *scæminæ filici* † *coliculi foliorumq;* figura secundum proportionem omnino similis est: sed multò minor, ac tenerior. siquidem dodrantalem altitudinem rarissimè excedit. insidet foliis à tergo hirsutis, subruffus & in puncta dispersus puluisculus, quo se propagat. nam hæc quoque aliarum filicum modo flore & semine caret, pro caule coliculos proferens, decetpta folia & manibus confricata, maiorem edunt strepitum quàm masculum *Pteridium*. Radicibus nititur perennibus, tenuibus, capillatis, cirrosis, nigris, implicitis & à crassiusculo principio, foris nigro, intus herbaceo enascentibus. Saporem habet tota herba acerbum & adstringentem, cum sensibili partium tenuitate. Odorem aliquantulum grauem spirat, ceu mascula *Filix*, Nascitur umbrosis montanisq; syluis, pingui plerumq; & muscoso in superficie solo: plurimùmq; in *Helsia*, & ad *Hercyniam* non longè à *Northusio*.

* In annotationibus suis in *Dioscoridem Cordus: Dryopteris* (inquit) *Thelypteridi similis*, multò minor nascitur in uetustarum quercuum muscosis partibus. Germani *Eychsaren/ Baumfaren/ Erdtsaren/ Windfaren* appellant.

Pteridion scæmina. T. 1. 184. p. 538.



Struthiopteris. T. 1. 188. p. 550.



DE STRUTHIOPTERI, [quam sic nominat auctor, quod a spectu et crispo foliorum habitu Struthiocameli pennas imitetur. Ea fortè est Lonchitis altera, quam ut Tragus exhibuit, Asplenii sylvestris nomine, etsi non accuratè pictum, adiunxit.] CAP. CLXXXIX.

INVENTA est præterito anno, cùm in Saxonia essem, in Hercynia sylva prope Goslariam filicis quædam insignis species, figura admodum spectabilis, hætenus à nullo auctore descripta, neque uulgo, neque Medicis cognita, cui Struthiopteridis nomen indidi, quoniam a spectu ac crispo foliorum habitu struthionis siue struthiocameli pennas imitatur. Est itaque Struthiopteris filicis species, pediculis assurgens, pede longioribus, satis crassis, interiore sui parte canaliculatis, colore in flauo rufis, paulatim usque ad cacumen attenuatis: quibus ferè totis ab utraque canalis parte usque ad summitem, deinceps brevissimo intervallo adnascuntur foliola: quorum maxima sunt, quæ à mediis pediculis exeunt, longitudine sesquiunciam æquantia, latitudine uero uix rarò quintam unciam partem excedentia, colore in flauo rubentia & subfusca, ab interiori parte canali proxima glabra: à tergo uerò, in ruffo, subfusco pulvere hirsuta, tenui, flauo & utrinque conspicuo neruo, per medium in longitudinem transeunte ueluti discreta, transversis incisuris & ceu rursus clausis, secta & imbricata, quæ, postquam ad statum peruenierint, utrinque retrorsum usque ad neruum contrahuntur, & seipsum adhaerentem pulverem inuoluunt, adeò ut ne appareat qui dem. Inferiora eorum spacia superioribus maiora sunt, quamuis & ipsa semunciam rarò excedant, eadem paulatim decrescunt, quò magis cacumini appropinquant, nã in summitate ac aliquanto inferius constituta, tam exiguis dirimuntur interstitiis, ut se inuicem non tantum contingant, uerum etiam trudent. quæ an hyeme etiam Phyllitidis modo uiuant, nondum expiscari potui: hætenus enim decerptam tantum & non nascentem uidere concessum est, ideo neque radicem describere possum. Folia gustu, cum tenuitate aliqua adstringunt. Nascitur in Hercynia sylua Saxonie, quæ Goslariam urbem attingit.

* Struthio apud Latinos recentiores tantum usurpatur: Græci Στροδοκμήλον dicunt, uel Στροθόν μετὰ ληνον ἢ Λυβικόν; neque laudatur compositio Latini et Græci uocabuli.

DE POLYPODIO. CAP. CLXXX.

POLYPODium, folia emittit do drantalia aut longiora, gracili & aliquantulum anguloso pediculo, utrinque in secta & partes diuisa, longitudine unciam, latitudine uerò tertiam aut quartam unciam partem æquantem, aut interdum maiores, nullis incisuris subdiuisas, interiore sui parte glabras, exteriori autem flauo, sub ruffo, hirsuto, atque in puncta diuiso puluere conspersas, utrinque pediculo enatas, in exortu sibi minimè aduersas, sed spaciis inuicem appositas. Radices habet in ipsa terræ superficie transversas, minimo digito plerumque graciliores, tortuosas à lateribus alias quoquo uersus emittentes, superius paruis, modicè concauis & eminentibus ceu coryledonibus, polyporum pedum extremitates, acetabula figura imitantes, foris in spadiceo colore nigras, intus pallidas & subuirides, carnosas & perennes, plurimis, tenuibus, nigricantibus & dense implicitis cirris capillatas, gustu cum quadam nauseabunda qualitate dulces, aliquantulum adstringentes, saluam elicientes, & modicè amarescentes. foliis idem est sapor, remissior tamen. Viret tota hyeme, nec folia amittit antequam in uere flaccescentibus noua succedunt: quibus enatis flaccida exarescunt, & in radicibus singula uestigia, coryledones constituentia, relinquunt. Nascitur in muscosis petris, riuulorum muscosis & saxosis ripis, in uentis quibusdam muris atque muscosis arborum, præsertim quercuum, truncis.

Polypodium. T. 1. 165. p. 540.

Scolopendrium. T. 1. 183. p. 551.



DE SCOLOPENDRIO, siue Aspleno.

CAP. CLXXXI.

SCOLOpendrion siue Asplenon, quod Arabes Ceterach appellant, Polypodio similis herba, multò tamen minor. siquidem ab uno radice glomere longitudine tantum quadrantalia, aut ad summum trientalia emittit numerosa q̃p̃ folia, utrinq̃ in partes Polypodii modo, spaciis aduersa, secta interiori sui parte uiridia, exteriori uerò & à tergo flauo, hirsuto squamosoq̃ puluere, eoq̃ non punctatim diuiso, sed continuo obducta, quæ siccata contrahuntur tam longitudine quàm latitudine. Radicibus nititur tenuibus, nigris, cirrosis, dense inuicem intricatis & perennibus. Viret tota hyeme ut Polypodium. Saporem folia adstringentem, & aliquantum tenuè habent. Nascitur in opacis petris, sed in Germania minimè frequens, præterquàm in nigra sylua inter Brisgoiam & Vuirtembergensem Sueuiam sita. *

* imò ad Rhenum etiam passim.

DE ADIANTO candido, [quod uulgo Rutam murorum uocant, Matthiolus Paronychiam.]

CAP. CLXXXII.

ADIANTum candidum, quod Germani Murariam Rutham, alii murarium petroselinum appellant, pediculos ab uno radicis capite seu cespite plures emittit

emittit, longitudine ut plurimum quadrantales, seta & Adianto nigro crassiores, colore uirides, inferius autem ubi à radice exeunt in fusco rubentes. Superius utrinque in peciolos unciales diuisos, quibus ab utraque parte foliola adnascuntur, parua incisa, nigri Adianti foliis similia, minora tamen, crassiora quoque, interiori sui parte glabra & uiridia, à tergo uerò in fusco rubescente hirsutò que puluere obsita, tota hyemè cum pediculis suis uirentia. Radicibus nititur tenuibus, breuibus, nigris, in densum glomerem intricatis, & ab uno ceu capitulo exeuntibus, folia & pediculi gustu adstringunt cum tenuitate aliqua. Nascitur è lapidum comm. Muris, in antiquis umbrosisq; muris, tam lapidibus quàm lateribus constructis.

Adiantum nigrum. T. 1. 182. p. 531.



Adiantum candidum. T. 1. 182. p. 530.



DE ADIANTO nigro, [quod in Gallia Narbonensi nascitur.] CAP. CLXXXIII.

ADiantum nigrum, ab uno cespite numerosos emittit coliculos, longitudine quadrantales, septunciales, quincunciales, et nonnunquam etiam trientales, capilli instar tenuissimos, in spadiceo colore nigros & nitidos, in exiguos tenuissimosque pediculos ex interuallo diuisos, à quibus folia exeunt parua, incisuris diuisa, & inferioribus coriandri foliis similia, minora tamen & admodum tenuia, aduersus hyemis iniuriam contumacia, nec flaccescentia, antequam nouo uere alia pereuntibus succedant. Radicibus nititur uillosis, capillaris, nigris, in densum glomerem & cespitem intricatis atq; perennibus. Folia gustu leniter Trichomanes modo adstringit

gunt, cum mediocri tenuitate. Nascitur umbrosis humentibusq; locis, roscidis muris, & in puteis, in Germania parcius, in Gallia autem Narbonensi copiosissime, praesertim circa montem Pessulanum.

DE MOSCHATELLA: [Nulla apud nos. alibi etiam rara, prope Basileam in sylva reperiisse memini: ex Lausanna iuxta sepem. Alius quod scia nullus meminit.] CAP. CLXXXIII.

MOSCHATELLA, plerumq; quadrantali, aut ad summū trientali altitudine ascendit. surgit, idq; primo vere, una cum Chelidonia Capno, iuxta quam etiam provenit. pediculos profert duos, tres aut quatuor, graciles, teneros et in viridi pallidos; in quorum summitate folia sunt parva, per ambitum incisa, & in partes Capni Chelidoniae, aut Ranunculi Chelidonii modo secta, minora tamen, tenuiora pallidioraque. Coliculus ē medio pediculorum singularis plerumq; exit, nihil ferē ab ipsis foliorum pediculis differens, in cuius summitate parvum, angulosum ac viride est capitulum, florum ulcem explens, & sub hoc unum atq; alterum folium, praedictis similia, sed paulo minora. Radice nititur breui, parva, candida, longitudine plerumq; semunciali aut aliquantulum maiori, pinguibus, crassiusculis & sursum uersis ceusquamis inaequali, paucis minimisq; fibris capillata. a qua exiguae partes Ari modo recedunt, quibus se propagat, sapore folia habent tenuem. Radix uerō subdulcem & modice adstringentem, odore folia spirant Moscho similem, unde nomen inuenit, statim flaccescit herbulā hāc, quemadmodum Capnos chelidonia, nonnunquam etiam antea. Nascitur umbrosis locis sub arbutis, iuxta Capnon Chelidoniā et Ranunculum Chelidonium, solo plerumq; subputrido.

Moschatella.

Oxyt. T. 1. 178. p. 120.



DE OXY. CAP. CLXXXV.

OXYS, quam hodie Alleluiam, atque Trifolium acetosum uocant, exigua herbula est, non uno tantum loco è terra erumpens, ueluti aliæ plantæ, quæ ab uno radicis capite germina fundunt, sed diuersis locis à transuersa & in multas partes sparsa radice enascens: latum cespitem constituens, & pro sui magnitudine satis amplum occupans spaciū. Pediculos emittit quadrantales, gracilesque, in summitate terna sunt folia, in mucronem ubi coniunguntur desinentia, colore admodum uiridia, longitudine semunciam excedentia, latitudine uerò unciam æquantia, superius unica tantum incisurâ, paulatim se insinuant, diuisa, & latiusculi cordis figuram referentia. primo uere Sole arietem tementem, cum primùm enascuntur complicata, postea autem se instar canalis aut sulci aperientia, donec iustam formam nacta, æqualiter in latitudinem expandantur. Flores Aprili mense profert in summis coliculis, foliorum pediculis æqualibus, singulos foliaceos, Cymbali modò concauos, colore candidos & sanguineis unculis distinctos, parua intus lutea quæ stamina continent, inter quæ etiam secuturi seminis rudimenta apparent, ea dilabentibus florum foliolis semuncia plerumque maiorem capeffunt longitudinem, simulque folliculorum naturam & acuminatam figuram induunt. semen enim continent nasturtio non dissimile, colore croceum, solo tactu dissiliens siliculis, prosiliens. Radice nititur tenui, geniculata, ex interuallo nodosa, subruffa, minimis capillamentis fibrata, in terræ superficie per transuersum serpente, pluribusque adnatis, quoque uersus sparsis propagante & perenni. Saporem folia & flores habent simpliciter acetosum, nullo alio sapore mixtum aut dilutum. Nascitur in Lucis & syluis supra arborum, præsertim fagorum præcisarum truncos, solo putrido, aut muscoso.

DE FRAGVLA. CAP. CLXXXVI.

FRAGVLA est herba quæ fraga gignit humi nascentia. Pediculos emittit trientales aut quincunciales, graciles, modicè angulosos hirsutosque, in singulorum cacumine terna sunt folia simul eodem loco coniuncta, longitudine plerumque sextantalia, latitudine uerò sesquiuncialia, per ambitum serrata, superius uiridia, inferius autem candicantia, utrinque tamen modicè hirsuta. Flores uere, in hirsutis, & foliorum pediculis similibus & æqualibus, aut paulò longioribus coliculis producit foliaceos, in quina foliola sectos, & colore candidos, in quorum medio paruum luteumque capitulum, ipsius fragi rudimentum extuberat, quod defluentibus florum foliolis semuncialem, ut plurimum, longitudinem, pauloque minorem latitudinem, acuminatam in summo figuram, exasperatam superficiem, teneram carnosamque substantiam, & rubentem colorem æstatis initio acquirit. in fructum euadens, fragum ab omnibus dictum, minimisque seminibus per carnem dispersis, plenum gustu uinosum, admodum suauem & uinosum. Radice nititur tenui, oblonga, subruffa, perenni, gustuque adstringente, folia quoque adstringunt, sed remissius. Nascitur in montibus, neque opacis, neque apricis nimium.



VALERII CORDIDE

plantis, liber III, arborum, fructuum, ET ARBUSTORVM DE

scriptiones continens.

*Securis animis tantum hæc cognoscere Cordi est:
Quos non ambitio, nec opes, nec gloria mundi,
Nec uarij affectus uana sub imagine torquent:
Sed dulcis natura inuat, pascitq; beatos.*

DE VLMO. CAP. I.

T. 3. 64. p. 1087.



magis conspicuus transit neruus, a quo alij minores ceu costæ, rectiq; & ueluti pa-

VLMVS speciosa, pro-
cera, ramosaq; arbor
est, duplici cortice uestita,
quorum exterior asper sca-
berq; est, interior uerò car-
nosus, mollis, lentus & in te-
nuissimas philuras tilic mo-
dò filisilis, lignum candidū,
tenerū, & in opère tractabi-
le. flores primo uerè sole in
arietē transeūte ex capitulis
numerosos, exilesq; pro-
fert, ceu exigua & rubentia
stamina, seu capillamenta,
quos copiosum, latū et folia
ceu semen subsequitur, circa
annexū angustum, anterio-
re parte latius & in paruum
sinum inflexū, in Maio ma-
turescens, in medio semine
tenuis, planus & candidus
nucleus est, sapore dulcis
magnitudine & figura len-
ticulæ similis. folia post flo-
res se proferunt quinq; aut
sex, uel interdum septem di-
gitorum longitudine, latitu-
dine triū aut quatuor utrinq;
que ex rotundo fastigiata,
undiq; per ambitum incisuris
diuisa, per mediam lon-
gitudinem rectus & à tergo

rasseli ad eminentes incisurarum partes exeunt, in uno tamen latere plures quàm in alio, quo fit ut altera foliorum pars alteram longitudine uincat. Folia, cortex, semenq; in gustu dulcem lubricumq; emittunt succum, ideoq; * Nascitur pinguibus & lutosiis campis.

DE ACERE tenui folia, [quæ & Opulus & Rumpotinus dicitur, Germani Nasseholder appellant.] CAP. II.

T. 3. 79. p. 1123.



ACER tenui folia, caudice & cortice ulmo similis existit; gracilior tamē, breuiorq; fragilioremq; interiorem corticem, quamuis substantia philuræ similem habet. Materia est alba, recta, tenera & fissilis. Ramos expandit numerosos, multis latis foliis, longo, uiridiq; aut rubente pediculo ab his dependentibus uirgineis similibus, leuioribus, mollioribus & tamē minoribus. in quinq; plerumq; potiores partes diuisis. flores in Aprili fert ab uno pediculo plures, paruoscq; colore uirides in candido, paucis intus staminibus et singulis binę plerumq; se proferunt siliquæ, circa connexum duræ, tumentesq; ob singulos inclusos nucleolos, qui parui candidiq; sunt, reliqua siliquarū pars membranæ modo tenuis & scarabeorum interioribus alis est similis, colore in uiridi rubente. Tenues uirgæ, folia & non-

dum aridi fructus, modicum lactei liquoris remittunt, si inciduntur. habent folia semen & cortex ulmo similes qualitates : nasciturq; iisdem quibus ulmus natalibus.

DE LYCOSTAPHYLO scemina. [Nostri sambucum aquaticam uocant: Saxones Lupinam uiam, quod nomen græcè exprimere uoluit Cordus. De scemina leges infra, cap. penultimo huius libri.] CAP. III.

ARBVSCVLA est quinq; aut sex cubitorum longitudine, caudice inferius crassitudine sua manum complente, cui cinericii coloris, glaberq; & fragilis circumdatur cortex: uirgæ ex caudice se proferunt longæ rectæq; crassitudine digiti, aut pollicis, sambuci modo per interualla geniculis præcinctæ: in singulis uero articulis bini erumpunt nodi seu ramuli, lignum tenerum candidumq; existit &

fit & propter amplam laxamq; intus medullam fragile. Folia habet latitudine & longitudine quatuor, quinq; aut sex digitorū et in tres partes diuisa: quo fit, ut paulo minus quā uirginea sint. in summis uirgis Maii initio umbellas fert rotūdas, sambuco similes, in quibus flores sunt candidi, magnitudine & forma leucoia ferē similes, in quinq; foliola obrotūda diuisi, nullis in medio staminibus præter unū aut alterum exiguum inflexumq; coloris candidi foliolū: uniuersa tamen umbella simul non floret. incipit enim exterior circumferentia singulis floribus, singulæ succrescunt rubentes bacce, minimis uuæ acinis æquales: tota hyeme in matre pendentes, in quibus singuli sunt duri planiq; nuclei. cortex amari & adstringētis est saporis. Baecartū uerō succus autumnō amarus modiceq; dulcis & acetosus est: in uere autem cum hyeme passus factus fuerit magis adstringit.

Lycostaphylon. T. 3. 25. p. 1002.*Cerviſpina. T. 3. 15. p. 979.*

DE CERVISPINA. CAP. IIII.

ARBVSCVLA est quinq; aut sex cubitorum altitudine, nonnunquam etiam procerior, cortice foris, ut cerasus transuerso nigrioreq; uestita, quo detracto subest alius tenuior colore uiridis, prædicti modò per transuersum ramos uestiens, sub quo est tertius crassior, setis candidis per longitudinem plenus, neruosus, colore diluto croco similis, quo in aqua decocto antylicium fit. gustu adstringēs cū amaritudine aliqua, paucisq; aculeis pirastri modo septa materia dura et

robusta, folia fert media inter cornum & malum similitudine modicè per ambitum serrata; flores Maii mensis principio producit admodum exiles iuxta foliorum pediculos colore uirides, in quatuor radios instar crucis diuisos quatuor intus minimis reflexis & flosculo concoloribus staminibus, baccæ ex singulis floribus singulæ nascuntur foris principio uirides, in maturitate uerò nigrae, intus uerò semper uiridi permanente succo, qui lubricus est in maturitate. baccis unus & alter inest nucleus. habent acini eius adstringendi & abstergerendi uim ob amarum & acerbum saporem, cū nauseabunda qualitate aliqua. *Saffegrün* fit ex baccis alternis uicibus allumine mixtis.

DE ACERE maiore, [quam Germani *Alhorn* uocant, aliqui non rectè *Platanum* esse putant.] CAP. V.

T. 3. 80. p. 1125.



ACER maior speciosa, procerâ, ramosâq; est arbor, folia ferens uitiginea, & quinque partita, superius uiridia, inferius autem candicantia, ac modica lanugine circa uenas obducta flores, fructus fert tenuis foliæ acerisimiles, binis aut interdum ternis alis, furcæ modo propius coeuntibus uni pediculo iunctis, rarò autem soli sunt fructuum gemelli, sed plura paria ab uno maiori pediculo dependent, cortice uestitur leui aut nõ adeò scabro. Materia consistat tenera, ac in opere tractabili. Nascitur editis locis, plerumq; solo pingui & spisso.

DE SORBO torminali [Tragus interpretatur, *Wilder Sperberbaum*/ *Eschrösel*.] CAP. VI.

SORBVS torminalis, speciosa & piro æqualis arbor est, cortice uestita flauo: caudex uerò scabriori libro tegitur. folia habet lata, duriuscula, aceri maiorem similia, flores fert fauaceos, cãdidos numerosos, instar corimbĩ. uni pediculo annexos. quos singuli sequuntur fructus, magnitudine auellanae, colore spadicei, sapore acido & adstringente, pira atq; Mespila æmulantes, in quibus exigui nuclei uer-

luti

luti in piro sunt. Nascitur montanis locis, solo pingui & interdum saxoso. Plurimaq; ad Herciniam syluam & circa Ienam.

Sorbus torminalis. T. 3. 30. p. 1010.

Sorbus aculeata. T. 3. 18. p. 934.




DE SORBO aculeata, id est, Piracantha. [Oxyacantha Dioscoridis uidetur, & Spina appendix, Plinij.] CAP. VII.

SORBV S aculeata, aspectu Torminali sorbo similis est, multo tamen minoribus caudice, foliis & fructu, quin etiam fruticosior est, & duriore materia constat, multisq; spinis pirastri modo armatus, cui aspectu, cortice & materia quoque non dissimilis est. Folia singulis apii foliis æqualia habet, gustu glutinosa: fructus rubent, ac intus unum atq; alterum lignosum nucleum continent, reliqua bacarum pars fragilis est, gustuq; aliquantulum glutinosa, statim satietatem uescentibus affert, & omnino succo caret: nascitur ubiq; tam planis quam editis locis, & in syluis.

DE ANONYMO. CAP. VIII.

ANONYMVS, quæ alio nomine etiam Euonymos appellatur, ramosa est arbuscula, quatuor aut quinque cubitorum altitudine, cuius stolonibus & nuper nati ramuli, propter corticem in quatuor angulos excurrentem, quadrangulares sunt.



furculos & ramos profert numerosos, breui intervallo, in singulo exortu binos & sibi contrarios: in quibus folia sunt Chamæceraso similia & æqualia, paulò tamen minora, nec serrata, ab iisdem furculis paulò post ueris initium flores profert pallidos, quatuor foliolis constantes, Leucoio similes, sed minores: quibus singuli succedūt fructus seu folliculi, forma quadrāgulares, Lathyridis utriculorū magnitudine, colore puniceo aut roseo: quī in autumnō, postquam maturuerint, aperti, quaterna crocei coloris semina ostendūt. ea croceo uelamine detractō cādī cantes nuclei sunt, figura gallinaceis testiculis similes. Saporē uerò habēt in amaro dulcescentem, & nauseabundum. Tota etiam arbuscula grauem & iniucundum habet odorem. Materies eius solida, fislis, tenera, & æqualis est. ea cum adhuc succo turget cōsa, diluto croceo pallore etiam Buxum prouocat. Nascitur in syluis tam planis quàm editis.

DE PIRO arbore & Pirus urbanis. CAP. IX.

PIRVS urbana, syluestri, caudice, cortice, materia, foliis & floribus similis est, speciosioribus tamen magisq̃ rectis ramis, foliisq̃ paulò maioribus constat, ipsorum autem fructuum, quæ pira nuncupamus infinita sunt genera, ex quibus aliquot in Germania prouenientia describemus: adiectis etiam Germanicis eorum nominibus, quæ

tamen secundum diuersas prouincias variant.

Præpositbiri/id est, Præpositana ex lata basi, iuxta pediculum in obtusum mucronem delinunt, longitudinem habent quadrantalem, latitudinem uerò paulo minorem, color, uis est in uiridi pallescens, uiridibus maculis ceu punctis conspersus: gustu adstringunt, & succi abundantia sitim extinguunt. maturescunt autumnī initio, & cito putrescunt propter frigidioris & aquei succi abundantiam, habentur copiose Islebii propè Herciniam Saxonix.

Speckbiri/id est, Lardina, in medio crasso uentre intumescunt, à quo subito in mucronem delinunt, longitudinem habent tribus uncis maiorem, latitudinem uerò quadrante paulo minorem, colore sunt pallido, & Præpositanorum modo uiridibus punctis conspersa, gustu sunt admodum miti & suauī, & porcini adipis modo in ore liquescunt, unde etiam nomen inuenerunt, atq̃ succi abundantia sitim refrigerant, cum excorticantur suauem spirant odorem: maturescunt autumnī initio & Præpositanorum modo facile putrescunt.

Kaulbiri/id est, Globosa, globiferè rotunditatem habent, nisi iuxta pediculū in obtusum & uix euidentè turbinem fastigiarentur, longitudine duas uncias uix, & raro excedunt, latitudine uerò longitudinem modicè superant. colore sunt in uiridi pallescente, sapore & odore Laridina æmulantur, cum quibus etiam maturescunt: facile & hæc putrescunt. Habentur Islebii.

Hansfbiri/id est, Cannabina, Globosis similia sunt, sed paulo maiora, colore habent

T. 3. 45 p. 1045.



habent viridem maculis
cei punctis distinctum, sa-
pore globosis respondent,
non tamen adeo in ore lie-
quescent, simul cum illis
maturescunt, & facile putre-
dine corripuntur. Ha-
bentur & hæc Islebiis.

Glockenbirn / id est,
Campani, à sessili basi in
angustum ueluti collū co-
arctantur, à quo deinde ita
obtusum ceu caput desi-
nunt, habentq; omnino cā-
panæ figuram, unde etiam
nomen inuenerūt. Colore
sunt omnino flauo puri-
et scq; maculoso, longitudi-
ne quadrante paulò mino-
ra sunt, latitudine uerò du-
as uncias nō assequuntur,
odorem spirant non in sua
uem, maxime excorticata,
gustu Cannabinis respon-
dent, pariterq; cum eis ma-
turitatem cōsequuntur. &
facile putrescent. Islebiis
proueniunt copiose.

Rünigsbirn uel **Re-
gelbirn** / id est, Regalia,
grandia sunt & uentrosa,
longitudinem habent in a-

terdum quatuor unciarum, latitudinem uerò paulò minorem, colore sunt cæsius, ea
autem parte, qua solem acceperūt, leniter rubescunt, Gustu adstringunt, & copioso
succo eoq; suauī, & aliquantulū uinoso sitim sedant. Maturescunt sole in libram in-
gresso, nec adeo facile putrescent.

Klunsbirn / id est, turgida, duplicis sunt differentiae, utrumq; tamen genus
Regalibus proportionaliter forma respondet, sed quantitate illis cedunt, differen-
tia in colore est unum siquidem genus, cæsius habet colorem, alterum in cæsius ru-
bentem, succum habent regalibus gustu similem, fortius tamen adstringunt. matu-
rescunt cum Regalibus. in Saxonia magnus eorum est prouentus, maxime Hildes-
heimii.

Bonnebirn / id est, Bonnana, à Bonna oppido Rheno imposito sic appellata,
unde in alias regiones translata sunt. figuram habent ferè globosam, nisi modicè in
obtusum mucronem iuxta pediculum desinerent. longitudine sunt quadrantali, la-
titudine uerò paulò minore. Color iis est ab una parte uiridis aut pallescens, ab alte-
ra autem, qua sole tacta fuerunt, rubens: gustu modicè adstringunt, succo abundant
copioso, eoq; ferè aqueo, actu uehementer os refrigerante. maturescunt sole ad Scorp-
ionem properante. Abundant Marpurgi in Helsia.

Schmalzbirn / id est, *σταρνια*, sic dicta sunt quod adipis, aut liquaminis cuius-
dam instar, in ore liquecant, fructus sunt ferè in ima parte tumidi, ac paulatim ius

xtapediculum, in angustum collum desinunt. Vt cucurbitae longitudine sunt quadrantali aut plerumque maiori, latitudine uero sextantem, excedunt, semuncia, Colorem habent in pallido flauum, odorem spirant suuendum, gustu autem strenue adstringunt non sine admixtione praecipui & uinosi saporis, non satis matura nec bene confecta dentibus, & nimis auide deuorata, in faucibus aliquandiu manet & anhilitum remorantur, alioquin matura ac bene mansa in ore adipis modo liquefit. Maturescunt antequam sol in libram transeat. Habentur in Hestia praesertim Francobergae ubi magnus est eorum proventus.

Jundfrawenbirn groß/id est, Virginea maiora, turgidis similia sunt colore et forma, quantitate uero paulo minora. Gustu efficacissime adstringunt, adeo ut fauces exasperent, atque labra in angustum, instar uirginei osculi contrahant, succum habent aqueum ueluti uino austero mixtum, Maturescunt aestatis exitu, Brunsvici in Saxonia copiose proueniunt.

Jundfrawenbirn klein/id est, Virginea minora, a tumido uentre in angustum collum desinunt, longitudinem habent quadrante paulo breuiorem, latitudine uero sesquiunciam aliquantulum excedunt, colore sunt pulchro, ueluti si quis caereum rubenti ac puniceo misceat, in super etiam punctis conspersa sunt, gustu adstringit, simulque facile in ore resoluuntur. Maturescunt autumnii initio, Islebii maxime colluntur.

Damelswenste/id est, *κρηγασπας*, nomen ab eo inuenerunt, quod ueruecum uentricos tumore amulantur, ea crasso ueluti uentre turgent, longitudine quadrantem equant, & sepe etiam excedit, latitudine uero quadrante minora sunt. Colore sunt caesio, eo autem latere quo solem aspexerunt, subrubente. Saporem habent ualde cum gratia quadam & uinoso succo adstringentem. Maturescunt aestatis exitu. Habentur Simesus in Hestia, & uicinis pagis, ibique reliquis piris praefertur.

Löwenbirn/id est, Leonina, a praestantia sic appellata, ea in Turingia et uicinis locis Hestatica nominantur, insignes sunt fructus, inter omnes autumnii doctes principatum, propter durationem & saporis succique bonitatem, obtinentes. Sunt autem inferius tumida & plerumque inaequalia, longitudinem habent quadrantalem & frequenter maiorem, latitudine uero sextantem non raro excedunt. Coloresunt caesio sub uiridi & modice ruffo. Saporem habent adstringentem cum praecipua suauitate. Succo abundant copioso, uinoso, odorato & actu refrigerante; unde sitim confestim sedant; quin & ipsa pira uehementi & aromatico odore mirum in modum agros recreant. Maturescunt sole in libram ingresso: postremo reposita in longum tempus durant, abundant in Hestia, maxime Marpurgi, eadem Francobergae, Marpurg uicina urbe, **Schärfbirn**/id est, Tonforiana uocantur, a tonfore quodam quia ea primus eo transtulit.

Dangelbirn/id est, pendula, Steatapiis figura, colore, & quantitate equalia sunt, pediculo dependent longo, unde etiam nomen sortita sunt, gustu a steatapiis differunt, non enim ita uinoso constant succo, nec adeo adstringunt, nam simpliciozem saporem habent, nec ex tot qualitatibus compositum, cum iisdem tamen simul maturescunt. Coluntur & haec in Hestia.

Margarethenbirn/id est, Margarethana, sic dicta sunt quod circa festum diuie Margarethae maturescant, sole in Leone ingrediente, in oblongum collum fastigiantur, longitudine quadrantem, latitudine uero uix sextantem assequuntur. Colorem habent in caereum rubentem. Carne constant tenera, succo saepe, gustu uehementer suauis, & in ore facile resolubili, odore sunt admodum grato. Abundant Brunsvici in Saxonia.

Winterbirn/id est, Hyemalia, ex rotundo modice turbinatur, longitudine quadrante minora sunt, latitudine uero sextantem parum superant. Colorem habent uiridem, substantiam uero durissimam, ut uix dentibus cedant. Gustu strenue adstringunt & refrigerant,

gerant, succo aqueo simulq; austero sitim sedant. Maturescunt serò in autumnò post omnes alios fructus, postquam pruinis & gelu tacta fuerunt. Habentur Francobergæ in Hefsia.

Rnochenbirn/id est, ossea, à duriciè nomen inuenerunt, ex tumido uentre paulatim in breue & angustum collum desinunt, longitudine sextantem, latitudine uerò sequiunciam raro excedunt. Colorem habent subrubentem, substantia sunt adeò dura, ut cruda mandì non queant, sed cocta tantum. Gustu ualdè adstringunt, maturescunt autumpi initio. Coluntur Francobergæ in Hefsia.

Augstbirn/id est, Augustana, serò rotunda essent, nisi in breuem mucronem desinerent. Longitudine sextantè parum excedūt, latitudine uerò paulo minora sunt. Colorem habent flauum interdum in pallido rubentem, gustu adstringunt cum peculiari succi suauitate, maturescunt tempestiue in Augusto mense, unde etiam nomē inuenerunt. Eadem fugacia sunt nec diu durant. Abundant in Hefsia ubiq;.

Honigbirn groß/id est, Mellea maiora, in oblongum desinunt turbinem, longitudine quadrante, semuncia minora sunt: latitudine uerò sextantē ferè assequitur. Colorem habent in flauo casium, & superficiem non adeo glabram, gustu adstringunt, succoq; abundanti suauì, maturescunt autumnì initio, aliquandiu durantes. Habentur Vuittembergæ in superiori Saxonia.

Honigbirn klein/id est, Mellea minora, turbinata sunt, longitudine sesquiunciam non excedunt, latitudine uerò paulo minora sunt, colorem habent subrubentem, saporem habent ualdè dulcem & suauem, unde nomen inuenerunt. Liquecunt facile in ore gustantium, maturescunt paulo post Augustana. Abundant in Hefsia.

Muscatterbirn/id est, Muscatellina, parua admodum sunt & turbinata, longitudine unciam paululū excedunt, latitudine uerò uncia paulò minora sunt. Colore in uiridi rubente, saporem habent suauissimum & aromaticum, ueluti modico musco condita essent, unde etiam nomē sortita sunt. Facile in ore liquecunt, odorē quoq; iucundum spirant. Maturescunt in Iunio mense. Coluntur studiose in Misnia.

Schaffbirn/Melleis maioribus similia sunt quantitate, figura & colore, paulò tamen oblongiora & angustiora. Saporem uerò habent uehemēter suauem, modicè adstringentem, facileq; propter carnis & succi teneram molliciem in ore resoluntur. Maturescunt sole ad libram properante. Habentur Francobergæ in Hefsia.

Waybirn/id est, Cæreà, inferius uentrosa sunt, superius in turbinem desinunt, longitudine quadrantem paululum interdum superant, latitudine uerò sextantem raro excedunt. Colorem habent flauum aut cæreum, unde nomen illis inditum est, ab ea etiam parte, qua solem receperunt, grato & maculoso rubore intuentes ad comedendum se inuitant. Saporem habent suauem, modicè adstringentem, carne constanti & facile in ore liquecente. Maturescunt sole in uirginem ingresso, fugacia sunt, nec diu durant. Habentur Marpurgi in Hefsia.

Rostbirn/id est, Rostia, in medio uentrosa sunt, & utrinq; in angustum desinunt, longitudine quadrantem semuncia excedunt, latitudine uerò sextantem cum semuncia equant. Colorem habent flauum, celsis punctis cōspersum, gustu sunt admodum miti & suauì, ac facile in ore liquecunt. eadem propter nimiam molliciem minime durant. Maturescunt autumnì initio. Coluntur Islebiì & uicinis oppidis.

Aschbirn/id est, Cinerea, nomen habent quod cineris modo mollia sint & facile in ore dissoluant. Rostia, figura, colore carnis substantia & sapore æmulantur, paulo tamen minorà sunt, magisq; in unam partē uersus pediculum turbinata, quamuis interdum Rostiorum modo in medio uentrosa fiant. Maturescunt cum Rostiis, Coluntur Islebiì.

Drinkebirn/id est, πόντισ, sic dicta sunt, quod alicuius potus instar sitim arceant, in medio tument & in obtusum mucronem desinunt, longitudine sextantem parum superant, latitudine uerò sextantem ferè æquant. Colore sunt omnino flauo,

rubescunt tamen ea parte quæ soli exposita fuit, saporem habent suauem, carnemq; teneram & largo potabilisq; succo abundantem. maturescunt cum Rostiis, & similiter ut illa cito putrescunt. Coluntur in agro Islebiano.

Eyerbirn/id est, Ouata, à figura nomen inuenerunt quæ illis est utrinq; breuis oui instar turbinata, alioquin etiam à potimis proportionem & formam non multum differunt, paulo tamen minora existunt, colore habent flauum, punctis conspersum, sapore Rostia æmulantur, simulq; modicè adstringunt, odorem spirant admodum suauem, maturescunt cum potimis, citoq; putrescunt. Habentur & hæc Islebiti & uicinis oppidis.

Pfalzgräuisch birn/id est, Palatina, quæ in Hestia **Wesbirn** uocantur, fugacium omnium generosissima sunt, æqualiter plerumq; in turbinem desinunt, longitudine quadrantem, semuncia dempta, æquant, latitudine uero sextantem raro excedunt. Colore sunt inter croceum, puniceum & rubentem medio. carne constant tenera, succosa, sapore supra modū suauis, & ueluti aromatica. Odorē habent tam ingratum quam incisa suauissimū, quæ nullum pirorum genus bonitate superet. Maturescunt Augusti exitu sole in uirginem ingressu. Habentur in Renano tractu. Francia, Hestia, & multis aliis regionibus.

Spindelbirn/siue **Kautenbirn**/id est, Rombacea, Rostiis figura, colore, et magnitudine similia sunt, paulo tamen angustiora, substantia uero & sapore ab illis differunt, duriores siquidē carne constant, ideoq; diutius durant, saporē habent adstringentem simulq; suauem. Maturescunt cum Rostiis. In agro Islebiano coluntur.

Zuckerbirn/id est, Zucharina, longitudine sextantem paululum excedunt, latitudine uero eundem uix aut raro attingunt, colore sunt uiridi. Carne constant tenera facile instar Zuchari in ore, liquefcente, gustu suauis & dulcia. Maturescunt cum ouatis nec diu durant. Coluntur in agro Islebiano.

Pactelenisch birn/id est, Pactemiana. Zucharinis quantitate & figura similia sunt. Colorē habent uiridē & cæsum, superficie aliquantulū sunt scabra, carne constant dura, succosa & adstringente. maturescunt cum Zucharinis, & si iniuria ablit non facile putrescunt, sed aliquamdiu durare possunt, sicut pleraq; alia quæ dura carne & adstringente succo constant. Coluntur in agro Islebiano.

Kirchmesbirn/id est, rotunda & uentrosa sunt, & uersus pediculū in longū, angustū & ualde attenuatum mucronē desinunt, longitudine triente, semuncia breuiora sunt, latitudinis uero diametro sextantem excedunt, quamuis etiam minora nascantur, colore sunt flauo, carne constant tenera succosaq; gustu simul Palatina & potima referunt. Maturescunt autumno, durantq; ferè donec sol sagittarium ingrediatur. Habentur Vuittembergæ.

Knausbirn/siue **Gelbe Honigbirn**/id est, Tumida & Mellea flaua, latam habent basim, atq; Turgidorum instar tumida & subrotundo sunt, iuxta pediculum in breuem, obtusum ac rotundum mucronem desinunt, tam longitudine quam latitudine, sextantem cum semuncia interdum excedunt, sed raro, colore sunt flauo et punctato, circa pythmen plerumq; Melleorum maiorum colore & asperitatem affectant. carne constant subdura, succosa, & circa seminum receptacula lapidosa. Saporem habent in mellea maiora, & Leonina medium, estq; hic admodus gratus. Maturescunt autumno, & nonnunquam ferè usq; ad hyemale solstitium durant. Coluntur Vuittembergæ uicinis locis.

Klosterbirn/id est, Cœnobia, inæquali uentre turgent & iuxta pediculū turbinantur, longitudine quadrantem attingunt, qui latitudine quoq; non multum cedunt, colore habent flauum & uiridibus punctis conspersum. substantia eis est subdura, & aliquantulū lapidosa. Gustu mediocriter adstringunt & modicè glutinosa cum suauitate existunt. Maturescunt cum Tumidis, illisq; similiter durant. Habentur in agro Vuittembergensi.

Glasbirn/id est, uitrea, rotunda sunt & modicè turbinata, longitudine sextantem cum tertia plerumq; uncie parte equant, latitudine uero, sextantem paululum

excedunt. Colorem habent in flauo modicè uirescentem: caro iis est tenera, succosa, gustu adstringēs, suauis & uinosa, maturescunt cū Rostiiis, paulò ante autumni initium, Islebi copiosus eorū est prouentus, uicinisq; oppidis, durant usquequo sol sagittarium ingreditur.

Kirchbirn/id est, Templaria, oblongam & ouatam habent figuram, magis tamen quam ouum in turbine delinunt. Longitudine sextantem æquant, latitudine uerò sesquiunciam aliquantulū excedunt. Colorem sunt ab unā parte in flauo uiridi, ab altera autem, qua solem receperunt, rubente. Carnem habent duram, modicè succosam, gustu modicè acetosam, ac uehementer adstringentem. Maturescunt æstatis exitu, diuq; durant. Horum quoq; magnus est Islebi prouentus.

Vuittembirn/id est, Cotonearia, Cœnobianorū modò inæquali uentre tumet, iuxta pediculum in breuem mucronem, uelut turbinata Cotonea, desinunt, pariterq; tuberosa existunt. Vnde etiam nomen illis factum est, sextantem cum tertia uncie parte, tam latitudine quam longitudine excedunt. Colorem habent uiridem, carnem uerò duram, succosam, gustu modicè uinosam & mediocriter adstringentē. Maturescunt autumni initio, durantq; usq; in hyemem. Habentur Islebi, &c.

Parissbirn/id est, Parisiana, inferius rotunda sunt, & superius in mucronē desinunt. Longitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine uerò sextantem nō excedunt, aut rarò. Colorem habent ab unā parte flauū, ab altera autē qua solem ferunt puniceū. Caro iis est succosa, gustu cū suauitate adstringens. Maturescunt cū prædictis, durantq; in hyemē usq;. Copiosus eorū est in agro Islebiano prouentus.

Weybersterben/id est, Thelyphona, rotunda essent, nisi iuxta pediculū in breuem obtusumq; mucronem fastigiarentur. sextantem tam latitudine quam longitudine plerunq; excedunt. Colorem habent flauum, & iuxta basim croceum, & punctis conspersum. Carne constant dura aliquantulum lapidosa, succo, gustu modicè acetosa & ualde adstringenti, quemadmodū Templaria, cum quibus etiam maturescunt. Durant in hyemem usq;. Coluntur in agro Islebiano.

Rölsbirn/id est, Brallicana, magna, subrotunda & turbinata sunt, longitudine quadrantem æquant, cui etiam latitudo eorum respondet, si semuncia, aut tertia uncie pars detrahatur. Colorem habent in uiridi pallidum, ab altera parte modicè rubentem & punctis conspersum. Carne constant duriuscula, succosa, gustu aliquantulum acetosa & fortiter adstringente, quemadmodum Theliphona, cum quibus etiam maturescunt, & similiter durant. Islebi coluntur.

Hölpener/id est, Vasta, magna, uentrosa, inæqualia & turbinata sunt, longitudine quadrantem cum semuncia interdum excedunt, latitudine autem longitudinem fere æquant. Color iis est uiridis, Carnem uerò habēt succosam, gustu uinosam, modicè acetosam, & Brallicanis fortius adstringentē. Maturescūt autumnī initio, diuq; usq; in hyemem durant. Frequens eorum est in agro Islebiano prouentus.

Saffebirn/id est, Succulenta, uastis similia sunt, paulo tamen minora, minusq; inæqualia, colore in uiridi flauo. carne constant solida, quæ incisa copioso succo manat, eadē manducata fere tota in succum transit, nimium enim quiddā remanet sicci, cum deglutitur succus, qui gustu frigidus, subacidus, uinosus & adstringēs est. Maturescunt autumnī initio, diuq; durant. Habentur Vuittembergæ.

Eierlinge/id est, Oualia, à forma ouali nomen acceperunt. mediam habent inter Potima & ouata figuram ac magnitudinem, color iis est flauus punctisq; subruffis in fusco conspersus. Carne constant dura, succosa, gustu acida, uinosa & adstringente. Maturescunt autumnī initio diuq; durant. Proueniunt Vuittembergæ.

Kreuselbirn/id est, Turbinata, figura turbine, quæ pueri funiculo inuolutam in terram proiciunt ut uertatur, emulantur. longitudine quadrantem attingunt, latitudine autē sextantem semuncia excedunt. Color eis est in uiridi pallidus, multis uiridibus maculis ceu punctis conspersus, carne constant solida, succosa gustu ualde adstringenti, aliquantulum acetosa & suauis. Durant usq; sol aquarium aut pisces superauerit. Abundant in Misnia,

Bratbirn gross/ quæ etiam **Fregelbirn**/ id est, quæ frigendo sunt, omnium ferè maxima sunt, nonnunquam enim minam cum dimidia pendent, figura sunt globosa, interimq; turbinata, & frequenter inæqualia, colore inter uiridem pallidum rufumq; medio, & ex altera parte magis ruffo. Carne constant cum suauitate succi, ad stringente, aliquid acetosi participante. Proueniunt in Misnia, præsertim Leisnichi & Coldici.

Gravchen/ id est, à colore nomē inuenerunt, siquidē cineracea, simulq; sub uiridia & sunt, figura globosa paruaq; unciā tam latitudine quā longitudine quantia, aspectu à syluestrium quibusdam nihil differunt, gustu sunt tenera, mitia, dulcia & suauia cum adstrictione aliqua, durant post solstitium hyemale, Proueniunt autem in Misnia Lipsensi agro.

Gelbrotebirn/ id est, Punicea, oblongam pyramidalem figuram habent, quadrantem longitudine paulominus quam semper attingētes, latitudine uerò sextantem. Colore sunt ab unā parte citrino, ab altera croceo & puniceo. Carne cōstante nera, gustu adstringente, suauis, subacido & aquoso, maturescunt autumnī initio & usq; ad solstitium hyemale durant. Proueniunt Hildesheimii in Saxonia:

Grimlinge/ id est, Prasina, satis magna sunt, siquidem quadrantem nonnunquā longitudine excedunt, latitudine uerò sextantem, figuram habent oblongam at pyramidalem, colorem uiridem, carnem succosam, non segniter gustu adstringentem, Maturescunt autumnō ineunte, & usq; post solstitium durant, prouentus eorum Hildesheimii est magnus.

Wasserbirn/ id est, Hydrapia, quantitate Prasina æmulantur, figuram habent uentrosam in medio, & utrinq; in mucronem desinunt, iuxta pediculum oblongiorem acutioremq; propè pythimena uero breuiorem & obtusiorē, colorem ab unā parte habent pallidum, punctisq; conspersum, ab altera autem rubentem, & per oram pallore dilutū. Carne constant succosa, gustu aquea cū suauitate aliqua, maturatur cum prasinis, nec usq; adeo durant. Proueniunt Hildesheimii.

Regelbirn/ id est, Conaria, pinei coni figuram habent, è latiuscula enim basi in mucronem desinunt, longitudo eis quadrantalis, latitudo autem sextantalī, colore sunt ex una parte uiridi, ex altera uero rubescente. Carne constant succosa, gustu austera, maturitas eis contingit autumnī initio, à quo tempore usque ad hyemale solstitium durare possunt. Nascuntur Hildesheimii.

DE MALIS. CAP. X.

MALORUM tam urbanorum quā syluestriū non minor quā pirorū uarietas est, plurima enim & horū genera, partim insitionū natura, partim diuersitate discreta, quæ autē ex his nobis optime cognita sunt, ea deinceps describemus.

Wißöpfel breyt/ id est, Pulmentaria lata, satis magna sunt, latitudine altitudinem superant, nam quadrantem altitudine non attingunt, aut rarò, cum latitudinis diametro trientem nonnunquam excedant. Colorem habent rubentem & modicè purpurascensibus uibicibus mixtum, carne constant miti, grügelicht & omnis succi experte: Facili in ore, dissolubiliq; gustu, in dulci subacida, & suauis, odorē uerò iucundum spirant. Copiosus eorum est Islebi prouentus.

Waidezitzchen/ id est, *καρτίτιδα*, sic dicta sunt, quod figura protuberantes & ferè acuminatas puellarum mammillas imitentur, tam exquisita similitudine, ut etiam pythmē eorum, papillas aspectu referat. Longitudo ijs est sextantalī, à quala titudo basis nihil aut parum differt, iuxta pythmena in obtusum, latum, & umbilici figura cauum mucronem desinunt. Colorem habent flauum, carnem uerò teneram succosam, gustu suauem, subacidam, uinosamq; odorem, reposita gratum spirant, maturescunt autumnī initio, & ad hyemis principium usq; durant, uel paulo diutius, Islebiano agro copiose proueniunt.

T. 1. 44. p. 1041.



Müßpöfel rund/id est, pulmentaria rotunda, ut plurimum globosa aut rotunda sunt, interdum tamē latitudine longitudinē superant, & ē contra, longitudine latitudinem, magnitudine etiam inter se differūt quantum ad indiuidua attinet, specie autem minime. Vt plurimum autem quadrantē cum semuncia lata sunt, sed altitudine quadrantem uix attingunt, inueniuntur etiam multo maiora. Colorem habent undique ferē rubentem, longis & in purpura roseis ceu uibicibus, distinctum. Carne constant miti in dulci modicē acescente, facile in gustantium ore liquecente, mediocriter succosa, gustu suauis, uinosaq;. Odorem habēt iucundum. Maturescunt autumnī principio, & ad hyemis initium usque durant, aut aliquantō diutius. Habentur Vuittembergæ.

Müßpöfel klein/id est, Pulmentaria minora, rotunda

dis Pulmentariis forma & colore similia sunt, multo tamen minora, oblongioraq; existunt, carne etiam teneriore, succosiore constant, saporem habent suauem, uinosum & subacidum. Odorem uerō iucundum. Maturescunt cum rotundis similiterq; durant. Proueniunt in agro Vuittembergensi.

Müßpöfel gelb/id est, Pulmentaria flaua, maximis rotundis pulmentariis æqualia sunt. Colorem habent flauum, ab una parte raris uibicibus. Colore sanguineis conspersum. Carne constant suauis, dulcis, uinosaq;, ueluti rotunda pulmentaria. Odorem bonum spirant. Autumnī initio perficiuntur & in hyemem usque durant. Magnus eorum est Islebii proventus.

Süßlinge klein/id est, dulcia minora, forma & colore minoribus pulmentariis similia sunt, sed multo minora, nam rarissimē Coretitthiorum magnitudinem excedunt. Carnem habent tencram, succosam, gustu uehementer dulcem & gratam. Odorem spirant suauē. Maturescunt hęc etiā autumnī initio & in hyemē usq; durant.

Pannöpfel/id est, Paterniana, lata & plana sunt, altitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine uerō quadrantem nonnunquam excedunt. Colorem habent flauum, sanguineis uibicibus, Pulmentariorum instar, maculosum. Carne constant tenera, mediocriter succosa, gustu subacida, uinosa & uehementer suauis, odore pulmentaria æmulantur. Maturescunt cum prædictis, durantq; similiter. Proueniunt in Vuittembergensi agro.

Scheiböpfel/id est, Orbiculata, Pateruianis similia sunt figura, odore, & sapore, plerumq; tamen paulò minora, pauloq; magis in latitudinem compressa existunt. Colorem habent pallidum, interdum flauum in croceo, paucisq; uibicibus, iisque sanguineis pictum.

Gotharde/siue **Polsöpfel**/oblonga sunt, & in medio aut inferius aliquantulum tumidiora, quorum pythmen profundiusculæ insidet superius ueluti lacuna. Colore sunt in spadice ruffa aut fusca, ab altera interdum parte pallidiora ac rubentibus uibicibus maculosa. Longitudinem habent multò plerumq; maiorem quadrante, latitudinem uerò quadranti æqualē. Carne constant tenera, miti ac rara, fungosa & tamen aliquantulum succosa. Gustu subacida, suauis, & in ore facile dissolubili. Maturescunt cum prædictis, atq; post medium hyemis usq; durant. Habentur in omnibus Germaniæ regionibus.

Karteeckenöpfel/ **Parisöpfel**/uel **Biscope**, id est, uel **Episcopia**, omnium dulciorum malorum nobilissima sunt. Figura eis est ut plurimum rotunda, colorem habent ab una parte suauiter, tenuissimis, contiguis roseisq; uibicibus rubentem, ab altera uerò in candido pallidum uix euidentibus, dilutisq; uibicibus conspersum, incertum, & descriptu difficilem, unde etiam Cartechianorum nomen inuenerunt. Odorem spirant gratum ac iucundum, longitudine quadranti cedunt, latitudine uerò eundem æquant. Carne constant tenerrima, succosa, niueaq;. Gustu supra modum suauis, dulcis atq; mitis. Maturescunt autumnii initio, & in hyemem usq; durant. Habentur in omnibus ferè Germaniæ nationibus.

Dartlinge weiß/id est, Duracina alba, rotunda sunt atq; modice in latitudinem compressa, altitudine sextantem, latitudinis uerò diametro sextantem & semunciam excedunt. Colorem habent unam partem, qua solem exceperunt in flauo rubentem, altera autem in uiridi candicante: intus albescentibus maculis, per cutim transparentibus aspersa sunt. Carne constant tenera & tamē solida, succosa, gustu acida, uinosa & suauis, odorem reposita aliquamdiu spirant iucundum. Maturescunt autumnii initio ac totam hyemem durant. Habentur ubiq; ferè in Germaniā.

Porstoffer/id est, Porstoriana, eandem habent quam Duracina alba figuram, & proportionē, paulò tamen minora sunt, colore quoq; non multum ab eis differunt. siquidem ab una parte pallent, ab altera uerò suauiore inspicientes rubore delectant. Carne constant iam dictis Duracinis simili gustu uehementer suauis & generoso, ueluti si quis Duracina Cartechianis commisceat. Odorē spirant gratum. Coluntur in Misnia, ubi propter saporis nobilitatem cæteris omnibus præferuntur. Maturescunt cum Duracinis, & similiter ferè durant.

Presilienöpfel/id est, Presiliana, aspectu sunt pulcherrima, figura rotunda & globosa similia, colore rosea, atq; Presiliū materiæ dilutum prouocantia, magnitudine quadrantem ut plurimum æquant, nonnunquam etiam excedunt. Carne constant tenera, subsolida, gustu dulci, simulq; acescente & suauis. Maturescunt autumnii initio, & usq; hyemale solstitiū durant. Magnus eorum est Hildesheimii prouentus.

Saffrāncke/uel **Hanenflöre**/id est, Crocina, è nobilissimis haud quaquā summa postrema, figuram habent globosam propemodum, tam longitudine quam latitudine sesquiuncialia, latitudo eorum, longitudinem non rarò excedat, paululum tamen, in summa Coreitithiis ferè æqualia & similia. Colore sunt inter uiridem flauum crociq; dilutum medio, quem serenis & calidis æstatibus puniceæ croceæq; maculae tenuesq; uibices distinguunt, eo insigni pluuiosis æstatibus destituuntur. Carne consistunt tenera, gustu dulci, aliquantulum subacida, suauis, & aromatico quodam halitu gustantis palatum commendante, quin etiam suauiter & iucundè redolent. Maturitatem adipiscuntur autumnii principio, & usq; ad æquinoctium uentū durant, frequenter etiam longius. Habentur Hildesheimii, præsertim in hortis Monachorum in Sulta extra urbem sito Cœnobio.

Saffrāncke rot/id est, Crocina rubentia, Crocinis figura & magnitudine eque
lia sunt,

lia sunt, colore uero pulmentariis & dulcibus minoribus, nam similiter sanguineis uibicibus roseam superficiem distinctam habent. Carnis substantia, saporis qualitate, maturescendi, durandiq; tempore Crocinis respondent. Proueniunt autem in Saxonia Hildesheimi ac Honouerae.

Boldhöpfel/id est, Pulmonea olim nominabant, omnium dulcium maxima sunt, figura globosa, diametri quoquo uersus non raro trientalis, colore flaua, nonnunquam etiam in uiridi pallido, praesertim ubi frigidiori humidioris quae aestate enata fuerint. Carne constant rara, fungosa, instar pulmonis, unde etiam nomen sortita sunt: ita digitis confricata & auribus adnota strepitum edunt. Saporem habent dulcem, non insuauem, nulla alia qualitate mixtum, maturitatem consequuntur aestatis exitu. Durare aliquandiu possunt, nunquam tamen aut raro hyemale solstitium attingunt. Proueniunt copiose in Hessia.

Weidenbolche/id est, Pulmonea salici inserta, Pulmones iam dictis aequalia & similia sunt. Carne constant paulo rariore, gustu dulci atq; aliquantulum amarescente. Aestatis exitu haec quoq; maturescunt, & similiter modico tempore durant, conluntur a quibusdam in Hessia. Possunt horum ad exemplum etiam alia salici inseri, praesertim, dulcia & alioquin rarae substantiae, auctuq; facilia.

Glasöpfel/id est, Vitrea, pulmoneis similia aequaliaque sunt, non tantum figura uerum etiam colore, praeterquam quod superficiem, nonnunquam etiam carnem habeant obscuri uitri modò pellucidam, quod horum malorum proprium est, idem si aliis malis contingat, uicium censendum est. Carne constant dulci, suauiter, modicè uinosa. Maturescunt aestatis exitu, diu autem durare minimè ualent. Nascentur Coburgi in Franconia.

Darlinger rot/id est, Duracina ruffa, figuram habent orbiculatam, interimq; globosam, magnitudinem uerò neque omnia, neque ubique eandem, ut plurimum tamen altitudine sextantem, latitudine autem sextantem & semunciam attingunt: colore sunt roseo, sanguineis longisq; uibicibus undique distincta. Carne constant admodum solida & densa, attamen ualdè tenera, succosa in gustu, acetosa, cum peculiari suauitate. Odorem spirant non ingratum. Maturescunt autem autumnii initio atq; omni diutissime durant, nonnunquā enim usq; ad aestatis medium, atq; non raro diutius, prorogantur. Proueniunt ferè in omnibus totius Germaniae pomariis.

Weinschirichen/id est, Oenoximela, Orbiculatis figura & quantitate similia sunt, paulò tamen altiora, nec usque adeò in planum compressa. Colore ab una parte in uiridi pallido quae candicante, ab altera leniter interdum rubescente. Carne constant admodum solida duraque, interim tamen delicata & tenera, succosa gustu, uinosa quae suauitate: tenue, austerum, syncerum quae uinum aemulante. Maturitatem adipiscuntur autumnio ineunte, & usque post æquinoctium uernum durant. Abundant in Hessia.

Ecköpfel/id est, Angulosa longa, ab angulis nomen inuenerunt, a pediculo enim usque ad pythmenam undiq; angulis crassioribus fulcantur, qui tamen iuxta utrumque caput eminentiores sint, in medio uerò, hoc est uentre non tam euidentes. Longitudinem habent quadrantalem, latitudinem sextantalem, nonnunquam tamen in maiorem quantitatem adolescunt. Colorem autem flauum, sanguineis uibicibus, dense conspersum. Caro est tenera, succosa & mitis, gustu inter dulcem atque acetosum saporem media, & suauis ualdè. Maturescunt autumnii principio, ac uernum usque ad æquinoctium durant. Proueniunt in Hessia ac Misania.

Ecköpfel rund/id est, Angulosa rotunda, angulorum eminentiis, colore, carnis substantia, sapore, maturescendi durandique tempore Angulosis longis similia sunt, in hoc tantum ab iis differunt, quod ut plurimum globosam figuram ha-

habeant, magnitudine sunt quoquo uersus quadrantalī, non rarò tamen maiora, quanquam frequenter etiam minora inueniantur. Proueniunt in Misnia.

Grunche/id est, Prasomela, figuram habent oblongam, latitudinem sextantalem, longitudinem autem semuncia maiorem, colore sunt in uiridi pallido. Carne constant tenera, gustu suauī, dulci simulq̃ acetosa. Maturescunt æstatis exitu, & totam hyemem durant. Proueniunt copiosè in Hessia Marpurgensi agro, acin uicina.

Weisse Godharde/id est, Gothardina alba, Gothardinis figura, carnis teneritudine, sapore, maturescendi durandiq̃ tempore similia sunt. Magnitudinem uerò inter Prasomela ac Gothardina mediam habent. Colorem autē in uiridi candicantem. Frequens eorum est Marpurgi in Hessia prouentus.

Augst öpfel/id est, Augustina, parua sunt atque propemodum globosa, sesquinciā tam latitudine quam longitudine rarò excedunt. Colorem habent flauum, Carnem teneram, gustu dulcissimam & ualdè suauem. Odorem gratum & iucundum. Maturescunt Augusto mense, unde nomen inueniunt. eadem fugacia sunt, minimèq̃ durant. Nascuntur ubique ferè in Germania, sed in Hessia copiosissimè, Saxones ea *splitte* uocant.

Rosen öpfel/id est, Rosacea, Præsilianis magnitudine & colore similia existunt, carnem habent paulò dulciorem, figuram uerò non usque adeò globosam. Maturescunt æstatis exitu & ad hyemem usque durant. Proueniunt Coburgi in Francia.

Blut öpfel/id est, Sanguinea, figura sunt globosa, quantitate sextante paulo maiore, colorem habent foris roseum. Carnem uerò teneram ueluti in sanguine macerata, robotisq̃ gratissimi: gustu dulcem, aliquantulum subacidam & suauissimam. Maturescunt æstatis exitu, Magnus eorum est Coburgi in Francia prouentus, quamuis & alibi non desint.

Süßöpfel groß/id est, Dulcia magna, Pulmoneis figura & quantitate æqualia sunt, paulò tamen minora, rotundioraq̃. Colorem habent in uiridi flauescentem, ex altera parte subrubentem. Carnem mediocriter solidam, gustu dulcem, suauemq̃. Odorem spirant gratum ac marrubio simillimum. Maturescunt æstatis exitu: abundant in Hessia.


Sauröpfel groß/Oxymela maiora, dulcibus magnis colore, magnitudine, figuraq̃ similia sunt, in hoc tanē differūtā dulcibus, ferè omnia acetosa, quòd candicātia exiguaq̃ puncta per cutim transpareāt. Carne cōstant solida, tenera, gustu acetosa, uinosa, suauiq̃. Maturescunt æstatis exitu, durantq̃ in hyemem. Proueniunt in Hessia.

Parelöpfel/id est, Parelia, Omnium maxima sunt, figura globosa, modicè compressa, colore in roseo alicubi flauescente, sanguineisq̃ uibicibus consperso. Carne constant tenera, sapore inter dulcem ac acescentem medio, estq̃ hic non mediocriter suauis. Odorem spirant iucundum, maturitatem consequuntur autumnī initio, durantq̃ ad autumnī ferè exitum. Coluntur Islebiī, uicinisq̃ tractibus.

Sauröpfel klein/id est, Oxymela minora, Duracinis ruffis æqualia similiaq̃ sunt, paulò tamē oblongiora, colore in uiridi candidoq̃ flauescente, pūctisq̃ candidis per cutim translucentibus conspersa. Carne, sapore, maturescendi durandiq̃ tempore Oxymela maiora imitantur, paulò tamen acetosiora existunt. Prouentus eorum est in Hessia magnus.

COTONEVS, SIVE malus Cydonia, siue Cotonea, arbor est fruticosa, numerosis, nisi coerceatur caudicibus, iisque ramosis & in æqualiter uirgatis ab uno radicis capite assurgens, altitudine quatuor, quinque
aut

T. 3. 43. p. 1039.



ginosumq; aliquid extuberat, secuturi uidelicet fructus rudimentum: hoc decidens
 floribus foliis incrementum capessit, donec iustam quantitatem assequatur.
 Porro ipsa Cotonea mala apud nos in duo præcipua genera conciduntur.
 Vnum enim maiorem molem adipiscitur, longitudine quadrantem cum semuncia
 interdum superantē, latitudine uerò, quadrantem, iuxta pediculum latiore, circa
 pythmena autem paulo angustiorē, superficie glabram, æqualem, & paucā, non-
 nunquam etiam nulla, obductam lanugine, colore in aureo flauescēte. Carne rari-
 uscula fungosaq;. Alterum multò inferius, magnitudine existit prope pediculū an-
 gustius, iuxta pythmena latius, angulis striisq; profundioribus sulcatum, colore in
 aureo flauoq; uirescente, densiore lanugine obductum. Olor utriq; generi suauissi-
 mus ac late spirans: minoribus uerò, id est, Strutheis uehementior. Caro utriusq; co-
 lorem flauum obtinet, minorum uero densior compactiorq; existit. Semina ferunt
 in medio pomo utriculo in cellas discreto, piri seminibus equalia similiaq;, cum nu-
 cleo tū cute spadicea, foris mucilaginoso dum madefiunt, lentore lubrica. Strutheo-
 rum caro, qua seminum conceptacula ambit, lapidosa existit. Vtrunq; genus dura-
 re diu nequit. Radicibus arbor hæc nititur multis, partim rectis, partim obliquis,
 fusco simulq; spadiceo cortice obfritis. Seritur auulsione, uiu radice, in sitione, ra-
 mulis & taleis.

aut sex cubitorum, crassitu-
 dine manū complente, nō
 nunquam etiam multo ma-
 iore, præsertim cum adiu-
 stam magnitudinem peruē-
 nerit. Cortice uestitur me-
 diocriter crasso, non rimoso
 nec ualdè scabro, inferius
 colore fusco, superius autē
 leuiore & glabro, folia ha-
 bet piro arbori non dissimi-
 lia, hoc est subrotunda, inte-
 rimq; fastigiata, plerumq;
 tamen minora, crassiora, ro-
 bustioraq;, supernè uiridia
 & glabra, internè autem cā-
 dicante lanuginosaq; pube
 obducta. Flores apud nos
 producit sole ac ariete ad
 Taurum properante, quin-
 que candidis leniter ruben-
 tibus, subrotundis, semun-
 cia latioribus foliis constan-
 tes, apicibus quibusdam in
 medio stipatos, propè
 quos exerunt se parua quæ-
 dam folia, arboris huius nō
 florū foliis similia. hinc est
 quod cotonea quædam ma-
 la & fere omnia iuxta pyth-
 mena foliata sint. Retro flo-
 rum folia oblongum lanu-

DE CITRO arbore ac malis Citreis. [Tragus trium diuersarum, sed cognatarum arborum fructus, Citrea mala, & Nerantia à recentioribus uocata, & Limones uulgò dictos, exprimere uoluit. Accuratiores singularum icones Mattheolus dedit.] CAP. XII.

T. 1. 40. p. 1032.



CITRVS arbor, est fruticosa uelut Cotoneus, ramos habet uiridi glabroq; uestitos cortice, ferendq; foetuum molli ualde impares & ad terrā pronos, ideoq; subiectis per transuersum hastilibus, funisq; fulciēdos. Folia laureis similia, dēfiora tamen, multoq; maiora, & ad iuglandis magnitudinē accedentia, oblonga, utrinq; acuminata, egregie uiriditatis, splendorisq; praesertim supernē, infernē enim pallidiora existunt. Tota hyeme arborem suam exornātia, odoris acerrimi, late spirantis, qualis in Melissophyllo sentitur, cū grauitate quadam cimicem imitante, spinis armatur sub omnium foliorum annexibus, longitudine uncialibus, rectis, acutis, ac uiridibus. Flores uiuentes, gemmarum caliculi emittunt oblongos candicantes, & quorum duplex est genus uidelicet, sterile & fructiferum; sterile nullum post se tuberculū producit; Fructiferum uero, praeterquam quod à tergo fructus rudimento sibi annexo comitetur, etiam in medio aliud insigne exerit pensum colo inuolutum æmulans, quod Theophrastus quoq; nouit. Fructus florem sequuntur singuli, longitudine non raro drantali, figura ouata, superficie rugosa, tuberolāq; colore primum uiridi, in maturitate uero aureo, seu citrino, nec solum ouata nascuntur figura, tum etiam globosum consequantur habitum, utrumq; eiusdem est odoris ac foliorū similis. Cortice ambiuntur gustu amaro, feruido simulq; tenui, cui subest caro cartilaginee duræq; consistentiæ, colore candido, aspectu atq; acetoso sapore condite capitatē Brassicę truncos referens, in medio malo cauitas quædam est, succo uehementer acetoso, suis mēbranis contento plena, cui immixta sunt oblonga & semuncialia femina, utrinq; ferē acuminata, cute foris flaua striatāq; intus candido dupliciq; nucleo constantia; quibus amarus, tenuis & mediocriter feruens est sapor praesertim cutis. Nucleus enim dulcedinem quandam admixtam habet, radicibus nititur copiosis & tenuibus; Coelum amat calidum, hyemis iniuriis minime obnoxium, quod si nactum fuerit, flores, adulescentes, maturescentes maturosq; fructus simul producit, non solum æstate, uerum etiam hyeme. Magnus est huius arboris malorumq; eius in regno Neapolitano & Hispania prouentus, feritur etiam in Germania, sed frustra, nihil enim praeter folia producit. Verum frigore siderata facile perit, nisi diligenti cura adhibita, contraq; hyemis sæuitiam muniantur, illatis in tepida cœnacula aut cellarum arbutis, sic enim ad plurimos annos uiuent. Cū fructificat subfructis iugis, hastilibus.

hastilibus furcisq; fulcienda est, ne malorum pondere crescente detracta succumbat, ac fracta prosternatur. Verum hoc in Germania timendum minime est, in qua uix frondes ab hyemis sæuitia uindicari queunt, quantum uis tepidis specubus foueantur.

DE CITRIO, id est, Arancio arbore, malisq; Arangijs. [Vide Lemma præcedens: utem ultimum huius libri.] CAP. XIII.

ARANGIVS, seu Citrius arbor est, Citro cortice, radicibus, aculeis, ramis, folijs, fructuq; similis, multò tamen maior ac singulari stipite seu caudice assurgens. quinetiam flores similes producit, sed pulchriores & multo odoratiores, inuicem subcitrios, per oram uerò limbi purpurascens, differt tantum foliorum singulari forma, fructusq; cum paruitate tum rotunditate. Folia enim quamuis Citreis similia sint tam colore quam nitore, acuminatiora tamen angustioraq; spectantur, & præter hanc notam etiam singulari quodam proprioq; insigni distinguuntur. quodlibet enim eorum posteriori parte iuxta annexum ferè, utrinque incisuram habet, quibus sibi inuicem aduersus constituitur isthmus, quinetiam spina per foliorum dorsum transiens in ipsa angustia iuncturam habet, qua ueluti in binaria folia, singula diuidantur, ita ut posterior eorum pars parua myrthiceq; aqualis sit, uerum obtusa, anterior autem Laurini maioris acuminatq; figuram ac quantitatem habeat. Odor is est quemadmodum & sapor, Citrinorum æmulus, remissior tamen paulò, licet & hæc cinicicum uirus nonnihil redolect. Fructus uiscidem quibus Citrius temporibus producit, rotundos ac globosos, modicè compressos, magnitudine mediocris mali. Colore primùm uirides, in maturitate postmodò fulvus aureiq; fulgoris, cortice, carne & semine constantes. Cortex est crassus & corio similis. Gustu, odoreq; citreos cortices imitans, iucundius tamen redolet, cui subest caro, per longitudinem senis plerumq; aut octonis membranis distincta, uinosa succo plena, qui in altero eorum genere dulcis, attamen aromaticus, uinosusq; existit, in altero uerò acetosus, utrumq; suis dignoscitur indicijs, dulcia superficiali habent glabriorem, leuiorem, mollioremq; corticem: acetosa autem asperiore ac durior. Semina in carne continentur Citreis similia, paulò tamen minora eiusdem etiam cuius Citrea saporis & odoris. Retinet & hæc arbor suas hyeme comas, quemadmodum Citrus, similemque cœli constitutionē, curam, cultumq; desiderat.

DE LIMONE arbore, eiusq; fructibus, id est, Limonibus. [Vide Lemma capituli 12.] CAP. XIII.

LIMON quoq; ex Citri est genere, multò tamen minore ac fruticosiore arbutus, pluribus ab una radice uirgis exeuntibus, cū large fructificat, subiectis hastilibus ac furcis fulcienda est. arbutus, cortices, ramos, uestiunt priorum instar uirides. Folia multò minora producit, piri Cotoneiq; folijs æqualia, rotundiora tantum, densa, uiridia ac glabra. Spinis armatur ueluti Citrius atque Arangius, minime tamen rectis, sed aliquantulum hamatis, multoq; pluribus quam illæ, quo fit ut eius uirgæ ac ramuli ad uncis aculeis quandam rubi imaginem referant. Flores Citrio, figura non dissimiles profert, paulo tamen minores, fructus uero Citreis ac Arangijs aspectu, odore, ac sapore non dissimiles, eorum quadruplex ad nos peruenit genus, primum anserini oui formam ac magnitudinem habet. Odore inter Citrium atq; Arangium malum medio. Secundum globosum existit, minusq; predicto, utroq; capite ueluti eminente umbilico insigne, cætera sui parte tuberosum. Tertium oblongum est gallinarum oui quantitate & figura. Quartum tertio æquale est sed globosum, & superficie magis æquali, omnibus crassior, ac aurei palloris cortex, quæ

lis Arangiis. Odore uehemens, gustu amarus, feruidus ac tenuis. Reliquum corpus caro est, rara cauernosaq; per longitudinem membranis quibusdam intersepta, cui immixta sunt Citriis similia figura odore aut gustu, semina minora tantum, succus per totam carnem diffusus est largus, saporis uehementer acetosi ac dentes hebetant. Radicibus nititur qualibus Citricus ac Arangius. Gaudet eodem coelo cura ac cultu, semper uiuens fructumq; fundens ac florens. Fructus eius omnis generis est ex Italia tum Hispania ad nos uehuntur terra marisq;, partim per se, partim etiam idq; frequentius marina aqua aut alia quapiam muria conditi. Plantam eius in Germania enascentem nullam uidere hactenus mihi contigit.

DE PVNICA malo, de Puniceis malis.

CAP. XV.

T. 3. 42. p. 1037.



PVNICA malus, parua est arbor, E. uonymo, quæ & Anonymus uocatur, magnitudine, cortice, ligni duricia, radicibus ac foliis similis, folia autem multo minora sunt, ac potius oleæ equalia, molliora tamen, obtusioraq;, longitudine sextantem, latitudine uero digitum raro excedente, grauiter cum foetore aliquo odorata, atq; canum halitum, feliumq; urinæ grauculentiam aliquo modo referentia; aculeos in ramis fert oblongos ac subrectos. Flores fert duplicis differentia, hoc est steriles & foecundos, hii à tergo oblonga capita annexa habent, hyosciami uasculis equalia ac similia, eaq; singuli singula, Græcis *κύνινος* nominata, quæ secuturi fructus rudimenta sunt. Illi autem nihil huiusmodi obtinent, sed nudo latoq; calici insidens. Vtriusq; amplitudo rosæ æmula, stipata conferctaq; foliorum densitas. Colore ut plurimum rutilo, ac inter sanguineum roseumq; medio, estq; hic aspectus iucundissimus. reperiuntur etiā candidi, mixtiq; è rutilo & albo coloris. Roseorum autem maior inualuit in Medicina usus. Steriles flores cum ad iustam consistētiam peruenerint, ponte delabuntur, ideoq; Balaustiorum nomen apud medicos habent. Eos eligere oportet densis, rutilis roseoq; colore, foliis confertos, & sanguineo decore aquam inter macerandum coquantumq; tingentes, gustu uehementer adstringentes, qui uero pallidiores fuerint è Medi-

cina excludendi. Non autem Balaustia tantum decidunt, decidunt etiam foecundorum florum capita, hoc est, fructuum rudimenta, quos antea Cytinos appellauimus, pluribus enim foetibus grauata parens, alimentum omnibus largiri nequit, sed robustioribus tantum, imbecilliores autem præcepto à ualidioribus succo destituti à pediculo resoluti delabuntur, qui collecti propter insignem quam habent adstringendi uim, magnopere medicinam instruunt. At qui in arbore remanserūt, pugni magnitudine adolescūt, figura globosi, breuiq; pediculo ramis annexi, pythmene in summo lato, amplo ac dolii plerumq; instar concauo ac profundo, Cortice uestiuntur

uestiuntur duro, crasso, subscabro, foris in obscura purpura subruffo, intus autem flauo, ac substantia, gustu & demigrandi facultate gallis simili, eo continentur oblongi, angulosi, conferti acini, tenui carne, uinoso succo ac semine constantes, ad fatiorum aliquam similitudinem dispositi, numerosis tenuissimisq; membranis distincti, differunt inter se acini colore ac sapore: quidam enim sunt ruffi, quidam, in purpura candicant, quidam etiam cādicant tantum. Sapor aliis acetosus, aliis dulcis, aliis mixtus, omnibus tamen uinosus ac præcipuè suauitatis. Semina acinis singula, acneco figura ac colore similia sunt, minora tamen, forisq; ligneo cortice, intus autem nucleo constant. Inuenitur etiam singulare quoddam huius mali genus, nullum in acinis semen continens, ob id *πύργιον* Græcis dictum, quod rarissimè ad nos peruenit. Cortex priuatim ad Medicinam reponitur, Græcis *ξύλον*, Latinis Malcorum appellatur, qui nunc corrupto nomine passim in Pharmacopoliis Plidia & cortex plidia uocatur. Eligito purum substantia flauum, intus nullo situ obsita cavitare: synceris, minimeq; corruptis aut putrefactis malis collectum. Colitur etiam in Germania Punica malus, magno studio curaq; custodienda, fructum tamen producere nequit, ob Cœli nostratis in hyeme rugorē, gaudet enim calidis regionibus, in quibus minimè seuit hyems. Prouenit etiam temperatis, ideoq; foeliciter etiam in Hispania, Italia ac Narbonensi Gallia fructificat, cum alias in Pœnis nascatur, unde etiam nomen inuenit.

DE PVNICA SYLVESTRIS.

CAP. XLV

PVNICA sylvestris, satiuæ per omnia similis est, incultius tamē, spinisq; horridior, cuius Balaustris ac Cythini in satiuæ punica natis efficaciora sunt. Nascitur in Aphrica ac in Hispania Herculeo freto uicina sponte, Regno hoc ob id Granati cognomento gaudente.

DE FICO ET FICVBVS.

CAP. XLVII

FICUS fruticosa est arbor, magnitudine mediocris sambuci, caudice breui cōtortoq; uirgas ac stolones ab eadē radice emitit plures, ceu geniculatas, crassitudinis diuersæ; cortice uestitur leui, tenui, simpliciq; inferius in caudicibus cineraceo, superius uerò in ramulis uiridi. Materia constat molli, infirma, rara, ampla intus cavitare, cuius inanē crassa fungosaq; medulla ad exemplū sambuci repletū est. Folia habet magna, crassa, lata, tam longitudine quam latitudine, nō raro dodrantalia, in tres partes antrorsum spectantesq; binis profundioribus incisuris diuisa, quarum mediā rectā præ cæteris eminet, reliquæ duæ obliquè ad latera tenduntur, quæ uicinarum à tergo per medium hirsuto neruo dirimuntur. iuxta pediculum utrinq; singulæ aliæ partes prædictis duabus exeunt. Color foliis supernè uiridior, internè pallidior, utrinq; scabricia quadam obsita sunt, inferius quidem mitiore, superius autem asperiore, præsertim cum uersus pediculum ea quis mulceat. Radicibus nititur multis, longis, firmis, lentis, euulsu distractuq; cōtumacibus, multis capillamentis fibratis, colore flauis, atq; rutæ radicibus per omnia similibus, maioribus tamen multo. abundant cortices & folia lacteo copiosoq; liquore, odore ac sapore ad rutam accedente, quemadmodum etiam reliquæ eius partes. Fructus omnis ferè urbana ficus bis producit, æstatis initio unum, autumnū uerò alterum, utroq; simul fouens, sed diuerso tempore perficiens. Flores, ut omnes hæcenus tradiderūt, fert, sed statim parua fructuum rudimenta, quos grossulos aut grossos Latini uocant, pīso aut fabæ æqualia, ea paulatim crescunt, donec piri mediocris figuram ac quantitatem consequantur, cum ad mediā magnitudinem peruenerint. intra se flores (quod fortasse mireris) concipit figura confectis staminibus similes, colore in candido purpurascens, undiq; carne exeuntes, atq; ad mediā fructus cavitatem se



liis immixtum. Tertium in parvis turbinatisq̃ è spartho contextis corbibus, Masiliensium cognomento, à provincia in qua proueniunt dicta, magnitudine cæteris quidem inferiores, saporis uerò generositate superiores. Cælum amat calidum, ac temperatum. Prouenit etiam frigidis regionibus, uerùm multa cura à frigoris iniuria uindicanda, ideo apud nos priorem fructum perficit tantum, alterum frigore præueniente.

DE CAPRIFICO.

CAP. XVIII

CAPRIFLcus syluestris est ficus, urbanae per omnia similis, incultior tamen duriorq̃ grossos fert, quales urbana, sed nunquam maturescentes. liquore manat quàm satius acriore, tam gustu quàm odore. Prouenit sponte in calidioribus regionibus, gaudet montanis, aut alioquin editis locis ac uetustis muris, quos inlanuatis radicibus etiam dirumpit, ideoq̃ copiosus eius est Romæ, ueterum in ædificiorum ruinis prouentus. Vbi equis etiam non ingrati pabulum uirgæ ac frondes eius faciunt. At in Germania nulla penitus sponte exit, cum uix urbanam maximo studio cultam, alere queat, tam difficile est, peregrinas plantas alii quam suo cœlo assuefacere.

DE OLEA, atq̃ Oliuiv.

CAP. XIX.

OLEA inter nobilissimas arbores haudquaquam postremum locum obtinet, cum

dirigentes, quibus singula minutaq̃ succedūt semina, colore flaua, quodāmodo leniter compressa, milioq̃ similia, unde etiam Cenchramides à Græcis dicuntur. Ipsæ ficus liquorem habendum adolescunt lacteum & subacrem, qui maturescēte fructu paulatim in dulcem excoquitur succum, ubi ad maturitatē peruenerint, caruitas eorum tota carne & semine repletur. carne primū constant dura, in maturitate uerò molli gustu, dulci, odore propemodū nullo, differūt inter se colore: quædam enim candicant, quædam rubent, quædam nigricant. Præterea genera eorum adhuc multa nobis nōdum uisa, ideoq̃ potius silentio prætereunda, quam ex historia & relatione aliorum describenda, donec aliquando Christo adiuuante, & hæc ipsi conspeximus. Afferuntur ad nos passarū triplex discrimina. Primum in spartheis magnisq̃ corbibus. Secundum in similibus sportis, sed lautis

T. 3. 5. p. 1061.



quod autem pingue dulcēq; in eo fuerit, oleum appellatur. quod uerō aqueū ac amarum, amurca. Semen oblongum, lignosum, durū, & utrinq; acuminatum, singulis oliuis singulum intra se candidum nucleum claudens, eiusdem figuræ, cuius ligneus cortex. Materia arbori æqualiter spissa, solida, crispa ac intorta, attamen tenera, gustu amarefcēs: colore, inter flauum ac spadiceum serē medio, nōnunquam etiam maculis utriusq; coloris inuicē conuolutis conspersa, præsertim cum ad iustā ætatis consistentiam peruenerit. Radicibus nititur partim rectis, partim obliquis, in summo cespite coherentibus. Materia arboris modō solida: gaudet calidis regionibus, ideoq; in Syria, Græcia, Italia atq; Hispania feliciter prouenit. In Germania uerō, quamuis diligentissimē coletur, nihil præter florem producit, idq; in calidiori eius parte.

DE COLYMBADIBVS.

CAP. XX.

COLYMBades, muria conditæ oliuæ sunt, ab innatando sic appellatæ, conduntur tam immaturæ quàm maturescentes, afferuntur ad nos integræ cum muria sua ex Italia, terrestri itinere, & Hispania per mare, arboris suæ frondibus, ac Thy mi manipulis mixtæ. Eligito solidas, æqualiter flauas, unciales ferē, nulla putredinis macula emollitas, superficiē extantæ, ac minimē rugosas, pediculis adhuc adhærentes. Saporem habent amarum, subacrem, ac propter muriam, salsum, estq; hienō ingratus. Vfus eorum in sanitate cum assatis carnibus est, in delicationibus Germaniæ Gentibus fræquens.

OLEVM est succus Oliuarum, præliope expressus, substantia pinguis, gustu dulcis, eius ad nos tria perueniunt genera, Italicum & Hispanicum, utrumque ex maturis oliuis expressum, atque Omphacinum, hoc est acerbum, ex immaturis bacis factum, assertur tam ex Hispania quam Italia. Italicum frigore facilius densatur, aquosius enim est, colore cum concreuerit in flauo candidum, aspectu subasperum inæquale ac ueluti harenaceum, qualis consistentia à Germanis *Grügelicht* uocatur: gustu dulce ac suauē. Hispanicum contra siue ab Vlisibona allatum pinguius est, aspectu ac substantia æqualius, leuius, tenuius & acrius. Sapore primum dulci, postea uerò fauces aliquantulum sacrificante. Omphacinum quod Latini acerbum uocant, uiridius existit, gustuque adstringit mediocriter. Omni recēti Oleo odor suauis, Hispanico tamē acrior paulo, Omphacino præter suauem quiddam aciditatis redolens. Contra inueterato cuiuscunque generis rancidus & nauseosus non tantum odor, uerum etiam sapor. Atqui omnerecens ac nuper expressum oleum, tria in se continet, oleum, amurcam & fraces, ut paulò ante relatum à nobis est, cū Oleam describeremus. Fraces appellantur fundo insidentes feces, hæc fiunt ex comminuta bacarum carne simul expressa ac fundum petente, sapore subamaro ac subacri. Amurca est aquosus ille succus, ab oleo & fracibus recedens, supra fraces & infra oleum constitutus, tenuior quidem fracibus, ponderosior uerò oleo: ideoque medium inter utrumque locum occupat, ueluti inter aërem ac terrā aqua. Oleum postremò utriusque leuius existit propter aëream pinguemque substantiam, supremū ex hiis locum obtinens, ac omnino similem qualem inter elementa aër. Porro hæcenus simplicis, naturæ ac proprie nominati olei Historiam recensuimus, alibi facticiorum, & ad Medicinam compositorum oleorum rationem tradituri.

DE CITRIO altero. [Vide suprà, Lemma capituli 12.]

CAP. XXII.

EST etiam altera Citrius per omnia similis Citrio, Arangia mala ferenti: fructus gignit Arangiis similes & æquales, multo tamen gratiore, magisque fuluo colore, odore, Arangiis ignauiora multò: sola figura, soloque aspectu gestantium oculos inuitantes. Carne constant Citreis simili, gustu insuauī. Quinetiam in superficie infixorum dentium uestigia habere dicuntur, unde eis Adamipomorum nomen factum est, quo ab Italis cognoscuntur. Colitur & hæc arbor in Calabria, nunc nondum uisa, quapropter breuiter eam percurramus.

DE LARICE, [cuius elegantem picturam Matthiolus dedit.]

CAP. XXIII.

LARIX resinifera est arbor, caudice recto, procero atque Abieti æquali cortice crasso, scabro, fuscoque, ramis supra medium multis folijs capillatis, uallorum instar coaceruatis, longitudine sextante, crassitudine uerò porcinas setas æquantibus, colore in uiridi pallidis, tactu mollibus, teneris, iuxta exortum è singulis ueluti tuberculis, per interualla dispositis, exeuntibus, leniter odoratis, contra hyemē cōtumaribus, nec antequam alia ueris initio succedant, defluentibus: quod ubi contigerit, non uniuersa simul, sed singula paulatim recedunt, aliis successiue ab iisdem tuberculis prodeuntibus, dilapsoꝝ uices occupaturis. Itaque non defluxisse folia, sed noui iuuentutis habitum induisse uidentur: Conos, (qui fructus eius sunt) è ramulis profert paruos, oblongos & ouatos, longitudinis sesquiuncialis, Cupressi galbulis similes & æquales, tenuioribus tamē squamis compactiles, autumno maturi scētes, semen singulis squamis geminū tegitur, admodū paruū, Tedæ seminis figurā & quantitatem referens, foris cinericeo cortice, intus autē candido nucleo cōstans, sapore dulci, & pineā nucem emulante, seminibus annexæ sunt singule ceu alæ, apud siue alterius cuiusdā insecti pennis similes, è dehiscētibus autumno conoꝝ squamis se exerētes, ipsa semina uento dispersa, ut diffusius & rarius spargantur, uehere & impellere nata.

nata. Squamis ex interiori parte binæ sunt cavitates, quarum convexa subitis latissima semina operiunt. Materia arboris est spissa, dura, colore spadicea, ueluti Cedro & Taxo, corruptioni ac teredinibus minimè opportuna, ideoq; seculis aliquot duraturis operibus & edificiis dicata. Resinam fundit larix liquidam, nunquam durascentem, liquidi mellis consistentia, colore flauam, nonnunquam etiam uitream & transparentem, gustu plusquam amarescentem, mediocriter acrem, tenuem, & odoratam, quæ hodie non tantum pro Terebinthina in usum recepta est, uerum etiam solo Terebinthinæ cognomento cognita, quamuis à quibusdam Italis etiam Largatum & Lachrymum, id est, lachryma appelletur. Nasceitur in Alpibus Germaniæ, copiosissima autem circa Saltzburgum regionibus, & Silesiæ Moraviæq; montibus, in finibus Boiohemix. * Lerchenbaum, unde Larigna resina est.

Larix. T. 3. 77. p. 119.

Oleaster Germanicus Cordi uidetur, aliqui Rhamni adnumerant,



DE OLEASTRO Germanico. [Hic fortè etiam cognatus frutex aculeatus, qui circa Rhenum uersus Curiam copiose nascitur, acinis è luteo rutilantibus, acidis: quem aliqui Rhamni speciem esse putant: cuius iconem de nostris addidimus. CAP. XXIII.]

OLEASTER Germanicus, arbor est non adeò procera: cum ad iustam magnitudinem peruenit, quatuor, quinq; aut sex cubitorum altitudine, nonnunquam etiam procerior. Caudice aliquantulum intorto, ramis, surculis, corticis, colore, aculeis, & toto propemodum habitu, sylvestri Pruno, hoc est, Spino pruna fe-

renti similis. siquidem cortice uestitur foris colore spadiceo: aculeisq; armatur longis, fescuncialibus aut sextantalibus, colore ut plurimum cinericeis. Folia totis ramulis furculisq; adnascuntur oblonga, oleæ similia, minora tamen tenuioraq; atq; breuissima, tenuissimaq; lanugine subtus canescentia, superius autem in uiridi cineracea, longitudine sesquiunciam, latitudine uerò tertiam digiti partem æquantia, sapore modicè adstringente, odore nullo. Flores totis ramulis adnascuntur quibus singulæ succedunt bacca, Myrti baccis similes, paulo tamen

maiores, oblongiores, multo tamen molliores, colore primum ^{autumno,} deinde cū ad maturitatē peruenierint, ^{tenui, glabra, fragilique cute & succo} cōstantes. Succus autē triplicē misturam sortitus est: uidelicet oleū, aquam & carnis parū, qui ē baccis expressus in tria medicamēta, ceu oleæ succus seipsum diuidit. Caro enim fundū uasculi petens, in fraces transit gustu adstringētes & acefcentes. Aqua medium locum occupat, supra fraces, & infra oleū constituta, in amurcā conuertitur, consistentia tenuem, sapore ualde acidam acipsum acetum emulantem. Quod autem pingue in hoc succo est, propter leuitatem in summo amurcæ suæ supernat, pinguedine nihil à uerò oleo distans: tenuius tamen, gustu pingue, subacidum & modicè adstringens, odore olei aceto cōmixti. Tota autem bacca digiti contorta, naribusq; admota propter acidam amurcam, magis quàm oleum acetum redollet: quæ uerò tota hyeme in arbore remanserint bacca, si terantur, succum remittunt aspectu & colore [†] post imitantē. Odore aceti ueterisq; rancido oleo cōmixti, corrumpitur enim, putrescitq; gelicidiū in baccis oleum, ut odore tantū abamurcæ inesse cognoscatur. Semina baccis sunt singula parua, oblonga, utrinq; acuminata, pallenti tunicæ inuoluta: aspectu foris fusca, intus uerò candicantia. Radice arbor nititur multifida & diffusa. Materia eius à Spina, pruna, agrestia ferētī, sola mollitia differt. Frondes eius in cubiculum proiectæ mures alliciunt, præsertim siccate. Nascitur circa fluuios & amnes, solo lapidoso arenosq; copiosissima autem in Germania ad Lycum Vindeliciæ amnem, & ad Danubium ab eiusdem Lyci ostio, usq; ad Petreas fauces, per quas Danubius fluit, tribus millibus passuum supra Kelheim oppidum litas.

†
Forte Pus
uel Porst.

DE TAMARISCO *Fœmina*, [*fœminam* uocat eam speciem, quæ latioribus folijs est, medullâ maiore, & ligno minus solido: *Mareh* uerò, cui folia tenuiora, medulla minor, & lignum solidius: qualis apud nos, & Argentorati circa Rhenum nascitur. *Fuchsius* in libro iconum *Tamaricem* *Hyulestem* *fœminam* pingit. *Tragus* non distinguit: figuratamen, quam ex eius libris exhibemus, illi quàm *Fuchsius* dedit, persimilis est.]
CAP. XXV.

TAMARISCVS *fœmina*, masculæ Tamarisco, uirgarum figura, magnitudine, & colore per omnia similis est, folijs eiusdem instar in uiridi cineraceis, indiuiduis, paruis, oblongis & circa ramulos furculosq; totos undiq; frequentibus, isdemq; sursum uergentibus. Flores ueris medio circa quadrantales aut sextantalesq; gracilesq; furculos fert, muscosos, exiles, numerosos, in quina ut plurimum acuminata foliola, stelle figura dehiscētes, colore aut candidos, aut in candido purpurascentes. Radicibus nititur foris colore fuscis. Materia uirgis seu baculis à radice præcisis est, multo quàm masculæ rarior: amplaq; intus & fungosa, medulla inanis & laxa. Saporem cortices, folia & flores habēt adstringentē, simulq; tenuem, & haliū faciliiori respiratione commendantē. Odorem siccate frondes iucundum exhalant. In summa tam qualitatibus, quàm aspectu masculam Tamariscum immitatur. Nascitur secus rapidos & crebris inundationibus tumidos amnes, solo saxoso: copiosa autem circa Lycum & Vertachum Vindeliciæ amnes: præsertim Augustæ & in ripa Danubii infra Lyci amnis ostium, porro in omnibus hisce locis promiscuè cum Oleastro Germanico prouenit, quamuis humiliores, humidiores & magis lapidosos quam Oleaster natales amet. siquidē hic etiā longius à fluuiis solo editiore & tamen plano exit, altissimis inundationibus expolito.

DE

Tamariscus. T. 3. 5. p. 955.

Pseudocrania. T. 3. 26. p. 1004.



DE PSEUDOCRANIA, *Lid est, falsa Corno. Querendum an hæc sit arbuscula, seu frutex, quem à ligni duritiâ, Germani Hartriegel appellât. Plinius Virgam sanguineam appellauit. Eruditi quidâ Cornû fœminam esse cõijciunt, (sed Cordus mox cap. 30. aliam Cornum fœminam describit.) cuius iconem ap-
posuimus.* CAP. XXVI.

PSEVD Ocrania, arbor est quatuor, quinçp aut sex cubitorum altitudine, caua
dice distorto ut plurimum, crassiore quàm ut manu complecti queat, cortice ue-
stita spadiceo, ramisq; pluribus brachiata. Folia habet subrotunda, ac interim in bre-
uem mucronem desinentia, leuissimè per ambitum serrata, rarò sesquiuncia latiora,
figura inter Tiliam, Betulam ac Pirastrum media. Flores pòst ueris initium secus
folia è furculis ramulisq; profert paruos, colore propemodum in herbaceo palle-
scentes, staminibus paucis breuib; stipatos: in medio flore exiguum & oblongu-
m eminet secuturi fructus rudimentum, quod paulatim, relicto post se flore, in
oblongam excrefcit baccam, utrinq; modice turbinatam, & corni fructus modò o-
uatam magnitudine principio uiridè, in maturitate demù Ra-
dice nititur multifida, quoquo uersus distracta. Nascitur in saxosis collibus inter
petras, quales sunt supra Regensburg urbem (quam Ratisbonam uocant) in u-
traque Danubii ripa.



TRIFOLIA
arbor, octo aut
decem cubitorū al-
titudine adolescit,
caudicem habet in-
ferius subscabro, su-
perius autem leui,
ac in cinericeo sub-
uירידי cortice uesti-
tum, circa medium
ramosum. Folijs
plerumq; sextantali-
bus utrinq; acumi-
natis, minime per
ambitū serratis, at-
que in singulis pedi-
culis ad Trifolium
emplum ternis. Flo-
res post ueris prin-
cipium producit, in
do drantalibus, gra-
cilibus atque depen-
dentibus pediculis
numerosos, figura
fabaceos seu papi-
lionaceos, quales in
omnibus legumini-
bus est uidere: co-
lore luteos & geni-
ste floribus similes.
ē quibus singulae
nascuntur siliquae,

longitudine quadrantales, sextantalesue, graciles, & in latitudinem aliquam com-
pressae, semine grauidae: colore, figura, & magnitudine inter foenogracum &
lentunculam medio, gustu subamaro, ac modice cum nausea quapiam adstrin-
gente. Transfertur a quibusdam propter florum decoram speciem in hortos: praes-
sertim Oeniponti, & Francoforti ad Moenum fluuium siti.

* Cytisus quorundam: Laburnum Plinij, & Anagyris altera (maior) Matthioli.

CYTISVS albus sylvestris frutex est, plures ab una radice perennes emittens
uirgas, longitudine cubitales, bicubitalesue, fractu aliquantulum cotumaces,
quibus totis folia adnascuntur numerosa, in singulis pediculis ternia, a tergo breui
admodū ac pilosa lanugine canescentia, dorso elato, ab utraq; parte in mucronem
desinente, carinam referentia: & uulgari alicui Trifolio similia, minora tamen. Gu-
stu suauiter glutinosa & dulcescentia. Flores post ueris initium ab inferiore sui
propemodum parte usque ad summam uirgarum, ē foliorum alis producit ob-
longos, papilionaceos, longitudine sesquiunciales, Fabae floribus similes, colo-
re luteos, sapore immaturi cuiusdam leguminis, ē quorum medio singulae sepe-
serunt,

Effigies hæc Cytisi est, qualis circa Scaphusiam in
collibus nuper à nobis repertus est.



ferunt siliculæ, prin-
cipio hirtæ & inca-
uæ, æstate mature-
scientes, longitudi-
ne ut plurimum se-
xtantales, angustæ
quæ. Semine intus
gravidæ, media fe-
rè inter Fœnogræ-
cum & Lenticulam
figura & magnitu-
dine, gustu uiciæ se-
men imitante. Ra-
dice nititur ligno-
sa, multifida, lōga
& quia frutex est,
perennî. Nasceitur
montanis locis in-
ter petras & arbu-
sta, iisdemq; nō ni-
mîum opacis aut
umbrosis sed poti-
us apricis, copiose
autem Ratisbonæ
ad Danubium sitis
collibus, & præser-
tim eo monte qui
Castein ab incolis
nominatur, inter
urbem ipsam &
Stauffam Danu-
bio imminens op-
pidum, ad sinistra
facente.

DE PSEUDOCYTISO, siue nigro & maiore Cytiso.

CAP. XXIX.

PSEUDOCYTISVS, siue niger Cytifus, prædicto similis est aspectu, ma-
gnitudine & foliis, hoc tamen differt quod magis in rectum adolescat, ramu-
losq; potius furculosos, quàm uirgas è caudice proferat: ligno etiã constat fragi-
liori, cortice & foliis nigrioribus, nec ita in carinæ figuram elato eorum dorso.
Gustu minus glutinoso, floribus quidem luteis, sed breuioribus, & fusco in siliquis
semine. Nasceitur iisdem quibus albus locis. Tubingæ autem in Vuirtember-
geni Sueuia, solus absq; albo prouenit.

DE CORNO FŒMINA. [Vide supra, lemma capituli 16. Corni simpli-
citer, maris nimirum, icon hæc est è Tragi libris.]

CAP. XXX.

CORNVS fœmina, mascula Corno per omnia similis est: distat tamen
ab hac, caudice minus procero, minusq; recto: flore racemoso quidem, sed
r iij

minore, colore in uiridi pallido, seriusq̃ erumpente; baccis austerioribus, & materia minus spissa.

* Cornus est arbor durissimo ligno, Germanicè *Cornlebaum*, & *Hornfirsche*, & *Welscher Firschenbaum*. Nascitur in Hercynia copiosè propè Stolbergam.

Cornus T. 3. 37. p. 1024.



DE COTONEA MALO sylvestris. CAP. XXXI.

COTONEA malus sylvestris, sativæ per omnia similis existit, à qua ramis distat minoribus tantū, caudice assurgit magis recto, iuxta terram minus fruticoso, sed singulari frequentius: eadem numerosioribus scatet floribus, & largius fructificat. Fructus sero perficit, qui etiam sativæ fructibus multo sunt minores,

Nascitur ad radices montium & collium, frequenter etiam inter petras, atque in uinearum sepibus, copiosissimè autem supra Ratisbonam & supra Kelheimium oppidum, petraeis faucibus, in utraq̃ Danubii ripa.

DE THYMELAEA minore. CAP. XXXII.

THYMELAEA minor, parvulus est frutex, plures ab una radice emittens uirgas, longitudine pedales aut dodrantes per terram staturas, lentas, flexiles, &



& distractu contumaces, foliis numerosis, undiq; uestitis, figura oblongis, utrinq; acuminatis, crassiusculis, superius uiridibus, inferius pallidioribus, Oleæ Myrthi q; foliis multo minoribus, ac potius fruticoso Polio similibus, paulo tamē maioribus, gustu glutinosis. Flores, sole Tauri occupate, producit in summis uirgis oblongos, inferius angustos, superius in quaterna folia parua se pandētes, ē purpurea in purpureū atq; candicantem colorem uergentes, densos, confectos, & ab uno principio se in corymbos diffundentes, suauiter odoratos, & mellis aliquē odorem redolentes, diuq; durantes, quibus coronarii utuntur. Floribus singulæ succedunt

Radice nititur longa, candicante, neruosa, lenta, flexili, infragili, & perennis: gustu ad aliquot horas fauces & palatum Coccognidii modo excalescente & scarificante. Nascitur frutescens & muscosis, tam planis quam editis locis, nonnunquam etiā sub Iuniperis. copiosa autem circa Vindelicorum Augustam & Ratisbonam.

DE GENISTA angulosa. [Tragus Chamæspartium nominat. Foliorum in descriptione meminit, quæ icon non representat.] CAP. XXXIII.

GENISTA angulosa, frutex est, cuius ramī in plurimas uirgas diuiduntur, longitudine cubitales, gracilitate iuncea, angulosas, egregiè uirent: cortice uestitas, erectas, lentas flexiles, distractu difficiles, & scoparum modo in densam congeriem stipatas, in quibus folia sunt parua, oblonga, utrinq; acuminata, rutæ foliis æqualia, & in singulis ferè exortibus terna. Flores medio uere, cū humidior annus fuerit, totas uirgas uestiunt, Papilionum aut Pisi florū figura, colore egregiè lutei, magnitudine unciales. ē quibus singulæ excrescunt siliculæ, principio leniter hirtæ, cum ad iustam magnitudinem adoleuerint, ut plurimum sextantales, in latitudine aliquam compressæ, colore nigricantes, intra se semen claudentes lenticulæ similes, minus tamen, colore flauum, consistentia mediocriter durum. Radice nititur multi



fida, nervosa, lenta, flexili & infragili, colore lutea. Totus frutex grauer Sambuci propemodū instar olet. Saporē caudicis ramulorumque cortex, folia, uirgæ, flores, semina & radices habent amarum, ac reliquorum purgantium medicamentorū modo nauseabundum. Folia autumnū exitu amittit, uirgis tota hycme inter niues grato aspectu uirentibus. Nascitur montanis, asperis locis, solo denso, rubricoso, simulque arenoso, ut in Hestia, Sorlandia; nec non planis campis in meretarena & sabulo, ueluti in toto Nurebergensi agro, præsertim circa Lauffam oppidum. Porro silentio prætereundum non est, hunc fruticem in arenosis campis humilem esse, & duos cubitos rarissimè excederet in montibus uerò, ubi densius & asperius solumnatus fuerit, arborefcere: caudice, qui manu amplecti nequeat, quinque & sex cubitorum proceritate, atque tam densa stipari uirgis, ut quantumuis profundas niues sustineat, nec patiatur temerè ad radices usque eas delabi: adeo utiliter uiam & transitum sylvarum eius, niueos fornices subeuntibus præbeant uiatoribus: maximè autem in Sorlandiæ montibus, quibus mirum in modum scatet, & abundat hæc Genista.

* Ginstcr zu Siegen. pabulum optimum pro ouibus.

DE GENISTA IUNCEA. CAP. XXXIIII.

GENISTA iuncea, angulosa & proximè descripta, ramulis, uirgarum rectitudine & uiriditate similis est, tenerior tamen in uniuersum, minimè angulosa, sed teretibus, glabris uenosisque uirgis, foris lento, nervoso, flexili & uirenti cortice: intus autem mani, fungoso candidoque habitu, leuem iuncum per omniareferentibus; folia, tene: & tantum & nuper enata uirgæ habent angusta, utrinque acuminata, longitudine uncialia, numero pauca, ex interuallo plerumque singula, non ut angulosa, in unoquoque exortu, terna: annua uerò & uetustiores uirgæ ramulique, foliis omnino carent, eo tantum loco excepto, quo tenera emittunt germina. Flores quibus singule succedunt, si liquæ prædictæ longiores quidem, sed paulò angustiores, quadrantem ut plurimum longitudine æquantes, semine intus Angulosè simile & æquale. Radicem habet cuius cortex, quemadmodum etiam caudicis & ramorum, gustu Angulosam genistam æmulantur. quin & huius semen gustu, & qualitates illius imitatur, omnes tamen eius partes remissiores sunt tam odore, quam sapore, at extremæ uirgæ & nouella germina nihil graue, nihil nauscosum, nihilque amarū olent aut resipiunt, præterquam herbaceam & insipidam Iunci qualitatem. Nascitur

Seritur

Seritur apud nos à quibusdam in hortis, quemadmodum & in Italia aliquot locis, spectandi tantum gratia.

* *Sparthum Hispanicum.*
Genista luncet.



DE LYCOSTAPHILO MASCULA. [De scemina leges suprâ,

Cap. 3. huius libri, ubi et iconem inuenies. CAP. XXXV.


LYCOSTAPHILUS mascula, arbor est fruticosa, multis circa caudicem stolonibus, quinque aut sex cubitorum altitudine assurgens, caudice brachiali crassitudine, ramis quoque uirgæ & furculi ex interuallo ramulis enascuntur gemini: alterno positu cruciformem habitum referentes, eum in modum dispositi, ut bini semper in singulo exortu sibi aduersentur. Folia habet quatuor aut quinque ut plurimum, unciarum latitudine, uirgineis propemodum similia, in tres partes minoribus incisuris ferratas dissecta, tactu mollia. Flores in extremis furculis, sole geminos intrante, se proferunt numerosi, conferti, latam, densam & corymbaceam umbellam constituentes, quinque subrotundis foliolis compositi, nullis in medio prorsus staminibus, aut staminum siue uestigijs, siue rudimentis, insignes. Colore candidissimi, nullo odore, sed solo candore commendabiles, & nullam secuturi fructus spem promittentes. Materia arboris est rara, fragilis, grandi intus acinani fungosaque medulla perua, ueluti Sambucus & Ficus. In summa tota arbor, radice, caudice, ramis, furculorum ordine, folijs, floribus, materia, corticisque odore, & sapore, Ly

costaphilo foeminae, hoc est, fructiferae similis existit, praeterquam quod masculae flores, nulla in medio, ut foemina, staminum uice foliola habeant. Masculae praeterea nullum fructum deprehendere potuimus, cum foemina etiam hyeme puniceis baccis suis gratum inter niues spectaculum praebat. Nascitur iisdem, quibus foemina, locis: sed in Germania parcius, ideoque in hortos propter florum elegantiam transfertur, praesertim Augustae Vindelicorum, Ratisbonae, ac Nurembergae.

* Videtur esse *Echwelcken*.

DE ANAGYRI. [Tragihæc est Faba inueterata, uel ut alij nominare malunt, foetida. Germanicè Baumbönn. Qui plenius pictum Anagyrin requirit, à Matthiolo petat. CAP. XXXVI.]

Anagyris. T. 2. 14. p. 619.



ANAGYRIS parua est arbuscula, caudice singulari, rimoso cortice, scabritiem quandam referente, qui in uirgas diuiditur rectas, teretes, flexiles, & fractu contumaces. duplici altero, alioque ordine germina ac furculos ita emittentes, ut alterius ordinis furculi oppositorum germinum spaciis ex aduerso innitantur. Folia habet partim oleæ partim Vitici similia, latiora tamen paulo, et Oleæ foliis molliora, utrinque acuminata, supernè uiridia, infernè in cinericeo canescentia, longitudine sesquiuncialia, nonnunquam etiam promissiora, & in singulis pediculis terna. Quod autem inter ea medium locum occupat, aliis duobus cum longius, tum etiam latius existit. In summa, Trifolii alicuius folia imitatur. Flores

quibus succedunt

siliquæ, semina intra claudentes renibus, aut Smilacis satiuæ seminibus similia, minora tamen, breuioraque, & ad minorum fabarum tam figuram quam magnitudinem propius accedentia, superficie glabra, colore inter se diuersa, quædam enim, arbusculæ purpureos, quædam liuentes, aliæ in cinericeo pallidos, fœtus excludunt: omnibus in maturitate ossea est soliditas, ac dentibus prope modum inuicta duriciës. quam non tantum in cortice, uerum etiam in flauo intus carne obtinent. Radice nititur recta,

descendente, plures fibras in obliquum emittente, flexili lentore uirgas æmulante. Fœtorem contrectata manibus, cortices, germina & folia, ædunt fœdum, nauseabundum, Xyridis maioris graueolentiæ non dissimilem. Saporem eadem partes habent ceu pratense aliquod Trifolium, interim tamen ingratum, semina uerò commanducata

* Faba foetida. Baumbönn Tragi.

VAL. CORDI PLAN-

tarum historiæ, liber III, in quo

LIGNORVM, CORTICVM, ET FRV-

Etuum peregrinorum: item peregrinarum radicum & lachrymarum descriptiones habentur.

Quidquid Thuriferis procul Sabæis,
Eoisq; rates uehunt ab oris,
Maurorumq; dat ampla, uasta tellus,
Atq; ex occiduis refertur Indis,
Descriptum modica frotè papyro,
Iste paruulus exhibet libellus.

DE GVAIACO, fortè Trogète, seu Thuita, seu Citro.

CAP. I.



GVAIACVM, lignum est proceræ arboris ex Hispaniola insula, ante quinquaginta annos primum ad nos allatum: cuius non unum genus esse multi arbitrantur: optimum autem ex sequenti descriptione cognoscitur. Caudex huius arboris ab incolis in trunco serra inciditur, cuius diameter plerumq; do drantis aut pedis longitudinem habet, cortice uestitur in candido cinereo: quo detracto, materiæ superfices pallida spectatur, pollicari profunditate. quæ uero intra hunc annulum clauditur nigrior materia, solidæ est, non unum habens colorem, nigricat enim quædã, quædam etiam in spadiceo colore flauescit, quædam præterea omnes istos colores discretos habet, quare in plura genera hoc lignum ab aliquibus diuiditur: eligendum tamen est quod rufum, spadiceum, flauum, liuidumq; colores simul mixtos habeat. Pectines, quibus in longitudinem findi possit, non habet, sed admodum breues, in rectum, obliquum, transuersumq; diuulsos reuersosq; quos Germani lignarii fabri *Widerburstige Schliffen* uocant, densa item, compactaq; est materia, quapropter torno leuigata, polito marmor, uel cornu similis est, & aquæ iniecta quamprimum fundum petit. Radice aut trunco eius inferiori nihil crispus, cum torto ac sinuoso uillorũ discurfu, cuiusuis aceris tuber prouocet, ac etiã superet. Saporẽ habet modice amarũ in dulci, leni & mordicante acrimonia adiuncta.

PRESILIVM lignum, aliquam in materia cum Acere habet similitudinē, colore tamen ruber; inuenitur etiam in ruffo candicans, sed prædictum melius est: crassitudine Guaiaco æquiparatur, pectines habet rectos, ideoq; facile finditur, scabina asperiore in assulas redigitur, quæ in liquorem, quo decoquantur, rubedinem suam deponunt, tinctoribus expetitam, scribendis etiam rubentibus literis aptam, Eligito materiam eius ruberrimam, decorticata ad nos affertur, ut pluiuas uel alias ex industria affusas aquas facilius inbibere possit: hoc enim pacto id quod pallidius est, floridiorem acquirit colorem: quidam etiam lixiuio humectant, facile deprehenditur, purpura scit enim in superficie, intusq; remanente pallore, Saporē habet modicē dulcem.

DE PRESILIO *citrino, id est, Bugia.*

CAP. III.

PRESILIVM citrinum, longi sunt baculi, crassitudine qua ferē manum impleant, rectis per longitudinem descendentibus pectinibus. Colorem habet flavum uel citrinum, dolabris in tenues & fasciis similes assulas scinditur, quæ in aqua decoctæ, luteum uel citrinum remittunt colorem, quo fullones tingendis lanis & pannis utuntur, in gustu ferē nulla qualitate linguam afficit.

DE SANDALO *rubeo, id est, Loto arbore.*

CAP. IIII.

SANDALVM rubeum, peregrinæ & in Aphrica Indiaq; nascentis arboris materia est, crassitudine & pectinibus rubenti præsilio similis, colore multo rubentior & ad nigredinem accedente: huius etiam solidior, & propterea ponderosior est quam illius materia, ideoq; aqua iniecta quamprimum fundum petit. Saporem habet dulcescentem adstringentemq; leniter: odorem uerò nullum fati dignum, tingit hoc etiam quemadmodum presilium, sed gratior profundiorq; huius est quam presilij color. Decorticatum affertur,

DE SANDALO CITRINO. CAP. V.

QVOD uerò Citrinum appellatur sandalum, diuersum penitus à ruffo miselle uidetur, nam gracilius quam illud est, & dissimili constat materia & qualitatibus, sine cortice ad nos affertur, forisq; pallidius est, intus uerò solido, ponderoso, pingui, et si aque imponatur, fundum petente, leni, tenuissimo, nullamq; medullam habente, ligno constat: sapore acri, aromatico, per totum os se diffundente, & ad caput usq; penetrante: colore in flauo rubescente. Odorē habet quemadmodum & saporem aromaticum, iucundum, fortemq;, qui facillimē caput tentet & repleat.

DE ALBO SANDALO.

CAP. VI.

EST & tertium sandalum, quod quidam album uocant, sed reuera nullam habet in colore, quā à citrino dignoscatur, differentiam: inuenitur enim quod magis flauo & profundiore sit colore quam antea descriptum citrinum. Quapropter hac nota non est à prædicto discernendum, sed tantum odore & sapore, hos enim ualde inbecilles, uix perceptiles, & citrino dissimiles habet, magnitudine uerò & materia illi omnino simile est, & similiter decorticatum ad nos affertur.

DE AGALOCHO, *id est, Xyloaloe solida & ponderosa.*

CAP. VII.

AGALOVVM in plures species ab authoribus, præsertim recentioribus diuiditur: quo uerò passim utimur, lignum est duum triumue digitorum crassitudine densum, ponderosum: & aquæ iniectum, fundum petens, pingue, nodosum, pectinibus nō adeo rectis, sed interdum in tuber inuolutis, colore uarium, maculosumq;.

tulosumq̃, nigris, fuscis, & flauis distinctum uenis, gustu acré, amarum & aromaticum: odore, dum prunis imponitur, grato & iucundo: prunarum calore pinguem, rubentemq̃ remittens liquorem, et spumę modo paruas agentem bullas: affertur & hoc decorticatū sandalorum modo. Nascitur in India & Arabia. Quidam hoc Agalochū, lignum Rhodium siue Rhodisium appellant, & Aspalathum esse affirmant, ut Sueffionensis ille Ruellius, sed errat plurimū, uir alioquin doctissimus, & multę lectionis: sunt etiam qui hoc Oleastri lignum esse credant.

DE TARO, id est, Xyloaloe fissili, leni, & aromatica.

CAP. VIII.

TARVM uerò, quamuis Agalochi species sit, & ab Aëtio Xyloaloe appelle-
tur, diuersum tamen penitus à prædicto Agalochō existit. Crassiores liquident
multò est trunco, ut uix utraq̃ manu amplecti possit: materiam, & rectos gracilesq̃
pectines instar fichte habet, quapropter facili in parua etiā frustra finditur: colore ue-
rò ab abiete multū differt: fuscū enim in cinereo existit. Et ut plurimū maculosū,
præsertim si per transuersum incidatur, partim enim fuscis, partimq̃ cæsius uenis di-
stinguitur, optimum erit in quo nigredo superet: pondere etiam prædicto multò le-
uius est, nec aquę injectum submergitur, nisi multis in ea diebus maduerit. Sapo-
rem habet aromaticum, per totum os, ob partium tenuitatem se diffundentem: o-
dorem uerò siue tritu siue prunis impositum, suauissimum: qui à gustato etiam ad
cerebrum ascendat.

DE TARO CRISPO.

CAP. IX.

AFFERTVR & aliud ex India Tarum, prædicto simillimum, leniter sinuo-
sis pectinibus, fluctuanti aceris tuberi simile, colore pallidius, materia rarius,
odore & sapore imbecillius multò. uidetur tamen ex eadem arbore desumptum es-
se, atq̃ à radice potius quàm caudice (nam radices arborum Crispiores plerumq̃
sunt quàm ipsi caudices.)

DE CINAMOMO CHARACIO, id est, usuali. CAP. X.

CINAMOMVM characium, quod nunc ubiq̃ simpliciter cinamomum si-
ue canella uocatur, cortex est rectus, longitudine cubiti aut maiore fistulæ, aut
cannalis modo concauus, colore in fusco rubescens, cuius crassiores & inferiores par-
tes, alio cinereo, tenui & scabriore cortice uestiuntur, qui, quoniam inutilis penitus
existit, deraditur: baculi autem arboris, à quibus deglubitur, pollicis aut digiti cras-
situdine sunt. Saporem habet ualde acrem, nō cum molestia pungentem, sed iucun-
dū, & supra omnia aromata, suauī acrimonia linguam titillantem. Odorem item
suauissimum, siue gustetur, siue alias tritum, aut confractum naribus admoueatur,
spirat. Optima autem est interiora corticis pars tenera, & in longum fissilis: exterior
enim scabrior existit, & remissiori acrimonia, eaq̃ simul adstringente constat. quod
uerò cortice continetur, lignum inutile est, ideoq̃ ab incolis, ubi nascitur, abiici-
tur.

DE CASIA AROMATICA.

CAP. XI.

CASIAE, apud ueteres multa, quemadmodum etiam cinamomi, genera co-
gnita fuerunt, quæ multis seculis iam delituerunt: iam uerò tria rursus afferri
coeperunt. Est autem quodlibet horum cinamomo similis frutex aut arbuscula,
quatuor plerumque, aut quinque cubitorum altitudine, rectis caudicibus & ra-
mis adolefcens, duorum pollicium, aut unius crassitudine: superiores uerò ra-
muli graciliores sunt. Folia habet densa, laurinīs similia, multò tamen maiora, ad
Citri potius folia accedentia, utrinque fastigiata, ternas indiuiduasq̃ uenas per
longitudinem transeuntes habentia, quarum media crassior rectaque est, reli-
quæ

quæ duæ leniter curuatur, & in arcu sinuantur, eæ à tergo eminent, & euidentiores sunt quam intus. Fructus fert laurinis baccis similes, minores tamen & rubentes, calicibus, seu capulis glandium modo insidentes, qui rarissime afferuntur. Cortices uerò eius qui iam afferuntur, longitudine cinamomo characio similes sunt, crassiores tamen & nigriores, præsertim duo priores: quorum unus saporem habet acrem & aromaticum, ueluti si quis cinamomum, galangam & Caryophyllos æquis portionibus miscëat, modicè insuper glutinosum; alter uerò paulo remissior, glutinosum in gustu lentorem instar symphyti, reddens. Tertia species gracilior existit, colore & forma ad cinamomum accedens, cui etiam saporem similem habet, sed remissiore acrimonia & glutinoso lentore leniter adstringentem. Quæ uerò passim iam in omnibus pharmaciopoliis habetur, appellata Cassia lignea, adulterina est, & præsertim diuersa penitus: radicis enim cuiusdã cortex existit, nullum fatu dignum saporem, præter adstringentem, habens. Nascuntur uerò omnes Cinamomi & Cassiæ species partim in India, partum etiam in felici & odorifera Arabia.

DE XYLOBALSAMO. CAP. XII

LIGNVM quod nostra ætate Xylobalsami nomine affertur, tenues gracilesque uirgæ sunt, cubiti longitudine, aut maiores ex uno caudice, minimi digiti crassitudine enascentes, in plures furculos diuisæ, tenui & cinereo cortice uestitæ, gustu lenem & aromaticam acrimoniam resipientes, odore non admodum uehementi, qui dum teritur, uix percipi potest.

DE NASCAPHTHO, id est, Thymiamate. CAP. XIII.

NASCAPHTHVM quod hodie Thimiama, & Storax rubea in pharmaciopoliis uocatur, crassius corticis fragmenta sunt, colore in rufis nigricantia, quæ sola per se aut cum aliis quibusdam ad odores uaporantur: habetque acrem, nec inuicundum in suffitu odorem, gustu nullam ferè qualitatem præ se fert præter siccitatem: estque huius rei causa, quod nimis inueteratum ad nos afferatur.

DE NVCE INDICA. CAP. XIII.

NVX Indica grandis, ouatus & triquetrus est fructus: humani capitis plerumque magnitudine, duplici cortice, nucleoque constans, exterior cortex crassus, carnosus, & nervosis uenis per carnem in longitudinem transeuntibus, plenus est, quod tracto alter subest solidus, lignosusque cortex, oblonga & paulo minus quam globosam speciem referens. Colore propemodum spadiceus, superficie modicè rugosus, obtusiore capite, rotundo foramine peruius, circa quod duæ aliae paruæ cauernæ sunt impressæ, his tribus foraminibus faciei aliquam formam æmulatur, ita ut cauernæ oculorum & superciliorum uicem, peruium uerò foramen oris impleat: in altero capite tres eminentiores anguli, in unum angulum desinunt. Nucleus lignoso hocputamine continetur, totam eius cavitatem proportionaliter explens, cum recens est siccatus uerò in cōcussio cortice uacillat & mouetur. Color ei est in rugosa superficie fuscus, intus uero candidus, substantiam habet mediocriter cartilaginosa, pingue & oleosa, recens gustu dulcem, & butyro non salito similem, inueteratus uerò similis rancidam. Habet hic intus cavitatem, qua maturus, & nuper decerpto fructu exemptus, aquam continet gustu dulcem, quæ successu temporis exiccatur: ideoque ad nos allatæ inanem habent cavitatem, propter quam multum nucleo decedit: nam is incisus, qui concavus est, uix minimi digiti crassitudine cernitur, qui cum siccus est, una cum lignoso & integro cortice bilanci impositus, ut plurimum duodecim, tredecim aut quatuordecim uncias pendet: affertur ex India, detracto plerumque exteriori cortice, cuius nervosæ uenæ torquendis funibus apte sunt. Ligneus autem, et nucleo proximus cortex, argento exceptus, & ornatus poculorum uice, in conuiuia recipitur. Durat aliquot annis propter nucleum soliditatem.



DE CVCI, id est, Nuce Indica minore.

CAP. XV.

NVX Indica minor, quam Theophrastus Cuci appellat, iam descriptæ similis est, multò tamen minor: totus enim fructus tres aut quatuor uncias longitudinerarò excedit, idē superius latior est, quam inferius, ubi pediculo adnascitur, figura triquetrus, foris carnosio uenosoq̃ cortice, intus lignoso cōstans, quo nucleus cōtinetur oblongus in summo quam imo latior, utriusq̃ corticis modo triquetrus, unus tamen angulus harum partium acutus est: reliqui duo obtusi ac teretes, color nucleo est in superficie fuscus, intus candidus, habet etiam in medio cauitatem proportionē toti fructui respondentem, aquoso humore plenum, paulatim cum exiccature euanescentem. Substantia nucleus constat primum cartilaginosa, pauloq̃ duriore quam maior Indica nux, sed cum inueteratus fuerit, cornu soliditate æqua, qui pluribus diebus in calida aqua maceratus teneræ cartilaginis duriciem acquirit. Saporē habet, quemadmodum & odorem subrancidum, uelut maior.

DE NVCE moschata mascula uel maiore.

CAP. XVI.

NVX moschata mascula, colore rugoso habitu, intusq̃ uersicolore uenarum discursu, nuci moschatae similis est, maior tamen, oblongiorq̃, figura atque

magnitudine ferè ad uulgares palmulas accedit, cuius pericarpium, quale sit, nobis nondum constat. Saporem habet subacrem, aliquantulum tenuem & aromaticum, ideoq; contra difficiles partus eam assumunt Venetæ mulieres. Afferitur ex India, non ramen copiosè, sed rarò, cum reliquis aromatis, præsertim nucibus moschat-
tis, casu quodam iis mixtæ.

DE NVCE MOSCHATA. CAP. XVII.

NVX Moschata insignis est fructus, qui totus, cum ad iustum incrementum peruenerit iuglandis, uiride, carnosumq; putamen adhuc habentis, magnitudine cernitur, triplici, cortice, nucleoq; compositus: exterior cortex carnosâ consistētia ac crassitudine uiuenti iuglandium putamini similis est, cui subest alter tenuior, non continuus, sed in partes sectus, colore in flauo rubescens, qui singulari proprioq; nomine olim macer, nunc uerò macis appellatur. Eo detracto apparet tertius colore in fusco purpureus, aut rufus, substantia lignosus nec admodum crassus: intra se nucleum cōtinens subrotundum, oblongum, longitudine uncialem, superficiei rugosum, colore cinereum, intus spadiceis candicantibus, discurrentibus intortisque uenis uersicolore, substantia subpinguem, cum pungitur, rubentem oleosumq; liquorem è plaga emittentem, in contundendo fragilem. Saporem habet quemadmodum & odorem tenuem, suauiter acrem, iucundum, ualde aromaticum & adstringentē, qui nux moschata uocatur, & decorticatus ex India afferitur. Afferuntur etiam integri fructus melle conditi, quos nuper cœperūt adulterare, eius singulis nucleis, uiridi iuglandiū putamini diuiso, impositis, & rursus composito, qui dolus faciliè deprehenditur, mollicia, sapore, & qua diuisa erant commissura, Carnosus enim moschatae nucis cortex iucundum habet saporem, solidioremq; consistentiam, iuglandis uerò austeriorem, & molliorem. Similiter quoq; excipiuntur Limonum & Chebulatorum (quos sic uocant,) conditorum carne, sed hic dolus commissuris deprehendendus est, quoniam condita eorum caro, gustu ferè nihil à nucis moschatae carnosio putamine differt. Medius autem cortex, quem macem uocamus, saporem & odorem habet nucleorum Teda pingui commixtorum, ideoq; amariusculus est, magisque caput tentat. Lignosus postremò cortex, gustu insipidus existit. Eligito nucleos maiores, ponderosiores, solidiores, intus spadicei coloris plurimum, candicantis autem ac pallidi minimum habentes, & copiosorem tenuioremq; liquorem è plaga remittentes.

DE MACE, id est, medio Nucis moschatae cortice.

CAP. XVIII.

DE Mace, seu ut ueteres uocant, Macere, iam in Nucis moschatae descriptione, ceu de parte eius diximus, quare denuo de ipso uerba facere opus nō esset, sed cum singulari nomine appelletur, ac separatim per se solum, ceu sui generis medicamentum ex India afferatur, atq; reponatur, non malè me facturum existimo, si proprium ei & peculiare caput tribuero. Est igitur Macis seu Macer nequaquam exterior, ut hactenus nobis traditum est, sed medius nucis moschatae cortex, inferius ubi pediculo proximus fuit, coniunctus, reliqua sui parte diuisus & inaequaliter dissectus, colore in flauo rubescens, non adeò crassus, substantia ferè cartilagineus, friabilis, & subpinguis cum pungitur, moschatae nuci similem liquorem è plaga fundens. Odorem & saporem habet nucis moschatae pauce pinguiq; Teda commixte. Eligendum est integrum crassissimum, fuluum seu rubentius, copiosorem liquore ex impressa plaga fundens, pinguisimum atq; ponderosissimum.

DE FAVFELE, id est, auellana Indica.

CAP. XXIX.

FAVFEL, quod Arabum Medicorum interpretes, Indicam auellanam nominant, longitudinis uncialis fructus est, inferius sublata basi, tubinata cauernur

cauernula, modicè concauis; superius teretis coni figura in mucronem desinens, qui supra mensam basi collocatus, cauitatem tegit, erectæ pyramidis figuram imitans, foris cinereo aut subfusco colore, tenuibusq; rugis, intus uersicolore uenarum discursu, nuci moschatæ similis. Saporem habet mediocriter adstringentem, odorem uerò nullum fatu dignum. Affertur ex India, sed rarissimè, nec nisi casu aliquo cum aliis aromatis, præsertim Zingibere. Eligito maximos, ponderosissimos & gustu uehementius adstringentes.

DE NVCE STYRACINA.

CAP. XX.

A. *Styracis fructus, uidetur fractus.* B. *Granum quoddam rufum, quod apud pharmacopolas cum Styrace calamite inuenitur.* C. *fructus quidam cum Styrace rub. apud pharmacopolas.*



NVX *Styracina* globosæ figuræ fructus est, mediocris auellanae magnitudine, duplici cortice nucleoque constans, exterior cortex carnosa substantia & in uiridice sio colore, supremum amygdalæ putamen refert, is in maturitate tribus rimis in tres partes dehiscit: alterum lignosum, durum, flavum, aut subrufum corticè ostendens, quo continetur nucleus pinguis, oleosus, gustu acris, odoratus & resinosa Styracis qualitatibus respondens, sed multo acrior, & fauces scarificans: affertur ex Asia minore frequenter unâ cum Styrace. Eligendæ sunt maturæ, recentes, rubescentes & minus rancidæ, uetustate enim nucleirancorem contrahunt propter oleosam substantiam.

DE NVCE VOMICA. CAP. XXI.

NVX *uomica*, qua hodie utimur, fructus planus, compressus, orbiculatus, latitudine uncialis, crassitudine sextam unciae partem non excedens: superficie, in cæsis candida, ad inclinationes splendente; tactuq; propemodum holo serici molliciem habente, breui denseq; stipata lanugine oblitus, quæ derafa, comminuto Amianto similis existit, in medio utrinq; obscurum, ceu umbilicum, parum & uix eidente tuberculo referens, concretionem duplex, atq; in duos orbiculos fissilis. Substantia, seu materia cõ

fiat candida, dura, solida, & infragili, ueluti cornu, tritu & contusu difficillima, nisi arida ramenta contendantur, quæ & ipsa maximo labore uix teruntur. Cũ in duos orbiculos finditur, uterq; in orbis circumferentia exiguum foramen habet, quo continetur germinaturæ, & ex semine hoc fato exituræ plantæ rudimentum: exiguò pediculo, & ueluti paruo Tiliagineo aut Hederaceo, uenoso, dupliciq; folio constans, tam exquisita perfectæq; figura, ut cum uerĩ folii consummata forma de perfectione certet, eius unica tantum pars, hoc est pediculus, prædicto foramine uel cauerna continetur, foliola uerò duplicis fructus commissura, clauduntur. Saporem habet

absq̃ ulla adstrictione, uehementer amarum, ideoq̃ nauseam & uomitum prouocantem, unde nomen inuenit.

DE ANACARDIO. CAP. XXII.

ANACARDIVM oblongus est fructus, aliquantulum planus, & in latitudine quadam compressus, longitudine ut plurimum uncialis, anteriori parte in rotundum obtusumq̃ mucronem attenuatus, posteriori uero ac latiore crasso, angulosoq̃ pediculo adhærens. Colorem habet nigrum & splendentem, formam uero, auium corda aspectu æmulantem, unde etiam nomen accepit, substantia ei diuersa est: intus enim planum candidumq̃ nucleum claudit, hunc ambit reliqua eius pars ceu cortex, quæ incisa, cauernosa & foraminibus, tophi, aut pumicis instar plena est, crassiusculum, uiscosum, glutinosum, lentum, & in ruffo nigro liquorem cauernosis anphractibus continens, cum inueteratus fuerit arefcentem & coagulatum, spumofum, exiccatumq̃ sanguinem, unâ cum cauernulis referentem. Saporem nucleus habet, primum dulcem, mox acrem, & paulatim eò usq̃ adstringentem, donec linguâ, palatû ac fauces planè cõtrahat; melligo uero eius, seu glutinosus liquor, gustu nucleò respõdet, multò tamè asperior est, ac uehementissimè adstringit, adeo, ut fauces in angustiam constringat, & strangulationis periculo respirationè detineat, contumaciter dentibus, linguæ atq̃ palato adhærens, idem paulò largius gustatus aut assumptus, uescentes strangulat & interimit. Eligito nigerrima, ponderosissima, candidum, recentemq̃ nucleum, & copiosiore ac fluidiorem liquorem habentia: durat pluribus annis antequam uetustate corrumpatur. Affertur ex transmarinis partibus ad nos in Europam.

DE BALANO MYREPSICA. CAP. XXIII.

BALANVS Myreplica, quam Arabes granum Ben appellant, fructus est, ut plurimum oblongus, figura triquetrus, colore candidus, aut in candido cinereus: cortice & nucleo constans. Quale autè pericarpium habeat, nobis adhuc incognitum est, nam calice & pericarpio suo exemptus, in Europam affertur. cortex modicè lignosus ei est, interimq̃ fragilis, & propter raritatem leuis, quo clauditur nucleus, proportionè corticis cauitati similis, colore tam foris quàm intus candidus, substantia pinguis & oleosus, in superficie tenui: fungosoq̃ uelamine circumdatus: sapore subdulci, subamaro! & tenui: saliuam, nauseam atq̃ uomitum ciens, præsertim cum intracorpore sumptus fuerit. Eligenda est colore undiq̃ candida, plenum candidum, minimè rugosum, neq̃ rancidum, neq̃ flauum nucleum habens. Affertur ex Syria & Aegypto in Europam.

DE SILIQUA Indica, id est, Cassia fistula, quam ueteres Fabam Indicam uocant. CAP. XXIII.

SILIQUA Indica quæ à ueteribus Faba Indica, à recentioribus uero Cassia foliata, seu Cassia fistula nominatur, siliquaceus est fructus, uiginti unciarum, duorum aut trium dodrantum plerumq̃ longitudine, digitali, pollicari, nonnunquam etiam maiori crassitudine, interdum rectus, frequenter etiam leniter incuruatus, atq̃ figura teres, lignoso cortice, ligneis interseptis, pulpa atq̃ seminibus constans. Cortex illi est tenuis, foris niger, reliqua sui parte pallidus duas cõmissuras uelut futuras habens per longitudinem transeuntes, sibiq̃ inuicè oppositas, quibus, malleo leniter percussus, dehiscit: tota siliqua intus nigra, subliquida, dulciq̃ medulla, seu pulpa repletur, nò tamen continua, sed planis, tenuibus, transversis, ligneisq̃ orbiculis, breui interuallo, distincta, crebroq̃ intersepta: in omnibus interstitiis singula sunt semina, tertiam uncie partem longitudine implentia, latitudine paulò minorâ, cordis figura turbinata, aliquantulum in planum compressa superficie tenus, pallida aut ruffa & nitida, substantia solida uelut cornu, aut cartilago lenta, vulgaris siliquæ non inæqualia aut dissimilia, in quorum commissura, flauum duplexq̃

ceu

ceum folium continetur, germinaturæ & ex terra prodituræ plantæ rudimentum; crassioribus autem siliquis, & pollicem excedentibus nulla insunt semina, rarissime enim illis contingunt. pulpa inueterati fructus paulatim omnino exsiccat: quò fit, ut ad motum intus crepitaculi instar resonent, qualis reicienda est eumentibus, atque eligenda crassissima, ponderosissima, atque intus liquidiore pulpa repleta. Affertur ad nos ex Aegypto & India.

DE CARPESIO. CAP. XXV.

CARPESIV Marboris Asianæ coaceruatus quidam fructus est, cuius hæc est constitutio: pediculi ab arbore exeunt in rotundum, et crassius capitulum desinentes, à quo undique plures exeunt teretes fructus, ut plurimum incurui, deorsum pendentes, figura siliquacei, foris nigri, ac ueluti geniculati, modicæque apparentibus angustis, breui intervallo præcincti, substantia nervosa, uenosa, & propterea difficili distractu, pinguique liquore madida constantes: semina intra se contigua, purpurea, nitida, & gigartis similia: sed paulò maiora claudentes, longitudine plerumque sextantales, paulò longiores, frequentius tamen breuiiores, crassitudine quartam uncie partem æquantes, & nulla commissura neque sponte, neque ui dehiscens. Saporem uenosa eius ac pinguis pars habet acrem, feruidum, aromaticum, & caput tentantem: odorem uerò similiter acrem, uehementem, naris ferientem, & caput implemtem, maximèque si frangatur aut contundatur. Semina gustu iniucunda, & rancida sunt, ideòque eximendum atque abijciendum, cum intra corpus assumendum, aut medicamenti aroma hoc miscendum fuerit. Eligito nigrius, ponderosissimum, pinguisimum, copiosiori liquore friantium digitos inficiens atque perungens, siue à pediculi capite adhuc dependeat, siue ab eo deciderit, nam utrumque simul ad nos ex Syria Asiæque affertur.

DE AMOMO. [*sic uocat Rosam Hierichuntis uulgo dictam, non probò.*] CAP. XXVI.

AMOMVM paruus est & dodrante breuior fruticulus, substantia lignosa, sus ab uno caudice, seu trunco minimo digito graciliore, plures emittens ramulos, qui & ipsi rursus in numerosos cirrososque furculos distrahuntur, in seipso introrsus conuolutos, fractu difficiles, & colore spadiceos. Corticem crassiores eius ramuli flauum, aut candicantem habent, totus frutex contracto habitu uix figuram æmulatur. Semen interiore sui parte conuolutis furculis tectum continetur, copiosum in singulis pericarpis geminum, alioquin circa pediculos numerosum, atque uix modo racemosum, quod in conuoluto frutice uix apparet, qui si aqua aut uino maceretur, extensis humore furculis diffunditur, & undique in latitudinem expanditur, omnes seminum racemulos ostendens, humore autem postea exemptum paulatim exsiccat, & rursus in pristini habitus figuram inuolutis cirris contrahitur. Odorem totus fruticulus habet acrem, suauem, aromaticum, caput replentem et somnum conciliantem. Saporem autem similiter acrem, linguam Carpesii instar mordentem, iucundum, atque aromaticum. Eligendum est recens, integrum, non comminutum, ponderosum, semine flauo aut subrufo adhuc plenum. Affertur ad nos ex Syria, ab ijs qui Hierosolymam religionis gratia hætenus hinc profecti sunt: eoq; ad imposturas suas hucusque usi sunt monachi & sacrificuli, simplici & credula plebecula persuadentes, rosam id esse circa Hierichum, in sancta terra natam, ideò in Natali Saluatoris nostri nocte atq; ipsa Natiuitatis hora, sponte sua, diuinitus aperiri & diffundi, maxima & execrabili impostura hoc mendacium hominibus inculcantes, reuera enim sponte expanditur nunquam, nam quotiescunque, & quando cunque uolueris aperitur, si aqua aut uino perfusum maceraueris, eodem illi quoque modo expansum populo ostenderunt. quapropter Amomum ad nos delatum, ignauum tum odorem, tum saporem habet, cum toties maceratum, in humorem qualitates suas, natura tenues & dissolubiles, deposuerit.

MELLIGETTA oblongus est fructus, & magnitudine, figura propemodum ovo æqualis, folliculo similis, cortice constans uenoso, fractu cõtumaci, subruffo, aut in pallido fusco supernum pythmena, inferius pediculi uestigium habens, intra se nitidis, angulosis, pipere minoribus, superficie ruffis, intusq; candidis seminibus, crebris, fungosisq; mēbranis distinctis & interseptis plenus. Gustu feruidis ut piper & Zingiber, quibus odore etiam nō dissimilia sunt. Cortici nulla ferē in gustu qualitas. Afferuntur ex India, & regno Mellī: cortici exempta eius grana, raroq; folliculo inclusa: eligenda sunt nitida, ruffa, superficie extenta, minimeq; rugosa, solida atq; ponderosissima.

CARDAMOMVM maius, Melligetæ similis fructus est, minor tamen, longitudine raro sextantem superans, superius iuxta pythmena latior, inferius propē pediculum angustior, & ficus aut piri modo turbinatus; nullam cōmissuram habens qua aperiri queat, colore foris in cinereo subruffus, uenoso & distractu difficili cortice constans: intus seminibus crebrō membranulis interseptis ac distinctis. Colore, figura ac magnitudine Melligetæ grani similibus, obtusioribus tamē angulis, plenus. Saporem grana habent quemadmodum & odore ualde iucundum, aromaticum, tenuem, subacrem, ac modicē amarescentem. Cortici nulla est in gustu gratia, ideoq; eo exempta semina ad nos ex Syria & Aegypto afferuntur, quamuis interdum etiam integri fructus, quales iam descripsimus, aduehantur. Eligito grana eius nitidiora, ponderosiora, at odoratissima. Fructus autem integri probantur maturi, hoc est superficiem extentam habentes, undiq; preclusi, neq; ex induritia aperti, neq; teredinibus corrosi, ponderosi, & cōsummati denseq; in se factis seminibus pleni. Errant quotquot dicunt, Melligetam, maius Cardamomum esse, Cardamomis enim tenuis minimeq; feruens, sed gratus ac iucundus est sapor, Melligetæ uerō piperis instar acerrimus: qua de re alibi in scriptis in Dioscoridem commentariis differuimus.

EST etiam aliud Cardamomum, figura oblongum, triquetrum, utrinq; acuminatum, colore in candido fuscum, quantitate grandiauellanæ nuci æquale, maiore Cardamomo minus, minore uerō maius, ideoq; mediocrea nobis nominatum, intus dense in se factis, maioriq; Cardamomo similibus grani plenus: cortice constat prædictū instar, uenoso, sed multo tenuiore, in tribus suis angulis, quibus maturum dehiscit, singulas commissuras habet. Gustu Cardamomo maiori grana eius respondēt. Afferitur & hoc ex Aegypto & India, sed paucissimum, idq; perquam raro, cum utroq; Cardamomo.

CARDAMOMVM minus mediocri per omnia simile est, paulo tamen minus, candidiori, paulo tenuiori cortice, & trium angulorum commissuris dehiscente uestitum, quo detractō semina apparēt dense in se facta, nullis membranulis distincta, maiori cardamomo similia, paulo minora, magisq; angulosa, in ruffo cineracea, atq; tam arctē sibi ipsis coniuncta, ut unum semen figura bubulos renes æmulans, appareant esse. Saporem grana habent ualde aromaticum, tenuem, maioriq; Cardamomo similem, sed paulo tenuiorem. Afferitur & hoc ex Aegypto & India, folliculis suis exemptum, nōnunquam etiam una cum folliculis, idq; copiosius quam maius, solumq; uulgo hodie cognoscitur; maius enim cum parcius aduehatur paucissimis notum est: probatur quod maioris, notas habuerit.

CARYOPHYLLVS immaturus aut minor, exiguus fructus est, in India nascentis parvæ cuiusdam arboris, solidam, ponderosam, duramq; materiam, & lauri folia habentis, vulgo per Europam Caryophylli appellatione cognitus, absq; immaturi adiectione: decerpitur enim, cum floret, cum adhuc est secuturi fructus rudimentum: longitudinem habet transversæ digiti, aut uncia minore, formam vero exigui & obtusi clauis: nam gracili eius corpori latiusculum & quadrangulum capitulum insidet, in angulis quatuor eminentiis dentatum, lacunulæ, aut quadrati alveoli instar, superius modicè excavatū, conuexo, concauq; ceu tuberculo rectum, friatu facili: quapropter hæc capituli pars, non in omnibus Caryophyllis cernitur, cum solidius eorum corpus, fragilius, in tanto itinere atterat. Materia constat cartilaginosa, modicè lignosa, lenta, infragili, tritu difficili tam foris quam intus, in nigro & rubente colore fusca: pinguem, oleosum, tenuemq; liquorem, cum pungitur, e plaga remittente. Saporem habet piperis modo acrem, tenuem, ualde aromaticum, simul adstringentem, & linguam ueluti stupore quodam afficientem. Odorem quoq; aliorum aromatum modo iucundissimum. Probatur nigrior, solidior, ponderosior, & copiosior liquorem ex inflicta plaga fundens. Affertur ut dictum est ex India.

CARYOPHYLLVS maior, nihil à minore differt, præterquam quòd ille immaturus, hic uero maturus sit: relictus enim in arbore sua, quoad iustum capiat incrementum, acerbus seu minor Caryophyllus, in maturum atq; maiorem convertitur, qui hodie ab omnibus tam Medicis quam Pharmacopolis Anthophyllus uocatur, figura oblongus, in medio crassior, magnitudine mediocri auellanae, aut potius Corni uel oliuæ nucleo similis & æqualis, superius quadrangularem pythamena, quam in Caryophyllo, capitulum à nobis dictum habens. Cortice foris uestitur tenui, quo detracto, duplex apparet nucleus, ideoq; in duas partes fissilis, incurua & sinuosa commissura compactilis, ligni aut cornu instar solidus trituq; difficilis; Saporem cortex eius, Caryophyllo minori similem habet, nucleus uero multo remissiore.

FESTVCAE Caryophyllorum, aliquibus fusti, aut fustichi nominati, graciles oblongiq; sunt surculi: quibus ceu pediculis, ipsi Caryophylli adnascuntur, colore & substantia Caryophyllo æquales, gustu uero paulo remissiores, hi ex Caryophyllis separati seorsim ab aliquibus seruantur. Eligantur nigriores, pinguior, liquorem fructuum modo remittentes, odore atq; sapore ad minores Caryophyllos proximè accedentes.

PIPER longum, oblongus est iulus, in India nascentis, gracili pediculo pendens, Coryli aut Betulae arborū apud nos nascentium, iulis similis & æqualis, longitudine plerumq; sesquiuncialis, crassitudine tertiam aut quartam uncia pariter raro excedens, colore ut plurimum cineraceus, aut fuscus, figura teres, in superficie numerosis & paruis eminētibus, ceu uerrucis, obliquis contiguisq; ordinibus dispositis, tuberosus. Semina sub omnibus tuberculis singula latitant, colore foris ruffa, intus candida, figura milio similia paulò tamen minora, nō nisi fracto iulo apparentia, quæ perfecti secuturiq; piperis rudimenta sunt. Saporem habet modicè amarescentē, uehementer acrē, & ignis modò feruidū, non tamen uestigio linguā pungentem, propter excrēmetice, ac nondū percocti humoris copiam, cuius culpa etiā tacilè à teredinibus perforatur. Odorē spirat modicè aromatū instar iucundū. Eligendū est recēs, magnū, solidum, minimè corrosū aut perforatū, pōderosum, seminibus intus, eo quo dictum est modo dispositis, plenum, ac si in aqua decoquatur, aut pluribus diebus maceretur, minimè diffuens: quod uero huiusmodi nō

fuerit, ceu inueteratum atque fictitium reprobandum est: adulteratur enim multis modis quos consulo hoc loco præterimus, ne potius imposturas tradere ac docere, quàm dolos deprehendere, uideamur.

DE PIPERE albo & nigro CAP. XXXV.

PIPER album atque nigrum ex longo fit, dehiscenribus eius iulis, & ab inuicem recedentibus, increfcentibusque, intus contentis miliaceis granis, donec in oblongos racemulos obliquis seminum ordinibus plenos diuisum, quadrantalem, aut maiorem consequatur longitudinem. singulis granis rotunda figura, & Vicie magnitudo est: ita ut duodecim grana perfecta, obolum pendeant, nonnunquam pauciora: frequentius autem plura. eadem principio uirent, quo tempore inter exteriorem, tenuem, extensumque corticem, & nucleum cauitas quædam inanis intercedit, quæ paulatim maturefcentibus nucleis repletur: cum autem ad iustam magnitudinem peruenerint, foris nigra fiunt, & rugis contrahuntur, partimque medullæ contumaciter coherentem corticem habent, quæ nigrum, & simpliciter uocatum Piper sunt: partim uerò non rugoso, tenui, & facile ab extento candidoque nudo, recedente cortice, uestiuntur, quæ candidum Piper sunt. Vtrumque odoratum & gustu acerrimum, feruidissimumque est, odoratius tamen acriusque candidum nigrum sentitur: ideoque medias habet candidum, inter longum & nigrum qualitates: tardius enim longi, citius candidi, citissime autem nigri acrimonia gustu percipitur, quam uis Dioscorides candidum, (que niam acerbum sit) utroque ignauius esse tradat, quàm bene non uideo, cum absurdum quiddam inde oriatur: nam idem noster Dioscorides nigro ignauius candidum ideo esse ratiocinatur, quoniam acerbius, hoc est immatURIUS sit nigro, ergo cum longum quoque acerbius, immatURIUS imperfectiusque sit candido, sequitur necessariò longū Piper omnium esse ignauissimum, ergo uidetur aut hæc ratiocinatio nullum in ueritate locum habere, aut Dioscorides male tradere, candidum tam longo quàm nigro ignauius esse, quæ de re in libris de qualitatibus & facultatibus medicamentorum latius disseremus, in quibus plures huiusmodi controuersias diiudicabimus. probatur in nigro maximum, solidissimum, ponderosissimum, & paucissimis rugis contractum. In candido albissimum, maximum, solidissimum, ponderosissimum, superficie extensum & minimè rugosum.

DE BRESMATE, id est Pipere abortiuo. CAP. XXXVI.

BRESMA siue Brasma imperfectum & uelut abortiuum est Piper, colore & magnitudinem nigro simile, sed inane & ualde leue, gustu quoque nigrum æmulans, sed imbecillius, quod à nostris negociatoribus Gerbelier nominatur, prædictis tribus Piperis speciebus in omni usu, (præsertim in medicina) postferendū.

DE CVBEBIS. CAP. XXXVII.

CVBEBÆ longè diuersi sunt à Carpesio fructus, figura rotundi, & nigro Piperi similes, paulò tamen minores, oblongis rectisque pediculis adherentest colore in cinereo fusci, acui aut cultello puncti, Cariophylli modo liquorem mittentes, qui ab Indiæ, in qua nascuntur, incolis partim cum adhuc acerbi sunt, partim cum ad iustam maturitatem peruenerint, colliguntur: hinc est quod immaturæ leues sint, superficiemque habeant rugis contractam, intus autem in corticis inani concauitate nudo exiguum, flaccidum & tabidum. Maturæ uerò in superficie sunt æquales, extensæ minimèque rugosæ, intus autem cæsis, tritu facili & consumatæ magnitudinis nucleo plenæ ac distentæ, ideoque acerbis ponderosiores. Saporem acerbæ, hoc est, ante maturitatem lectæ, habent ualde aromaticum, acré & mediocriter amarum, subtilem, cum maxima tenuitate ad caput in gustu euaporantem.

porantem. quæ uerò ad iustam magnitudinem perueniunt, gustu minus acres, minusq; amaræ sentiuntur, magnam penetrabilis & uaporabilis saporis partem & ipsæ retinent, imbelliores itaq; acerbis maturæ sunt. Probantur acerbæ, quæ rugosæ, inanēs, læues, & ualde aromaticæ tam gustu quàm odore fuerint: maturæ autem quæ maiores, ponderosiores, foris æquali superficie minimeq; rugosæ, intus plenæ & nequaquam inanēs sint.

DE CARPOBALSAMO. CAP. XXXVIII.

CARPOBALSAMUM quod ad nos fertur, hoc nomine parui, oblongi, & utrinq; acuminati sunt fructus, duplo aut triplo pipere maiores, duplici cortice & nucleo constantes. exterior cortex crassior est, rufumq; in fusco colorem habet, & quatuor euidentes commissuras per longitudinem transeunt, quibus post maturitatem aperitur: exterior uerò tenuior est & candidus, claudiq; intra se candidum pinguemq; nucleum. Saporem & odorem habet acrem, tenuem & ualde aromaticum, inter Carpesium, Cardamomum atq; Cubebas medium. Optimum est grande, plenum, pingue, & liquore Balsami in exteriori cortice plenum, sapote atq; odore uehementissimo. Adulteratur ualde similibus granis, quæ multo imbecillioribus qualitatibus & mediastino septo, per longitudinem nuclei transeunte, à dicto Carpobalsamo dignoscuntur & distinguuntur. Affertur ad nos ex Aegypto, sed ualde inueteratum.

DE CVCVLI fructibus. [Vulgò Cocce de leuant nominant.] CAP. XXXIX.

CADHUC in matre sua herent, habitu, nouē, decē aut duodecim acinis ab uno pediculo corymbi figura dependentibus: nigra, succosa, molliq; carne, lignoso cortice, & nucleo constantibus. quoru caro paulatim, exiccato eius succo, tabescit & rugis cōtra hitur antequā ad nos ē tam longinqua regione perferātur, Singulis acinis siccatis a uellane parue magnitudo est, & rotunda, aliquantulum oblonga figura, & circa annexum modicē renum instar sima. Nucleum habent candicantem, pinguem, sinuoso, contorto, & lignoso distinctum inter septo, sapore amaricantem, subdulcem, & modicē tenuem, quo ad capiendos pisces utuntur. Eligito maximos, ponderosissimos, & candido nucleo intus repletos, nam ad nos allati, ut plurimum inanēs & leuissimi sunt.

*Historie ad
pud Dio-
scoridē;
Theophr-
astum non
respondet.*

DE THAMARINDO, id est, Acacia Indica. CAP. XL.

THAMARINDUS Ceratio, hoc est Siliquæ similis & æqualis fructus est, in India nascens, foris in ruffo niger, splendens, tactu mollis, succosa & melalis despumati spissitudine, liquore plena, per longitudinem neruis uenosa, ac siliquis crassiori carne constans, quo continentur contigua, in angulos & planiciem compressa, cartilaginea ruffaq; aut flaua semina, nigro & friabili cortice uestita: duplicia, duabus separabilibus partibus compacta, in fructus longitudine disposita, magnitudine fabis æquali paruis aliquantulum maiora, ita, ut terna aut quaterna drachmam pendeant. Saporem melliginosus carnis succus habet uehementer acetosum, subdulcem & adstringentem. Caro autem gustu succo respondet, ignauior tamen minusq; dulcis existit, quamuis fortius quàm succus adstringat. Semina postremo uehementius etiam carne adstringunt, paululum acetosæ qualitatis habentes, dulcedinis uerò nihil. Orientales populi expresso eius succo ceu præstantissima parte, in medicamentis utuntur, nobis carnem & semina, hoc est abiectas reliquias mittentes: probatissimi in nigro purpurei, succosi, non tamen aceto perfusi, atq; ualde in gustu acetosi.

MYROBALANVM tam Græci quàm Latini auctores sex minino generis re proferunt, cum à Balano tæminini generis nomine uocabulum hoc compositum sit: posteriores uerò, & barbari, grammaticis præceptis non satis instructi, atque bonos auctores neque curantes, neque obseruantes, ad hunc usque diem masculinum genus eis tribuunt, quarum tres tantum differentias uetustiores Arabes medici tradiderunt, uidelicet Indas, Chebulos & Citrinas, de Belliricis ac Emblicis seorsim, ceu sui generis medicamentis differentes: recentiores uerò etiam hos duos fructus Myrobalanis annumerant, quinque earum differentias colligentes, quas hoc disticho comprehendunt. *Myrobalanorum species sunt quinque bonorum, Citinus, Kebelus, Belliricus, Emblicus, Indus.* Reuera autem neque Belliricus, neque Emblicus ex earum numero sunt, cum nullam habeant in figura cum Balano, hoc est, glande, similitudinem: glandes enim oblongæ sunt: hi uerò fructus duo, globuli modo rotundi. At quoniam similiter Myrobalanis adstringant, uenti enimque aliquantulum comprimendo subducant, ac lignosos, ut ipsæ, habeant nucleos, uisum est recentioribus, hos quoque Myrobalanorum generi adicere, quorum uestigia nos etiam sequemur, eodem ordine eas descripturi, sumpto ab Inda principio, cuius etiam Plinius in Palmularum enumeratione meminit. Porro una eademque a bor omnes tres Myrobalanorum differentias gignit, ex quibus Inda seu nigra, acerbis, immaturus, & adhuc adolefcens fructus est, ideoque nullum intra se nucleum habet, sed quoddam cavitatis secuturum nucleum excepturæ rudimentum: magnitudinis est incertæ, quoniam tam intempestiuè, quàm tempestiuè colligitur. Hinc est quòd aliquæ earum unciam, aliquæ etiam sesquiunciam longitudine excedant. Colorem habent foris in uiridi fuscum & pallescentem, qui tamen non nisi in absterisæ et Iota apparet: nam cum copiose afferatur, inuicem confricantur & atteruntur, detritoque sibi fusco puluere, in nigrum colorem tinctæ conuertuntur, figuram habet Oliuæ & utrinque turbinate. Carne constat densa, solida, ponderosa, dum confringitur splendete colore nigra aut fusca, gustu uehementer adstringente, aliquantulum acida, subduli, tenui, saliuam prouocante, ideoque sitim arceate, & oris halitum commendante. Odores nullum fatu dignum siccata spirat. Eligito neque minimas neque maximas, sed mediocres, longitudine uncia paulo breuiores, aut ad summum unciales, pondere trilobulares aut 2 3 nonnunquam excedentes, simulque densas, solidas, intus nigerrimas, & splendentes: foris autem in citrino & fusco colore, si abluantur, uirescentes: minus rugosæ, nulloque aut admodum exili & compresso cavitatis rudimento inanes,

DE MYROBALANO CITRINA CAP. XLIII

MYROBALANVS citrina ex Inda fit: relicta enim in arbore sua Inda quoad increseat & maturefcere incipiat, concepto intus lignoso semine, in eam quam citrinam nominauimus, euadit: longitudine sesquiuncialis est et nonnunquam maiorem, crassitudine uerò media & tumentis parte digitalem, utrinque in mucronem desinentem, quinque angulis per longitudinem transeuntibus inæqualem, modice rugosam, tenui cortice, densa solidaque carne & semine constantem. Corticis color est citrinus: carni ex citrino ad rufum uergens. Semen eius lignosum, candidum, angulosum, rugosum, scabrum, ualde durum, figura oblongum: corni semine duplo, triplo, aut quaduplo maius, intus candidum oblongum, utrinque acuminatum nucleum tenui, pallidaque cuticula uestitum claudens, figura & sapore Pinei nucleo simile. caro gustu Indæ respondet. Probatissimæ sunt maiores, maxime citrinæ minus rugosæ, densæ, crassæ, & in fracturis splendentes subrufæque carne, minori que semine prægnantes, & pondere duas drachmas et scrupulum æquant.

DE MYROBALANO CHEBVLO CAP. XLIII.

CHAE Bula appellata Myrobalanus fit, cum citrina ad consummatam maturitatem peruenit, quæ Citrinæ figura, carne, semine & nucleo per omnia respondet

respondet, maior tamē est, mollioriq; crassiore, & minus fragili carne constat, colora
re tam foris quam intus nigra, gustu citrinae aut Indae simili. Eligantur maximae,
ponderosissimae: foris, cum abluuntur in citriho puniceoq; colore nigrae, carnem
crassiore, nigriorem, lentam, mollem, & fractu ob succi copiam difficilem habentē
testad trium drachmarum pondus quam proximē accedentes.

DE MYROBALANO Bellirico. CAP. XLIII.

MYROBALANVS quae Belliricus appellatur, a praedictis tribus differt,
in alterius generis quam illae, arbore nascens, figuram habet rotundam aut
modicē oblongam, superficiem fuscā, aequalem, in longitudine quinque ut pluri
mum angulis distinctam, magnitudinem uerō maioris gallae, pondere quatuor aut
quinque scrupulos superans aut aequans, tenui carne, & magno, lignoso, duroq; feti
ne constans. Chebuli semine multo maiori, drachmę pōdus leuante, & intus oblon
go, acuminatum & auellanae propemodū aequalem nucleum claudentē. Saporem
caro eius habet proximē ad praedictarum Myrobalanorum qualitatem acceden
tem: substantiam uerō illis rariorem. Eligito maiores, ponderosiores, solidioriq;
carne constantes,

DE MYROBALANO Emblico. CAP. XLV.

MYROBALANUS appellata Emblicus, suum peculiare & proprium genus ha
bet, etiam a Bellirico diuersum: magnitudine Bellirico cedit, eadem nun
quam integra affertur, sed in fragmina diuisa & dilapsa: habet enim eius caro sex in lō
gitudine commissuras, quibus cum maturuit dehiscens in totidem partes dilabitur,
quae singulae adhuc in binas partes digitis findi queunt, crassitudine mediocri, ha
bitu contracto, & aliquantulum rugoso, colore cinereo aut fusco. Totus fructus sub
commissuris singulas cauitates habet, quarum uestigia in fragmentis apparent. Se
men in medio est lignosum, durum, paulo minus quam rotundum, colore subruf
um, aequale, minimē rugosum, paruae rotundaeq; auellanae aequale: sex angulis &
commissuris compactile, & in totidem partes secundum longitudinem fissile, qui
bus singuli insunt nuclei figura oblongi & triquetri, ligneo, tenui, & tamen
duro cortice, intus autem medulla constantes. Saporem caro eius Indae Myrobala
no aut Chebulo similem habet, Eligito fragmenta eius maiora, solidiora, pondero
siora, & minimē rugis contracta.

DE PISTACIIS. CAP. XLVI.

PISTACIAE, quas alii in neutro genere Pistacia uocant, in Syria natae nucēs
sunt, amygdalinis fructibus minores, pincis uerō nucibus paulo maiores, du
plici cortice & nucleo constantes, figura oblongae, superius acuminatae, inferius pe
diculi, cui adhaeserunt, uestigium seruantes, ab una parte tumidiore & in angulum
desinente uentre protuberantes, una commissura, per mediam anguli longitudinē
transcunte, cum maturuerunt dehiscentes. Exterior eius cortex carnosus, modicē
rugosus est, supremo amygdalae putamini substantiae, & colore similis, qui facile a
maturis fructibus recedens, interiorem ostendit corticem. Colore candidum, su
perficie glabrum, substantia durum, lentum, fractu contumacem & ueluti osseum,
qui intus barbatę, ruffaeq; auellanae nucleo, similem & aequalem nucleum continet;
substantia tenerum, pinguem, colore in flauo uirescentem, rubenti cuticula uela
tum, gustu dulcem, ualde suauem, tenuem, orisq; halitum commendantes. Eligito
maximas, ponderosissimas, candidissimas, sponte sua modicē dehiscente commissu
ra plenum, recentem, & neq; prancidum, neq; rugosum, neq; situ oblitum nucleum
ostendentes: quae autem ab hiis notis, uel ab aliquibus earum recedunt & discre
pant, inutiles sunt, neq; medicamentis intra corpus sumendis, miscendae, sed liuores
exictu curantibus, confectionibus relinquendae.



DE AMYGDALIS minoribus.

CAP. XLVII.

AMYGDALAE minores, uulgaribus proportionaliter per omnia similes sunt, quibus etiam sapore & facultatibus respondent: multo tamen, hoc est triplo aut quadruplo minores existunt, eadem in duplicem differentiam diuiduntur, una enim amaras, altera uero dulces nuces producit. Afferuntur adhuc putaminibus suis inclusæ cum Gallis Asiaticis atque aliis medicamentis ex Asia aduectis.

DE PERSICIS minoribus.

CAP. XLVIII.

PERSICA minora ab Armeniacis differunt: nostratibus per omnia respondent: multo tamen minora sunt, ut ex nucibus æstimare facile quis potest, quæ cum a uulgarium nucibus lignosa substantia & scabra, cauerno scilicet habitu nihil differre possent, duplo tamen aut triplo minores sunt paruis, & ex Asia uenientibus Amygdalis. Saporem & qualitates uulgaribus easdem habent.

DE IUIVIBIS seu Zizyphis.

CAP. XLIX.

IUIVBAE, quæ Grecis Zizypha uocantur, ab Oriente in Europam inuectæ, arboris poma seu baccae sunt: Corni baccis sanguineo & splendente foris colore, ob longam figuram & singularem intus ligneoque semine similes: aliquantulum tamen maiores,

& ad

& ad mediocriſ pruni aut oliuæ magnitudinem accedentes, leui, molli, glutinoſa, guſtuq̃ dolci pulpa ſeu carne conſtantes, in medio ſingulare, ut dictum eſt, ſemen continentes, utrinq̃ acuminatum, foris duro ligno, intus oblongo, alſquãtulum compreſſo & ruſſo nucleo conſtans. Afferuntur ex Italia ad nos ſiccata, ideoq̃ ruſſa ſæ. Eligito maximas, plenas, recentes, molles, nec adeo rugoſas.

Iuiuba. T. 3. 36. p. 1023.

Myxa. T. 3. 35. p. 1011.



DE MYXIS. CAP. L.

MYXAE uel Sebaſtæ, quas hodie Sebeſten appellant, & ipſæ è Syria tranſlatæ in Europam, arboris fructus ſunt, Iuiubis aut cornis ſimiles & æquales, orbiculato calici ceu adnexæ inſidentes, foris nigri, intus lentæ, glutinoſa, uiſcoſa guſtuq̃ dolci carne conſtantes, in quorum medio ſingulare eſt ſemen, Corni ſemini æquale, modicè planum, foris duro ligneoq̃ cortice, intus dolci nucleo compoſitum. Eligito maiores, & natiuo lentore madidas, uiſcoſas, & adhuc orbiculato calici ad hærentes.

DE IUIVBIS minoribus, quas Plinius Tuberes nominat. CAP. LI.

IUIVBÆ minores, Plinio tuberes appellatæ, colore, nitore, carne, molli
u iij

lentore. Sapore & nucleo maiores imitantur: his tamen minores, nec oblongæ, seu rotundæ atque similiter flaccidæ. Eligantur maiores, ponderosiores, minus flaccidæ, & plenior carnem habentes. Afferuntur hæ quoque ex Italia.

DE FOLIO CASIAE CAP. LII

CASIA omnis aromatica, maximam habet cum Cinamomo similitudinem, ideoque folium quod hodie pro Malobathro in usu est, & simpliciter folium, magno errore uocatur, Cinamomi folium à plerisque etiam doctis esse creditur, sed male: est enim à Malobathro penitus diuersum quemadmodum etiam à Cinamomi folio, nam sine dubio à uiliore & non adeò efficaci Casia producit, quod pediculi eius sapor manifestè indicat, qui planè rubentem & glutinosi saporis Casiam refert, & nequaquam Cinamomum. Est autem figura oblongum, utrinque mucronatum, speciosum, densum, crassum, atque interiori sui parte glabrum, nitidumque: posteriori autem tribus eminentibus neruis ab uno mucrone ad alterum transcurrentibus exaratum, quorum medius crassior est, rectaque extenditur, reliqui uerò duo qui utrinque sunt, in arcum flectuntur, utrumque folii limbum sequentes: nullus enim tortuosus, aut in ramulos diuisus est. Magnitudo foliorum non est eadem, plerumque tamen quinque, sex aut septem uncias longitudine æquat, latitudine autem tres, aut circiter. Colorem habet in cinereo & pallido, cum ad nos peruenit uirescentem; saporem uerò glutinosum, tenuem, aliquantulum subacrem, & quandam Cinamomi gratiam respicientem. Odorem quoque subacrem, aromaticum modo iucundum, ueluti si quis Piperis & Cinamomi odores commisceat. Eligito recens, densius, crassius, maturus atque integrum, quod tam gustu quam odore proximè ad Casiam accedat. Fragmenta uerò & friatorum puluerem, medicamentis ne commisceas.

DE FOLIIS CARIOPHYLLI CAP. LIII


CARIOPHYLLI folia densa sunt, crebrisque & tortuosis uenulis exarata: figura autem & magnitudine tenuifoliae Lauri folia imitantur. Colorem habent iisdem paulò fusciorum; odorem uerò ac saporem Cariophyllorum, sed remissiorem. Eligito quæ maiora, crassiora, firmitiora integraque sint: friata uerò in puluerem, aut fragmenta eorum uitanda. Afferuntur cum Cariophyllis, sed rarò.

DE SCHOENO, uel Schoenuanto. CAP. LIIII

SCHOENVS hoc est teres odoratus iuncus, hodiè corrupto uocabulo Squinantum appellatus, in plures species diuiditur, natalibus tantum diuersas, quidam enim in Nabathæa, quidam in Arabia reliqua, quidam etiam in Lybia, prouenit. Is autem qui ad nos affertur, qua regione natus sit nondum comperit: est autem aspectu nostri lunc tenuiore non adeò dissimilis: sed colore differt in candido subruffoque purpurascente, neque simplici tunica fungosam medullam continet, sed multis tenuibus inuolutisque in teretem habitum tunicis totus constat, quorum medio caulis emicat gracilis & teres, in summitate purpureis flosculis plenus, qui rarissimè in Europam aduehuntur, cum à Camelis prærodantur, quod Galeno etiam cognitum fuit. Festucas, quas inuolutis tunicis constare diximus, ab una radice numerosas emittit, inferius crassiores, superius tenuiores, longitudine dodrantales aut pedales: radicibus nititur tenuibus, lentis & lignosis. Sapore stipulae seu festucae habent feruidum, tenuissimum, ualde aromaticum, & Pulegio per omnia similem, multò tamen uehementiorem, atque optima arte destillatam Pulegii aquam respicientem. Odorem quoque inter Rosas & Pulegium mediū, estque hic suauissimus. Eligito integrum, longum, plures stipulas ex una radice proferentem, non candicantem, sed rubentiorum, intus purpurascens, superius in tenuiori coma in ruffo purpureoque colore cineraceum, sapore feruidissimū, tenuissimumque, & odore uehementissimum.

Schœnus.

Nardus Indica.



DE NARDO INDICA. CAP. LV.

NARDVS Indica à Syriaca & Gange nite nullam habet genere differentiam, natalibus tantum distinguuntur, siquidem omnes in uno eodemque monte gignuntur, ex quibus Syriaca in occidentali eius parte, Syriam respiciente, Indica uero in Orientali parte ad Indiam uergente nascitur. Indica in duas species diuiditur, quarum una in ipso monte prouenit, altera uero in radice montis, non longè à præterfluente Gange nascens. Odore uirosior, atque in monte nata ignauior. Hodie autem hæ nardi species ad nos indistinctæ, iisdem saccis aduehuntur. Planta eius tota qualis sit, nobis nondum constat, pars uero ea quæ Nardi aut Spicæ appellatione affertur, radicis caput est, aliqua radicis portione, et foliorum caulisque

lentis, uenosis, neruosis, capillatis, & in spicæ figurâ intricatis reliquiis ac uestigiis constans, colore in fusco rubens. Saporem radix habet amarum, tenuem, acrem, aromaticum & Celticæ nardo similem. Odorem uero inter Celticam Nardum atque Schœnum, medium. Spica autem radici insidens eandem qualitates habet, sed multò ignauiore saporem. Eligito singularem aut unam atque alteram spicam una radice ferentem, mediocrem, hoc est, neque maximam neque minimam, densam, non in uillos distractam, ponderosiore, rufam, subfuscam, gustu amarissimam, tenuissimam, aromaticam atque odoratissimam, tam spica quam radice, longiorẽ radicis partem habentem. Fragmenta autem friatumque puluerem medicamenti ne misceto.

DE NARDO CELTICA seu Saliunca.

CAP. LVI.

NARDVS Celtica, quam Latini Gallicam, atque Saliuncam Germanico nomine appellant, odorata, aromatica & admodum breuis herbula est, coliculis sesquiunciali aut sextantali, paruis, oblongis, in cinereo pallidis aut flauis sursum uersis, & sibi squamarum instar superiacentibus tunicis, ceu foliis, obliato, in terra plerumque iacente, & cuius summitate terna, quaterna, quinque uice oblonga, tenuia, uenosaque folia, colore lutea, inferius admodum angusta, superius latius

Nardus Celtica.



scula, longitudine sesquiuncialia aut sextantalia, quæ cum deciderint, singula uestigia & reliquias post se relinquunt, foliaceas coliculi squamas, seu tunicas constituentia. Radice nititur tenui, oblonga, fusca, fibrata, uillosa & Azaro simili, tenuiori tamen, quin etiam ex inferiore coliculi parte terræ incumbenti, fibras & radículas demittit. Odorem habet grauem, uehementem, latè spirantem, uestes bono halitu commendantem, Cyperum & ueluti situm redolentem: estq; hic admodum iucundus; quibusdam tamen fastidium, ob nimiam odoris, caput leniter agrauantis uehementiam. Saporem radix & coctum habent amarum, acrem, tenuem, aromaticum, halitum oris commendantem, & diu in gustantis palato peruerantem. Squamosæ autem foliaceæq; tunica & flores, neq; odore, neq; sapore fatu digno, commendantur: ideoq; hæ partes medicamentis non sunt miscendæ. Nascitur apricis Germaniæ alpihus copiosissimè: quemadmodum in Norico & Istria, ubi ab incolis una cum radicibus uellitur, & in manum complentes fasciculos ligatur, qui deinde per totam Europam à Pharmacopolis & mercatoribus comportantur. Eligito fasciculos maiores, radicum & florum plenos: hæ enim partes recentis signa sunt. Paleacea eius fragmenta, friatumq; puluerem medicamentis intra corpus sumendis ne admisceas.

DE CRETHAMO marino, uel Crethmo ueterum.

CAP. LVII.

CRETHAMUM marinum, siue Crethmum à ueteribus dictum, umbellifera herba est, caulem ab uno radicis cespite, unum atq; alterum aut nonnunc quam plures emittit, longitudine pedales, aut proceriores, graciles, geniculatos, aliquantulum solidos, teretes, intus fungosa tenuiq; medulla plenos, pediculos è geniculis singulos producit, aliquoties in ternos minores pediculos subdiuisos, superiores atq; extremi singuli terna habent folia, longitudine uncialia, aut sesquiuncialia, figura angusta, utrinq; acuminata, crassa, portulacæ modo pinguis, & in ruffo uiridique colore albescens, gustu aliquantulum salsa. Flores in umbellis ramulorum summitatibus insidentibus, fert paruos & candidos, quibus succedit oblongum, teres, modicè angulosum, duplex candidumq; semen, Smyriniæ aut Libanotidis albæ semini æquale & simile, foris molle, intus cartilagineum ueluti nucleum habens. Radice nititur ab uno capite in duas tres aut quatuor longas & teretes partes diuisa, crassitudine ferè digitales, colore candidas & perennes, gustu subacres, dulces, tenues & suaves, ueluti si quis pastinacæ satiuæ, & Crethami agrestis radicem sapores misceat. Semen quoq; subacre & suaue est quemadmodum radices, tenuioribus tamen partibus constat. Nascitur maritimis saxosisq; locis, in lapidum rimis ac commissuris, plurimumq; maritimis Liburniæ partibus.

DE

Crethamum.

Rhabarbaricum.



DE RHABARBARO seu Indico. CAP. LVIII.

RHABarbarum seu Indicum grandis est radix, herba cuiusdam Rumici cognata, crassitudine utramque interdum manum complens, foris undique fusca, intus uersicolore, Aceris aut Alni, aut Betulae tuborum modo in crispum habitum intorta, conuolutaque carne constans, pondere leui, fungosa, partim flaua, partim candicante & croceis, puniceis rufisque uenis distincta, gustu mediocriter amara & cum glutinosa lentore aliquo adstringens, eadem humorem in quo maceratur croceo pallore tingit, Eligito propter natuum humorem ponderosum, intus multis rubentibus uenis interdemque peruersicolorem carnem sparsis, plenum, odoratissimum, quod minime teredinem senserit, neque antea maceratum fuerit. Affertur ex India, per transuerfum in partes, seu crassiores orbiculos secta.

DE CENTAVRIO MAIORE. CAP. LIX.

CENTAVRIVM maius, quod hodie in omnibus Pharmacopoliis, & a cunctis Medicis Rheu siue Rhaponticum appellatur magno errore, insignis herba est, caule interdum ferè tricubitali, multis adnatis ramoso, toliis magnis luglandi equalibus, colore uiridibus, per ambitum aliquantulum incisus, flore in oblongis ac subrotundis capitulis capillaceo, in caeruleo colore purpurascente, semine pap^a



posæ florum lanugine inuoluta, in capitulo molliter collocato, duro, anguloso, colore candicante simulq; liuido, ac Cnico per omnia simili, paulo tamen maiore. Radice nititur grandi, sæpius bicubitali, crassitudine sextantali aut sesquiunciali, nonnunquam etiã multo crassiore, & manum complente, recta, singulari, in nullas partes distracta, instar logi teretisq; pali in terram acta, foris fusca, intus rubescente, densa, pœderosa, æqualiter carnosa, et circulos, cum per transversum inciditur, sibi superinductos plures habẽte, quibus singulorum annorum incrementum, ac uniuersa eius ætas colligitur: copio

so, ruffo, substantia pingui, oleoso, simulq; fiscofo & aquæ innatante liquore plena, eundemq; copiosiore exterioribus è circulis fundente, gustu leniter acri, cum leniore aliquo modicè adstringente, subdulci ac aliquantulum tenui, cuius usus est. Eligito recentem, hoc est plenam, solidam, ponderosam, liquidiore liquore manantẽ, à uermibus minimè corrosam, & cum frangitur, Rhabarbari instar uersicolorem, propter pallidam simulq; ruffam substantiam & rubentem liquorem in longis porosis angustisq; cauitatibus contentum. Nascitur montanis, apricis & frutetosissimis, solo pingui, copiosissimaq; in Italia monte sancti Angeli, unde ad nos à nostratibus Agrytis eò proficiscẽtibus affertur. Nascitur etiam in Germania, sed uiribus in Italia natæ, cedens.

DE COSTO ALBO seu Arabico.

CAP. LX.

COSTV Salbus seu Arabicus, maiori Centaurio similis radix est, ut plurimũ tamen minor, densa & candida : quæ per transversum in partes secta ex Oriente huaffertur. Inulæ campanæ instar subruffum liquorem continens, roscidis guttulis per substantiam eius dispersum. Saporem habet uehementer cum aromatica gratia feruidum, & sub amarum, odorem autem ualdè acrem, aromati similem & nares ferientem. Eligito solidum, candidissimum, plenum & minimè teredinibus corrosum. Sapore & odore acerrimus & suauissimus, hæc enim recentis notæ sunt: nam plerumq; ualdè inueteratus affertur, nunc autem rarissimè

simè aduehitur, sed loco eius acerrimæ herbæ radix, ipsius uidelicet Thapsiæ maioris in Italia nascentis, & præterea Inula in oriente nascente, ueri Costi modo in tasleolas aut orbiculos secta, de quibus radicibus mox agemus. Dolo uerò ab iis facile deprehenditur, qui Enulæ nostratis figuram, substantiam & qualitates probe perspectas & cognitas habent.

DE COSTO flauo uel Syriaco.

CAP. LXI.

COSTVS flauus, qui à ueteribus Syriacus appellatur, candido seu Arabico per omnia similis est, maior tamen & ad Centaurii maioris radicem propius accedens, siquidem colorem habet Buxi modo flauum, ac nonnunquam ad Centaurii ruborem inclinantem, quo fere solo ab Arabico differt, nam gustu & odore eidem omnino respondet uenit hic quoq; ex Oriente per transuersum in frustra dissectus. Eligito plenum, solidum, gustu ac odore acerrimum & iucundum, à uermibus nequaquam corrosum, talis à recenti crebris foraminibus ac contento in foraminibus puluere nimia leuitate deprehenditur. Affertur hodie quam rarissimè, cum impostores hoc dolo, turpi ac Deo abominabili lucro inhiantes, alias pro eo radices uenditent, de quibus in Arabico dictum est Costo, & iam latius dicitur.

DE INULA COMAGENA.

CAP. LXII.

INVLAE Comagenæ ac reliquis in Oriente locis nascentis radix, quæ pro candido, hoc est Arabico Costo, ab indigenis impostoribus ad nos militatur, nostratis Enulæ Campanæ radici, forma ac qualitatibus per omnia similis est, densior tamen solidiorq; & magis percocta ob cœli calorem, quapropter siue in orbiculos transuersa secetur, seu secundum longitudinem findatur, minus in exiccando flaccescit & parcius in rugas contrahitur quam nostras, quæ aquei & incocti humoris plurimum habet, quò inter exiccandum exhalante corpus remanens flaccescit ac rugis contrahitur. Partim autem hæc Orientalis Enula candicat, quæ bonitate excellit, partim liuet aut fusca est, quod uetustatis aut intempestiue effossæ, ac negligenter siccatae indicium est, partim etiam per transuersum in orbiculos secta affertur, partim etiam in longitudinem fissa.

DE THAPSIA MAIORE.

CAP. LXIII.

THAPSIA maior, umbellifera & ferulacea herba est. Radice nititur grandi, longa, crassitudine manum complente, foris nigra aut fusca, intus autem candida, crasso, carnosoque cortice, & lignosa simulque fungosa medulla constante. Gustu acerrima, linguam exurente, plurimam saliuam prouocante, ingratißima, nauseosa, & fauces ueluti strangulationis comminatione afficiente. Odore uirosa, rancida, & uetustissimæ cuiusdam rancidaque pinguedinis qualitates referente. Nasçitur in Italiæ calidioribus regionibus, unde ad nos pro Costo ab impudentissimis impostoribus hisce annis militari capta est, execrabili, periculossimo ac capitali poena digno dolo ac impostura.



DE GALANGA MAIORE.

CAP. LXIII.

NVPER admodum cœpta est afferri, antea nobis incognita quædã radix, in partes secta, quam maiorem Galangam uocant, quoniam Galangæ, quod ad figuram attinet, per omnia respondet: multo tamen maior est, nam pollicem et duos interdum digitos crassitudine æquat: eadem in æqualis ueluti ramis brachiata, & foliorum candicantibus uestigiis, ueluti zonis & circulis cincta est, & gracilibus nervosisq; cirris fibrata, qui ceu inutiles auferuntur. Colorem habet foris rufum, intus autem uenosam, ualde leuem, candidam, aridam atq; Zingiberi similem substantiam. Odore ualde acrem, in caput penetrantem et sternutamenta prouocantem, nõ tamen gratam, aut iucundam ut minor. Sapore acerrimam, ingratam & uentriculum subuertentem. Eligo maximam, leuem, plenam, ac uermibus non corrosam.

DE GALANGA MINORE.

CAP. LXV.

RADIX hæc simpliciter & propriè hætenus Galangæ uocabulo cognita fuit, nulla cognomenti adiectione, nunc autem cum alia maior eiusdem nominis afferatur, minoris cognomine ab illa distinguitur. Est autem herba Orientalis ex Cyperi generibus, à quibusdam Cyperus Babylonicus appellata, cuius radix in taleolas secta ex Oriente afferitur, pondere leuis, figura in æqualis, & in transversum & obliquum tendentibus adnatis brachiata, minimum digitum crassitudine æquans,

æquans, foliorū uestigiis ex intervallo, ceu zonis aut circulis præcincta, foris ruffa et subfusca, intus autem fulua, dura, solida, uenosa cum frangitur & tritu difficilis. Odore ualde acris, & aromatum modo iucunda. Sapore quoque ignis inftar feruida & aromatica. Eligito nitidam, solidam, mediocriter ponderosam, foris in fusco ruffam, intus fuluam, minimè pallidam, dum cultro inciditur splendenter, nequaquam uermibus corrosam, gustu cum aromatica suauitate acerrimā & odoratissimā.

DE ACORO, qui uulgò Calamus aromaticus dicitur.

CAP. LXVI.

ACORVS uerus qui hodie per totam Europam magno errore Calamus aromaticus appellatur, gladiolacei generis herba est, foliis statim à terra exuntibus cubitalibus, latitudine ferè uncialibus, uenosis, se inuicem dissecta aluo ueluti carina excipientibus, & sibi infertis, nostratem lridem figura imitantibus, atque gladii modo in aciem & mucronem fastigiatis. Radices habet lridi syluestri nostrati similes, perennes, posteriori parte sibi coherentes et implicatas, foliorum uestigiis inæquales, quincunciales aut longiores minimo digito: cum seccatæ sunt, ut plurimum in crassitudine æquales, nonnunquam crassiores, præsertim antequam exiccantur, undique per terræ superficiem in transversum sparsas, ita ut à superiori parte cælum spectante, folia proferant: inferiore autem qua terræ incumbunt, fibras deorsum mittant, quarum uestigia, ceu stigmata in exiccatis adhuc apparent. Colorem foris subruffum aut candicantem: intus candidum, aut in candido modicè rubescentem. Substantiam raram, angustissimis contiguisque poris fungosam ac pondere leuem. Gustu subamaram, acrem, tenuem, & aromatum modo suauiter odoratam. Eligito non crassiores minimo digito, candicantes, densas, minimè rugosas, admodum breui intervallo foliorum uestigiis præcinctas, teretes, tam gustu quam odore uehementiores, & non cariosas. Nascentur aquosis locis, in calidioribus provinciis, plurimè que in Asia, unde ad nos affertur.

DE ZINGIBERE.

CAP. LXVII.

ZINGIBER Cypero cognata est herba, in India proueniens, cuius radices ad nos afferuntur omnibus Zingiberis nomine cognitæ, figura inæquales, modicè planæ, in paucas bulbosas partes ut plurimum diuisæ, longitudine sesquiunciales, sextantales, aut nonnunquam maiores, foris cæsiæ aut in candido subfusca: intus alba, friabili, tenera, & per longitudinem uenis seu setis aut filis neruosa carne constantes. Gustu ceu Piper, feruida, acres, & aromatum modo odoratæ, quarum hodie duæ aut tres afferuntur seorsim differentia, scilicet foris, quò ponderosiores fiant, rubrica tinctæ, quæ coloratum Zingiber uocantur, et albæ quæ album Zingiber. Eligito candidissimum, friabile, & tamen solidum, superficie exten-
tum, plenum magnumque & quod nequaquam teredinem senserit, facile enim propter excrementicii humoris copiam à uermibus corroditur. Est etiam fuscum intus & ueluti corneum Zingiber intempestiue collectum, quod improbatum.

DE ZEDOARIA, quæ Veterum Arnabo uel Zarnabum est.

CAP. LXVIII.

ZEDOARIA quæ ueteribus Arnabo & Zarnabum appellatur, duplicem habet differentiam, altera enim longa, altera uerò rotunda est: longam ex Arnabibus quidam simpliciter Zedoariam uocant, rotundam autem Zurumbet, ideo nos quoque utrumque medicamentum descripturi, eam distinctionem sequemur, utrique eius speciei suum proprium caput tribuentes. Est itaque Zedoaria Arnabi altera species, longam radicem habens, longitudine sextantalem, trientalem aut quadrantalem: crassitudine minimo digito æqualem, utrinque in obtusum mucronem desinentem, foris candidam, intus ex cinereo in fuscum colorem uergentem. Substantia densam, solidam, pinguem & ponderosam. Gustu atque odore uehementer tenuem, subamaram, mediocriter acrem & late cum grauitate quadam ac ualde aromatica suauitate, dum tunditur aut manducatur, spirantem: minima portione diu oris halitum commendantem, & per palatum ac nares in caput penetrantem. Eligito magnam, densam,

plenam, non rugosam, intus ueluti pinguem, lentam, dentibus propter soliditatem aliquantulum repugnantem, gustu tenuissimam odoratissimamq; & nullis foraminibus peruiam, facillimè enim cariè ac teredinem sentit, ob calidi, crassi, lenti & excrementicei humoris, quo tota constat, copiam, quapropter etiam ante uetustatem corrumpitur, si humidiori & solum redolente loco seruetur, aut si, ut plerumq; inter uendendum fit, ex uno loco in alterum transferatur, uidelicet ex sicco in uidum, aut è contra, praesertim si crebro fiat.

DE ZVRVMBETO, [quam Zedoariam rotundam dixeris.] CAP. LXIX.

ZVRVMBETVM, siue ut Arabes proferunt, Zurumbet, substantia, ponderosa, soliditate, colore, sapore & odore longae Zedoariae omnino similis est, sola figura differt. Est enim radix rotunda, globosa, magnitudine uncialis, aut interdum maior, nonnunquam etiam minor, superficie aliquantulum inaequalis, ac praecipuarum fibrarum uestigiis tuberosa: Ari bulbo similis & aequalis, eadem superius in breuem plerumq; mucronem definit, quo germen terrae adhuc inhaerens fundere consuevit. Eligito praedictae Zedoariae notis commendabile. Affertur ex India.

DE CVRCVMA LONGA. CAP. LXX.

CVRCVMA quae à ueteribus Cyperus Indica uocatur, duplicis est differentiae, uidelicet longa & rotunda, quemadmodum Cyperus in Europa proueniens, suum tamen proprium, à Cypero nostrate diuersum genus habet. Sunt autem prioris speciei radices ut plurimum sextante longiores, minimo digito crassitudine aequales, Zingiberi simulq; longis Cyperi radicibus similes, teretes, utroq; latere radicibus aliis minoribus, quarum aliquae breues, & oculaceis bulbis similes sunt brachiatæ, & obcuris foliorum uestigiis praecinctæ, foris pallidæ & modice scabrae, intus autem ex croceo colore in puniceum aliquantulum declinantes, ponderosae, densae, & ueluti densato atq; exiccato humore constantes: gustu subamaræ, & cum aromatica tenuitate acres & odoratae, quae uino aut aqua maceratae, croceo colore tingunt. Eligito densiorem, ponderosorem, nullis foraminibus peruiam, gustu feruidissimam atq; odoratissimam.

DE CVRCVMA ROTVND. CAP. LXXI.

CVRCVMA rotunda substantia, pondere, soliditate, colore, odore, & sapore longae Curcumae omnino respondet: figuram uero rotundam habet aut modice oblongam & ouatam, qualem oliua aut radix Ari, quibus etiam magnitudine aequalis est ut plurimum, eadem fibris quoq; ut longa nititur. Odore ac sapore priorum ut dictum est imitatur, multo tamen acrior, feruidior & tenuior existit, praesertim quae substantia constat rariori ut Zingiber: haec enim ferè medium habet inter Zedoariam & Carpesium tam odorem quam saporem. Eligito gustu feruidissimam, tenuissimam, aromaticum modo odoratam, diu acrimoniam in gustantis palato relinquentem, orisq; halitum odoris gratia commendantem, & quae nondum teredinem senserit.

DE DORONICO. [uulgo dicto, quod Romanum cognominant, quo maius est, sed minus efficax, quod in nostris alpibus Helueticorum oritur.] CAP. LXII.

DORONICVM parua cuiusdam herbæ radícula est, longitudine uncialis aut sesquiuncialis, aliquantulum in latitudinem compressa, modice inaequalis uelut squamata, in medio latiuscula, inferius uero atq; superius paulatim in angustum tenuemq; mucronem desinens, ex utroq; latere unum aut alterum oblongum tuberculum seu pedes emittens, quo fit ut tota radícula minimae tarantulae aut laetertiae figuram exprimat: colorem habet in candido & cinereo modice flauum aut subruffum,

subruffum, substantiam uerò densam, solidam, recrementiceo humore constantem, gustu dulcem, paululum amarescentem, subtenuem, & rosarum propemodum modo odoratam, Eligito maiusculas, densas, æquales, extensas, lentas, & minimè perforatas: facillè enim, dum ueterascunt, teredinem sentiunt ob excrementice & acido re non percocti humoris copiam.

DE TURBITO. CAP. LXXIII.

TURBITVM, siue ut Arabes uocant Turbit, radix est in calidioribus regionibus nascentis herbe, hæcenus nondum cognita. Radix autem ad nos asserta ualde inueteratus, in sextantales aut quadrantales partes secta, crassitudinis incerta, partim enim duorum digitorum, partim unius crassitudinem habet, partim etiam festucarum & sirculorum modo tenuis est, maiora frustra inæqualia & tortuosa sunt, tenuiora uerò æqualia & recta. Colorem habet foris in cinericeo fuscum, intus autem cædidum: substantiam exterius corticosam, interius ueluti lignosam, per longitudinem concavis, angustis & contiguis poris ceu canalibus fistulosam, & raram, ideoq; pondere ualde leuem. Saporem habet, quod corticosum foris est, acre, paulatim feruere in gustantium ore & faucibus incipientem, saluam copiosam elicientem, idem inter terendum odoratum quiddam spirat. Eligito cortices eius, æquales, rectos, intus candidos, exiccati liquoris, ceu rosidas guttulas in se continentes, leues, & minimè à uermibus perforatos: adulteratur gūmi, utriq; extremitati seu capite illito, ut ueluti natiuo liquore pingue uideatur. Sed dolus cognoscitur, quod gummi hoc illitum, gustu nequaquam ferueat, & quod contractus cortex nullas intra natui liquoris reliquias contineat. Adulteratur etiam immixtis minoris Thapsiæ tenuioribus radicibus, quæ candidiores, fractu puluerulentæ & facillè in farinam conteri aptæ sunt.

DE THAPSIA MINORE. CAP. LXXIIII.

THAPSIA minor, æque ut maior, ex umbelliferarum & ferulacearum herbarum genere est: radicem habet longam, satis magnam, crassitudine digitalem aut pollicarem, nonnunquam etiā crassiore uel graciliore, foris nigram, intus candidam, carnosam, crassoq; cortice constantem, qui exempta interiori neruosaq; medulla affertur, substantia tener, in farinam friabilis, leuis, & liquorẽm ruffum, exiccatum, guttatim dispersum continens. Saporem habet, cum siccatus ad nos peruenerit, primum ferè insipidum aut farinæ tribuli aquatici similem, mox tenuem aliquantulum, postremo mediocriter acrem & feruentem, ob excrementice humoris copiam, non uestigio, sed tardius acrimoniam suam linguæ ac palato imprimentem. Eligito corticem eius magnitudine mediocrem, crassum, siccati liquoris guttarum plenum, & à uermibus nondum corrosum, quod facillè sit ob crassiæ humiditatis copiam.

DE MANDRAGORA albo seu masculino. CAP. LXXV.

MANDRAGORA albus, quem masculum ueteres appellant, folia à radicis capite proferit magna, iuglandi aut latifoliæ lactuce æqualia, oblongiora tamen his, mollia, glabra, in uiridi candicantia, & circa radicis caput per terram sparsa, seorsus quæ trientales exeunt pediculi, in quibus flos est pallidus & foliaceus ceu latiusculo calici insidens, floribus singula succedunt poma, figura rotunda, paruis limonibus æqualia, colore ad dilutum aqua crocum inclinantia, succosa carne constantia, qua continentur pallida aut cæsia semina, piri seminibus æqualia, non tamen acuminata, sed modicè plana, & ab una parte renū instar lima. Radice nititur perenni, grandi, longa, crassitudine manum implente, in partes distracta, foris pallida aut incandido subfusca, intus candida, carnosam, succosam & crasso cortice constantem. Odorem tota herba grauem spirat, præsertim poma, quibus succus est aliquantulum gustu uinosus, subamarus tã odore quã sapore caput aggrauans. Radix amarescit simulq; subdulcis est. Eligito cortices radicis crassiores, candidiores, & à uermibus

non corrofos, Nascitur in Aegypto & Syria, unde ad nos affertur, quamvis in Germania quoq; ab aliquot studiose colatur licet & ipse feci.

Mandragoras albus. T. 1. 126. p. 809.

Mandragoras femina.



DE MANDRAGORA nigro seu femina.

CAP. LXXVI.


MANDRAGORAS niger seu femina, folia habet candidi instar per terram sparsa, minora tamen, & angustiora, tenuifoliae lactucae similia, sed hiis quoq; minora, mollia, odore graui, ac in viridi colore nigricantia: secus quoq; pediculi flores & poma sunt albo Mandragorae, succosa carne, seminibusq; similia, colore uero paulo pallidiora, duplo minora, Sorbis aut medicis epimelidibus, id est, mespilis nostratibus aequalia. Radicem habet prioris substantia & figura similem, minorem tamen, in duas aut tres sibi inuicem ut plurimum implicitas partes diuisam, foris nigricantem, intus autem candidam & perennem, quae sapore prioris radici responderet. Eligito cortices eius maris Mandragorae notis commendabiles. Nascitur hic quoq; calidioribus terris ut praedictus, & similiter apud nos a paucissimis colitur, magnam curam, qua a gelu uindicetur, postulans.

DE MACHOLEBO.

CAP. LXXVII.

MACHOLEBVM, seu ut Arabes uocant Mahaleb, nuclei sunt, figura, quantitate & colore Cerasiorum nucleis similes, gustu tamen tenuiores, uel hemcnuiores,

hementiores, & odorati, ideoq; suavi odore oris halitum commendantes. Eligito recens, hoc est, plenum, in candido subruffum, odoratum, & minimè uetustate rancidum. Affertur ex Africâ & Aegypto in Italiam, Galliam & Hispaniam: in Germaniam uerò rarissimè, quia apud nos nullus adhuc eius usus inualuit. Arbor autem in qua nascitur, qualis sit nobis nondum constat.

*Macholebum.**Cuminum satium.* T. 2. in p. 376.

DE CUMINO SATIVO. CAP. LXXVIII

CUMINVM satium, siue ut aliqui scribunt Cyminum, parua & umbellifera herba est, altitudine raro pedem excedens, tenuibus & in plures angustas partes sectis foliis: semine in umbellis oblongo, utrinq; acuminato, anguloso, cartilagineo: in cinereo colore subflauo; longitudine quartam unciae partem æquante: gustu subamaro, tenui, mediocriter acri, & cum grauitate sua uiter odorato. Radice nititur oblonga, tenui, & cum maturuit semē, pereunte. Eligito plenum, magnum, flauum, aut pallidum, purum, intus pingue ueluti liquore aut oleo madefactum, minimèq; acerosum, inuehitur ad nos ex Vlisibona & Venetiis, Antuerpiam, ac in reliquis urbes atq; emporia.



BRASSICA maritima, quam hodie Soldanellā uocant, coliculos ceu uiticulas per terram spargit graciles, à quibus exeunt folia longis pediculis, posteriori parte latiuscula, anteriore uerò in obtusum mucronem desinentia, hederæ aut Chelidonio minori similia, latius cline plerumq; sese

quiuncialia, pingua, crassaq; lacteum liquorem cum præciduntur remittentia : semen habet in rotundis folliculis nigrum, angulosum, durum, cicere minus, intus flauum. Saporem habet herba acrem, amarum & subfalsum, maximè liquor. Nasquitur maritimis locis, in Italia & Narbonensi Gallia, unde ad nos affertur.

DE SERIPHIO Absinthio, [siue marino: quod uulgò Alexandrinum aut Zinzæ semen appellatur. Aliud uidetur Absinthium marinum, quod Matitholus pingit.] CAP. LXXX.

ABSINTHIUM Seriphium, siue marinum Absinthium, ramosa est herba, nostrati absinthio similis, multò tamen minoribus foliis : semen habet paruum ueluti ammi, acerosum, colore flauum, gustu ualdè amarum, acre, uehementer renue & grauius, ueluti si quis Santonicū absinthio misceat, & cum aromatica qualitate aliqua odoratum. Eligito magnum, non puluerulentum, & odoratissimum: Nasquitur maritimis locis in Aegypto, unde ad nos affertur, Alexandrinum semen, aut Zinzæ semen appellatum, aliud ab hoc est Santonicum.

DE BDELLIO. CAP. LXXXI.

BDELLIUM ueteres regionum, in quibus prouenit, nominibus distinxerunt, sed quoniam etià in eisdem prouinciis diuersa eius genera proueniunt, uisum est mihi conuenientius esse, coloris & qualitatum differentiis ea distinguere, præsertim cum nobis non constet, neq; facile inquiri possit in tanta ignauia, & ueritatis contemptu, ubi quæuis eius species nascatur. Est autem Bdeillum densata lachryma, in aqua dissolubilis. Myrihæ concretionem & aspectum similis, in Arabia, India, & uicinis aliquot regionibus, ex arbore quadam Ceraso simili cortice uestita emanans, atq; circa ramulos in magnos grumos, pondere sextunciales, quiunciales, sextantales & unciales concrescens, qui tam integri quam confracti ad nos afferruntur, unà cum adhærente cortice & ramulis : quod in crassiores grumos seu glebas concreuit, Hadrobolon à ueteribus Græcis Medicis cognominatur. Difert autem Bdeillum colore & sapore: quoddam enim rufum, aut in ruffo subsuscum est, quod plerumq; maioribus grumis constat, & cum frangitur in plures grumulos dissilit, modicè transparet, & mediocriter splendet. Gustu amarum, acre, & tenue existens. Quoddam minoribus est grumis, forisq; in ruffo subsuscum, intus rufum, cum frangitur in duas tantum partes se diuidens, & ueluti dissectum prædicto magis translucens, densum, lentum, glutinosum, pingue & lachry-

Primum.

Secundum.

Lachrymas albas, seu guttas omnino translucidas, cum in calido loco reponitur, emittens. Est etiam quod pallidum aut candidum habet colorem, grumis oblongis & mediocribus constans, multis longis, inter defluendum densatis guttis concretum: sapore amarum ualde ingratum, omnibus Bdellii speciebus acerrimum, et fauces uehementer scarificans adeo interdum, ut anhelitum restringat. Est præterea nigrum Bdellium, colore foris nigrum, intus autem, cum frangitur, in nigro ruffum: Gustu, glutinosum, lentum, & mediam inter Thus & Cerasi gummi qualitatem respiciens. Affertur quoque aliud Bdellium, foris nigrum, intus fuluum in igneo aut purpureo colore, & omnium maxime translucens: substantia lentum, molle, glutinosum & Cerasi gummi simile, sapore idem Cerasi gummi cum amaritudine quadam & modica acrimonia imitans. Est postremo Bdellium, prioribus speciebus simile substantia, colore & sapore, quod intus paucis, pallidis, aut candicantibus maculis ceu unguibus distinguitur. Odor cuiuscunque Bdellii generi prunis imposito acris, grauis & aromaticus, ueluti si quis Thus & Myrrham commisceat: differt tamen aliquantulum secundum substantiæ diuersitatem. Eligito in quouis Bdellii genere aspectu, cum frangitur, nitidum, cornu ungui aut taurino glutino simile, magis translucens & pinguius molliusque, hoc enim recentis indicium est.

DE MYRRHA. CAP. LXXXII.

MYRRHA in odorifera Arabia nascentis arboris lachryma est, in aqueo aliquo humore dissolubilis cuius sex ad nos perueniunt genera, non tamè distincta, sed sine discrimine simul in unum saccum coniecta, ex quibus primum rubrum habet colorem. Secundum flauum. Tertium flauum aut subruffum, & maculis ceu candidis unguibus uarium colorem habet. Quartum omnino & æquale candidum est. Hæc quatuor Myrrhæ genera pinguia synceraque sunt, & fractu non difficilia, pondere leuia, paruis & semuncialibus aut uncialibus ad summum grummi constant, globosam & natiuam formam habentibus, ex quibus candidum in gustu Cerae modo lentescit, Sapor omnibus est amarus, acris, tenuis & aromaticus. Odores habent per se, & prunis imposita, aciem, aromaticum, iucundum, cum grauitate non pauca caput in somnum trahentem. Quintum myrrhæ genus, magnis, nigris & compactis glebis constat, substantia aridum, odore & sapore iniucundum, quoniam nimio solis seruore exaruit, aut tenuiores & aromaticas partes propter expressam ex se stactem amisit. Sextum adulterinum est, aloë, gummi Arabico & paucis Myrrhæ diluto compactum, & in grumos conformatum, qui dolus facile apprehenditur odore, sapore & prunis: nam naribus admotum non iucundè olet, gustatum aromaticam tenuitatem & acrimonia caret, & dentibus contumaciter adhæret, prunisque impositum fœcet ueluti gummi, & cum frangitur, propter ariditatem in multas partes friatum dissilit. Syncera autem Myrrha dentibus non adhæret, sed facile resoluitur. Eligito Myrrham pinguis simam, leuem, foris & qualiter flauam & ueluti tabidam ac purulentam, intus autem ruffam, aut flauam, aut uersicolorè, plures candidos ungues habentem, aut candidam atque liquorem plenam, quem a stacte in roscidas guttas concretum emittat. Vendiderunt hisce annis impositiores maiores Myrrhæ grumos pro Bdellio, sed dolus apprehenditur, quod Bdellium gummi instar dentibus adhæreat, nullumque ferè odorem per se spiraret, nisi prunis imponatur, sic enim grauem, uehementem, Thuri que non dissimilem & à Myrrha differentem odorem spirat.

DE STACTE. CAP. LXXXIII.

STACTE, pinguis, ruffus aut flauus liquor est, ex recenti, syncera, pinguis sima que Myrrha expressus, oleo liquido crassior, infuso aqueo quodam humore dissolubilis, gustu ac odore Myrrhæ qualitates cunctas referens, sed multo est ca-

ciores, cum optima illius pars, atq; ipse flos existat, probatur odoratissima, medio-
cris et liquida, colore fulua aut ruffa, gustu amara atq; tenuissima, nulloq; oleo adu-
terata, qui dolus superinfusa calida aqua facillime deprehenditur: syncera enim Sta-
cte in ea resoluitur: oleum uero, qualecumq; id fuerit, nullo modo aquae commisce-
tur, sed ipsi innatat. Nunquam in Germaniam allata huc usq; Stacte est, potest ta-
men paruo labore, sed magno dispendio, ex optima Myrrha exprimi.

DE OPOBALSAMO.

CAP. LXXXIIII.

OPOBALSAMVM, Balsami liquor est ex infecta cortici eius plaga
guttatim destillans, in aqueo humore dissolubilis. Colore, dum mustum ad-
huc est, candicans & lactescens, atq; liquidi olei consistentiam habens, postea cum in-
ueterascit exhalans quod tenuissimum in eo est, solum colorem acquires & cras-
sescens, Odorem habet supra omnia aromata suauissimum, acrem et late spirantem.
Saporem autem seruidum mediocriter, cum maxima partium tenuitate per totum
palatum, ad caput & odoratus organa penetrantem. Eligito praeter iam dictas no-
tas, lac coagulans, si aequae instilletur, primum fundum petens, & mox a se ipso disso-
lutum ipsi aquae se commiscens: cum linteo aut panno instillatur, neq; maculam,
neq; maculae uestigium in eo relinquens, postquam potius trigidissima quam cali-
da aqua rursus pannus sit ablutus. Adulteratur enim multis modis, odorato ali-
quo oleo, aut resina, aut cera: sed deprehenditur hic dolus sola frigida aqua: syncerum
enim facile in ea dissoluitur, nec quidquam eo in fundo remanet, aut superius aquae
innatat. Adulterinum uero & quod doli causa syncero mixtum fuerit, nequaquam
aquae commiscetur: sed separatim, aut fundum petit, aut innatat, aut utrunque
facit.

DE CANCHAMO.

CAP. LXXXV.

CANCHAMVM, quod recentiores authores Laccam appellant, in Ara-
bia nascentis arboris lachryma est, colore ruffa, fulua aut flaua; ramulis undiq;
in succini duriciem densata & concreta adhærens: lumine accensa lucidissimè a flama
ardens, liquefcens, & ardentibus flammantibusq; guttis destillans, quae extin-
ctae nigricant & indurantur. Eadem in calida aqua ad ignem dissoluitur, & ei omni-
no commiscetur, sanguineo aut purpureo colore aquam tingens, qua tingendis pel-
libus utuntur: ex eadem fit floridus ille & preciosus color, quem pictores eodem
nomine Laccam uocant. Odorem prunis impositum iucundum spirat. Saporem ha-
bet cum resolutum fuerit amarum actenuem, quale autem per se est, nullum ferè o-
doris aut saporis qualitatem remittit propter nimiam substantiae densitatem. Eli-
gito maiores eius grumos, colore fuluos, translucidos & adhuc furculis adherentes:
reprobatur immundum, admixtis corticibus aut aliis rebus plenum, & quod nigrum
est. Cum lauare & sordes ab eo segregare uolueris, in seruientis aquae sextarium
sex Canchami uncias conuicito, & bullire paulatim finito, donec aqua sanguinea aut
purpurea reddatur, tum excolatam aquam, abiectis quae in colo remanserint sordibus,
ad spissitudinem liquidi mellis decoquito, & liquidis medicamentis, quae Lac-
cam requirunt, misceto. si uero solidis & lictis miscere opus fuerit, diutius coquito,
donec refrigeratum pristinam soliditatem ac duriciem recuperet, hoc modo prepa-
ratum Canchamum nigrum fit, estq; haec genuina lauandi Laccam ratio, poteris etiā
pro simplici aqua Schœnanti, aut aliorum epati obstructo cōuenientium & aperien-
tium medicamentorum decoctionem aut dilutum accipere: lauatur etiā alia ra-
tione, tritum abiecta aliquoties in qualauatur decoctione, aut aqua, secundum
absurdam & omnibus modis improbandam recentiorum authorum traditio-
nem,

DE SARCOCOLLA. CAP. LXXXVI.

SARCOCOLLA, arbusculæ cuiusdam in Perside nascentis lachryma est, colore ruffa aut candicans, concretionem tenuis, minutis, ueluti friatis, atq; Thuris, Mannæ similibus grumis cõstans: Sapore amara, acris, nauseosa, gummi instar glutinosa, atq; in aqua aut aqueo humore aliquo dissolubilis. Eligitorum rarum, ueluti spumofum, candidum, amarissimum, & gummi instar glutinosum: ruffus color inueterascens indicium est: adulteratur minuto & friato gummi, sed faciliè deprehenditur, adulteratum enim minorem amaritudinem respicit, & minime acre est, neque nauseam, cum deglutitur, prouocat, neq; fauces scarificat.

DE BENZOO. CAP. LXXXVII.

BENZOO seu Benzoi, quod etiam Assa dulcis appellatur, arboris cuiusdam in India nascentis resinosa lachryma est, quæ ad nos non grumis ueluti Thus, Myrrha, Canchamum atq; alia huiusmodi affertur, sed antea ab incolis, apud quos prouenit, expressa, ac demum in magnos pastillos, massas ac panes compacta, qui malleo percussi faciliè in partes & grumos dissiliunt. Substantiam enim habet aridam & friabilem ceu pix aut resina siccissima atq; Colophoniam, alio nomine Græca pix appellata. Colorem habet uarium, ruffum, flauum & candidum, eosq; distinctos & translucentes. Saporem subdulcem, suauem, & modicè ueluti arescentem, quemadmodum Guaiacum lignum: commanducatum in ore non dissoluitur propter resinofam consistentiam, sed Mastiches modo inter dentes lentescit, pallidumq; in lurido colorem acquirit, translucidum amittens. Odorem spirat ualde iucundum, cum teritur ac tractatur: prunis uerò impositum multo acriorem, & propter fuliginosum siccum uaporem fauces siccantem & tussim irritantem. Eligito purum, & quod immixtis foliis & corticibus careat, translucidum, maioribus grumis distinctos colores habentibus, in densam massam compactum & formatum. Substantia constat neutra, hoc est neq; aqua neq; oleo dissolubili, quemadmodum & Viscum. Cortex arbori, ex qua destillat, est Guaiaco similis, sed uenosus: folia uerò lata Terebintho aut Lauro similia & æqualia, quæ nonnunquam panibus immixta una cum lachryma afferuntur: materia uerò arboris qualis sit nobis nondum cõstat: uerum quatenus ex sapore & odore sumptaratiocinatio ualeat, magnam habet cum Guaiacæ arbore in qualitatibus similitudinem, quid autem figura differant, explorandum.

DE OLEO BENZOINO. CAP. LXXXVIII.

BENZOIN V Moleum duplex est. Primum enim in India ex recenti Benzoo ui exprimitur, quemadmodum ex Myrrha Stacæ, substantia liquidum, & tenue, colore ruffi, fuluum & candicans, odoratissimum, nares & caput opplens, atque gustu multo quam Benzoum acrius, facileq; penetrans: quod rarissimè sincerum affertur, neq; enim ad hunc usq; diem uulgò eius in Germania usus est, quamuis sit uiribus efficacissimis. Secundum peculiari quodam artificio per destillationem fit prædicto simile, sed multo ignauius tam gustu quam odore: utrumq; adulteratur oleo, sed deprehenditur dolus turbido oleagineoq; colore, & rancida faucesq; offendentem in gustu acrimonia.

DE CINNABARI, id est, Sanguine draconis. CAP. LXXXIX.

CINNABARI, seu uthodie adhuc uocatur Sanguis draconis, nascentis in Æphrica arboris cuiusdam lachryma est, & nequaquam Elephantorū Dragonumq; in fabulosa pugna occumbentium sanies, ut olim hominibus inculcauerunt suis uenditionibus mercatores, & ut Plinius credidit. Cõrescit hoc in densos & picis modo fragiles grumos, coagulato sanguini foris colore, & aspectu similes, qui una cum adherente cortice afferuntur, in paruas micæ fractum splendet, & luci oppositum modicè ueluti spumofum est, accu teritur roseum floridissimèq; colorem habet, integrum uerò

in profundo & saturò colore nigricat, commanducatum inter molares dentes lentescit, ijsq; tenacissimè adhæret propter glutinosam uiscosamq; substantiam: saporem inter masticandum remittit præter glutinosum lentorem, primum subdulcem, & modicè ueluti adstringentem, mox ualdè acrem, & si gustetur paulò diutius linguæ mucronem instar Cariophyllorum, obstupefacientem. & gustati doronici haustum in palato relinquentem. Eligito paruis & cortici ruffo aut candicanti adhuc adhærentibus cōstans, purum, splendidum, profundū, donec integrum est, coloris: cum teritur uerò, floridissimū. Adulteratur pluribus modis, Rubrica, arida colophonias, & pauca synceri Cinnabaris quantitate mixtis, quod in magnos pastillos & oblongos grumos formatur, ut pendentium in arbore micararum natuiam figuram referat atq; æmuletur, sed dolus facillimè deprehenditur colore turbido, liuido, rubricolo & minimè florido: præterea etiā saporis ignauia. Acrimonia enim atq; doronici halitus in gustu caret, postremò in oleo statim resoluitur, & colophonias ad pristinum fuluumq; colorem redit, ad fundum uasis descendente rubrica: sincera uerò, neq; oleo, neq; aquæ inter dissoluendum miscetur, sed aquam, in qua coquitur, lacteam reddit in pallido, cum refrigeratur, uasq; adhæret.

DE PROPOLI. CAP. XC.

PROPOLIS lachryma est resinosa Betulae, Populi nigrae & alpinae arborum gemmantibus, oculis aut germinibus innascens & adhærens: apibus collecta & in alueariis circa oras & aditus eorum suspensa, qua hyeme omnes rimas amplosq; aditus contrà frigoris iniuriam obturant, cuius quatuor sunt differentie. Prima è nigra populo colligitur tantum, secunda ex Betula tantum, tertia promiscuè, ex nigra alpinaq; Populis & Betula, facillè tamen dignoscuntur. Populo enim nigra desumpta, cui Aegyriæ cognomen sit, colore est flauo aut fuluo, manibusq; tractata mollis fit, & in longum trahitur quemadmodum uiscum. Odorem habet suauem, iucundum, caput mulcentem & somnum inuitantem ueluti Aegyri, hoc est Populi nigrae germina primo uere enata, atq; Styracis non dissimilem, sapore eiusdè Populi oculis respondet. Quæ uerò è Betula sumpta est, Semidea, id est, Betulnea in posterum nominetur. Hæc Betula oculorum odorem spirat, qui Aegyro non est absimilis: colorem habet inter flauum, cinereum & subuiridem medium, atq; iam dictæ instar in manibus mollis fit & distrahitur, paulò tamen siccior existit quam Aegyriana. Quarta uerò quæ ex nigra alpinaq; populis, & Betula colligitur, utriusq; colorem, odorem, saporem & consistentiā mixtas habet, ideoq; mixtæ nomen post hac obtineat. Tertiam ex alpinae Populi lachryma apes faciunt, sed rarò, ijsq; tantum locis quibus nulla populus aut Betula, sed Alpina solummodo abundat. Est propoli natura, ut oleo resoluat ur ueluti cera, ponderosior tamè densiorq; est, nam in aqua liquefacta fundum petit: cera uerò aquæ supernat. Eligito in quouis genere odo ratissimam, synceram, & minimè admixtam ceram habentem, quod si cera doli causa adiciatur, in aquam propolis coniiciatur sufficientem, & coquatur, ita enim syncera ad fundum uasis descendet, cera uerò aquæ innabit, quæ refrigerata facillè aueretur.

DE STYRACE. CAP. XCI.

STYRAX nascentis in minore Asia arboris cuiusdam lachryma est, in paruas micas aut grumos concrescens, substantia resinosa, pinguis, in longum, ubi incaluit, ductilis, in oleo resoluibilis admodum, cum grauitate non pauca, odorata ueluti propolis, præsertim cum prunis imponitur, cuius tres cognoscuntur species colore tantum differentes, prima candicat, altera ruffa est, tertia nigricat simulq; liuet, ruffa foris plus rubet quam intus: candida, ac nigra per totam substantiam eundem colorem habet, reperitur etiam flaua quædam inter ruffam & candidam media. Meminit præterea Dioscorides candidæ pellucidæq; Styracis gummi similitudinem

tudinem habentis, quam mihi uidere nondum licuit, quantum diligentissime eam inquisiuerim: prædictarum enim nulla pellucet, neque ulla ex his copiose & sola affertur, sed omnes commixtæ, atque arboris suæ schobe quam plurima adulteratæ, adeo etiam ut ex integra eius libra, uix uncia syncera eligi queat, sic allatam hodie omnes Storacem calamitam uocant. Eligito puram, in longum ductilem, pinguem, odoratissimam, atque cum suauitate caput aggrauantem, & somnum inuitantem. Adulteratam, fursurosam, aridam, cano situ oblitam & scobe plenam, nullis medicamentis admisceas, præterquam iis quæ odoris causa conficiuntur: præstaret tamen ijs quoque potius synceram miscere quam adulterinam, siquidem puriorem, uehementioremque uaporem syncera emittit: adulterata autem imbecillior est. Fit in quibusdam confectionibus Rubæ storacis mentio, ibi ruffa lachryma Syriacis accipienda est, & minimè cortex ille fuscus et aridus, falso Storax rubea uocatus.

DE STYRACE LIQVIDO ET OLEO STYRACINO. CAP. XCII.

STYRAX liquidus qui ad nos peruenit, liquidæ aut Laricæ resina confitentiam & crassitudinem habet. Colorem in cineraceo candicantem, Odorem Styraci similem, uehementem, acrem & grauem, præsertim cum prunis imponitur, per se latius spirat, quam prædictus Styrax, propter liquidiorē substantiam. Idem natiuus non est, sed fit additis pauca calamitæ Storaci, copiosiore liquida aut Laricæ resina oleo & uino, simulque coctis, expressis, atque cum refrigerit donec candorem acquirat, ligneo pistillo agitatis: ex ea mixtura duo resultant, uidelicet Styrax liquidus, & oleum Syracinum: dimissa enim uno atque altero mense, quod deinde tenuissimum, liquidissimum, atque odoratissimum in mixtorum illorum medicaminum substantia fuerit, a crassiore discedit, eidemque ad fundum uasus descendenti, superius innatat oleo crassior, Laricæ resinæ liquidior, colore fulua & pellucida, Syracinum olei appellata, quod a reliquo aufertur, & separatim seruatur, reliquum rursus agitur ut candorem induat. Eligito in liquido Styrace odoratissimam, odore ad purum Syracem propius accedentem: sed multo uehementius & grauius redolentem, colore candicantem in cineraceo. Oleum Syracinum ad nos rarissimè affertur, in quo probatur suluū pellucidū, odoratissimum, & suauius quam liquida Styrax redolens, & quod lentum sequacissimumque fuerit dum ab intincto digito defluens dependet.

DE THVRE, manna Thuris, & cortice Thuris.

CAP. XCIII.

THVS quod in omnibus Pharmacopoliis hodie corrupto a Libano uocabatur, in oleo liquefens: cuius plures sunt species, colore & magnitudine grumorum tantum differentes, uidelicet Indicum, mammosum, masculum Orobia & Manna, ex iis Indicum maximis inæqualibusque glebis constat, pondere sextantalibus & trientalibus, nonnunquam etiam grauioribus: colore tam foris quam intus liuidum, nigricans, candicantibusque aut flauis maculis uarsum. Mammosum oblongis est grumis Indicis minoribus, multis oblongis guttis prioribus superuenientibus & inter defluendum densatis, pendulorum mammarum figura compositum: colore flauum. cognominatur hoc Stagonia quemadmodum etiam proxime sequens masculum: hoc paruis, rotundis, candicantibus aut flauis singulis, partim geminis, ueluti testiculis coherentibus constans. Orobia autem minimis est grumulis, Eruo aut Vicia æqualibus: minoribus tamē, maioribusque interdum singulis, partim geminis, ueluti testiculis coherentibus constans. Colore masculo simile, hæ Thuris differentia hodie non separatim sed mixtæ afferuntur. Habet omne Thus suauem, acrem, aromaticum, & uehementem odorem, cum per se, sicut prunis impositum. Saporem autem amarum, suauiter acrum et tenuem. Probatur natiua habens in grumis figuram in quouis genere, nitidum, purum, intus cum frangitur pingue, odoratissimum, & quod quamprimum, si accendatur, ardeat flamma lucidissima. Adulterabatur olim Pineæ resina, et gummi, hodie uero Terebinthina uera: sed facile deprehenditur. Resina enim in tenues micæ & farinam facile friatur, & in fumum cum uritur, euanescit atque liquefit. Thus solidius est, citissime accenditur nec adeo liquefit, gummi in igne foetet & in oleo nequaquam dissoluitur. Porro manna a ueteribus appellata, Thuris pollen & farina est: crebro motu concussionem et a-

titione in faccis aut cistis elisa, colore candicans. Probatur pura, Thuris grumulis, Orobis minoribus mixta, atq; eundem Thuri odorem ac saporem habens. Vitanda est cribrata, resina adulterata: hec, cum prunis inspergitur, inequali fumosoq; motu, & obscure ardet, mixtumq; odorem alieno uapore spirat. Cortex uero, Thuris arboris Thuriferæ cortex est, qui una cum adherentibus affertur. Eligito crassum, pinguem, nitidum, leuiorem habentem, et qui Thus imbiberit, odore & sapore Thus similem, sed uehementius adstringentem.

DE TEREBINTHINA RESINA. CAP. XCIII.

TEREBINThina, appellata Terebinthi, arboris resina est: colore candida, sub flaua, uitrea, aut candido cœruleo colorem affectans, interdum pellucida, quæ friata, primum in plurimas micæ teritur, mox lentescit, & glutinosa fit. Odorem habet acrem, suauem, aliquantulum grauem, & Laricis resine non dissimilem, præsertim manibus tractata, & prunis imposita. Gustu modice amarescit, et inter dentes lente scit, iis dum masticatur adherens: destillat hæc primū liquida, deinde paulatim arefcit. Eandem hæcenus sacrificuli una cum Thure accessam, in templis adoleuerunt, ob id incensum appellantes: quod factum est, ut hodie adhuc cum Thure ex Syria & Aegypto allata, pro Thuris quadam specie uendatur ab imperitis & impostoribus mercatoribus, qui differentiam inter utrumq; facturi, hanc, Incensum siue Thus appellant: (sed magno errore) Thus autem uerum Olibanum, non intelligentes hæc duo uocabula, alterum græcum, alterum latinum, eiusdem rei nomen esse.

DE MASTICHE. CAP. XCV.

MASTICHA, seu Mastiche, quæ hodie Mastix ubiq; nominatur, Lentis arboris resina est: colore foris propter inhaerentem puluerem, attritione elisum, candida, aut flauescens: eo autem absterfo, uitrea, aut propemodum CrySTALLINA atq; omnino translucens: odore suauis: gustu aliquantulum adstringens, tenuis, oris halitum commendans, & inter dentes lentescens: liquida primum destillat, deinde paulatim aridam consistentiam acquirit, & in guttas densatur, ideoq; minutis grumulis constat, pondere obolum plerumq; pendentibus, frequentius etiam minoribus, & nonnunquam maioribus. Eligito synceram, puram, candidam, omnino translucentem, odoratissimam, dum manibus tractatur aut masticatur, lentescentem, atq; inter dentes transparentem, qualitatem amittentem, & loco eius niueum candorem inducentem.

DE SANDARACE. CAP. XCVI.

SANDARAX maioris luniperi resina est: substantia arida, dura, flaua, omnino translucida & aspectu Mastiche similis: longioribus tamen coniunctis, & inter destillandum densatis in grumos guttis constat, duriorq; & multo aridior existit, ideoq; neq; inter digitos neq; dentes lentescit. Odorem habet Mastiche, sed acriorē dum teritur, aut prunis imponitur: saporem etiam eidem similem, sed amariorē. Probatur munda, calculorum, corticum & furculorum expers, prorsus transparent, flaua, atq; odoratissima: aliud ab hac Sandarace est Sandaraca, metallicū medicamentum Auripigmento cognatum.

DE RESINA ELEMNIA. CAP. XCVII.

RESINA Elemnia, quam aliqui gummi Elemni uocant: ex qua arbore destillet nullus authorum prodidit, cum ne nomen quidem eius apud ipsos reperitur, quapropter hodie adhuc nullus est eius in Germania usus, rarissime etiam hæcenus affertur, idq; ab uno aut altero in tota Germania Pharmacopola tantum. Quātum autem ego ex consistentiis, qualitatibus & facultatibus eius ratiocinari possum, hæc resina nihil aliud est, quàm Cedri lachryma: at quoniam hoc nondum certo cōperi,

peri, ideo Elemniæ nomine, phar macopolis cognito, eam descripturus sum. Est autem Elemnia, non gummi, sed resina densa & sicca, in grumos castaneorum magnitudine concreta, foris in flauo fordida, intus flaua, maculis modicè candicantibus distincta, et Thuris modo pinguis. Odore acris, uehemens, & Sandaraci similis, sed grauius & uehementius redolet, ueluti hodie uocata Colophonia. Saporem habet inter Thus, Colophoniam & Sandaracem medium. Eligito, synceram, pinguem, flauam & translucidior.

DE COLOPHONIA. CAP. XCVIII.

COLOPHONIA quæ nunc ita uocatur, pix est arida: colore in ruffo fulua, & translucida, cum grauitate et uehementia quadam odorata. Sapore amariuscula & subacris, magnam habens cum Elemnia resina, odore, sapore, & substantia similitudinem: quapropter si Elemnia Cedri est resina, hæc sine dubio eiusdem arboris pix est: nam nostra Colophonia plurimum à ueterum Colophonia differt, siquidem quæ apud ueteres sic appellatur, resina est liquida: quam uerò hodie Colophoniam nominamus, arida pix est, à quibusdam Græca pix uocata. Laudatur purior, fulua atq; omninò translucida.

DE LARIGNA RESINA. CAP. XCIX.

LARIGNA resina è Larice arbore emanat, est autem omninò liquida, consistentia oleo crassior, melle uerò liquidior: colore flaua, aut uitrea: odore acris & suauis, atq; aliquantulum grauis: gustu amara, acris & tenuis: probatissima quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter defluit, aliquantulum translucida, odoratissima atq; purissima. In uitrea probatur clarissima & uitri instar lucem transmittens. Hanc hodie ubiq; ferè per Hispaniam, Galliam, Italiam atq; Germaniam Terebinthinam appellant atque eadem etiam pro Terebinthina utuntur, magno in re errore. Nascitur copiosissimè hæc resina eiusq; arbor in Germania, uidelicet in Silesia, Morauia, Transsylvania & Alpibus, unde in alias Europæ nationes deferitur.

DE LADANO CAP. C.

LADANON neque resina neq; gummi est, sed pinguedo quædam rosca, Ladæ frondibus superficie tenuis insidens. Est autem Lada Cysto similis frutex: colligitur hæc pinguedo duplici ratione, uidelicet casu & industria. Nam dum capræ frondes huius fruticis depascunt, barbæ pinguedinem abstergunt, inhærentemq; uillis, domum saturæ portant, dominis suis depectendam: hic collectio nis modus casu deprehensus est. Ex industria autē Ladanum collecturi uillis obstrictos funes, aut iuncos tantum per Ladæ frondes trahunt, itque sic inhærentem pinguedinem depectunt, & in ossas latiusculasq; massas conformant, medicamentum quod Ladanum seu Laudanum uocatur cōstituentes. Tactu lentum & mollescens, in oleo dissolubile: colore cū huc affertur, ruffum, aut in purpura fuscum: sapore adstringens: odore ferum, uehemens, acre, & tamen suaue atque iucundum, nec ingrata suauitate caput olfactumq; mulcens. Adulteratur calculis minutis, terra & arena, sed deprehenditur facili, pondere, duricia, nigricia atq; odoris ignauia: nā syncero multò ponderosius est, neq; digitus dū tractatur adeò adheret, neq; mole scit si cultro incidatur, terram & harenam ostendit, cultriq; aciem hebetat, atque inter masticandum dentes offendit. Syncerum uerò nullo ex iis uiciis dedecoratur, sed dentibus cedit absq; ulla eorum offensione. Eligito leuissimum, in sole diffusens & mollescens, inter digitos lentescens, iisq; adhærens, colore ruffum, purū atq; odoratissimum, cū per se tū prunis impositū. Nascitur in Lybia, Arabia et Cypro, unde ad nos affertur.

DE GVMMI. CAP. CI.

GVMMI quod Arabicum cognominatur, Crispinæ spinæ modo aculeatæ, si liquas Lupini figura ferentis, contortique aspectus arboris in Arabia atque

Aegyptio nascens lachryma est, in grumos Auellanae Castaneæue magnitudine concretescens, frequenter etiam uermium aut lumbricorum contortorum figuram referens: colore uitreum, candidum, fulvum & pellucidum: gustu glutinosum, dulce, dentibus contumaciter adhærens, eosq; glutinoso lentore coniunctos detinens, ut difficilissimè distraherentur: aquam qua dissolvitur in lentam, sequacem liquidamq; mucilaginem conuertens. Eligito purum, uitreum, translucidum aridumq;.

DE TRAGACANTHO.

TRAGACANTHUM glutinosum est gummi, ex Hircinae spinæ radicibus collectum, oblongis, curvis, intortisque lachrymis, ueluti per cribrum aut rarum linteam expressis, constans colore candidum & pellucidum nitorem leuoremque habens: reperitur etiam flauescens, subruffum, & in fusco rubescens. Substantiam habet lentam, glutinosam, tritu difficilem, aquam qua dissolvitur, in densam, coagulata & tremulam mucilaginem, glutinis instar tenacem, conuertentem: sapore subamarum & mediocriter dulcem. Eligito candidissimum, purum, minimè sordidum, & qualiter translucens, & cuius minima portio maximam aquæ copiam coagulet, Affertur ad nos ex Asia.

DE LASERPICIO CAP. CII.

LASERPICIUM ferulaceæ cuiusdam herbæ densatus liquor est, in Lybiæ Media & Syria nascens, ex his, qui in Lybiâ prouenit, alibi natum odoris bonitate excedit. Verùm hic in Germaniam aduectus est nunquam. Illud autem Lasericium quod in Syria ac Media gignitur, ad nos peruenit atque in alias Europæ nationes, Asiæ fœtidæ nomine. Scarificantur eius herbæ radices & caules: liquor è plagis destillat, & in guttas grumosas concreuit, colore ruffus, flauus aut candidus: sapore acris, feruidus & subamarus: odore acerrimus & latè spirans, uirosa grauitate Allii, Ceparum Porriq; odorem superans, caput replens. Eligito candidioribus, flauis, tactu lentis, atque lucem mediocriter transmittentibus guttis constantem: purum, lentum, inter tractandum uiscosum, pondere leuiusculum, & nullis festucis sordidum. Adulteratur pluribus modis, plerumque tamen terra, arena & trito marmore, sed deprehenditur facile, duricia, ponderis magnitudine, habitu sordido, minimè natiuam grumorum figuram referente, atq; arena, marmore & terra dè resolvitur, ad fundum uasis descendentes, ac si coletur in colo remanentibus. Resolvitur ad liquida medicamenta aqua, aut aceto, aut uino iniectum supra prunas;

DE SAGAPENO. CAP. CIII.

SAGAPENUM quod hodie Serapinum corrupto nomine appellatur, nascens in Syria atque uicinis ei regionibus ferulaceæ plantæ densatus liquor est, quemadmodum & Lasericium, cui etiam colore, sapore & odore non est dissimilis, non tamen adeo magnum, sed mitius uirus redolet. Eligito syncerum, pellucidum, foris ruffis: intus autem cum frangitur flauis aut candicantibus guttis compactum, inter digitos si tractetur lentescens, & propemodum medium inter Lasericium & Galbanum odorem habens. Affertur ad nos in hunc usque diem recens, syncerum ac minimè adulteratum, quod in posterum quoque ut fiat, opto. Resolvitur quemadmodum Lasericium.

DE GALBANO. CAP. CIIII.

GALBANUM prouenientis in Syria ferulaceæ plantæ Metopium appellatè liquor est, grumis tam foris quam intus flauis aut candicantibus compactus: substantia mollis, pinguis, cum tractatur uiscosus & digitis adhærens: sapore amariuscule, mediocriter acris, odore grauis, caput suauiter implens & somnum concilians,

conciilians, plerumq; caulium sic cum assulis mixtus. Eligito syncerum, purum, pingue, cum accenditur claram & cum impetu ardentem flammam nutriens, neq; nimis liquidum, neq; nimis aridum, sed mediocriter viscosum, micis suis Thureas guttas imitans, colore maxime flauum, tale enim recens est. Resoluitur ut Lasericium.

DE HAMMONIACO. CAP. CV.

HAMMONIACUM, seu gutta Hammoniaca, à ueteribus etiam Hammoniacum Thymima appellatum, nunc uero corrupto nomine Armoniacum, ferulaceæ plantæ Agasyllus nominatæ, & in Lybiæ harenis, atq; circa Hamonis locus delubrum nascentis densatus liquor est, densis solidisq; grumis, in massas compactus Thuri non dissimilibus, foris flauis, ruffis, aut in fusco flauis, intus autem candidis aut subcandidis, nitidis & splendentibus. Odore ferè Galbanum pauco castoreo mixtum referens, gustu amarum. Eligito syncerum, minime harenosum, omnino purum, maioribus grumis, foris flauis aut croceis, intus uerò candidioribus congestum, cum accenditur, claram flammam alens, & repentino ictu propter densitatem aridiorem in plures splendas nitentesq; micas dissiliens, & cum manibus tractatur, cum lentore mollescens, quod huiusmodi fuerit Thrausima à Dioscoride uocatur, quæ uerò minoribus micis est, & arenis plena, ab eodem Phyræa dicitur. Affertur ad nos syncerum & ualde purum, omnibusq; bonitatis notis commendabile: nonnunquam tamè semine suo permixtum, quod latum duplexq; est, ueluti Anethi semen, sed maius. Resoluitur ad medicamenta quemadmodum Lasericium.

DE OPOPANACE. CAP. CVI.

OPOPANAX, siue Opopanacum, ferulaceæ plantæ, Panaces Herculeum appellatæ densata lachryma, seu liquor est, pisco æqualibus aut maioribus guttis in massas compactum. Massis, grumis, guttisq; eius foris croceus, uel ruffus in puniceo color est, intus uerò candidus aut flauescens. Substantiam habet pinguem inter digitos lentescentem, saporem amarum, mediocriter acrem & tenuem, Lygustico nostrati per omnia similem, uehementiorem tamen. Odorem quoq; remittit ueluti Lygusticum acrem, late spirantem, cum grauitate aliqua caput implentem. Eligito croceo foris colore, intus candido, pingue & Galbani instar lentescens, primum, nullis caulium assulis mixtum, gustu uehementissimum, odoratissimum, maioribus grumis constans, atq; propius ad lacteum liquore, dum resoluitur, accedens. Dissoluitur ad liquida medicamenta, quemadmodum Lasericium, eiq; cognati liquores. Quod si aliquem ex prædictis liquorem ab immixtis ferulæ assulis aut succulis purgare uolueris, mediocriter contritum linteo præligato excipito, atq; in fistili suspendito, superinfuso quantum satis fecerit uino, aceto aut aqua, prout conducere aliquis horum liquorum uideatur: atq; paulatim calefieri supra fornacem sinito, cum deinde in linteo liquidum factum fuerit, aut fieri cœperit, exprimito quod sincerum est, funiculos uerò in linteo remanentes abiicito. Purgatur etiam alia ratione, cum nodus ita suspenditur ut humorem non tangat, sed ut feruentis tantum humoris uapor per lintheum penetrans liquorem emolliat, donec exprimi queat, quod calente adhuc eo fieri necesse est. Affertur ex Aphrica, Aegypto & minori Asia.

DE OPIO. CAP. CVII.

OPIUM nigri papaueris liquor est, ex scarificato eius uasculo emanans, colore primum lacteus & consistentia liquidus collectus flauescit atq; exiccatur, cum omnino defatus fuerit colorem acquirit ruffum, spadiceum aut fulcum, atq; in massas herbe sue foliis inuolutas conformatur. Odorem spirat acrem, grauem, & caput in soporem trahentem, ueluti tota ex qua colligitur herba, sed multo grauiorem. Saporem habet amarum, acrem, & linguam stupefacientem. Probatum syncerum, purum, in arido mollescens, in sole diffuens, colore quam maxime ruffum aut spadiceum.

ceum, cum frangitur splendore quodam nitens, & qui facile dissoluitur, nec Cera modo lentescit. Affertur ex Aegypto ad nos.

DE EUPHORBIO.

CAP. CVIII

EUPHORBIVM, Euphorbie nominatę plantę liquor est, cuius duo sunt genera. unū in æquales densatur guttas, magnitudine pisi, modicę cauernosas; colore flauas & mediocriter lucem transmittentes. Alterum in excipulas sub plagis suspensas confluit, & in massam densatur: colore uitreum aut candicans. Primum affertur ad nos frequentius: utrumq; saporem habet omnium feruidissimum, non tamen ē uestigio cum gustatur agentem: sed paulatim feruescentem, palatum, fauces maxima acrimonia scarificantem, exurentē, & interdum integrum diem perferentē, si uel tantillū ex eo in ore dilutū deglutiat: naribus attractū idem præstat. In summa Tithymalli alicuius gustu qualitatem representat. Porro planta ex qua colligitur, aculeis cortice crassiusculo exētib; ceu uallo munita est, fructū parit in trifido foliulo, ternis utriculis coniunctū, Lathyridi similē, sed paulo minorē: semina utriculis singula clauduntur, colore foris flaua, intus autē candida ac pinguis: gustu liquore emulanti. Quapropter si quis accuratē hanc plantā consideret, inter Tithymalli species reponendā esse indicabit. Eligito grumos liquoris eius puros, cādidos, aut flauos & pellucidos: qui uerō plantę suę aculeis & fructibus permixtus est, reprobat, ideoq; tā spinas quā semina ē liquore electa abiecit, cum syncero uti cēstinaueris. Affertur ad nos ex Africā syncerū, rarissimē adulteratū. Adulteratur autem Gummi, aut Sarcocolla, & Tithymallorū liquore, sed faciliē dignoscitur. Gummi enim dulcedine & glutinoso lentore deprehenditur: Sarcocolla friabilis est, gustuq; amara: Tithymalli uerō liquor non ita in guttas magnas concreuit, sapore tamen similis ei est.

DE SCAMMONIO.

CAP. CIX.

SCAMMONIVM, quod hodie Scammonęm appellant, Scammonę nominatę herbę liquor est, in excauatam eius radicem confluens, colore primū lacteus, & substantia liquidus: is aufertur, & densatur in massas confirmatur: cum exaruit colorem acquirit fuscum, aut liuidum, aut cineraceum, aut fuluum: qui fuluus aut rufus fuerit, pellucet: ceteri colores densis massis sunt, lucemq; non transmittunt. Eligito rarum, spongice instar foraminosum, pondere leue, minimeq; densum aut ponderosum, colore cum frangitur fuluum, Taurini glutinis modo translucentem, mediocriter lentum, & tamen fragile, dissolutum facile, uenis tenuissimis distinctum: gustu leniter amarescens, paululū acre tenuitate qualitatis, mediocriter saliuam eliciens, & cum lingūe adfricatur, in candidissimum liquorem, lacti similem superficie se resoluens, Adulteratur Tithymallorum liquore, qui similiter ad linguam albescit, sed deprehenditur in gustu, fauces exurentē & dolum prodente acrimonia. Syncerus autem fauces nequaquam scarificat, ut Tithymalli liquor, sed omnino Cyllampeli, hoc est, maioris Conuoluoli liquorem respicit, & similiter nauasam gustatus affert, idē non immerito: est enim Scammoniacuius liquor est Scammonium, Conuoluolo per omnia similis, quantum ad uitulas, flores, lacteum liquorem & qualitates attinet: folia quoq; ab huius foliis parum discrepant: sunt enim ipsius foliis similia, sed pilosa, triangularia, atq; in alarū sagittā figuram redacta.

DE

Scammonium.

DE ALOE.

CAP. CX.

AL O E eiusdem nominis herbæ densatus succus est, quem Indi pellibus infusum ad nos mittunt; eius tres hodie cognoscuntur differentię, ex eadem tamē planta expressæ. Optima Succotrina appellatur, omnium purissima, quę dum frigida est, malleo percussa, in splendida nitidaq; fragmenta dissilit. Colore fulva, aut rufa & pellucida, inter tractandum mollescens, in sole diffuens, atque foris nitido fuscoq; aut nigro colore bonitatem suam intus latentem, abscondens & dissimulans. Saporem habet amarum, adstringentem, aromaticum, abscondens & dissimulans. Oris halitum cōmendantem. Odorem autem aromaticū, & tamē grauem. Secunda Hepatica cognominatur, prædicto densior, aridior, iocininoris modo concreta, Colore in citrino subrufo, & Succotrina minus pellucida. Odore & sapore Succotrinam æmulatur, grauius tamen olet, pauloq; amarior existit, magisq; adstringit. Tertia Caballina uocatur, ueterinariis relinquenda, omnium ponderosissima, aridissima, densissimaq;. Colore nigra, & minimē translucens, terra arenisq; plena, & maius quā prædictæ uirus olens. Gustu amarissima & ualde adstringens, & non sine horribili qualitate aliqua palatum & stomachum afficiens. Eligito in quouis genere pinguisimā, purissimā, hyeme friabilē, æstate mollisculā, & in manibus leni-



tescentem, calculis, arenis ac terra carentem, tam gustu quam olfactu aromaticā amaritudinem respicientem, somnum odore conciliantem, & dissolutu facillimam. Afferitur ad nos ex India atque Arabia, per Syriam & Aegyptum. Herbam autē eius ex Hispania allatam, plātaui, omnibus quibus à Dioscoride describitur notis respondentem, hyeme tamē obgelu eruenda est, & in tepido quodam loco suspendenda, nam in aëre quoq; suspensa uiuit ac incrementum capit, cuius rei causā etiam amphibion appellatur: non enim in Arabia, Indiaq; tantummodo prouenit, uerum etiam maritimis Apulix & Hispanix partibus, sed faciendo succo inutilis.

DE SACHARO. CAP. CXL


I
Natiuum.

II
Thomæ.

SACHARVM quod hodie Zuccharum appellatur, melleæ dulcedinis succus est, è singulari harundinis genere expressus, ad iustam cōsistentiam coctus, & in turbيناتas metas densatus, colore & splendore niueus, aut in candido rubescens, cū aqua dissoluitur & rursum ad crassitudinē coquitur, mellis instar pinguis, & in longum ductilis, dulcedinis gratia & suauitate ipsū mel superans, cuius prima diuisio duplex est, natiuum enim alterū & facticē alterum. Natiuum liquor est, sponte ex harundinis suæ oculis in geniculis germinantibus erumpens, principio liquidus, deinde cum sole excoquitur, pīso, fabæ, aut auellanae æqualibus grummis, in salis friabilem naturam ac densitatem concrelescens, colore interdum candidum, interdū etiam fuluum, & pellucidum: hoc antiquis medicis tantū Sachari atq; salis Indi nomine cognitum fuit. Hodie uerō non amplius affertur, sed eius in locum substitutum est, quod Candum aut candidum cognominatur, cuius mox fiet mentio. Facticiū diuiditur in Pyramidale, Candum, Penidium. Pyramidale rursus in species plures, uidelicet Thomæum, Melisiū, Cannariū & Finale, Thomæū à quodam Occidentalis Indix loco, cui Sancti Thomæ nomen est, cognominatur, ubi plurimum fit: hoc omnium pinguisimum est, colore candidum aut in flauum uergens, frequenter etiam in medijs metis rufum, præsertim in summitate: quod in eo candidum est, præsertim foris, friatur facīle: rufum uerō propter leuissimam

tam

Saccharum.



tam pinguedinis densitatem friantirefistit, cū
resoluitur ruffescit, & in despumando pluri-
mū spumæ excernit, cum rursus ad spissitudi-
nem coquitur, densitatem diu seruare nequit,
sed propter pinguitudinem melli cognatam
semper humescit. Saporem habet cum odore
aliquo pingui, cæteris quidem dulciorem, ma-
gisq; uiscosum, sed minus suauē. Adulteratur
spuma sua, intus pyramidibus admixta: dolus
fusco rubore detegitur. Eligito tactu facile,
pingue, densum, candidius, & quod non adeo
lentum & contumax fractu est, cū malleo per-
cutitur. Melisium similiter ut Thomæum ab
India occidentalis quodam loco cognomina-
tur, mediamq; habet inter Thomæum & Can-
narium substantiam, colorem & naturam: pu-
rius enim, nitidius, candidiusq; Thomæo exi-
stet, idem facile friatur, manibus mediocriter
propter pinguitudinem aliquam adheret friati
farina. Probatum tam intus quàm foris candi-
dissimum: quod autem foris tantum candicat,
intus uero subruffum est improbatum, nam ad-
ulteratur hoc quoq; spuma sua Pyramidibus
intus commixta. Cannarium nominatur ab
Insula Cannaria, inter Aphricam, Spagnollam
& Americam sita, ubi copiosissimum coquitur:
est hoc prædictis duobus generibus solidius,
multo candidius, splendidius, ac purius. Sa-
porem habet ualde dulcem & suauissimum.
Eligito undiq; niuis instar candidissimum, ari-
dissimum, minimè lentum aut pingue, sed mal-
leo percussum, in solidas partes dissiliens, dum
dentibus atteritur, cum strepitu quodam cre-

III
MelisiumIIII
CannariumV
FinaleVI
Candum

pans, atq; si resoluatur ac despumetur, aequam claritatem habens. Finale, siue Zuc-
charum Finis aut Fini à mercatoribus appellatum, nomen inuenit ab extrema & fi-
nem consecuta bonitate. Fit hoc è Cannario cū optimè despumatur & depuratur:
decoquitur deinde lento igne ad debitam consistentiam, postremò in dodrantes
Pyramides cœrulea charta inuolutas fingitur. Optimū quod candore, ariditate &
splendore etiam optimū Cannariū superauerit. Adulteratur Cannario in paruas
metas, seu Pyramides formato, sola metarū paruitate & chartæ colore: Finale men-
tiente dolum detegunt fragmenta, à Cannario nihil differentia. Candum ex quo
uis supradictorum genere fit, è Thomæo difficile tamen; uerū è præstantiore, præ-
stantius & pulchrius. Resoluitur eorum quoddam, ac denuò ad iustam consisten-
tiam, certum modum non excedentem, tum ollis infunditur è rariore luto factis,
intus prius ligneis tenuibusq; hastulis, per transuersum inuicem crucis modo cre-
bro dispositis, repletis, ita tamen uncæ aut duorum digitorum interuallo, ab inuicē
ligna illa distēto. Fiunt hæc è recto fissilib; ligno quale est Abietis aut Piceastris. Re-
ponitur deinde feruens adhuc in calefacto æstuario, donec circa insertas hastulas
densatum, cuborum aut cocti Calchanti modo concreuerit, tum eximitur & in par-
tes ueluti longos racemos diuiditur. Saporem habet Cannario similem, ori indi-
tum sensim liquefcit, dentibus autem comminutum, crepitu uehementiore quàm
Cannarium obstrepit, quoniam omnium durissimam substantiam possidet. Proba-
tur quod in fuluo colore flauescit & pellucet, quòd q; in maiores eubos exequatis

splendidisq; lateribus, densatum fuerit. Laudatur atq; excellentissimum censetur omne Zaccharum, quod recens fuerit, atq; minimum spumæ ac sordium in despumando remiserit. Affertur quod iam descripsimus Zaccharum Pyramidale omne ex occidentis Insulis atq; regionibus, quas antea nominauimus, Antuerpiam, clarissimum inferioris Germaniæ emporium: ubi demum interpolatur, ac Finale coquitur, atq; maxima Candia appellati copia. Affertur etiam a Venetiis terrestri per alpes itinere, non tantum Finale, uerum etiam aliæ eius differentiæ. Hæc sunt Zacchari genera quæ nobis mittuntur hætenus, & quæ unâ cum nominibus suis in Germania cognoscuntur. Ahbi autem natum ueluti in Creta, Cypro aut aliis regionibus, quibus differentiis dignoscatur, inquirendum. Nouisse autem oportet hæc generum differentias non plantæ diuersitate fieri, sed terræ ac locorum, in quibus nascitur, diuersa natura ac situ oriri: eadem enim est herba quæ hunc liquorem fundit, quantum ad figuram, attinet, qualis autem hæc sit, iam trademus. Herba est harundinei generis, ab uno radice cespite plures ac proceras harundines, quas Cannas recentiores uocant, emittens, humanam proceritatem longitudine excedentes, pollice multo crassiores: ac interdum manum complentes, figura teretes, colore flauas, crebris geniculis ueluti Zozis, sextantis, quadrantis, aut trientis interuallo distantibus præcinctas. Folia è geniculis exeunt sursum erecta, figura harundinea, bicubitalia, ac frequenter etiam longiora, duobus digitis latiora, atq; palustri Tiphæam figura quam posito similia: ipsæ harundines fungosa intus medulla plene sunt, & melleæ dulcedinis succo turgent. Radicibus nititur crassis, geniculatis, obliquis, atq; per transuersum se propagantibus, intus non minus quam Cannæ fungosa, dulci, succosâq; medulla grauidis, à quibus oculi aut germina ad consitionem auferruntur. Flores & semen eius quales sint mihi uidere nondum licuit, quapropter si lentio ea præteribimus, donec aliquando utrumq; concedente Christo, oculata fide cognouero. Penidium uerò Zaccharum ex Pyramidali fit, in micæ confracto, per noctem in sufficienti aqua, donec resoluitur macerato, tum ad iustam & diligenter considerandam consistentiam lentis prunis, absq; despumatione coquendum, usque quo gutta eius frigido marmoris instillata, seipsam contineat nec diffluat, aut do nec frigida aquæ instillatum omnino densetur atq; in durescat, nec in ea inter instillandum dissoluatur: deinde super marmoream tabulam aut mensam optime exaquantam, oleo quodam pinguisimo superunctam, dum adhuc feruet effundendū, eiusq; diffluentes oræ & extremitates continuè in medium referendæ: cū autem propemodum Larignæ resine crassitudinem acquisiuerit, in unco parieti affixū, suspendendum, defluensq; sine intermissione ad uncum referendum, atq; celerrimè diducendum distrahendumq; est, donec candorem acquirat, tum ueluti in tennes funes torquendum & exiccandum: agenda hæc sunt in calido æstuuario, manusq; Amylo conspergendæ. Eligito candidissimum, rarissimum, at leuissimum.

VII
Melicalis
mms.

VIII
Penidium.

DE DROSOMELITE, id est, Manna.

CAP. CXII.

DROSOMELI, quod etiam Aëromeli à Græcis, ab Arabibus uerò, Men, Siracost & Tereniabin, à Medicis autem recentioribus Manna appellatur: roscidum siue aëreum mel est, ut ipsa etiam Græca eius nomina indicant. Pandecta tamen Tereniabin diuersum esse à Manna tradit, sed improprie, siquidem genere nihil differunt, utrumq; enim aërei mellis species existit. Est autem omne aëreum mel qualecunq; id fuerit succosus, optimusq; terræ uapor: æstate cum plures ferentissimi dies fuerint, calore eleuatus, in aërem attractus, & ibidem in dulcem liquorem excoctus, qui postremo nocturno frigore coactus, ante diluculum, uice roris super arborum & fruticum folia decedit. Colorem & consistentiam eandem minime habens in omnibus regionibus: quod enim in calidioribus locis, ueluti Arabia ac Syria gignitur, in paruas, friabiles, cãdidasq; micæ densatur: quod uerò apud nos in Germania decedit, (decidit enim æstate serena sæpissimè) liquidum, flauumq; est, foliisq; ceu superinfusus aliquis Sirupus insidet, liquidum permanens, donec


ab apibus & eius generis insectis absorptum auferatur. Gignitur etiam in Calabria, nostrati siccus, propter coeli temperaturam, nostri aëris temperamentum calore uiuentem, Hoc ab incolis colligitur, & ad medicinæ usum seruatur, diu tamen durare nequit: corrumpitur enim ac diffluit quauis humida aëris constitutione, ideoq; calido siccoq; loco repositum seruari debet. Eius duæ à pharmacopolis constitutur differentie, Masticina & Granata, ab argumento cognominatæ. Granata manna minoribus granis aut grumulis constat. Masticina autem maioribus atque Mastichæ guttis propemodum æqualibus. Saporem habet ubi cunq; genita, dulcissimum, aliquantulum Penidii instar lubricum & uiscosum, Eligito recentem, candidam, & anno minimè uetustiore, ultra id tempus inueterata ruffescit & fusca fit, atq; medicinæ inutilis redditur. Adulteratur quàm facillimè Zacharo penidio, graminum aliarumq; herbarum foliolis circumuoluto, & in paruas micæ formato, ut de coelo cadentes, ac circa foliola densatas guttas, habitu suo mentiens, pro natiuo uenit dipossit: indicat fraudem durationis tempus: huiusmodi enim in annos plures seruatur. Nouisse etiam oportet facticæ esse quæcunq; Senæ folia grumis suis amplectitur, nulla enim ex Arabia & Aegypto ad nos affertur Manna, nedum quæ super Senæ frondes in Aegypto prouenientis ceciderit: nam Sena in Europa nascentis satiuæ est, & Manna super satiuas herbas parcius cadit, cum parua earum sit copia: in syluestres uerò frequentius se dimittit, quoniam largos campos occupent, recipiendo huic liquorì capaciores.

DE CHINAE RADICE. CAP. CXIII.

CHINAE radix quam aliqui Chinam appellant, & Schinam pronunciant, à China occidentalis Indig regione nomē accepit, in qua copiose nascitur. est autem tuberosa, inæqualis, media inter Tuber & Rhodiam radicem figura, magnitudine incerta, rarò tamen triente breuior: foris in cineraceo pallida, simulq; fusca, intus uerò candida, nigrisq; filis per longitudinem transeuntibus distincta: substantia tenera, fungosa, leuis & arida ueluti Galanga aut Rhodia radix: ea digitis confricata & auribus admota Pumicis aut Meliæ terræ instar, strepitum emittit. Saporem habet tenuem, subdulcem, & aliquantulum suauem. Odorē similiter tenuem, non iniucundum, & halitum inter masticandum commendantem. Vtuntur indigene ea aduersus morbum Gallicum, decoctum ipsius propinantes. Affertur Antuerpiam.

FINIS LIBRI QVARTI ET VLTIMI

Folium ad cap. 52. fib. 4.



Elaeagnus Cordi.



Caspari Collino Pharmocopœo

peritissimo Seduni apud Vallesios, Conradus Gesnerus S. D.

ACCIDIT errore quodam, ut pictor dum stirpes aliquot è meo pictarum stirpium thesau-
ro pro his Cordi libris depingeret, has etiam numero quinq; ad Cordi libros nō pertinentes,
in formis ligneis expresserit. quod ne frustra factum esset (nostrum enim stirpibus quod meditatur
uolumen, an cum eiusmodi aut aliter factis iconibus, olim Deo largiente edituri simus, nondum con-
stitimus.) Cordi libris hic eas subiungere, & ad tuam humanitatem, optimè & charissimè mi Cole-
line, mittere uolui. tu enim inter Pharmacopœos eruditione excellis, & meum in Stirpibus inue-
stigandis studium benignè iuuas, communicandis subindè ijs quæ in patria tua herbarum seracissi-
ma, non uulgaria tibi se offerunt. His igitur fruiere interim, donec tandem nostrum etiam De Fontia-
tibus Helueticæ & Germaniæ medicatis, iam dudum in tuam gratiam inchoati, & propter alias oc-
cupationes intermissum librum absoluero. Vale. Tiguri decimo Calend. Ianuarij, instantis anni
M. D. LX.

DE TVLIPA TVRCARVM



HOC Anno
à natiuitate
Domini M. D.
LIX. initio Aprī-
lis, Augustæ, in
horto magnifici ui-
ri Ioannis Heinri-
chi Heruuarti ui-
di herbam hīc ex-
hibitam, ortam è
semine quod By-
zantio (uel ut alij,
è Cappadocia) ala-
latum erat. Flore-
bat tū temporis,
flore uno pulcher-
rimè rubente, ma-
gno, instar lilij ru-
bri, octonis condi-
to folijs : quorum
quatuor foris sūt,
& totidem intus,
odore suauissimo,
leni, & subtili, qui
breuī euanescit.
Color interius pal-
lidus est aut sub-
flauus: & stamina
tanquam croci, in
medio intercepta
ceti geniculo, ipsa
quoq; octona, ex

quibus itidem alia exterius paulò sunt, alia interius. Calix nullus. Caulis est circiter
pedem altus. Folia in eo quaterna albicant, crassiuscula, solida, duos palmos (id est
digitos octo) longa, Orcheon ferè foliorum figura, modicè recuruato margine,
(non adeò quidem ut pictura præ se fert, quam antea expressam amicus quidam
Aa ij

Tulipa.

ad nos misit.) ex his tria inferiora maiuscula sunt: summum, paruulum. Maculae nullae dum erant, quas in adultioribus foliis apparere aiunt. Radicem non uidi: sed aiunt esse bulbosam instar hermodactyli ferè, uel porri forma & magnitudine, tertio anno florem producere. propagari de radice, bulbulo puto adnascente, semen nullum proferre, siue natura, siue nostri cœli culpa. Turcio uocabulo Tulipam uocant aliqui. Sed aliam herbam in Italia eruditi Turcico Tulipæ nomine demonstrant, cuius picturam Ioan. Kentmannus nobis communicauit: ternis foliis, flore ceu lilii parui, luteo, bulbo ruffo, simili cepe. cuius semina olim Guſſandinus Borus ad me misit, lata, ruffa, similia seminibus lilii syluestris quod Martagon Itali uocant, ipse Satyrium triphyllum esse coniiciebat. & forè nostra etiam hæc Tulipa, Satyrii species est, præsertim erythri uel erythraici, cum flore rubeat. Quòd autem semina non fert, uel regionis uic accidere potest, uel quia species diuersa est. nam & Iridis species alia femine fecunda est, alia sterilis. Sunt ex Turcis (inquit Kentmannus) qui Tulipam dicunt nomen habere à flore, qui formam refert pileoli Dalmatici,

DE CHAMAECERASO MONTANA.



FRVTEX in alpidibus Claronæ, circa Fabarias thermas, alibiq; & apud nos etiam in Albio monte nascitur, cubitalis plerumq; aut parum supra. qui cerasa pulchra & rubra fert, ueris simillima, paulò minora, pediculo etiam simili: succo plena aquoso, subamaro, croceo per maturitatē, hoc est, in fine Septembris, locis frigidioribus: apud nos Augusto. prodeunt ea ex alarum cauis. semina insunt alba, lata, in singulis fructibus ferè sex septemue, aut plura, circa pediculum inter se coniuncta, amara. Fructus quidem gemelli uisuntur. Aspectus sanè cerasa uera mentitur, sed gustus ingratus ilico prodit. Hoc etiam peculiare habent, quòd punctis binis nigricantibus singuli hi fructus, tanquam ocellis aut pupillis notantur. Folia quoq; cerasi, (uel arbuti, sed non crenata) oblonga, in mucronē exeuntia, marginibus non setratis: sapore non certo quidem, sed ingrato: bina. Stipitis cortex albicat, ut fruticis illius quem *Beinhülzen* Germani uocant, (*Dodonæus*, ni fallor, *Periclymeni* speciem: nos *Periclymenum* rectum uel marem appellabimus:) cui sanè cognatus uideri potest, foliis & fructibus tanto maior, quantò stipitate & ramis minor est, succo & sapore eodē, nescio an etiam seminibus. Florem quoq; nondū uidi. Medulla ligni alba est. Quòd si, ut suspicor, cognatus illi fuerit, *Chamaepericlymenum* appellabimus. Sed hoc a-

Chamaecerasus lias certius indagabitur: interea (si placeat) *Chamaecerasum* nuncupemus: nam & montium nostrorum incolæ *BergEriese* appellant, hoc est, Cerasa montana. In literis quidem, quod sciam, nulla hæcenus eius memoria extitit: neq; usum eius ullum esse

esseputo, audiui quidem quatuor aut quinque cerasa deuorata, uomitum clere: aliquid quando etiam aluum. Chamæcerasus alia est cuius meminit Dioscorides ille, aut quisquis est, confarcinator libri Græci De morbis curandis per simplicium medica, a capite ad pedes, &c. capite, cxxiii his uerbis: Chamæcerasus, herba (ῥόη) exigua, circa filices nascens: eo tempore quo & arboris (nimirum cerasi) fructus maturefcit, duos aut tres fructus cerasi fructibus per similes profert, ualde odoratos instar moschi, huius fasciculus cum radicibus, foliis & fructu, in uino decoctus ad tertias, certissimum est remedium ad sclerias, id est, duos tumores emolliendos. Sic ille. Quænam autem sit herba ista, fateor mihi non constare, dubitavi aliquando an hæc esset quæ fraga fert: quoniam & parua est herba, & fructu non dissimili cerasi, & locis quidem montanis (illic enim & circa filices quoque præcipue nascitur) non ante cerasa maturefcit: & fructus odore est suauissimo, præsertim altioribus locis: & ad remedia uaria herbæ simul & fructus radicumque usus esse solet. & aliud eius Græcum nomen hætenus nemo dixit, & ipsa quoque arbutus à Bithynis uidetur Chamæcerasus dicta, ut inferius patebit. An uero duos tumores mollire aut discutere possit, affirmare non habeo. est quidem ei uis astringentia, quæ partes corroborat intus forisque, sed aperiendi quoque uim habet, (& per omnia fere eandem quam pentaphyllum:) quæ iecoris ac lienis obstructionibus summopere prodest: & urinum strenue ducit, sicut & renum calculos. Fructus quidem non propriè Moschum olerem mihi uidetur: & arbuto quam ceraso similior: quare Chamæcomarum potius quam Chamæcerasum appellarem. nam & Plinius: Aliud (inquit) corpus est terrestribus fragis: aliud congenerie eorum unedoni, &c. xv. xxiii. A Nicolao Myrepsio fit huius herbæ corrupto nomine φράδα, in Martiati inagni compositione: ubi Fragulam quidam Latine nominarunt. Ab eodem χαμοκέρασις (sic enim habet manuscriptus codex quo Fuchsius usus est, ut noster iam citatus Dioscoridis codex χαμοκέρασις) radix nominatur, in Dioscato lxxxii, ad iocinerosos, lienosos, &c. inscripto: ut proximè præcedente (ad iocinerosos) radix eius simpliciter. Fuchsius simpliciter cerasum humilem ab eo sic nominari putat, nec aliud addit. Recentior quidam Græcus innominatus, (cuius interpretationem super nomenclaturis simplicium medicamentorum, barbarè quidem prorsus & ineptè scriptam habeo) Cistum aliis nominibus Citharum, Oribithrum, & Chamæcessarum (sic enim scribit χαμοκέραρον, non χαμοκέραρον) uocat: nos apud Dioscoridem Cistum aliter Citharum, aut Cissarum, dici legimus. Sed Cistus (opinor) nec fructum nec aliud ceraso simile habet. Dalechampius doctissimus Lugduni medicus Chamæcerasum nominat arbusculam, quæ Arabicè Mahaleb dicatur. Aduchitur (inquit) ex Syria, quamuis ubique per sepes istie (circa Lugdunum) nascatur, sed arbore humiliore, fructu minus habito, nucleo & semine tenuiore ac graciliore. Folia rotundiora sunt: flos albus, ceraso similis. primus omnium uere prodit, fructus sigillatim pediculo suo adnexus, niger ubi maturuit, rotundus, ex amaro subdulcis. Sic ille: a quo etiam ramulum unum cum fructu suo accepi: quem depictum inter alias Cordi descriptionibus plantarum adiectas icones reperies. In Gallia passim nasci Belonius mihi retulit, & inuenisse se etiam in monte illo Rhætorum, qui inter Curiam & Clauennam interfacet. Seminibus eius quæ odorata sunt uti Lugduni illos, qui Chirothecas odoribus imbuunt. Nascitur, si bene memini, inuenta aliquando mihi, copiose in monte proximo Vuesæ oppido (quod ad Riuarium lacum apud nos est) exeunti Curiam uersus ad sinistram, locis lapidosis. Et, nisi fallor, in Vallesia quoque: ut conicio ex epistola tua, doctissime Colline, qua superiore Augusto ad me scribebas, inuenisse te fruticem satis altum, foliis fere cerasi, cui etià fructu (quam uis immaturo adhuc tibi uiso) respondere uideretur: & pediculis oblongis. Huius ramulum, & fructus, quanquam aridos, ut quamprimum unum cum aliis quas mihi promisisti rebus ad me mittas, cupio. Mahaleb (uel Mahalub, inquit Anicenna) eligendus est albi coloris, & purus. Calefacit in primo ordine, & modicè siccatur: abstergit, attenuat, resoluit, & mitigat dolores, præsertim ilium ac dorsi, cum aqua

multa hîbitur utiliter in syncope. Prodest etiam aduersus coli morbum, & calculos renum ac uesicæ. Mahaleb (inquit Bellunenſis) est granum fructus, simile ossi cerasorum, notum in Syria, & commendatum contra calculos renum. Serapio Phillyream, Arabicè Mahaleb nominat: quam etiam Matthiolus pluchrè pictam exhibet: sed fruticem à nostro iam dicto siue Mahaleb (ut Datechampi & Bellonius mihi nominarunt) siue Chamæceraso diuersum. Plinius lib. xv. cap. xxv. cum cerasorum diuersa genera memorasset, subdit: Sunt & Macedonica parua arboris, raroq; tria cubita excedentis, & minore etiânum frutice Chamæcerasi. Tales & tantas (id est, urbanas quidem & propter fructum expetitas cerasos, sed nanas ac pumilas) hodie etiam aliqui in hortis alunt, ut Torgæ apud Misenos Kreichius, ualdè humilem & fruticem potius quàm arborem. *Swergkriese* uocare licet Germanicè, sicut & Malum nanam, *Swerg ôpfel* appellant. Asclepiades Myrleanus (ut refert Athenus lib. ij. Chamæcerasum dictam, pumilam esse tradit, in Bithynorum agro frequentem, cuius radix non magna sit, ut neque ipsa arbor, sed par rosarum arbori, (ut uertit Natalis de Comitibus: Græcus codex noster impressus habet, ἀλλὰ τῆ ἰσὺς: Natalis legit nimirum ἀλλὰ τῆ ῥοδῆς uel ῥοδωνιά ἰσὺς.) Baccæ eius cætera omnia cerasis cõsimiles sunt: sed copiosè uescientibus caput uisui modo grauant, & dolores cient. Hæc quidem Athenæus de Mimaecylis, id est, unedone uel arbuti fructu intelligit, quorum & arbor huiusmodi sit: & qui fructus plures septenis ingestæ, capite grauat. Apparet itaq; Chamæcerasos esse & dici diuersas: quas distinguendi gratia, à nobis exhibitam, si libet, montanam cognominemus: eam cuius grana à Syris petuntur, Syriacam: quæ in hortis propter fructum edulem colitur, urbanam, Arbutum autem & herbam quæ fraga fert, usitatis suis, non Chamæcerasi, nominibus, ad uitandam homonymiam, usurpemus.

DE CHAMAEMESPILO.

CHAMAEMESPILVM nomino hunc fruticem, quod & ualdè humilis, & fructum ferens mespilaceum, proueniat. Frutex est lignosus, cubitalis, foliis ferè ocimi, subrotundis penè, parte supina in canis uel albicantibus & modicè lanuginosis, ferè insipidis. Baccæ in eo singulæ aut binæ dependent, elegantes aspectu, cocci colore, magnitudine qua fructus polygonati: umbilico in quinque partes dissecto, ut in generis Mespilacci fructibus cum cæteris, tum Spinæ appendicis siue oxyacanthæ, cuius etiam saporem refert, hoc est, insipidū. Caro intus siccior, colore subluteo: grana terna, parua ceu uinacea. Matureſcunt initio Iulii, decimo enim huius mensis die maturas decerpsi. Ramuli cortice subruſſo uestiuntur: & minores ex eis uiminum instar lenti sunt. Nascitur in montibus & collibus cum alibi, non passim tamen, tum iuxta Badam nostram in Legerio monte, & alicubi in Albio nostro. In Bernensi agro *Wâlpi* uocant, ut audio: licebit etiâ *Swergkriespelen* (id est, Mespilum terrestrè uel nanam appellare. Itali, ni fallor, Pyrum ceruinam (uulgo Pero ceruino) nominant; ut ex ramulo quem doctissimus Aldrouandus ad me misit, facillè cõiicio: foliis sub rotundis, ocimi, infernè albicantibus, mandenti subglutinosi: cortice subruſſo: est Bellonius cum apud me Chamæmespilum hanc uideret, similem potius pyro ceruinæ, quàm eandem existimabat. Nascitur & Italorum Pyrus ceruina in alpiſibus: ramulo quem habeo cum foliis, nihil differt: fructū non uidi. Bellonius Chamæpyrum nominabat: mihi rectius Mespilis adnumeranda uidetur. Idem alicubi in obseruationibus suis Gallicis hunc fruticem Gallicè Malancier appellat. Chamæpyri nomen non laudo ex Græco & Latino compositum. Chamæapion potius dixerim, quanquam & Apios uocatur herba, cuius radix ἀπιον, id est, Pyri similitudinem habet.




DE CHAMAENERIO.

CHAMAENERION uoco hanc plantā, quod Nerion siue Rhododaph-
 Cnē aliquo modo æmuletur, foliis, floribus quod ad sitū, & semine in siliquis la-
 nuginoso, &c. & natalibus, iuxta aquas. Veneni quidem, ut Nerion, nihil habere
 puto. Sed quoniam aliæ etiam species huic similes sunt, de omnibus aliquid afferam:
 merentur enim omnes sub genus unum referri, unoq; nomine cōmuni appel-
 lari, differentiis à magnitudine aut aliunde adiectis. Ruellius unam tantū eius spe-
 ciem describit, quam Delphinium esse putat. Herbarii quidam (inquit) putant esse,
 quam Filium ante patrem suprà diximus appellari, (atqui suprà lib. 2. cap. 125. in Bellio flore al-
 terius herbe quam alij, Itali præsertim, eodem nomine Filium ante patrem, uel Antipatrem uocant, meminut, hic cō-
 fundit,) quod siliquam & intus semen ante floris exitum ostendat, rectius si Partus an-
 te conceptum ab eis appellaretur. Iam audio aptius à teretis siliquulæ per extremū
 in expansum florem exeunte, Buccinariam quadam similitudine dici. (Dioscorides
 etiam Delphinium suum à Romanis Buccinum uocari tradit.) Surculis à radi-
 ce unapedalibus funditur, foliis paruis, tenuibus, intersectis, incuruis, longiuscu-
 la Delphinis effigie: flore uiolæ matronalis, subpurpureo: semine in ualuis
 teretibus exiguo, milio (mihi non uidetur) non dissimili. Inuenitur frequens
 in asperis, & locis totius dici solem accipientibus. Hæc ille. Mihi magis incli-
 nat animus Delphinium esse consolidam regalem uulgò dictam, &c. Vide-
 tur autem Ruellius primam & uulgarem huius generis speciē tantū obseruasse:

Buccinaria

Chamenerion.

Antoniana



Epilobiū.

spide ferrea. Iam dictæ herbæ species altera reperitur, solo floris colore, quicquidus est, differens: rarior inuentu. Vtraque iam dicta foliis & caule lauis est. Tertia species aliquantò maior, & leniter hirsutis foliis reperitur, infrequentior prima. Quarta maiori frutice nascitur, eoque suauis odoris, sed leuissimi, cum relique omnes odore uacent: sed huius etiam forsan odor ille tenuis, non omni tempore sentitur, mihi quidem uehementer gratus. Siliquæ quadrangulæ sunt, non teretes: flos purpureus: caulis rotundus & ex parte puniceus, ut & anguli siliquarum. Radix quadrangula, tenuibus per interualla fibris capillata, dura et ferè lignosa. Sed ex his notis aliquæ forsan etiam aliis speciebus conueniunt. Calidam esse iudico in medio secundi gradus, siccam in fine eiusdem uel initio tertiæ: astringit enim euidenter, sed cum dulcedine quadam suauis: ac simul modicè abstergit, leui quadam ferè nituosa facultate, ut diuersis eam constare partibus ac uiribus appareat. Inferiores quidam Germani (Frisii præcipuè puto) hanc priuatim *Schilmont* appellant, nescio quæ etymologia, nisi fortè quasi *Schelmund*/ ut superiores Germani dicerent, quod ad crustas & ulcera oris, quibus os excoriari (*Schelen* dicunt nostri) uidetur, præcipuam uim habeat, in illo præsertim morbo & stomacace, quam accola quidam Oceani regionibus illis peculiarem, *Schorbock* appellant. Contra quod malum olim iisdem in regionibus Britannica utebantur, hodie non satis cognita. Eadem uires prædictis etiam speciebus esse coniicio: sed minus efficaces. Poculis imponere

quæ à quibusdam, ut dictum est, Filius ante patrem uocatur: ab aliis (in Germania inferiori præsertim) Antoniana, uel sancti Antonii herba: ab eo nimirum quod Erysipelatis, quæ uulgo sancti Antonii ignem nominat, medeatur. At Romæ herbam aliam sic nominari audio, quæ eruditis Plumbago Plinii uidetur, causticâ, & ignis instar urentem, non extinguentem. Nostri *Schoftraut* appellant, quoniam dolores eorumque impetus in dentes, abigat, collo suspensa, ut creditur: aut fumo eius dum uritur ore excepto. Dodonæus inter *Lysimachia* describens, & species eius tres distinguens, Germanicè uocat *Braun oder rot Weiderich*/ non usitato, (ni fallor) sed propter aliquam cum *Lysimachio* similitudinem à se conficto nomine. *Lysimachium* quidem genere toto diuersum dixerim: & Dodonæus etiâ, *Lysimachium* illud solum ex quatuor à se propositis iconibus, quod luteos flores habet, uerum esse, & quæ de eo tradunt aucthores præstare posse putat. Mihi ubi uetera nomina non inuenio, aut dubito, nota potius excogitare certa ratione, quam illis temerè abuti, placet. Appelletur igitur si libet *Epilobium*, *ἐπιλόβιον*, uocabulo ex tribus composito: quoniam ion (id est, uiola seu flos eius, quæ *Leucoio* similem habet) *ἐπιλόβιον*, id est, super siliqua nascitur, eoque insidet, ita ut siliqua suo flore ceu præpiletur, sicut hasta uel hastile cur

ponere solent, qui stomachacæten timent aut patiuntur. Hanc Lucas Ghinus Italus *Lychnis*.
Lychnidem existimabat. Hæstæus memoratæ huius generis species, singulis cau-
 libus exiliunt. At quinta species, quam priuatim *Chamænerion* nuncupare libet, *Chamæne-
 rion*.
 propter maiorem cum Nerio similitudinem, pluribus surgit caulibus; omnium maxi-
 ma, nisi aquæ incrementum prohibeat, eius ramulæ unum depictum exhi-
 bui. Vidi iuxta riuos & lætiore solo sæpe quatuor aut quinque cubitorum altam: circa
 sylvas & montes nascitur, foliis ferè Nerii. Aliqui apud nos priuatim *Sclittraue*
 appellant, id est, Igniariam: quod circa sylvas illic potissimum nascatur, ubi arcæ ua-
 eæ ab igne quondam illic excitato relicte fuerint. In hortos translata diu uiuit,
 & æstate ferè tota à solstitio usque in autumnum particulatim floret. Calidior
 quam prædicta uidetur, & minus aut nihil astrictionis habere. Quare non asse-
 nior illis qui *Lyfimachii* speciem hanc esse suspicantur. Sexta & ultima species
 nihil à quinta differt, nisi quod undiquaque minor est, foliis angustioribus: rarior
 inuentu apud nos, aut ferè nulla. Non procul Verbano multa. Omnes loca aquo-
 sa amant: & aquam uel indicant præsentem, uel subesse pollicentur. Siliqua o-
 mnium in hoc genere à maturitate dehiscens, in quatuor partes distorquetur, &
 lanuginem quandam albam splendidamque ostendit. Hæstæus sex *Epilo-
 bii*, si ita mecum nominare libet, differentias descripsi, ex quibus an ulla sit *Vin-
 cetoxicum* à Syluatico dictum, æstimandum est: licenim ille. *Vincetoxicum*
 (inquit) foliis æ Persici, stipite subtili, qui tendit ad uioleaceum colorem; idemque
 Antipharmacum dicitur. Caulis eius longus unum aut alterum palmum, uires
 contra toxicum habet, & miscetur theriacæ diacæssaron in Antidotario Galeni.
 Scio quidem etiam alias herbas aliis Vincetoxici nomine uenire. Nascitur in
 albis frutex quidam cubitalis, aut paulò altior, odoratus, roseo flore, *Alp rosen*,
 foliis Oleæ, interiori parte rufi coloris cum fusco mixti, pinguis, &c. Hunc uir
 quidam eruditus in Italia ceu *Chamænerion* quoddam, *Nerion* Alpinum uocia-
 tar. Sed quamquam folia Nerio ferè similia habet, reliqua tamen forma naturaq; to-
 ta discrepat.

DE CONYZOIDE cœrulea.

CONYZoides à nobis appellatur hæc herba, donec uel antiquum ipsius
 nomen reuocetur, uel nouum aliquod commodius imponatur. Cognata ui-
 detur Asteri Attico Fuchsi, quem Itali quidam uir docti Amellum Vergili
 interpretantur, nescio quam rectè. Conyzis aliquo modo similis est foliis, flore
 & pappis. Ab Hier. Trago describitur libro primo, capite quadragesimo nono,
 cum Atere Attico Fuchsi, & aliis duabus herbis, nomine Tinctorii floris im-
 posito, quoniam tinctores alicubi unius ex quatuor istis floribus utantur. Fuchsius
 hoc nomine Genistæ speciem quandam apellauit, nos incertis uagis & homony-
 mis uocabulis abstinēbimus. Ex iis quas Tragus describit, duæ tantum aut tres
 priores, cognatæ inuicem uidentur herbe, & *Korv Zedlæs* uocari posse: adiecta
 singulis aliqua à colore aut aliunde differentia: nos hic exhibitam cœruleam co-
 gnominamus, à colore floris subcœruleo. Germanicè alicubi *Schartenkraut*
 appellatur, sicut & aliæ duæ Trago descriptæ species: quod foliorum margines
 (in ea præsertim specie opinor, quæ flores luteos fert) figura & acie falcem quo-
 dammodo referant: alicubi etiam herbis aliis communi nomine *Heidisch Wund-
 kraut*. Omnes calidi & sicci temperamenti sunt, lutea minus calida, cœrulea ma-
 gis, Fuchsi Aster inter utrâque: ita ut hanc in secundo gradu calefacere, luteam
 in fine primi, cœruleam in principio tertii dixerim: quantum nunc meminisse
 possum ex eo quod sæpius singulas gustando iudicaui. Siccandi quidem
 gradus non tam facile est gustu discernere: neque enim tam citò tamque eu-
 denter siccandi uis in linguam agit ut calefaciendi. Omnes tamen gradu secundo
 siccare mihi uidentur. Ergo Conyzoides cœrulea caule exilit singulari, rotun-
 do, striato, inferius rubicundo, hirsuto, pedali plerumque, Folia Oleæ ferè sunt, citra

Dentelaria quibusdam.



ea radice latiora, duo decim aut plu-
ra, quæ caule etiam prognato durant,
(quod in plerisque aliis herbis non fit:
quo non observato icones Matthioli
aliquoties non probe expressæ sunt.)
Eadem hirsuta sunt, oblonga, angu-
sta, acris, sapore non nihil ad pyrethrum
accedente. Cauli sine petiolis hærent
per intervalla, alternis singula ab
imò ad summum. Supra dimidium
caulem ramuli ex initiis foliorum ceu
alarum caulis exoriantur breves: &
flores sustinent, singulos, binos aut
ternos, subcæruleos, multis minutis
staminibus constantes, in medio fe-
rè cauos, sed lanugine pallida pappo-
rum instar refertos. Flos totus mox
in pappos soluitur, citius opinor quàm
ullus alius. *ἡραζιγορρα* dixeris, nam
alius est *ἡραζιγορρα*. Floret Julio mense,
asperis, siccis & apricis locis, ut circa
sylvas, & in muris urbis nostræ, ad
fossam cervis dicatam.

FINIS.

SYLVA

SYLVA OBSERVA-

tionum uariarum Valerij Cordi,

QVAS INTER PEREGRINAN-
dum breuissimè notauit, primum de rebus fossilibus, ut lapidibus, metallis,
&c. deinde etiam plantis.

CL. V. IOANNI PLACOTOMO DOCTORI MEDICO, ERV-
ditione & artis usu praestantissimo, Conradus Gese-
rus Medicus. S. D.

RATIAE ALIQVIS FRVCTVS, GRATITVDINIS



Gratitudo argumentum, ad eum à quo exiit primum, ut reuertatur, par est. id quod elegantia studio antiquitas tribus gratiarum simulacris scitè propositis, ita ut una daret auer-
sus: ex reliquis duabus inter se aduersis, una acciperet, altera redderet, quanquā nō ex-
pectāti & auerſe, nobis insinuauit. Hoc mihi meū animo uolūti, iur ornatissime,
omnes ferè Valerij Cordi, quæ hoc uolumine cōprehenduntur lucubrationes, in tu-
um unius nomen inscribi. & ad te unum redire, postulare uidebantur. Quoniam tu
& in Dioscoridis libros annotationes, & quatuor illos quibus omne genus stirpes
describuntur ipsius Cordi manu perscriptos: & hæc obseruationes rerum natu-
re uariarum, pro summo & benignissimo candore tuo, mittere ad me non designa-
tus es, & ut publice utilitatis ergo euulgarentur, hortatus. Rursus cum in optimis & doctissimis quibusq; uiris (quon-
rum uel præcipuis te adnumero) non singulas uirtutes, sed arcto complures inter se iunctas uinculo esse considero: ui-
rum te ut eruditum, candidum, & humanum, ita liberalem quoq; & natiuū esse, hoc est, promptum ad communi-
candum, non res modò, sed etiam honorem & gloriam & à uana ambitione alienum, facile mihi persuadeo. Erudi-
tionem tuam libelli abs te editi loquuntur, quorum aliquos magna cum uoluptate, & non sine fructu perlegi: ac in-
dies magno iudicio, summaq; diligentia conditam à te Pharmacopœiam expecto: cuius lectione frui si mihi licuerit, eo
quidem nomine felicior me arbitror. Candorem tuum, & de uirtute & de re, hi libri tam promptè mecum commu-
nicati ostendunt. Itaq; iudicabam te in laudis ex horum librorum editione participationem, facile quosuis bonos &
eruditos uiros, illos præfertim, qui & ipsi aliqua Cordi scripta, uel tecum, ut Ralla honorandus ille senex Pharma-
copola Lysſiæ: uel mecum, ut nobilis ille Noriberge medicus Hieronymus Heroldus, impertiti fuissent. Quamob-
rem & illis & alijs quibusdam egregijs uiris diuersos huius uoluminis libros nuncupauī, alijs alios: Heroldo autem
quatuor illos, quibus uarie plantæ describuntur: quos ab eodem primò acceperam. Ralle, in Dioscoridem annota-
tiones, quod ab illo primum eas ad te peruenisse existimarem. Merebatur quidem C.V. Ge. Aemylus, Theologus in-
signis, & affinitate tibi coniunctus, ut aliqua huius uoluminis pars in ipsius nomen inscriberetur: quoniam tibi hæc
edituro, quæcumq; à Cordo olim acceperat, emendata, & breuissimis scholijs illustrata permisit. Sed reuerentia tanti
uiri, facrarum & humanarum literarum cognitione præstantis, qui in maiora & grauiora studia nunc totus incam-
bit (quorum comparatione rerum naturalium notitia omnis puerile quiddam est) id audendi animum mihi excusa-
sit.

Accipe igitur doctissimè & charissimè mi Placotome partem aliquam debiti mei, aut si mauis depōsi-
ti reddendi, Syluam hanc Obseruationum uariarum Cordi tui, hilari & serena fronte: in qua & authoris memoriam
colas, & Gesneri erga te obseruantiam, gratitudinem, ac tui amorem agnoscas. Non autem dubito, quin optimum et
huius & omnium Cordi librorum patronum te sis declaraturus, qui ipsius amicitia olim familiariter usus es, et Dio-
scoridis libros ipsum enarrantem audisti. Seruabis autem hoc ueluti pignus debiti maioris, quo præstantie tue, tum
propter enumeratas iam causas, tum alia quedam non uulgaria in me beneficia tua, obligatum me profiteor. Est ea-
nim etiānum inter nauis mea, erūq; dum uiuam, series illa Succini Prutenici globulorum, quorum aliquot ani-
malculis infectis (quæ liquidum adhuc nimirum inuoluerat uiua) rari & spectabiles sunt, eoq; chariores mihi,
quod etiam Plinius Succini hoc nomine naturam sit admiratus. Sunt & Succini orientalis globuli duo, carissima mui-
noræ tua, candore & perspicuitate crystalli: Quod tante authoritatis est, sicuti scribis, ut reginis Portugallicæ dotem
impleat, & pro suauissimo precio soq; suffitu Vlyſibone uratur: cuius in literis nulla hæcenus, quod sciam, memo-
ria fuit. Sunt deniq; lapides metallici, qui circa Islebiam eruiuntur, admirando nature artificio, quamofis piscium fœ-
mis, æreo penè colore, insignem: quibus es etiam consulari audio. Pro his omnibus ut perpetuò memorem gratumq;
animum tibi seruabo, ita quamquam in remotissima Germaniæ ora, Danisici (quæ clarissima Prusiæ ciuitas & nobi-
le emporium est) degentem, nunquam non amare & uenerari pergam. Vale. Tiguri Heluetiorum, laibus Decem-
bris. Anno salutis. M. D. LIX.

VENA siue terra aluminosa est ad Brambecum pagum in ripa Albis dextra, quinque ferè infra Vuittembergam miliaribus. habet etiam aliquid de Misy ac Calchantho.

Pyrites ibidem in eadem uena est, friabilis ac impurus.

Aluminosa terra candida lubricaque est in cuniculis Davidis Hatzkerodi ad Hercyniam Saxoniae.

Pyrites multiplex ibidem est, uidelicet solidus & friabilis.

Aerugo ibidem in cuniculis fit destillante per solidum pyritem aqua. friabilis uerò Pyrites minimum aut nihil æruginis gignit: sed plus Calchanthi ac Aluminis.

Bituminosa terra levis, arida, & quæ nunquam lutum fit, etiam imbris maximis, & quæ accensa ardet carbonum modo, donec in cinerem soluat, tota, odore dum ardet Bituminis sulphuri mixti, Halæ Saxoniae est, sub ipsa urbe, maxime autem in fossa uersus meridiem.

Bituminacei carbones sunt propè Cunhardem, ubi etiam bituminosa æris & argenti uena est.

Salsa terra est circa Seburgum undiq; ad salsum lacum: lacum alioquin dulcem inficiens.

Salsus ille lacus omni septennio turbatur: in medio enim eius abyssus est, emitens ceu uisti bituminis & sulphuris foetorem, quo totus inficitur lacus, adeo ut pisces in eo moriantur, quotiescumq; turbatus fuerit.

Salsa terra salisq; campi sunt circa Langebeugen lacum, cuius aqua è salso fluit lacu: item Salzemunda, id est, ad Salsam Mundam pagum ad sextum ab Halæ Saxoniae lapidem.

Bitumen sub durum effoditur in agro Brunswicensi, campestri loco.

Bitumen liquidum olei modo fluidum ibidem confluit in excauatas foueas, quo rustici utuntur ad lucernarum lumina, & ungendos curruum axes.

Cœrulei uenæ propè Bituminis huius scaturigines sunt.

Dactyli Idæi sub flauo ac pellucidi ibidem effodiuntur è glareoso solo, quos rustici uocant *Alusstein*.

Fons qui Hildesheimii sulphureum limum emittit, ante sedecim annos primum fluere cœpit, post bellum, quod contra Hildesheimianos gessit princeps Henricus Brunswicensis dux, nunc exul.

Terra candida, lubrica, & splendens effoditur ex montanis Hercyniae campis: qua dealbant rustici parietes circa Haselnselde oppidum ac Breytensteinum pagum. Agyræam pro Bolo uendunt albo, fortè non malè.

Aes purissimum, quod suum est, reperitur circa Vuimelrodum pagum ad tertium à Mansfelda lapidem: admodum ductile est.

Cœruleum ibidem pulcherrimum, æris uenæ adnatum inuenitur.

Chrysocola etiam pulcherrimè uirens eidem inest uenæ.

Gypsi excellentissimi variae sunt species inter Northusium & Stolbergum.

Salsus tractus est circa Atram oppidum non longè à Franckenhusio.

Salfit Scheningii in ducatu Brunswicensi ad uigelimum quartum à Brunswico lapidem.

Sal fit in Salz dalheim pago ad quartum à Brunswico lapidem, uersus meridiem.

Sal fit in Solta pago prope Bodenbursum pagum, ad quartum ab Hildesheimia lapidem,

Lapis Alabastriti similis sub arce Vuolfenbuttel inuenitur.

Lapis specularis inter Brunswicum & Vuolfenbuttel circa Stederburgum cœnobium effoditur.

OMNIA QUAE SEQUUNTUR VIDI ET COGNŌVI PRIMVM
*in peregrinatione Anni M. D. XLII. post natum Christum, [Sunt autem
 Observationes primū de rebus varijs fissilibus, lapidibus, me-
 tallis, &c. deinde etiam de plantis.]*

IASPIDIS uiridis fragmentum, cuius uena per saxum ferebatur non longè à
 Rochlicio oppido Misniae uersus septentrionem.

Chalcedoniam appellatam gemmā uersicoloribus lineis sinuosam ibidem, pau-
 lō tamen plus ad septentrionem, iuxta Betulletum.

Marmor planum, mensarium, subcinericū, fuscis maculis, ueluti cornicum ue-
 stigis distinctū, Rochlicū in radice montis inuenitur, uena dilatata.

Iaspis spadicēus inuenitur copiosè in agro Aldēburgensi in Misnia, quo rudi ad
 huc publicæ uitæ sternuntur.

Iasponyx gemma constat spadiceo Iaspide & candicante Chalcedonia seu onyx
 che. inuenitur Aldenburgi in Misnia.

Onyx simplex & uulgaris reperitur ibidem humano ungui colore similis.

Sarda, id est, Corneola, siue Carneola, eadem est fortassis quæ Sarcites apud Pla-
 nium, reperitur Aldeburgi in Misnia.

Sardonyx quæ constat Sarda carneola, & Chalcedonia uulgari, inuenitur in Al-
 denburgensi agro.

Turchoides gemmæ uirides inueniuntur in Silesia Goltbergi, & Strigæ,
 &c.

Zinstein/ ueluti plumbarius lapis per quarzum, id est, Silicē metallicum disper-
 sus, Marienbergi.

Hematites fissilis, uena amplissima inuenitur Marienbergi: ut xx aut x minarū
 pondere lapides decurantur.

Zinstein/Stein wie Körner von Nüßsamen/ lauantur in Theodoro oppido
 propè Vallem D. Ioaehimi, appellaturq; Seyffenzin.

Vena Stanni, hoc est, Bisemuti pura & impura eruitur copiosè circa uallem Di-
 ui Ioaehimi.

Stannum purissimum, id est, quod iam suum est, effoditur ibidem in ualle Diui
 Ioaehimi.

Hematites niger turritus, stalacticus & erinacei modo aculeatus, effoditur circa
 uallem Diui Ioaehimi.

Lignum carbonis modo nigrum, aridum ac leue effoditur in iisdem montibus
 quadraginta orgyiarum profunditate.

Lapides oblongi, candicantes, fissiles, ossæ substantia, atq; etiam aspectu ossibus
 simili, ibidem ē montibus eruuntur.

Magnes lapis ualenter ferrum attrahens effoditur inter Snebergum & Annæ-
 bergum in ualle diui Ioaehimi & Irberstorff.

Magnes ueluti squamati in tessellas fissilis, uisus mihi est Nurenbergæ apud
 D. D. H. S. colore cœruleus.

Magnes ultramarinus in cœrulo fuscus, uisus est mihi Nurenbergæ apud Ol-
 lingerum.

Lutum seu Creta figulina in solidissimas in terra usta testas, effoditur inter Ther-
 mas Caroli quarti & Schlackenuerdam oppidum propè Lessauium pagum, quo ar-
 gumento apparet quondam cum tractum arsisse sponte propter latens in terra sul-
 phur, aut bitumen, aut utrumq;: nam terra & agri circumiacentes similitudinem ha-
 bent luti ē fornace fracta sumpti.

Ferrarii lapides grādes eodē loco effodiuntur, colore nigri, fuligine obsiti, et ueluti

usti: qui etiam incendii naturalis uestigium atq; argumentum existunt.

Rubrica ruffa in assulas fissilis; ualde pinguis ac floridi coloris effoditur inter eundem pagum & Caroli quarti Thermas.

Rubrica uersicolor, uarii coloris, uidelicet candidi, flauī, lutei, cinerei, puniceīq; effoditur ex eodem loco in torrente quodam.

Saxa dura ualde & lineis cinericeis conuoluta effodiuntur propē Suuartzbergum oppidum inter Snebergum & uallem diui loachimi.

Ferrariæ sunt inter idem Suuartzbergum atq; uallem diui loachimi; ibidem globi ferrei hac ætate fiunt.

Saxum durum magnas rupes faciens, est circa Thermas Caroli quarti & propē Elnbogen oppidum, candidis ueluti tessellis immixtis uarium.

Acidula est propē Thermas Caroli quarti, sapida quidem, sed aliquo modo diluta.

Acidulæ aquæ sunt inter Culmam, Acutum & Aegeram, austeri uini sapore.

Acidula semper turbida & in altum multis locis ebulliens, nō tamen effluens, tactu frigida, haustu aues enecans, est in prato inter Acidulas & Culmam propē pagum quendam solo lutofo & cauernoso: eadem strepit feruentis modo: appellatur Germanis, *Das dolle wasser*; id est, stolidi aqua.

Acidulæ aliæ non procul sunt ab hac stulta aqua ad duo uel tria millia passuum uersus occasum hybernū, in loco uliginoso, muscoso ac palustri: eæ similiter feruentis modo grandes ueluti globos euomunt, nusquam tamen ē fontis uel lacunæ labro effluūt. Strepitus & mugitus earum auditur ad quingentesimum passum aut longius tranquillo tempore, haustu fertur non tantum iumenta, feras, pecudes & aues, uerum etiam homines enecare, gustari tamen sine periculo potest. Appellatur autem hæc aqua ab indigenis *Das wütende wasser*.

Acidulæ aliæ non procul sunt ab arce & uico Kunigspergo in eodem tractu locis pluribus.

Acidulæ dilutæ sunt ad suburbium septentrionale Aegeræ.

Acidulæ aliæ sunt Bulemeuti iuxta ferrarijs fodinas, quæ celebres ibi sunt.

Acidulæ saluberrimæ sunt in Sueuiæ Vuirtenbergensis sinibus orientalibus, ad quas hominum egrorum turbæ confluunt, in calefactis, ueluti Thermis felici successu lauantes.

Acidulæ sapidissimæ sunt propē Frideburgū in sinibus Hessiæ & Vuederauię, in prato quodam.

Acidularum acidi saporis causa est ferrarius lapis, qui rubiginosa qualitate fontes uicinos & contiguos sua medicata ui inficit: nam ubicunq; eæ sunt, iuxta latent aut apparent ferrariæ uenæ, lapides & saxa: quod ne obliuiscaris, uide.

Ferrariæ celebres sunt circa Bulemeutum & uicino tractu.

Ferrariæ aliæ sunt nobiles non procul ab oppido quod uocatur *Kemmet* & uicinis locis.

Ferrarię diuites sunt circa Blechum pagum, ad quintum à Nurenberga lapidem.

Ferrariarum omnium largissimæ & ditissimæ sunt Ambergi in Bauaria, in iis hæmatites niger pulcherrimus ferrum optimum fundit.

Ochra item rubiginosa, quam uocant *Leber erz*; copiose ibidem effoditur, quæ optimum remittit ferrum.

Rubrica dura, hæmatitis modo ferri splendorem præ se ferens, nascitur in ferrariis Ambergi.

Fons quidam largus tanto impetu eructans aquas, ut etiam iniecta grandia saxa respuat, est propē Kunigsteinum arcem & oppidum, non longē ab Albi fluuiio, in Misniæ sinibus.

Thermæ Caroli quarti sitæ sunt duobus à ualle loachimica Germanicis miliaribus, uno à Schlaccenuuerda, uno à Splaccenuualde, & uno ab Elnbogio. Sūt autem

autem in ualle ad Dopelam amnem, in medio fluuio atq; utraq; eius ripa magnè cum sonitu eructantes. Vbi effluunt aut oriuntur lixiuii modo ruffum colorem habent propter lapides. Sunt autè lixiuii propemodum diluti atq; urinq; à nitro nimium; sapore, neq; salem, neq; sulphur, neq; bitumen, neq; alumen, quæ quidem ullo sensu aut ratione percipi queant, habentes.

Lapides & saxa Thermæ eæ intra terram faciunt diuersos: alius candidissimus est: alius roseo conspersus est rubore, alius roseum habet ruborè lacteo colori permixtum, flauet alius. Omnes duri sunt mediocriter, Zonis præcincti, & Calcarii, & calx quæ ex candidioribus solidisq; coquitur, melius in aëre & humidis locis durat.

Lapides cum prædictis nascuntur porosi, fauacei, lutei aut pallidi & friabiles in puluerem, ex quibus calx coquitur quæ melius igni resistit. Hæc extruuntur cæmiani, fornaces, &c.

Lapides alii gignuntur iis locis quibus Thermæ defluunt, aspectu racemosi, tunicæ berqli & tunicis constantes, colore partim flauo, partim ruffi: partim etiam in stirias diuersi coloris concresecunt, in Thermis uerò quæ sub arce sunt, stiria & lapides candidissimi coloris gignuntur:

Saxum aliud ex Thermis ibi genitum est cinericeum in fusco, durum atq; marinosum infra oppidum uersus sinistram, ad ipsum amnem.

Saxum ibidem est eminens in cinereo candidum, multis tenuibus tunicis constans, hoc si diu cremetur ac deinde teratur, atq; tritum uitro aqua repleto iniiciatur, adeò incalescit, & tanto feruore aquam accendit, ut teneri manibus uix queat: redactaq; aquam gustu acerrimam, causticam & corrodentem, si cuti imponatur.

Aphronitrum è cauernofo saxo ibidem in specu nascitur, quouis alio acris & tenuius: gigniturq; intra oppidum sub arce, ubi prædicti calcarii erunt lapides.

Thermæ istæ calidæ ualdè lauantium corpora nō exulcerant, etiā si multis diebus lauent: eōtrā frigidiores aut tepide altera aut tertia aut etiā prima die exulcerāt.

Eadem, amnis Dopelæ uadum in oppido totum lapide obduxerunt.

Lichen nascitur in iisdem Thermis ad lapides, & Thermarum undis natos, gustu ferè Thermarum: quæ præsens est aduersus impetigines remedium: acrior enim est quam ea quæ dulcium aquarum aspergine in saxis prouenit.

Thermæ Mattiacæ, hoc est, *Wißbaden* / sitæ sunt in Mattiacis pratenſi loco, uero miliari Germanico uersus septentrionem & occasum æstiuum à Moguntia co urbe, Carolinarum modo largæ: eiusdem saporis, magis tamen salæ, citius Carolinis lauantium uires resoluentes.

Lapidem hæc faciunt quæ fluunt, quemadmodum Carolinæ, eiusdè coloris, sed non ita copiosum: non enim usq; adeò terrestrem consistentiam habent.

Sal in plateis quibus fluūt serenis diebus terra enascitur, circa marginē fluentis unde gignitur, cōsistentia tenuis, colore candidus, gustu salis ueri, sed paulò tenuiori.

Lapis Calcarius etiam undiq; est circa has Thermas in montibus & circa oppidum undiq; quæ constat totus ueluti minutis oblongis conchis.

Thermæ Vuirtembergenses quas uocant *das Wildbad* / sitæ sunt in Sueuiæ Vuirtembergensi ad tertium à Tubinga, ad secundum ab Herrenbergo, ad primum à Kalba miliari, natura Carolinis similes.

Lapis Calcarius etiam hoc loco inuenitur.

Thermæ factitiæ sunt propè Tubingam, circiter mille passus ab urbe uersus meridiem, in *Steinmacher tal* ad sinistram Steinmachiam torrentem ascenden do: eæ nulla qualitate uidentur mihi à uulgarī quāpiam fontana aqua differre: nam diligenter gustauī & consideraui, sed superstitiosa fide his se credūt infirmi. Appellantur autem *Das Bläsi bad*.

Thermæ in eadem Sueuiæ Vuirtembergensi sunt similiter igne calefaciendæ propè Aro oppidum quod distat à Tubinga uersus ortum tribus miliaribus Sueuicis, & uno à Nurtunga oppido, uidentur & hæc nihil, aut tantillum, à fontana unda uulgarī dulci differre. Appellantur autem *das Sewbad*.

L I C V S non exiguus amnis Vindelitiæ, Augustam Vindelicorum præterfluens, semper est turbidus, & ueluti in cinericeo candidus, eius rei causa est quod

cum impetuperlutosū ac albicans solū fertur p̄ceptis, et quod in alpihus supra Cam podunū semper sint niues, quę liquefcentes limum candicantē dēserūt: serenīs autē diebus brumalibus & frigidissimo gelu concretę sunt, nec liquefcent, nec cum limo dēserūt niues: inuēctus antea in alucum limus eluitur, & cum nullus in eluti uicē delabitur, contigit Lycum clarissimum fieri; nam istę alpes etiā medię state niue alben̄t plerisq; locis.

Lynum ostryę arboris, *Hagenbüch*/ id est, *Haynbüchen* mutatum est in durissimam silicē amq; eodem iuxta Francofortum ad Moenum amnem, & in Vuirtenbergenſi Sueuiā.

Lapis Aëtites Plinii, dilatatus quadrangulārī figurā, obtusis angulis, ē sabulo lutoq; ferrugineis concretus, Francoforti ad Moenum in Pharmacopolio Ioannis Metlingeri. Hic fortasse est ea Aëtitis species, quam Plinius Aethiopicum uocat.

Aëtites lapis globosus, pilę minoris magnitudine, absolutę rotunditatis, foris candidus, æqualisq; superficiei: substantia intus, cum frangitur, omnino silicea, ad ictum ignē elidente, in medio habet cauitatem rotundā, proportionē totī lapidi respondentem. in qua globus est candidissimus: friabili & ualdē siccante luto, aridissimoq; constante, qui intus ut plurimum uacillat, si lapis integer concutitur. Attulit hunc Anshelmus rhizotomus ē Gargano Apulię monte: hic aliquando foris cinereus est.

Aëtites huic similis aspectu, colore, materia & luto, sed concretione geminus: ex eodem monte ab Anshelmo rhizotomo Nurenbergam allatus.

Aëtites grandis, globosus, superficiei inæquali, cauernis & anfractibus peruius, harena sabuloq; in cauernis resonantibus, intus etiā lutum impurū harenosumq; continens, allatus est ex eodem monte ab Anshelmo rhizotomo.

Lapides conchoides calcarii diuersę figurę, inueniuntur non longē à Tumpachio oppido, qua itur uersus Aurspachium oppidum.

Lapis rufus minii ac hæmatitis colore, est copiosus magnusq; inter Tumpachium & Aurspachium oppida: est autem substantię hæmatinę & ferruginę.

Lapis ferrugineus, imō saxum, in maxima qualitate est ibidem, colore rufius, nec ita floridi coloris.

Lapis Ostracites, ostracis, ad unco ueluti rostro, colore cinericeus, tunicis compactus ueluti Ostrea in Vuirtenbergenſi Sueuiā inter Hechingam oppidum & montes orientales in radice montium.

Dactyliidæi lapides in eodem inueniuntur Sueuię loco, ubi ostracis.

Omnia lapidosa & crustacea inueniuntur iisdem in Sueuiā locis, quibus ostracis & Dactyliidæi lapides.

Gypsum copiosum candidumq; effoditur in Vuirtenbergenſi Sueuiā, iuxta Tumbingam & Herrenbergum oppida.

Lapis Armenus uel eius uenę reperiuntur in finibus Vuirtembergensis Sueuię uersus meridiem & occasum hyemalem in montibus.

Ceruleum pulchrum Armeno lapidi & Chrysocolle uenis permixtum, reperitur in iisdem Armeni lapidis uenis in Sueuiā.

Marmor mensarium candidum, quo in Germania mensę fiunt, uenam habet dilatatam in montibus, ita ut in latissimas mensas duum digitorum crassitudine suis commissuris diuidantur marmorea saxa.

Marmoris eiusdem alia species in paruas ueluti tegulas fissilis, quibus etiā pro tegulis utuntur in Bauaria Kelheimi, Ratisbonę & alibi: ceditur utrunq; genus inter Ratisbonam & Kelheimum paulō infra Kelheimum ipsum.

Marmor purpureum maculosum in spadiceo, est in montibus circa Salisburgum: quantislibet cædendis molibus sufficiunt lapidicinę. Ex hoc defunctorum monumenta & columnę fiunt Augustę & alibi.

Marmor Salisburgense aliud omnium ferè colorum mirabiliaspectus gratia Augustæ uidetur in quibusdam structuris: aliaq̃ multa eius genera in templis.

Marmor aliud pulcherrimum, *ist anzusehen wie ein hübsche gemalte landes schaffe*/conspicitur Augustæ Vindelicorum in sacello Fuccherorum.

Marmor candidum ueluti siliceum reperitur in montanis circa Egeram urbem, ex quo sepulchrorum lapides.

Marmorosum saxum, coloris liuidi, *gestalt wie grosse vngeschlachte holzspalten*/circa Egeram in montibus, ex quo ponticuli & lithostrota.

Marmorosum saxum prædicto materia & aspectu simile, colore in flauo candidum & spadiceum, in montibus inter Egeram & Kemmetam urbes.

Marmor calcarium in candido liuidum aut cinereum, eruitur circa Rebicum opidum inter Egeram & Kemmetam.

Lateres Augustæ & Nurenbergæ fiunt ex luto & abiectis ligni scobe, simul in lateres ductis & coctis, exustæ scobes relinquunt cauernulas, ideoq̃ pumicibus raritate & leuitate similes sunt hilateres: ex quibus camini & intestini parietes extruuntur.

Lapis (aut Saxum) Calcarius latitudine fissili, mensario marmoris similis, inuenitur in montibus Fichtelbergi: materia est talcū, hoc est, amiantus crustaceus, breuis squamis: ideoq̃ in igne non exurit, cum factæ ex eo mensæ poliuntur, superficies maculis ueluti argenteis ac plumbeis nitet. Vidi Nurenbergæ apud Leonhardum pharmacopolam contractam mensam.

Lutum citrinum floridi coloris, tenerimum, pinguisimum, in metallis Annæbergi inuentum, appellatur à metallicis *Ein gelber Seyffengang*: quoniam saponi simile est.

Lutum eiusdem substantiæ sub fuscum eodem loco effossum, uocatur *ein schwarzer Seyffengang*/ à metallicis.

Creta nigra minimis pyritidis mixta atomis, gustu salis & Chalcanthi, effoditur supra Saluendam Turingiæ urbem, qua utuntur tingendis & disciorum trabibus.

Creta nigra iam dictæ colorè gustuq̃ similis, asperior tamen duriorq̃, effoditur Hildesheimi inter urbem & Marienburgum castellum, iuxta pumilionum antrū in profundo.

Creta nigra, optima, lenis, facile lineas remittens, gustu subacris, effoditur in inferiori Germania, in agro Aquisgranensi, qua architecti & pictores utuntur. affertur uenalis Francofortum ad Nundinas.

Pumex cædidus, leuis & rarus, Siculoq̃ aut Melino aut Aphricano similis, effoditur in montibus nō longè à Cōfluentia urbe, in Rheno & Mosellæ cōfluentibus sita.

Minium grandibus cæditur ē uena glebis colore penè purpureum, merum nihilq̃ aliud continens: contractum argenti uiui guttas ostendit, uidi Nurenbergæ apud D. D. Hyeronimum Schallerum.

Glimmer res est metallica, plumbeo ferè colore, sed splendidissima, effoditur in montibus Fichtelbergi.

Rubrica lapidis Hematitidis modo splendens in liuido cum madescit, Nurenbergæ.

Aes quod iam suum est purissimum inuenitur in Morauia finibus, in metallis quibus præest Wolff Schelle/ frater Doctoris.

Lapis molochites uocatus, colore est uiridissimus, substantia & materia Chrysolæ: cum frangitur, dissilit, ferè ad modum uitreæ massæ, aspectu etiam† uiridæ smathæ similis est. inuenitur in alpibus, non longè ab Oeniponte.

Vena quædam gemmea, dilatata ab una parte, amethysti, cœu politis cubis & angulosis turbinibus constans: ab altera parte autem est Arabici lapidis peculiare quoddam genus, durum, candidum, in poliendo ebur splendore & candore superas: inuenitur & hæc in Athesina regione in alpibus quemadmodum molochites.

Chalcanti uena in candido pallida, duo habens, uidelicet alumen & Chalcantum uiride in cœruleo; Schemnicio.

Alumen scillile candidum, lene, subpingue tactu, in capillamēta amianti instar diuisibile; gustu uehementissimè adstringens, affertur à Schemnicio.

Sulphur quod duriusculum Sandarachæ colore in guttas oblongas coneretur, elicitur ē uena quadam metallica, Nurenbergæ uidi.

Sulphur quod suum est, citrini coloris, syncerissimum, propemodum pellucidū, inuenitur in quibusdam Germaniæ metallis ad Bohemiam.

Bitumen nigrum durum, simile carbonibus bituminosis, hoc est, fossilibus, inuenitur in alpibus Helueticorum.

Bitumen nigrum durum inuenitur in tractu qui est inter Egeram, Kulmam altam Falkenauum, & Elenbogium: copiosissimum autem non longe à Falkenauio in colle quodam qua itur à Falkenauio ad Sattelampagum: optimum uerò circa Sattelam & in ipso pago, aspectu crustaceum, leue, accensum flagrat & copiosum remittit uaporem.

Tractus qui est inter Culmam altam seu acutam, & Elenbogium olim arsisse uidetur: quia in utraq; ripa Egeræ adusta est terra, & facta similis terræ fornacum adustæ: præterea terra ipsa partim in lateres cremata est propter spontanei incendii uehementiam. huiusmodi autem lateres reperiuntur inter Falkenauum & Culmam altam.

Bituminis ueluti exusti cineres inueniuntur inter Elenbogen, & Falkenauum, Culmam & Egeram urbem.

Radices arborum in ipsa terra in carbones crematæ & redactæ, eruntur inter Falkenauum & Sattelam pagum.

Terra purpurea cum aliquo Indici colore, inuenitur imbribus detecta magnis inter Elenbogium & Sattelampagum, quæ & ipsa incendii uestigium est.

Bitumen illud quod circa Falkenauum & Sattelam eruitur partim pyritosum est, partim synceri pyritis ærei frustra continet, partim etiam eo caret.

Ea loca pastorum ignibus accenduntur non contemnendo uicinatorum periculo.

Ciuitas luhonum, ut Cornelius Tacitus refert, grauiter afflictæ & propemodum deleta est huiusmodi incendio, & igne sponte ē terra ædita. Fuit autem ciuitas luhonum fortassis hoc loco: aut, quod potius credo, in eo tractu ubi Zuuickauia (quam Cygneam uocant aliqui) sita est: nam quantum ex Tacito colligi potest, Hermundurorum ea fuit ciuitas. Tractus autem Zuuickauianus non rarò sponte exardescit, adeo ut saxa liquefacta riuorum instar liqui uitri defluant, quale fuit hoc incendium quod ante quadraginta annos, pagos, uillas, non satis tuta etiam urbe uastauit.

Achates sanguineis uenis in se conuolutus & flauis: lineis maculisq; uariis, Nurenbergæ apud Gemmarios.

Gammehu oyychis placodis species est: inuenitur in Vuesterichia,

Achates alius cinereis ac liuidis in cœruleo uenis conuolutus, Nurenbergæ.

Achates uulgaris fabæ magnitudine ē Gallia allatus.

Achates mineaceis maculis, lacteo & luteo corpori immixtis, Nurenbergæ.

Onyx pulcherrima, grandis, & lata, ouata figura, colore cœruleo, lacteo, & spadiceo nigroq; crustatis uariis, imaginem speculi instar reddens.

Halmyrax nitri species est, qua canescunt siccatae camporum conualles, ut Plinius ait, in Media. Gignitur etiam apud nos circa Berneburgum, & Stasphurtum ac propè Vuarmsdorfium.

Terra nitrosa est Berneburgi, etiam ad tres cubitos effossis seroebus.

Terra falsa est Stasfurti, ideoq; fale canescunt siccitatibus fossarum margines.

Lacus falsi sunt ibidem: in quibus nascitur anthyllis. quidam ad eò falsam habent

habent muriam ut nihil gignant.

Frutex parvus, Ericę similis, minor tamen, nascitur inter Caroli quarti Thermas, Elenbogen & Falkenauium.

Fruticulus exiguus, humi prostratus, iunceis uiridibusq; uirgulis: foliis myrtinis, duris, acuminatis, perennibusq; floribus papilionaceis ferè, diuerso colore, uidelicet albo, flauo & rubente: extimum quidem albet, proximum flauet, intimum rubet. Nascitur in syluis montanis circa Egeram, in Bauaria & Vindelicia.

Orifella Musci quoddam genus est, incauum, ramosum, quod ex Italia afferitur.

Muscus quidam, Crispę lactuce similis, minor, & per ambitus leniter aculeatus, ce spite latiusculo diffusus, nascitur in Tædacea sylua, inter Suetachium & Lauffam.

Fungus grandis, pylę instar rotundus, foris pallenti cortice, intus candida, succo sa dulciq; carne constans, non in puluerem transiens, sed hyemis iniuria, Peponum exemplo, putrescens: nascitur uerè in eadem sylua ex meris arenis.

Ramulus ueluti è lentisco decerptus, foliis utrinq; ex intervallo dispositis, crebro geminatis, in exortu sibi inuicem respondentibus. Nurenbergæ apud D. D. Schaller.

Abfinthium Seriphium, exilibus ramulis, colore in spadiceo nigricantibus, semine tenui, paleaceo, ac totis furculis adnascente, leniter amaro, cum tenuitate euidenti, ibidem, apud eundem.

Herba foliis Pyrethri, caule cubitali, flore, folliculo & semine Scrophulariæ: in horto Ollingeri, ea uenenata est, & ex Austria allata.

Crethamum ^Tmarinum, foliis portulacę syluestris, oblongioribus similiter pin- Crithmum. guibus in horto eiusdem.

Cyclaminus orbiculata radice: foliis inter Cucumim & Béchion mediis, non tamen hirsutis, rubentibus & albicantibus maculis. Autumno floret: æstatis initio pau- cis spectatur foliis. Nurenbergæ in horto eiusdem.

Cyclaminus globosus, id est, globosa radice, foliis prædicti, similiterq; maculosi, rotundioribus tamen, flore inter puniceum & purpureum medio, autumno ex- unte. Nurenbergæ in horto D. D. Schalleri.

Calaminthe tenuifolia, ualde odorata, perennis, tenuibus foliis: ibidem.

Coton herba lanigera, caule duro, tereti, alis brachiato rubenti, subhirsuto: foliis uirginis & purpureis partim folliculi Cotoniei amplitudine, triplici aut quadruplici commissura dehiscentibus: & semina habens ciceris quantitate, intus Cinereis spar- sapunctis, candida multaq; lana inuoluta: ibidem.

Genista iunceis uirgis, nq; non angulosis, sed teretibus: ibidem descripti.

Trifolia arbor, flore in singulis pediculis numeroso, siliquis longis, semine scæ- nograci. Francofurti in horto ciuis cuiusdam.

Lepidium maius sponte nascitur Spire ad uetusta monumenta, in rudibus Tem- pli B. Germani extra urbem.

Rubea syluestris uerè nascitur sponte ibidem in sepibus, satiuæ per omnia simi- lis, multo tamen maiore radice.

Hyacinthus diphyllos Fuchsi, floribus candidis, nascitur Tubingæ in syluulis iuxta diphylum purpureum.

Calaminthe ^Tquædam, Ocimi ferè foliis, hirsutis, caulibus cubitalibus, semine ex Clinopos-
itum quon-
dum foli-
licet. intervallo in raris & semicirculum equantibus uerticillis: nascitur inter Tubingam & Nirtingam.

Tilia grandis ueris medio, aut paulò antè, iulos ferens longos colore flauos: na- scitur propè Nirtingam oppidum in pago.

Herba hederacis aut cucumeracis foliis, hirsutis: caule cubitum excedente: ra- Lunaria
Greca pro-
lit. dice multifida, lenta, perenni, sapore raphani aliquo. Nascitur in montibus Sueuiæ supra Auo oppidum.

Ruta quædam syluestris foliis Rutæ minoribus, coluteæ modo geminatis coliculis, cum erumpunt tenuibus, multis, rubentibus, colore in corymbis dependentibus; luteo semine in corniculis, oblonga radice, crassa, rimosa, flaua, perenni, firma, &c. Saporem folia Rutæ habent. Nascitur in alpibus Vuirtembergensis Sueuiæ.

Hyacinthus minor globosis, concavis, purpureis, deorsum nutantibus & gibbo sam comam constituentibus floribus, in caule dodrante breuiori: foliis Porro multo minoribus, radice bulbosa; floret post ueris initium. Nascitur copiosissime in alpium Sueuicarum planis pratis, in Hestia & Vuederauia.

Hyacinthus minor, candidus, proximo similis, maior paulò, Nascitur iisdem locis, sed parcius.

Herba foliis Narcissi, caule dodrantali, flore in lateralibus pediculis candido, stellato aut cruciformi, odorato: radice bulbosa. Nurenbergæ in horto Ollingeri.

Lilium syluestre, quod aliqui falsò Asphodelum uocant, uidi flore candido, cum aliàs rubescat, in horto Ollingeri.

Cucumis recto caule, fructu Melonis aut Peponis parui. Nurenbergæ in horto ciuis, &c.

Herba caule cubitali, foliis spinosis, capitulis acanaceis, floribus Scabiosæ: in montibus Sueuiæ Vuirtembergensis.

Thlaspi quoddam minutum multis ab una radice ramulis, flore candido, numero: ibidem in montibus altissimis.

Helleborus candidus, plantaginis foliis, n̄sq̃ uenosis & liris: in montibus alpihusq̃ inter Sueuiam & Constantiam, auff der Hart vnd Bar, non longè a Danubii exortu.

Lycostomum aconitum purpureo flore: ibidem sponte nascitur in opacis syluis.

Lycostomum cœruleis floribus: ibidem nascitur, utrumq̃ aliàs in hortis colitur.

Mentastrium ualde odoratum ut Hedysmus, in montibus auff der Bar iuxta pagos, ibidem.

Mentastrium uulgaris simile, sed pulchrius odoratiuscq̃ multò, non longè ab Vlmæ urbe prope fossas humidas * in pratis.

Hippion, id est, Viola equina, Leucoio æquales flores habet in quadrantali coliculo, cœruleos, pulcherrimos, profundo colore. Nascitur in pratis inter Vlmam & Augustam.

Maiæle, coronarii puniceiq̃ sunt flores, in dodrantalis teretisq̃ caulis summo, folia ad perennem radicem fert oblonga, inferius candicantia. Nascitur opacis campis in Vindelicia.

Thymelæa minor, tenuibus foliis, floribus in corymbo puniceis. Nascitur in Vindelicia circa Augustam, &c. descripsi eam partim.

Herba foliis latiusculis, acuminatis, stellatim in terra alternatimq̃ stratis: radice fibrata coliculo quincunciali, tenero, unico: in summo flore purpureo, Violaceo, apicem acutum habente. Nascitur in Vindelicia inter Augustam et Licum amnem in campis.

Ophioglosson, quam alibi descripsi, copiose nascitur in montanis Sueuicis campis.

Lunaria copiose etiã prouenit in montibus, nō ita herbosis, collibus & tumulis, folio uno pingui, quadrantali aut sextantali ab uno coliculo exeunte, Polypodij diuisura. In summitate racemosum quiddā est radice diuisa, tenui, fibrata, perenni, &c.

Draco herba acetaria, saporis feruidi tenuisq̃, caulibus cubito procerioribus ramosis, foliis oblongis, Lino aut Hyssopo maioribus, semine flore q̃ minuto, radice crassiuscula, multifida, intorta, perenni, & multa emittente germina. Colitur in hortis Augustæ Vindelicorum, & Nurenbergæ expetitur lautioribus hominibus ad acetaria, &c.

Iris Illyrica nostrati est simillima; differt tantū odore, sapore et floris colore, quem candidissimum habet & non purpureum. Colitur Nurenbergæ in hortis.

Herba Irinis foliis, longioribus multò, radice fibrata, Ollingero ex Italia proli-

Xyris

Xyris minor, seu spatula foetida minor, maiori similis est; differt quantitate minore, radice scabriore & fusciore, atq; semine duriore. Nasctur in campis & secus fossas inter Oppenheim & Moguntiacum ad Rhenum fluuium.

Herba cicuta foliis & odore radice crassa, nigra, perenni, semine in umbellis
† caro crassiore, quo in quibusdā Gallie & Italiae locis malè pro Ligustico utuntur, [†] quam Cabi
ibidem prouenit ubi Xyris minor. uel Carui.

Caryophylli Indici minores, caule statim à terra ramossissimo à uerè florent usque ad hyemem, foliis multò minoribus, ibidem.

Piper Aphricanum longis, angustis, multisq; foliis, & folliculis, colore rutilum. Nurenbergæ, in horto D.D. Schalleri.

Piper Aphricanum huic simillimum, colore tantum in fusco purpureo ibidem, &c.

Melon Indicus citrinus, propemodum globosus, semine lato candidoq;.

Melon Indicus citrinus, oblongus, angulis aliquot inæqualibus, crassa & uix tricubitali uitacula.

Melon Indicus citrinus, oblongo similis, fructus tantum figura differens, què ueriticulo similem profert, in latitudinem aliquam compressum.

Alcea species, * conca minoribus foliis (affertur ex Italia) magisq; incis; caule mollioribus aculeis hispido, flore ex quinque candidis foliis roseo; mane se aperiente, meridie unam horam hiante, postea se contrahente, foris partim purpurascente, ^{Malua Ve}
quemadmodum etiam intus in profundo capitulo hirsuto ex luteis apicibus, in medio ^{neta.}
quinque purpureis apiculis uariante, semine in globofo, hirsuto, membranaceo pericarpio, deinde in nigro aperiente se, subrotundo, nigroq; radice semestri.

Bechion syluestre, foliis minoribus rotundioribusq; multò, coliculo dodrantali, floribus in summo multis, densis, in purpura candicantibus, ueluti Petasitis, radice fibrata & perenni. Nasctur altissimis uliginosissimisq; montibus, inter uallem D. loachimi, & Bisentalum, metallica oppida.

Herba carduaceis foliis, acanaceisq; capitulis: ibidem in montanis pratis.

Herba trientalis, foliis oblongis, ueluti Neriadii minoris, flore candido stellatoq; nasctur ibidem in montibus non ita herbosis, solo neq; nimis madido, neq; nimis arido, nec sylvoso.

Herba Lycopodi, maioris uel Geranii foliis, caule tereti, tenero, floribus foliaceis, ranunculaceis, candidisq; radice perenni fibrata, candida, cum arescit leuiter radicem Phu odore æmulante. Nasctur in sylua inter Bisentalum & Annæbergum.

Fruticulus tenuibus & cubitalibus uirgultis: foliis polygoni masculi: semine rotundo, nigro, juniperinis baccis simili, gustu acri: allatus est mihi ex horto Episcopi ^{Ruta tan}
Cenomannensis à Gallia à Petro Bellonio. ^{praria Gal}
^{lorum for}

Herba umbellifera, foliis inter Anisi, Apii & Coriandri foliorum figuram metiens, semine acri, odoratoq;. Ex eodem horto allatum.

Herba radice nucis auellanae figura & quantitate, què seminis modo sata aut defixa germinat: foliis gramineis durisq;, gustu dulcis. Vide an sit Xiphion Theophrasti aut Ornithogalon, aut Moly siue Myle: ex eodem horto. ^{Trasi Italorum uidetur.}

Fruticulus Siciliæ foliis, sed angustioribus multò, satis carnosus: umbellatiuscula. Semine Cymino simili, nigro: fortè Tragis Cretici est species: nā ex Creta affertur, & lachrymam fundit lacteam què postea spissatur. Ex eodē horto per Petrum Bellonium mihi allatus.

Foeniculus longo semine, prima qua feritur æstate caulem semenq; fundens, ut uulgaris: missus mihi est pro Hippomarathro.

Cepæ similes fissilibus, multò tamē minores, breuiioresq; coma cōcaua: cepa comuni tenuiore. Vere maturescit et cū primis aut etiā antè euellitur, Germani uocantur.

Aſchlauch: alii **Absſchlag.** Fortè ſunt Aſcaloniæ: nam ſic ab Italis & Gallis appellantur. Vide etiam quid ab iſis differat Gethyum.

Coryledon uerus radice Ari eſt, & uilloſa: coliculo dodrantali, ſemine circundato: foliis pinguibus, rotundis, craſſiusculis, leniter cõcauis, &c. Allatus mihi eſt cum aliis quæ ex horto Episcopi Cenomannenſis è Gallia Petrus Bellonius ferebat.

Rhus fruticem uidit aridum, foliis oblongis, figura Vlmeis, & tamen Laurinſis ramulis, alternatim geminatis, flore in Corymbis candidis: ex Italia allatus eſt.

Ciſtus frutex folio eſt oblongo, & tamen ſubrotundo, Saluie aliquo modo ſimili, maiori, hirsuto cauocq, ſemine in pericarpis minuto Papaueri ſimili, &c. guſtu adſtringit, &c. Allatus mihi eſt ex Cenomannenſis Episcopi horto.

Frutex tenuibus multis acutisq; aculeis ſpinofus: uirgis & ſurculis tenuiſſimis, foliis paruis, oblongis, candidis, hirsutis, pro Paliuro miſſus mihi eſt ex Gallia: ſed uidetur potius Rhamnus eſſe.

Rhamni nigri fructus niger eſt, Verticilli figura, orbiculatus, in medio elatus. ex eiſdem Episcopi horto.

Rhamni candidi fructus, prædicto ſimilis eſt figura, ſed colore candidus. Allatus eſt mihi ex eodem.

Tragus ſylueſtris uulgaris minor eſt, foliis in latitudinem aliquam compreſſis: floribus in candido puniceis, Centauri minoris figura. Naſcitur in cultis locis ac campis inter Egeram & Filſecum oppida.

Phleon paluſtris herba, aculeata ſub foliorum exortu: foliis harundineis ab uno principio in uentilabri figuram explicitis. Affertur ex Italia cum ſarcinis aliarum rerum, idq; caſu.

Cicuta ſylueſtris maioribus quàm uulgaris foliis, hirsutisq; in ſyluis inter Pſerin gen & Ehingen.

Herba Cicutæ foliis, maioribus: radice pedali, craſſa, foris nigra, intus candida: guſtu acris, ſeruſida, tenuis, & aromaticum quiddam præ ſe ferens: provenit inter Ebingeram & Sueiningam in montibus.

Aizoom ſylueſtre ſiue ſerratatum minus, non longè ab Ebinger oppido ſcatet in ſcopulis.

Asparagus quidam fruticoſior, multò maioribus quàm reliquis baccis. Nurenbergæ in hortis D.D. Schalleri ac Olingerii.

Semen herbæ cuiuſdam Umbelliferæ, Braſſicæ æquale rotundumq; colore nigrum, quod pro Smyrnio ex Italia Nurenbergam ferebatur.

Semen herbæ cuiuſdam Umbelliferæ, colore & figura Caris, ſed minus: & Ammii magnitudinem paululùm excedens. Francoforti.

Ricinus quidam uulgaris per omnia ſimilis, triplo tamen maiori ſemine. Nurenbergæ in horto D.D. Schalleri.

Agaricus in Picea ſylueſtri, Tæda, Abiete & Larice: ſed omnium optimus eſt Larignus: hic enim ſolus in uſu eſt medicis.

Viſcum in Populo nigra Sorbo lanata, Sorbo, Spina alba, id eſt, Pyracanta, ſeu Sorbo Torminali aculeata: in Sueuiæ alpiſus.

Anthyllis maior caulem habet dodrantalem aut maiorem, inferius digiti craſſitudine & ſerè ſingularem: ſuperius ramoſum: foliis anguſtis, oblongis craſſiusculis, guſtu ſaliſis. Flore Anthemidis aut Aſteris Attici figura & magnitudine quidem illius: colore uerò huius. Naſcitur ſaliſis locis, nō procul à lacu Salſiuſculo Staſfurti.

Anthyllis minor prædictæ ſimilis eſt, ſed multò minor: caule tenuiori. ibidem exit.

Anthyllis prædicta breuior, anguſtis foliis: exiguo foliatōque & purpureo flore. ibidem.

Anthyllis tenuis, gracili coliculo, foliis ualde anguſtis, ſaliſis: ſemine & floſculis ſecus ſolia tantillis. ibidem.

Anthyllis conſtans primùm ueluti tritici granis, cacumine ſibi inſertis. ibidem:

Antyla

Anthyllis humisparfa, minori *Azoo* similis, falsa, ibidem.

Anthyllis latiusculis oblongisq; foliis, falso gustu, ibidē. toriē *Telephium* falsum.

Larix arbor resinifera, conos fert *Tæda*, sed minores. *Augustæ* à quibusdam in deliciis habetur, spontē nascitur in Alpibus, descripsi eam.

Trifolia arbor nascitur *Oeniponte* & *Francforti* ad *Mœnum*, utrobique tamen culta: in montibus uerò quibusdam sponte, descripsi eam.

Lycostaphylos mascula uisa mihi est *Augustæ Vindelicorum* & *Nurenbergæ*: descripta est.

Oleastris peculiare genus nascitur in *Vindeliçia* ad *Licum* amnem & ad *Danubium* inter *Donauerdum* & *Kelheimium* oppida, descripta est.

Tamariscus sœmina nascitur iisdem locis, glareoso solo, nec non ad *Verrachum* amnem prope *Augustam Vindelicorum*, descripta est.

Coronea malus sylvestris sponte provenit in collibus & sepibus circa *Kelheimium* & *Ratisponam*, in utraq; *Danubii* ripa, descripta est.

Pseudocrania arbor provenit iisdem locis & natalibus, descripta est.

Telycrania, id est *Cornus* sœmina, nascitur inter *Augustam* et *Donauerdum* urbes campestri solo planoq; descripta est.

Cytisus sylvestris, quem paulò ante descripsi, nascitur in montibus *Bavariæ* copiosus, præsertim *Ratisponæ* in *Casteino* monte rupibus pleno.

Orhocarpi peculiare genus rimoso & fillo ac dependente cortice in montibus inter *Ehingen* & *Pferingen* in sylvis.

Styrax arbor è nucē enata solus *Cotonæ* similibus, *Nurenbergæ* in horto *D. D. Schalleri*.

Luniperus parva duplex est: una floret mínimos flauosque iulos coni figura ferendo, qui in puluerem abeunt, hæc fructum non fert.

Altera *Luniperus* non floret, sed baccas immediatē profert, decidentibus primū anni fructibus, cum tertii anni nasci incipiunt, tum peruenerunt ad iustam magnitudinem secundi anni baccæ, sed uirides adhuc sunt.

Tæda arbor cono suo similes sed flauos uere producit iulos, qui in puluerem resoluuntur toti, nihil producentes: coni uerò immediatē nascuntur.

Atriplicis sylvestris genus gustu falsum, nascitur *Stasphurti* cum *Anthyllidibus* ad lacus falsos.

Melon Indus *Verticillo* similis, fructu uerrucis undique tuberosus.

† *Grasæ Polei* herba est, *Polygoni* masculæ foliis, non humi prostrata sed erecta. Nascitur aliquantulum * *uliginosis* locis: copiosa autem *Stasphurti*. forte Gros
se.

Coronopus sylvestris satiuæ est similis, foliis tamē minus fiscis, alioquin eadem est. Nascitur *Stasphurti* in campis secus uias.

Pseudocyperus lignosa rotundaq; & ueluti ossæa radice, ex *Gallia* allatus mihi. *Melissophyllum* sylvestre foliis florib;que maioribus: candidis floribus labro inferiori rubentibus. *Fuchs* uerum esse credit, sed falso.

Nux quædam *Pineæ* nuci similis, sed maior, crassiori cortice, uenosa quadam carne operta, nudeo duro. Affertur ex *India*: *Fancoforti*.

Nucleus quidam *Indicus*, trium ferè digitorum latitudine, planus, compressus, orbiculatusque: colore in spadiceo niger. *Nurenbergæ*.

Lupinus quidam *Indicus* trium ferè digitorum latitudine, planus, compressus, orbiculatusq; colore in spadiceo niger, *Nurenbergæ*.

Fructus quidam globosus modicè, acuminatus, ossæa foris soliditatis, colore cineraceus: linea quadam à basi usque ad apicem spiræ modo circumuolutus. *Nurenbergæ*.

Smilaces Indicæ unciali longitudine, aliæ purpureæ, aliæ rosæ, aliæ candidæ, aliæ in purpura cœruleæ. *Nurenbergæ*.

Cardamomum quoddam pinguius, acrius, odoratius scabiusq; ueluti incultius quiddam. *Fancoforti* ad *Mœnum* in nudinis.

Folium Querno simile, sed minus, oblongius, ac pulchrioribus incisuris concinnius: quod Ollingerus aiebat esse Styracis, sed falso: nam tale erat, quale Loto tribuitur arbori.

Spinæ Indicæ, id est, Acaciæ maioris, materia Augustæ & Nurenbergæ à quibusdam pro Ebena uenditur.

Ebenus uera nigerrima, ostensa est mihi à Conrado Rellingero patritio Augustano Augustæ, qui magnos Cylindros habebat.

Materia arboris cuiusdam peregrinæ, colore inter Sandalum rubeum & Resifilium. llium medio: ex qua faciunt capulos cultrorum Nurenbergæ.

Sandali rubræ peculiaris species, colore incandido ruffo, paulatim nigram purpuream induens, à superficie incipiendo, donec successu temporis totum cum colorem acquirit. Nurenbergæ apud cultuarios fabros.

Resina quædam uitrea, quæ cum manibus tractaretur liquefcebat: frigidâque, si cum impetu percutiebatur, dissiliebat in paruas micæ, fortè erat Terebinthina uera, nam pro ea afferebatur Francofortum in nundinis.

Radix speciei Cardopaciæ maioris, cubito longior, figura Centaurii maioris, Francoforti in nundinis.

Centaurium maius Germanicum nascitur in Heluetiorum alpihus, Cardopacis nostratis modo fissa & gracili radice.

Cyperella herba quædam Cypero multò minor, fibratis tenuibusque radicum capitulis, allata est Francofortum ex Heluetiis.

Petroselinum Indicum, latè diffusis foliis, semina in umbellis oblonga, ceu caron, gustu aromatico, etiam odore. Nurenbergæ apud D. D. Schallerum.

Lentiscides, id est Lentifici arboris bacca, parua rotundæq; sunt, Ligustri baccis siue acinis æquales, sed colore uirides. Vnde etiam à quibusdam dicitur Lentiscus arbor grana uiridis. Francoforti.

Pulmo marinus spongiæ est similis, substantia inter Cartilaginem & membranam media: siccata contrahitur, humida distenditur.

Myrrhæ quædam species, minutis constans grumis, colore ruffis, Francoforti in nundinis.

Fortè pura Casia fistula Cinamomo similis, purpure tamen, gustu lubrica &c.

Casia solo gustu à Cinamomo Characio distans, qui est uocato Calamo atq; Galangæ non dissimilis, tenuior tamen.

Alcea quædam tenuissimis foliis in sylua Hercynia supra Stollbergi oppidum, ad montem Aurbergum, qua itur ad Mansfeldium & Sangerhausen.

Seriphium, id est, Absinthium marinum ad lacum salsum prope Seburgum.

Sanguis Rumicis species, cuius folia rubentibus sunt distincta uenis: in uenis est succus purpureus, primo anno non caulem fert.

Draconis Lyfimachia minor indiuiduo caule. Vuittembergæ.

nulgò. Monoclono Artemisiæ non dissimilis herba, Stasphurti.

PISCIS uolitans pede longior, figura Barbonis, alis membranaceis geminis tantum continuisq; qui uiuit ultra Gades. Hispanis dicitur Pescauolar, Latinis fortè Miluus, aut Hirundo marina.

Dentata, quæ & ossea lingua, cubito longior, utrinque serræ modo eminentibus dentibus. fortè est Serra marina cuius Plinius meminit. Francofordiæ.

Conchæ Indicæ grandes, in spiram conuolutæ conuexæ: tam foris quàm intus splendidissimè. Franeoforti.

Lacertæ Indicæ, ut uocabant, cubitales aut maiores, Crocodilo similes, minoribus tamen squamis. Francoforti ad Mœnum.

Capricorni cornua longa sunt, falcata & tuberosa longitudine trium pedu. Francoforti.

Cornua Ibicum minora, pauloq; crassiora sunt, falcata & superficie æquali, & ualde ponderosa. Francoforti.

Cornua Dambocci ramosissima maximæque, & ita intricata, ut nullum uideatur animali præstare utilitatem. Lochaurii in arce electoris Saxonie.

Cornua ceruorum caprearumq; ualde intorta, manca & monstrosa, ibidem.

Simia Porcaria cui barba ab auribus usque sub mentum. Francoforti, uulgo *ein Pauian*.

Subulones Plinio cerui sunt simplicibus & indiuiduis cornibus, à subule mucrone dicti: uulgo ab acumine cornuum *Spisbirsche* uocantur.

Cuniculis similia animalia in campis & agris latibula excauant: uide an sint Dasypodes Leporum genus, reperiuntur autem in Pannonia iuxta Budam urbem, & uicinis regionibus: alii tamen Cuniculum Dasypoda uocant.

Cutis piscis cuiusdam marini, aspera, & scobinæ modo scabra, qua capuli & manubria Hispanicorum gladiatorum obducuntur. Vidi huiusmodi gladios ex Antuerpia allatos, uidetur mihi ex Squatina esse pisce.

Vulpecula marina fote.

Orphus siue Vrphus piscis qui Germanicè *ein Vrff* uocatur: sapidissimus est, media inter Carpionem, Plozam & Bresnam figura & magnitudine. Vide ergo an sit apud Plinium Orphus.

Goldesforren similes sunt reliquis forris, sed squamas habent deauratas, Augustæ Vindelicorum habentur.

Rorforren reliquis similes quidem sunt, sed carnem habent rubentem & ualde sapidam.

Gundesforren eandem habet figuram, sed frequentius fundum amnium sequuntur: unde nomen eis apud Germanos.

Pisciculi in fusco pallidi, aliquantulum maculosi, longitudine digitali, Augustæ sunt quibus pascunt forras suas in piscinis diuites.

Sengelè minutissimi sunt pisciculi, gregatim tranquillioribus amnium partibus apicandi gratia innatantes. Augustæ in deliciis sunt.

Testudinum magna est copia Spiræ ad Rhenum, in campis ac riuiulis uiuentium: Cum ibi sunt comitia, rustici eas cancrorum modo uenantur & uenales portant. Hispanis in comitiis sibi agentibus, lautissimum faciunt cibum, cum non temerè ab aliquo Germanorum expetantur.

Steynraben, corui sunt in rupium & petrarum cauernis uiuentes, uita illis ad Danubium in utraq; ripa ubicunq; saxa & rupes attolluntur: ut non procul à Passauiò et supra Kelheimium in petræis faucibus. expetuntur regum uenationibus & mensis.

Pyrgocorax. Item Brisaci apud sanctam Mariam de lapide prope Basileam

Steyndolen, monedulæ sunt in petrarum cauernis agentes: reliquis monedulis multò minores: frequentes autem sunt supra Kelheimium in petræis faucibus, utràque Danubii ripa.

Piscis planus Soleæ aut Passeri marino similis, carnosior tamen, * atq; aculeata nigra & cœlum spectante parte, in mari uiuit.

Chlorion auis uidetur mihi esse quæ Germanis uocatur *ein Worgangel*. colorem habet in uiridi luteum, quemadmodum etiam eius carnes. Vide etiam Hemmerlinge.

Spermatis Ceti genus, seuo simile, multis tenuibusq; ceu neruis plenum, inuenitur in nostro mari.

Motacillæ auis species altera lœtero, id est, Hemmerlingo colore similis, cætera Motacillæ uulgaris.

LOCA MEDICAMINVM FERACIA IN GERMANIA

sunt præcipua hæc sequentia.

MONTANI hercyniæ sylvæ tractus circa Bohemiam totam: & in finibus Saxonum ac Thuringorum, iuxta Goslariam, Osteradam, Halberstadtum, Quedlingburgum, Oscharolebium, & Stolbergum urbes.

Item Alpes totæ, præsertim Helueticorum & Noricorum,

Montes Transylvaniæ.

Deysterus in Brunsvicensi Saxonía.

Vuinbergus, Gleysbergus, aliiq; Salæ fluviio imminentes iuxta Ienam urbem.

Mons S. Petri iuxta Halam Saxoníæ, omnesq; montes Thuringiam circumdantes, præsertim iuxta Vualtershusium.

Vogelbergus, Arneftusq; montes, & sylva Reynhardina in Hefsia.

Rheno imminentes montes: Brisgoiæ item, Pomeraniæq; partes priuatim quædam excellentiora in suo genere ferunt.

Palustria quoq; Chauchorum quædam copiose ferunt.

Sylva quoq; nigra, quæ Hercyniæ pars est: & Alpium cornua in Sueuia, quæ Almen incolæ appellant, plurimis optimisq; nec ubiq; inuentu facilibus scætant.

V.A.L.

VAL. CORDI DE ARTIFICIOSIS EXTRACTIONIBUS Liber: cuius tres sunt partes.

- I. De extractione efficaciorum partium è medicamentis purgantibus, simplicibus & compositis.
- II. De Destillatione oleorum.
- III. De Destillatione olei è Chalcantho duplicis, eorumq; uiribus.

CL. V. PHILIPPO BECHIO BASILIENSI DOCTORI MEDICO, artis scientia & usu celeberrimo, Con. Gesnerus Medicus. S. D.



ΑΡΙΤΑΞ ΔΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΟΥ, ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕ, Gratitudo
nis laus.

antiquissimo Menandri scenario celebrata sententia, non gentium modò, sed naturali iure antiquis hominibus inscripta, iustitiam plus quàm ciuilem constituit. Leges enim ciuiles eatantum dare aut reddere queng; iubent, quæ ex boni ciuis officio sacere debet: ac nisi faceret, iure cogere tur. at qui beneficium ultro et gratis confert, is ut plus quàm ciuiler iustus est, & ueluti melioris ciuitatis celestisq; reipub. ciuis, inq; ea summi uentura *αὐτοῦ πάρος* & Dei O. M. imitator, ac sicut in prouerbio est, Homo homini deus: ita ingenuè, candidè, liberè, liberaliter, ei sine remunerationis spe, quæ pones se sunt communitat, largitur, commodat, gratificatur aut donat alijs hominibus, diuina quadam animi magnitudine præditus. Huic uerò proximus est, is qui grato fructuq; animo, non minus benignè, libenter atq; liberaliter, quàm ille dedit, acceperit: & uerbis, si opus sit, memoriam gratumq; se exhibuerit: & si nihil impediatur, re ipsa *αὐτῷ τῷ πάρος* *ἡ δὲ χάρις αὐτῷ ἀνέστανται*, beneficium retulerit. nā hic quoq; homine ciuiler iustus, ut mihi uidetur, iustior est: ad referendam enim gratiam legibus non adigitur, sed sponte facit. Quem admodum autem sine ciuili iure res publica esse aut durare prorsus non potest, ita si beneficentie & gratitudinis officia accedant mutua, melior eadem, iucundior atq; felicior fuerit, duraueritq; diutius. Hic præcijs amicitiæ, perfectissimæ uirtutis: hic potissimum sacro sancti illius & uniuersalis præcepti: Quod tibi fieri nolis, ne feceris alicui, iustus atq; fructus est. Quamobrem erga benè merentes gratitudinem, ita propemodum laudandam iudico, ut erga Deum pietatem laudamus: ingrati tudinem uerò ueluti impietatem quandam detestari oportere. Sic igitur effectus ego in omni uita beneficiorum quorum uis mihi auctoribus, gratum memoremq; animum saltem, si rebus fortè assequi nequeam, declarandum mihi imperaui. Itaq; in his etiam Cordi libris ad editionem promouendus hoc primum spectauimus, ut publico artis medicæ studio forum nomine, conditori eorum, aut eius memorie saltem, quo possem modo præberem me gratum: idq; merito, cum ipse uita sue periculo, in eoq; tandem amissione, medicis, mō mortalibus omnibus, prodesse uoluerit. Deinde priuatim ijs, qui mihi scripta eius conquirenti, quæ habebant exemplaria obtulere, ut & mihi gratificarentur, & ex peculiari bono publicum facerent, gratitudinis aliquod specimen d: promere conatus, oblatos ab eis libros, ut profecta ab ipsis gratia ad ipsos quodammodo rediret, in ipsorum nomina inscripsi, uidelicet Ralle, Heroldi, Placotomi. Dedicatio.

Ceterum huic instituto meo, doctissime & ornatissime Bechii, nisi hunc De extractione subtiliorum partium ex medicamentis purgantibus, & oleorum destillatione libellum tue humanitati dedicarem, non satis facerem. Eius enim tu primus mihi copiam fecisti, quanquam illius tantum partis, quæ oleum Chalcantibi destillat: quam postea unā cum prioribus duobus partibus Ioannes Crato etiam (uir doctissima & uirtute præstans, Cæsare & maiestatis medicus) Vratislauia ad me misit. Sed nolui idcirco destinatum nomen tui tuo iam antè nuncupationem mutare. Collatis quidem ijs quæ ambo communicauiis eadem, libellum integro rem do. Hunc ipsum autem non minus benigno liberaliq; animo nunc recepturum te, quàm prius dedisti, non negat illatus, quam uultu, sermone, moribus, totaq; uita præ te fers (ut nihil iam de eruditionis tue præstantia dicam,) spem indubiam mihi facit. Quod si fortè inuidus aliquis secum stomachetur, & artificiosos illos adeoq; subtiles & secretos medicamentorum apparatus (quos paucissimi hactenus, soli fortè principum medici, non multis ante hoc tempus annis, aut qui magna pecunia redemissent, callebant) in uulgus edi ac ueluti mysteria profanari indignè ferat: illi equidem in præsentia nihil respondebo, ut magis etiam indignando ipse sibi inuidie suæ penam det. Ego (ut aliquid saltem dicam) bona omnia communissima esse cupio: neq; ab hoc proposito abuentium imperitia aut malitia me deterrebit. Istos enim coërcere, & a medicine professione prohibere, magistratum interest, qui si alicubi officio suo hac in parte non satisfacuit, ut sit, præsertim in populari reipub. statui nos tamen quæ optima excellentissima

VALERII CORDI DE ARTIFICIOSIS

mag. remedia nouimus, nihilominus & publicè & priuatim unũ bonis ac eruditis (quorum, Dei gratia, magnus ubique numerus est) communicare non desinemus. Vale uir clarissime, & me ama. Tiguri decimo Kal. Ianuarij, instantis anni à uirgineo partu. M. D. LX.

VALERII CORDI DE EXTRACTIONE, VT

uocant, Purgantium medicamentorum: & Oleorum destillatione: in genere primum: deinde priuatim De oleo è Chalcantho duplici, uno austero (uel acido) altero dulci, Libellus tripartitus.

PARS. I.

DE EXTRACTIONE. CAP. I.

EXTRAhitur ex medicamentis solutiuis ipsa qualitas purgans æquè ac Olea, sed diuersa ratione. Olea propter aëream substantiam ascendunt in destillatione. Solutiua uerò facultas, quoniam terrestri corpori inseparabiliter inhaeret, non ascendit, sed in fundo relinquitur: excepto uno atque altero, flore uis delicti Pruni syluestris & Persici, quorum aquæ destillatæ alium subducunt: & hoc, quia flores hanc uim obtinent. Nam hi melius à sole excoquantur, & subtiliores uires, quæ faciliè resoluuntur in uaporem, acquirunt. Sed quæ propriè solutiua uocantur: aut sunt radices, aut radicum liquores, aut succi, aut cortices, aut semina, quibus omnibus inest tenaciter inhaerens & uiscosa qualitas. Ideoque eorum solutiua uis non potest ascendere in destillatione, sed manet in substantia decoctionis, ex ea euaporante quicquid est aqueum. Excogitata autem hæc est extractio pro delicatis & nauseabundis, ut qui magnam solutiui *Alorij* nō ferunt.

ELLEBORI nigri extractio. CAP. II.

RECIPE Rad. Ellebori nigri recentes, libras iiii. lauentur dum sunt succo præditæ: deinde incide minutim, ac superinfunde sequentis decoctionis Colaturam. Re. succi Buglossæ, Borag. lib. ii. Succidepurati, & colentur diligentissimè, ut auri claritatem acquirant, & reponantur ad tempus conueniens.

Item deinde Rad. Foeniculi, Cicoreæ, Asparagi, Petroseliniana unc. iiii. Fruct. Iulubarum. Sebesten añ drach. ii. Seminum Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli: decoquantur secundum artem in aqua lib. xii. Colaturæ infunde prædictas lib. iiii. succorum: deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, usque dum radices emineant: deinde exprime rursum per filtrum. Colaturam coque ad mellis crassitudinem, clementi igne, adhibita assidua cura ne aduratur. Postea reponere, & utere faciendo periculum in dosi à scrup. s. usque ad unum.

EXTRACTIO RHABARBARI. CAP. III.

RHABARB. electi lib. i. minutim incidatur, & grosso modo teratur, postea adfunde succi depurati Borriginis, Buglossæ lib. ij. maceretur per horas xxiii. deinde coque ad lentissimum ignem, usque quo extra emineat Rhabarbarum. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & exprime, ut substantia in colatorio maneat: colaturam coque ad mellis spissitudinem, adiectis Zuccari uncis ij. Quidam in balneo Mariæ ad spissitudinem coquant, ne aduratur, quod melius est, quemadmodum etiam in duplici uase. Purgando deglutendum cum gutta olei Cinnamomi, aut Anisi mixtum & azymo inuolutum, faciendo in dosi periculum, à scrup. i. usque ad scrup. ii. Quidam quia Rhabarbara per se non ualde purgat, acuiunt totam extractionem cum modico Diagridii optimi quod nihil nocet.

DE Extractione è Massis Catapotiorum. CAP. IIII.

CVM uirtutem solutiua ex massis pilularum extrahatur es, necesse est, ut

ut prius diligenter dispensata sit massa, sumpta aloë purissima, & aliis medicamentis electis. Deinde recipe quancumq; uolueris massam, & concidas in minutas partes, ac macera per octiduum in aqua pluuiali, succorum Borriginis, sceniculi, ana q. s. Coque deinde in uitreo duplici uase, per integrum diem, deinde exprime per laneum pannum mundissimum, qui nullos pilos emitat, & iterum in balneo [†] in duplici uase ad iustam spissitudinem diligenter coquito, & forma pilulas minutas. da scrup. ii, aut circiter i. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facile in manu liquefit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum uires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt, & melius multo est, ut omnia in duplici uase coquantur.

ALOE quomodo optimè lauetur.

CAP. V.

ALOE N optimam, fuluam, pellucidā, facile in manu liquecentem confringe in partes minutas, & pone in patinam uitream, mundam: & infunde desuper sufficientem quantitatem aque pluuialis. dissolue in duplici uase omnino, & permittite denuo refrigerari: postea auter innatantes si qui sunt pilos: & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici uase coque. Quod uero in fundo uasis est crassiusculum in alio usus seruetur.

PARS II.

DE DESTILLATIONE Oleorum.

CAP. I.

QVONIAM Aromata quædam, & omnium umbelliferarum herbarum semina ferè constant magna ex parte, calida, tenui & aërea substantia: ideo necesse est, ut aliquid de oleaginsia substantia habeant. Nam talem habet mixturam propemodum omne oleum. At cū oleum & pinguedo quæ in simplicibus medicamentis continentur duplex sit, quædam monenda sunt. Naturæ periti duplex inueniunt oleum: in simplicibus medicamentis unum terrestre, crassum & uiscosum, & totaliter suo corpori in quo est commixtū: quale est oleum Nucis, Amygdalarum, Baccarū lauri, Seminū lini, Hyoscyami, Sinapi, Papaueris: & omnia similia quæ in fructuum aut seminum nucleis continentur. Hæc autem omnia propter totalem cū substantia cui insunt commixtionem inseparabilia sunt, nec ullo modo per distillationem elici possunt: quare uel exprimenda sunt è substantia. Alterū tenue aëreū: quod est, & separabiliter suo corpori inhæret: & hoc est segregabile. Ascendit enim facile in distillatione, nec difficulter à suo cui inest corpori decedit. Tale autem est quod continetur in aromatibus, Carpobalsamo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis, Cinnamomo, Caryophyllis, Macere, nuce Muscata, ligno Aloës. Item quod continetur in seminibus umbelliferarum herbarum: Quales sunt Ligusticum, Angelica, Angelica minor, Libanotis nigra, Magisfrantia, Pastinacæ, Caros, Cymini, Ammi quod appellant Amomum: item Apium, Petroselinum, Gingidiū, Pimpinella, Anisum, Foeniculum, Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per distillationem in arena, ita ut tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam uitream luto intestam optimè: una autē uice ad unc. iii. iniiciantur, & sint trita secundum capacitatem cucurbitæ, infundatur deinde ad vi. lib. aquæ clarissimæ, ac misceto diligenter. Pone deinde cucurbitam in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, sed interfit arena. Cucurbitæ impone alembicum uitreum, cuius rostrum desinat [†] in stanneam uel ferream fistulam [†] intus & foris illitam. ea fistula transeat in obliquo [†] te addenda. quum per uas quod habet in se aquam frigidam, ut inter distillandum egrediens [†] dum. cum oleo [†] liquorum refrigeretur, claude iuncturas accuratè, madefacta papyro uel linteo, & suppone exceptorium. Postea accende ignem lentum, & uide ne nimium surgat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam ut anisum propter raritatem substantiæ suæ, simulq; uiscosum quod habent largiter ebulliunt, ideo non statim alembicū imponere debemus: sed posteaquam bulbas excitari uideris, & uaporem sursum ferri: Quod cum fiet depone alembicum,

D d iii

& immisso bacillo agita ita resoluetur in uaporē spuma, quæ postea mediocri igne moderari, compesci & excitari potest. Quo facto impone rursus amlebicum, & circumlutato satis, ac destillari sine cessatione, donec conieceris nullum amplius intus contineri oleum: quod usu & gustu statim percipies: nam cum gustu destillantes guttæ non amplius respicient inacti aromatis saporem, desistendum est ne a roma fundo cucurbitæ inhaereat, & exuratur. Deinde segrega contentum in destillata aqua oleum optimum, quo potes artificio. Porro notandum est, quædam ex his oleis aquæ innatare, quædam fundum pertere. Innatant piperis nigri, & recentis Cardamomi, & Anisi Fundum petunt, Cinnamomi, Macis & Cariophyllorum, &c. ut uidetur. Aqua Cinnamomi & Anisi cum destillantur, lacteum habent colorem, & lacteum hoc paulatim in oleum conuertitur. Reseruanda autem Cinnamomi est aqua, præsertim quæ primò exierit.

NATURA & vires Oleorum.

CAP. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam mirabilem habent, nam in hyeme uerumque concreuit instar butyri, ita ut aspectu imitetur sperma ceti, præsertim Anisi. Nam hoc æstate media concreuit aspectu niueum: reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præsertim Cardamomi & piperis. Ea enim omnium tenuissimam substantiam habent, adeò ut neglecta omnino euanescent. Vires autem habent earum rerum, è quibus extracta sunt, sed multò efficaciores. Nam efficacia quæ uni libræ inest in paucas drachmas contrahitur. Gariophylli enim uncia xvi, contrahuntur in unciam unam semis, aut duas, Cinnamomi in drachmas duas semis aut duas: piperis in Dra. ij. aut tres una semis: Miscentur autem in confectione† ad guttæ x uel xv aut xx, libræ Zuccari pro delicatis, sed infundendum est ultimò cum morfellis, quos facis uel orbiculis, optimè miscendo.

†
ad fortè abundat.

PARS III.

DE OLEO uitrioli faciundo.

CAP. I.

OLEUM uitrioli quod à quibusdam oleum uitæ appellatur, aut melancholia artificialis, nihil aliud est, quam aluminosa qualitas, & substantia ex uitriolo per artem extracta, modicoque sulphuri mixta. Nam ipsum uitriolum, è quo fit, triplici constat mixtura, uidelicet multo alumine, modico ærugine, & paucò sulphure: Aluminosa enim aqua in metallis per æris uenas & Marchasitam destillans, æruginosam qualitatem acquirit, & sulphur quod Marchasitæ inest, mixta paulatim concreuit, aut industria ad spissitudinem coquitur: in destillando autem aluminosus & sulphureus uapor tantum ascendunt, æruginosam qualitate in fundo retortæ relicta, quo fit ut hoc oleum alumini, & non æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerrum & dulce. Austerrum duplici constat mixtura, scilicet alumine multo, & modico sulphure. Dulce uerò simpliciter sulphure constat. Nihil enim aliud est, quam liquidum sulphur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequæquam alumen, sed sulphur æmulatur. Faciendum est autem utrumque maxima cura & diligentia, adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidem aptitudo instrumentorum, ut aiunt Chemistæ, magistrum parit. Quapropter sequentes Canones diligenter obseruentur.

ELECTIO VITRIOLI.

CAP. II.

CVM plurimæ sint uitrioli species, operæ precium est indicare, quæ nam species eius huic operi potissimum conducatur. Et quamuis omne uitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen est ex omnibus præstantius cœruleo aut uiridi: quoniam plurimum fugitiui sulphuris obtinet, quo adiuuatur ut facilius oleum ascendat. Notandum etiam melius esse factitio natium uitriolum, & maxime Vngaricum: aut si huius copia non sit Goslarie nse, Eligendum præterea est quod magnis racemis

racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem [†] fractum, minutū & puluerulentū est, ueluti inutile non est recipiendum, quemadmodū etiam quod solis [†] uel aëris iniuria candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

COCTIO VITRIOLI. CAP. III.

AT quia uitriolum multum in se habet aquei & excrementitii humoris, qui oleum diluit, & non nisi longo tempore & magnis molestiis per destillationem ab oleo separari potest, compendiarie est inuenta uia, qua breuitemporis intervallo id absumi queat, ne longa mora artificii fastidium pariat. Recipe igitur prædicti uitrioli lib. xii. conice eas in ollam magnam, nouam & optimè crematam. ollam impone fornaci profundæ, supra ardentes prunas: cum liquefieri & bullire cœperit, spatula agitur, ut integrū liquefacto misceatur donec & ipsum liquefiat. Bullire demum finito usquequo nullā prorsus bullam amplius excitet, & donec totū densetur. Deinde exemplarē fornacem uitriolo ollam refrigerari permittito, loco neq; humido neq; uentoso, sed sicco & tepido. postquam refrigeratum fuerit, ex olla eximito, & considera an superficies eius undiq; rubescat. Nam si rubescit bonum est signum, & facilius calcinatur, ut iam dicemus.

CALCINATIO Vitrioli.

CAP. IIII.


EXEMPTVM olla uitriolum in minutas partes confringe, & in mortario subtilissimè tere, deinde tertiam aut quartam eius partem in recentem [†] ac combustam ollam conice, ac rursus in profundam fornacē, si ut ante, dimitte. & aliam quamdiu urito, donec rufius fiat color. Mox ollam ab igne depone et moue eā, ut

uideas notā, an satis calcinatū sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argenti uiui aut liquefacti plumbi modo & exsistentes bullas efascatur, satis usū esse intellige, tunc effunde in magnā & recentē ollam prius calefactam, & effluet quasi sit liquidū, aut ad modū argenti uiui. Quod autē reliquum est Vitrioli, similiter sigillatim, ut calcinetur [†] uras. Cū usū fuerit, comisce rursus optimè in mortario, modo sit agitās ne puluerē excites nares & fauces offensurū. Cū hæc omnia executus fueris, uitriolum in bilancē ponito, & animaduerte pōdus ipsius. Nā si sex lib. id est, medietas superfuerit, benè omnia facta sunt. sed hæc sufficiant.

DE FORNACE faciunda. CAP. V.

MAteria, quæ destillanda est, quo modo preparanda sit, iā indicauimus. Nunc autē dicere de fornace res & ordo postulat: nā si hæc inepta fuerit, [†] frustra omnia fiēt. Extrusa igitur est fornax ex lateribus in planum, [†] alius finis sit. positis, quod crassioribus parietibus ignis facilius & diutius contineatur: fiet etiā quadrata & æqualiter crassā, intusq; habeat propemodum duarū spithamarum latitudinem, nō tamen omnino, sed dempta tertia parte spithamæ. Extruat autē hoc modo. Prima & infima cavitās habeat altitudinem semipedis, cui per transuersum imponentur ferra menta satis crassā, ut ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cavitās quæ est constituta supra ferream craterem, (id est, vber den rost) habeat dupum pedum altitudinem, & ex anteriori parte

D d iiii



foramen, per quod carbones iniiciantur. Hoc incipiat lateris transuersi crassitudine super cratem. Per mediam deinde cavitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transuersum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortæ collum exeratur.

DESTILLATIO VITRIOLI. CAP. VI.

POSTquam fornacem extruxeris, eligit retortam capacē aptamq; ante omnia, ex uitro Venetiano aut saltem Heliaco factam, prius undiq; luto obductā. in eam coniecit totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortę relinquatur uacua, quō facilius a[†] Vitriolo spiritus ascendere queant. Mox transuersam & ferream trabem in fornace optimē luto obducto, eiq; in medio superposito perlutatum testę fragmentum, super id collocabis retortam, ne ācendente ferro immediatē dissecetur, ita tamen ut in medio fornacis retorta constituta sit, eiusq; rostrum extorsum modicē prouum promineat, & meatus per quem collum suum ē fornacē exerit, diligentissimē luto farciatur atq; obstruatur. Postea accipe quinq; tegulas, & fac ex iis tectum supra fornacem sub quo lateat retorta ad eum modū quē depinxi, tectum luto undiq; obducatur, quatuor pro fumo foraminibus relictis, in singulis angulis singulo, ea amplitudine ut crassissimus pollex liberē intrōmitti et exeri queat. Fac etiā quatuor conos ex luto, quibus foramina obstruantur, quo facto, applica retorta orificio receptaculum grande ex uitro Venetiano aut Heliaco, quō enim maius id ipsum fuerit, eō liberius spiritus recipiet; si uerō paruum fuerit, periculum est ne spirituum copia distentum rumpatur, infunde etiam in retortam aquę clariss; unc. xviii. aqua enim citō spiritus ad se rapit, & prohibet ne confringatur receptaculum, ita applicatum optimo luto diligentissimē obstruatur, magna adhibita cura ne quicquam in receptaculum incidat, tingitur enim inde in rufum colorem oleum. Cum omnia hæc feceris dimitte per integram noctem lutum exiccare; ac si quę fatiscunt, rimæ luto illinantur, mane deinde[†] perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus, aperto uno superius foramine, per quod fumus exeat, augeaturq; successiue ignis usq; ad uesperam: quo tempore aperiendum est secundum foramen, & attende diligenter[†] an appareant spiritus, quī retorta egrediuntur, ueluti si quis candidum efflaret fumum. nocte sequente uigili cura cauendum, ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen, ita deinde auctum ignem in uigore teneas, ac altera die tertium aperi foramen, augendo sigillatim ignem, usq; quō etiam retortæ collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem, & post mediā noctem aperi quartum foramē. Cum ita in summo uigore ignis fuerit constitutus, uidebis spiritus egredi, ueluti conglomeratas nubes, qui cum cessare uoluerint, aperi omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonesingere, usq; quō etiam receptaculum excandescat, studiosē cauendo ne quicquam frigidum aut humidum super retortam aut receptaculum iniuria aut casu decadat. Agenda hæc sunt in loco claufo, quō neq; imber neq; uentus ingreditur: conseruandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in[†] Vitriolo relinquātur, quod uisū facile percipi potest. Cum autem nulli amplius egredientur, sine ut per se extinguatur ignis, ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito, postea aufer cum contento humore receptaculum, & repone donec oleum ab aqua segrebabis, tum[†] confectam retortam inspice, & uide an caput mortuum nigrum sit, hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum exustum in retorta Vitriolum.

SEGREGATIO INFUSAE AQVAE. CAP. VII.

QVONIAM in receptaculo continetur unā cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, ut Vitrioli liquor syncerus reponatur; segregatur autē per destillationem in balneo aut cinere subtili, tutius tamen in balneo, quapropter totum humorem

humorem qui est in receptaculo, in cucurbitam uitream Venetianā aut Hesiācam infunde, superponendo Alembicum ē simili uitro factum, quæ benè luto circumlinatur. sub balneo deinde accenso igne paulatim sine aqua[†] donec habeas unc. xviii. illas quas infudisti. Si Vitriolum non benè calcinātū fuerit, plus egredietur, quare uide ut prædictæ xviii. unciae sint bonæ mensuræ. Cū hoc feceris refrigera balneum finito, et aquam quæ destillauit abiicito, quod uerò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumq; rufum colorem, ideo secundum sequentem modum rectificandum est, ut clarum fiet,

RECTIFICATIO OLEI VITRIOLI CAP. VIII.

ACCIPE retortam Venetianam aut saltem Hesiācam, antea luteo optimo uestitam, in eam funde quod in cucurbita continetur oleum, retortam pone in minorem fornacem in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena destilla, paulatim ignem acuendo, ut sigillatim ex intervallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem uitro factum, accomissuram optimè luto claude, ne quicquam expiaret. cū deinde totum ē retorta destillauerit, refrigerari finito, ac postea aufer & infunde sensim in purum uitrum Venetianum, quod habeat angustum orificium, ac repone, ceu præsens in multis morbis remedium: hoc est austerum Vitrioli oleum, cuius vires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet,

VIRES EIVS. CAP. IX.

MERVM ac non dilutum, neque debet neq; potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam ignis modo interanea, & quicquid attingit a durit: omnia, n. corrodit præter uitrū & pinguis, ueluti ceram, picem, seu & liquidorum etiam oleorum colorem immutat, præsertim olei Macis, cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus uasculis contineatur quantum uis frigidum, & repente sibi ipsi misceatur, adeo incalcescit sua sponte ut manibus uix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiam pura melancholia. quare etiam melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleum uentriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat, frigidum uentriculum calefacit, phlegma consumit, crassos & uiscosos humores incidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur, sitim ac feruorem interaneorum in febribus extinguit: singultum prohibet confestim & nauisem ac cibi abominationem auerit, sed temperandum est cum aliis quibusdam. Quare exemplū unum atq; alterum ponemus.

Aduersus Calculum.

Recipe Olei macis,
Terebinthinæ clariss. ana guttas xii;
Aquarum Anisi,
Fœniculi, ana unc. ii.
Syr. liquiritiæ. unc. i.
Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè, et gusta: si habet acetositatem, quæ dentes[†] non in stuporē[†] celi rem trahat, benè est: si non est acetosa potio, instilla adhuc unam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina securè.

Ad uentriculum debilem.

Recipe Syr. de Mentha unciam i.
Aquæ Cinnamomi unc. iiii.

VALERII CORDI DE ARTIFICIOSIS

Olei Cinamomi guttas ii.

Olei Vitrioli guttas iii.

Da securè.

AD CALOREM ET SITIM in febribus.

Recipe Syrup: ex succo aut infusione uiolarum unc. i.

Aquarum Cinamomi unc. i.

Hordei. unc. iii.

Olei Vitrioli guttas iii. aut iiij.

Misce, & contrahet puniceum colorem, & saporem uini austeri Cinamomo aromatizati.

EX AVSTERO quomodo Dulce fiat.

CAP. X.

ANTEA dictum est austerum Vitrioli oleum, duplici constare mixtura, uidelicet multo alumine, & pauco sulphure. Quare cū ex austero oleo dulce extrahitur, nihil aliud fit, quam quod sulphur ab alumine segregetur. Est itaq; dulce Vitrioli oleum nihil aliud, quam oleum sulphuris aut ipsum sulphur in liquidam substantiam redactum: & hoc propriè oleum dici potest est enim pingue unctuosumq;, quemadmodum ipsum sulphur quod in oleo, & non in aqua liquefit, sequitur autem modus segregationis.

MODVS SEGREGATIONIS.


CAP. XI.

†
ut ignis ag-
glutinati.

RECIPE uini ardentis acerrimi & ter sublimati unc. vi. olei Vitrioli austeri tantundem, misce in Veneto uetro, & pone in Cucurbitam parua, angusto orificio, & optimè luto orificium claude, dimitte ita per integrum mensem aut duos. Deinde effunde in Cucurbitam, cui sit immediatè annexum alembicum, (hoc est, ein Kolb mit einem angeschmolzenen helm) cuius figuram subiiciemus. pone deinde in parua fornacem, ac dimidiam partem eius cinere obrue, postea applica recipientem, & luto iuncturam claude diligenter, & extrahe unc. vi. uini ardentis quas infudisti: ut uerò tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ, sic solum uinū absq; oleo ascendet. Cū extraxeris autem per Balneum infusas vi. unc. uini ardentis, pone id quod residuum est in fornacem, ut arena mediam Cucurbitæ partem attingat, ac nouo & uacuo recipiente, eoq; non magno applicato, luto iuncturam diligenter claude, Accende deinde lentum ignem, & sensim extrahe omnem humiditatē, quæ relicta est in Cucurbita, donec nihil humidi amplius in fundo appareat: adhibita semper maxima & cura & diligentia, ut ignē ita modereris, ne ebulliat usq; ad alembici canalē. Nam si hunc ebullitio attigerit, sedari non potest nec prohiberi, quin in receptaculum egrediatur: ac totum oleum corrumpat, solet enim facillimè ebullire. Cū autem sensim extraxeris, aufer statim recipientem cum suo humore, tum uidebis duo contineri in eo, uidelicet aqueum humorem & oleosum ac pinguem. Segregabis autem unum ab altero statim, ita ut nihil aqueum in oleo relinquatur: Nam aqua illa perdit oleum. Solet autem oleum ipsum plerumq; aquæ innatare, maxime si infusum prius uinum omnino per balneum extractum fuerit, sed statim poteris tactu discernere oleum ab aqua. Oleum enim pingue est, aqua minimè. Segregatum oleum deinde usui reserua.

Ein Kolb mit einem angeschmolzenen helm muß man etlich auff der Glashütten bestellen zu machen / auß zerbrochnem Venedischem glasi/oder auß Bessischem glasi.

Vires



VIRE S EIVS QVOD segregatum est.

CAP. XII

VIRE S habet quascunq; & sulphur, sed omnia efficacius præstat, quia propter liquiditatem facilius penetrat & ad actiones T[†] proprias, quod sulphur nō potest, quia impeditur à soliditate & spissitudine sua, quo minus penetret. Illud uero amplius potest sulphure hoc oleum, quod ualeat potenter, ad omnes in corpore putrefactiones, & præcipuè ad pestem, ad educendum è pulmone in pleuritide, & peripneumonia, & difficili tussis, pus, & crassos uiscososq; humores: tuto enim absq; omni periculo intra corpus sumitur. Calculum neq; in renibus neq; uesica coalescere sinit, exulceratam uesicam sanat. Dosis eius est una aut altera guttula, aut tres, in uino modico temperatæ. miscetur etiam rotulis & morsellis è saccharo factis. Diligenter autem reseruandum est. Nam modicum fit ex lib. i. austeri olei Vitrioli, & facile propter tenuitatem partium euanescit.

FINIS:

E c ñ

VAL.CORDI COMPO- sitiones medicinales aliquot, non uulgares.

CLARISSIMO VIRO SEBALDO HAVVENREVERTERO
Illustris Reipub. Argentinenſis medico præſantiſſimo, Con. Geſnerus
medicus S. P. D.



VIBERALITATIS PVLCHERRIMAE VIRTVTIS LAVS ET
decus, nō in magnis ſolum donandis, ſed paruis etiam eodē animo accipiendis, conſi-
ſtere mihi uidetur. Itaq; cū te uirum bonum & liberalem eſſe, doctiſſime Sebalde,
nōrum atque expertus ſim, pauculas iſtas Valerij Cordi medicamentorum compoſi-
tiones, tantillum munuſculum offerre excellentiæ tuæ auſus ſum. In quibus (ut ſpe-
ro, ac mihi polliceor) oblectabit te primū animus, qui exiguo potius
quam nullo, obligatum ſe beneficijs tuis proſiteri uoluit argumento. Deinde ipſius
Cordi memoria, tertio res ipſa, uidelicet compoſitiones Medicinales non omnibus uul-
gares. Librum quidem huius authoris De pharmacorum compoſitione Ioan. Petreius
Norimbergæ iam dudum paulō poſt ipſius mortem edidit, ſed in eo ueteres tantum &
aliorum compoſitiones deſcribuntur, ac ſcholijs ipſius illuſtrantur : propria uerō nulla continentur, præter Aleſan-
gina eius catapotia, et elegia Diamoron Ego hic alias quaſdam ad te mitto, per paucas, ſed egregias: inter quas præ-
cipua eſt Succino trochiſci, quos à Ioh. Cratone etiam Caſaris medico præſantiſſimo, in ipſius ad me epiſtola huic
uolumini præfixa laudatos reperies. Ad tuam autem poſitiſſimū præſtantiam dare hæc uolui, ut amicitie noſtræ
argumentum hoc publicum extaret, & ut tuam quoque ſuper his ſententiam audirem. Tu enim ſi quis alius, & plu-
rimis iam annis artem medicam magna cum laude ſacitaviſti: & eruditione ſolida cū excellas, iudicare de ijs quæ
ad artem noſtram faciunt omnibus rectiſſimè potes. Vale. Tiguri pridie natalis Domini, incunte anno ab eius na-
tuitate ſexageſimo ſupra ſeſquimilleſimum, quem tibi tuiſq; ſauſtum ac ſclicem cum alijs deinceps innumeris ab
eodem Domino noſtro, eterno Dei Opt. Max. filio unigenito ſecundari ex animo opto.

DIAMORON VALERII CORDE (NAM ALIVD EXTAT

Nicolai Myreſſi:) contra depaſcentia oris ulcera, ad dentium effectus
& gingiuarum noxas, atq; ad omnia oris uitia collutione
& gargarismo proficiens,

Recipe Succi mororum rubi,
Succi mororum rubi Idæi,
Succi mororum de arbore,
Succi fragorum, ana lib. ii.
Mellis deſpumati optimi lib. iiij.

Coquantur lento igne ſecundum artem:

MORORVM omnium ſuccus exprimens eſt, antequam perueniant ad maturitatem. Porro Mora rubi Idæi
& fraga citius matureſcunt quàm alia: quare oportet horum ſuccum colligi, & cum Saccharo decoctum reponi, do-
nec alij matureſcant. ſit autem Sacchari ad ſuccos proportio dupla. Rubi Idæi nomine intelligi illum quem uoca-
mus Zumpen & fructum Zumpcer.

PILVLAE Aleſangine Valerij Cordi.

Recipe Myrobal. quinque generum ana unc. i.
Acori ueri, Galangæ,
Zedoariæ, Doronici Rom.
Radic. aſari, Radic. diſtamminoſtratis,
Abſinthii, Roſarum, ana dra. iiij.

Contura

Contundantur omnia crassiusculè: & Myrobala. ni per se macerentur prius in aqua clarissimæ fontanæ libris quatuor, per horas xx. (iii.) deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in uaporem resoluta. postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici uase cum aquæ clarissimæ lib. vi. & affunde his antea coctas Myrobalos cum suo infusculo. Vltimò rosas adiciendo coquantur usq; ad tertias. Coletur postea ualidè exprimendo. Tum in colatura dissolue Aloës optimæ & lotæ acursum exiccata lib. iiii.

Ponantur omnia in uitrea patina ad solem, aut in stufam, & agitentur sa. pissimè, ut concrefcaens in margine Aloë, liquido commisceatur. Cùm uerò mellis spissitudinem fuerint consecuta, tunc adde sequentium specierum puluer. in minutissimè tritum.

Recipe	Galangæ,	Cyperī,
	Zedoariæ,	Doronici,
	Lignialoës,	Cinnamomi,
	Schœnanthi,	Nardi Celticę radicularum,
	Nucis moschatæ,	Macis,
	Cubebarum,	Cardamomi,
	Caryophyllorum,	ana dra. iiii.
	Mastiches,	Succini, id est, Carabe, ana dra. vi.
	Myrrhæ,	Croci ana dra. iiii.

Agitentur optimè cum Aloë species, & fiat massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus debent habere exemptis nucleis siue lignis.

PILULAE istæ Alefanginæ sunt efficaces, immò efficaciares prioribus, (& Mesue scilicet præscriptis:) relinquitur tamen unicuiq; liberum arbitrium, alterutras uel utraq; componendi.

HOC loco non debet poni Dictamnus Creticus, sed radices Diptami dictæ, quæ uulgò in usu sunt, & propriè cortex radicum eius. Germanicè uocatur Elschwurtz/propiterea quòd folia eius sint similia fraxino arbori, & hec est uera fraxinella (uulgò ab Italis dicta.)

ALOE quomodo ritè lauari debeat, in postrema huius libri parte (inquit) quæ est de preparatione quorundam simplicium medic. docebimus.

COMPOSITIONES quæ sequuntur, in impressis Val. Cordi De Pharmacorum compositione codicibus non reperiuntur. Ego à Laurentio Huel medico doctissimo accepi.

SYRVPVS De piris Valerij Cordi.

Recipe	Succipirorum Moschatellinorum,
	Succipirorum Palatinorum,
	Sacchari clarificati, ana lib. ii.

Coquantur secundum artem. Et quoniam pira Moschatellina citius maturefcunt, expressum eorum succum clarificatum cum saccharo decoctum repones, donec etiam Palatina maturefcant: demùm miscebis.

SYRVPVS de Cichorio Val. Cordi.

Recipe	Radicum foeniculi,	Cichorii, ana unc. iiii.
	Linguae ceruinæ,	Scolopendrii,
	Capillorum Veneris,	Trichomanis, ana M. i.
	Aquæ cichorii,	Succi eiusdem, ana lib. iiii.

Coquantur omnia secundum artem. Colaturæ adde Sacchari clarificati lib. iiii. & species sequentes petiæ illigatas suspende in syrupo.

Recipe	Rhabbarbari unc. ii.
	Radic. spicæ Rom. scrup. i. fiat syrupus.

SYRVPVS refectiuus Val. Cordi.

Recipe	Dactylorum enucleatorum,
--------	--------------------------

VALERII CORDI COMPOSITIONES

Ficuum siccarum pinguium,
 Xyloceratiorem enucleatorum,
 Vuarum cibearum passarum,
 Vuarum passarum uulgarium maiorum & minorum,
 Tamarindorum enucleatorum, ana unc. iiii.
 Musti generosi recentis,
 Succu Cydoniorum, ana lib. vi.

Incidentur fructus in partes. Passulæ uerò minores & Xyloceratiæ modicè contundantur, unumquodq; per se; deinde misceantur omnia: & in fictili denso affundatur eis succus et mustum; macerenturq; horis xxiiii. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis aut amplius. Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosea lib. ii. ex una libra Amygdalarum dulcium tritarum expressi. Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xii. Huic decocto clarificato adde sacchari despumati libras iiii. Coquatur ad perfectionem. & cum reponis, tum suspende in syrupo sequentes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas.

Recipe Cinnamomi interioris optimi, Macis, Nucis moschatæ, Cardamomi, Zinziberis, Galangæ, Zedoariæ, Caryophyllorū, ana dra. ii. Ligni aloës, dra. iiii. Huiusmodi dilutum, uel decoctum fructuum horum, uel alicuius eorum, uocant Arabes Nabuh, quo utuntur pro uino & melle in calidis regionibus. Hunc syrupum composui diuitibus quibusdam in chronicis morbis, omnem cibum & potum auersantibus, & comperi mirum in modum uires reficere, alere, & iam desperatos refocillatis uiribus sanitati restituere.

TROCHISCI DE LACCA Valerii Cordi.

Recipe Laccæ electæ unc. iiii.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti lib. i.

Coquatur lignum Guaiacum in libris iiii. aquæ cœlestis ad consumptionem ferè dimidiæ partis. In colatura deinde coquito rad. Rubæ tinctorum unc. iiii. donec remaneat lib. i. s.

Dein iterum colato, & colaturæ iniice prædictas unc. iiii. Laccæ: & ad ignem coquito donec Lacca dissoluatur. postea colato, & exprimito, & ab iuce superfluitates Laccæ. colaturam dein ad spissitudinem aliquam coquito, & inasperge sequentes pulueres.

Recipe Aristolochiæ longæ,

Radiciſ concauæ,

Rhabarbari,

Costi ueri, ana dra. ii.

Zedoariæ,

Galangæ,

Asari radicum,

Curcumæ,

Cinnamomi,

Ligni aloës,

Nucis moschatæ,

Schœnanthi, ana dra. i.

Camphoræ scrup. i.

Misceantur omnia optimè & formentur trochisci dra. i. pondere.

Radix concaua, Bolwurtz, quæ falso appellatur Aristolochia rotunda.

Hos trochiscos composui aliquibus obstructione splenis hepatisq; laborantibus: & presenti auxilio id malum sustulerunt.

Recipe Ambrae excellentis,
Succini albis ana unc. i.
Succini Phaleri,
Succini cerei ana dra. iiii.
Succini nigri,
Camphoræ,
Margar. non perforatarum,
Margar. perforatarum, ana dra. ii,
Onychis,
Dentaliorum,
Entalorum,
Vmbilici marini,
Lapidum cancerorum,
Synodontum,
Ligni aloës,
Cinamomi,
Schœnanthi,
Nucis muscatæ,
Cubebarum,
Cardamomi,
Croci,
Cyperi rotundi,
Zedoariæ,
Doronici, ana dra. i.

Conterantur omnia minutis. & conficiantur trochisci cum mucilagine traga-
canthæ albisimæ in aqua maioranæ dissoluta.

Ambra est Succinum orient.

Succinum est quod Arabibus uocatur Carabe, Germanis *Agstein* / siue *Bernstein* : Sudauis *Gentar* : Gallis
ambra. Est enim Succinum nil aliud quam ambra Germanica.

Phalerium, id est, stauum & clarissimum & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod cereæ colorem habet, non adeo pellucidum est.

Nigrum succinum alio nomine uocatur *Gagates lapis*, Germanicè *Schwarzer Agstein* / oder *schwar-
zer Bernstein*.

Inter emendum album succinum uitare oportet scobem et ramenta. Nam hæc solent pro albo Carabe uendi.
Cum enim cereum aut phalerium succinum tornatur candida ramenta remittit. Ideoq; integras glebas candidi succi-
ni emere oportet. Est enim ualde præciosum.

Onychis, id est, blattæ byzantiæ.

Vmbilici marini Germanicè, *Neerbonen*.

Lapis cancerorum, id est, quos uocant oculos cancerorum.

Synodontes lapides sunt in capite Synodontis piscis inuenti : qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus
est: pro ijs accipiantur lapilli, qui bini inueniuntur in capitibus piscium fluuiatiliū, quos *Baulperßfen* Germa-
nicè uocant.

Hi Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem uentriculum, uertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem &
imbecillitatem cordis. Ad paralyin si dantur in aquis appropriatis, cum Betonicæ floribus, aut lauendulæ, aut tilis.
Et ad suffocationes & strangulationes uteri ualent.

POPOBALSA MI Succedaneum præciosum D. Euricij Cordi, qui Valerij pater fuit.

Recipe Iridis Illyricæ,
Zarnabi longi, id est, Zedoariæ,
Zarnabi rotundi, id est, Zurumbet,
Cubebarum,

VALERII CORDI COMPOSITIONES

Cardamomi maioris & minoris,
 Agallochi,
 Olei Benzoi, ana dra. iiii.
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatae,
 Macis,
 Arceutidum, i. gra. Iuniperi nost.
 Cassiae,
 Cinnamomi,
 Sandali citrini,
 Benzoi, ana dra. ii;
 Croci,
 Asari,
 Maioranae,
 Schœnanthi,
 Nardi Celticae radic.
 Rosarum rub.
 Cyperi longi & rotundi, ana dra. i.
 Camphorae scrup. ii.
 Moschi scrup. i.

Hec omnia trita macerentur in uino Rhenano ter sublimato, diebus viii. Postea diligentissime destillentur in balneo. Destillatae deinde aquae quae primo exiuerit, cape unc. vi. in quibus dissolue optimae, candidiss. electaeque myrrhae unc. ii. Sic tenuissima & praestantiss. pars myrrhae aquae uitae miscetur : crassior uero instar fecis subidet quae nequaquam est separanda aut excolanda, quoniam in fundo dimissa ipsum Opobalsamum aliquot annis conseruabit incorruptum.

FINIS.

STOCC.

STOCC-HORNII ET Nessi in Bernatium Heluetio-

rum ditione montium, & nascentium in eis stirpium brevis descriptio, à Be-
nedicto Aretio Græcæ & Hebraicæ linguarum in schola Bernensi pro-
fessore clarissimo dictata.

CHRISTOPHORO PIPERINO VERBI MINISTRO

in Sigisquilla pago Bernatium, doctissimo fidelissimoq; Con-

Gestuerus. S. D.



MITTO AD TE HVMANISIME ET HONORANDE MI PIA-
rerine montium tibi uicinorum Descriptiones, miraris? non meas illas, sed ab Aretio
nostro communi amico, in meam præcipue gratiam, cum ante biennium rusticari ei
lul uisset, & montes illos ascendere, non accurate quidem conscriptas: sed quantum
recens memoria suppeditabat, ut primum redijt domum, puero dictatas. Eas quoniam
ipse pro sua modestia, ceu opus imperfectum, nemini nuncupauit, meoq; arbitrio per-
misit, ne solus in hoc uolumine liber hic ueluti accephalus, si nullius nomen patroni su-
uideret, relinqueretur, tuæ humanitati dicare uolui, quamuis alienam operam. sed cum
amicorum omnia sint communia, non rectè aliena hæc appello. quin potius quoniam
Aretius utrique nostrum charissimus est, (id quod meretur, uir sanè doctrina, pietate

& omni uirtutum genere singularis, quæ illius sunt tanquam mea, tibi etiam tanquam tua, pro amicitie iurè, ceu
communij quodam pendere, offero & communico. Hoc ut facerem, argumentum quoque me inuitabat, montium in-
quam descriptio, quos tu ut quotidie alutissimos, tecto tuo (ni fallor) imminentes prospicis: ita ipsorum admiratio, et
nascentium in eis rerum cognitio, iucunda tibi atque familiaris est. Hæc quidem frè sunt causæ, propter quas hunc li-
bellum in tuo nomine apparere uolui: & insuper alia maior, benignitas illa tua, qua me de facie ignotum iam aliquo-
ties tibi deuinxisti, misisti aliquot plantas montanis, radiibus ac seminibus: ut meos in uniuersa stirpium historia scri-
ptis picturisq; illustranda conatus, quos iam diu conor & uerso, omni ope tua iuuare, ac promoueres. Quod ut
porro etiam scire pergas, & me, ut capisti, ames, uehementer te oro et obsecro: ego uicissim nulla sinceri amici offi-
cia erga te prætermisso sciens. Vale Tiguri X. L. Cal. Ianuarij, instantis anni à salutifero partu. M. D. LXX.

STOCC—HORNII ET NESSI MONTIUM IN

ditione Bernensium Heluetiorum, & nascentium in eis stirpium

brevis Descriptio, per Benedictum Aretium

Bernensem.

EGREDIENTIBUS Bernam, ad Meridiem & ortum hybernium, primo con-
spectu montes occurrunt uasti, et in immensum alti, —Capita inter nubila con-
dunt. Hinc excurrunt ad Meridiem per Galliam ad mare Ligusticum: inde in
ortum per Pannoniam, Macedoniam, Thraciam, ad Pontum Euxinum extendun-
tur, rigore perpetuo niuium & inuicta glacie indurati, ita ut medijs etiam ardoris
bus æstiuis aciem contuentium candore suo hebetent. Ab his summis Alpibus
excurrunt in nostrum Bernatem agrum: montes humiliores, colles herbidi, & syl-
uæ opacæ, quibus ualles amœnissimæ continentur. Quemadmodum enim
in mari sinus ampliores & promontoria describuntur, ad quæ ex mari seruido tan-
quam ad loca tutiora nauis sese recipiunt: ita omnino montium anfractu ualles re-
conditæ efficiuntur. Paradisos Cyri dixeris, in quibus homines in summa rerum
affluentia uiuunt. Hyeme etiam, quod incredibile uidetur, cœli temperies mon-
tium undiq; obiectu mitior eis exiit.

Stocæ — hornij igitur iugum in iis montibus, qui Simeam uallem à Septentrione cingunt, altissimū est, ac quanquam montes quibus istud insidet omni propè ex parte peruii sint, tamen ipsum cornu à meridionali plaga tantū superari potest. A Septentrione, qua parte arduus surgit, Stocæ — hornius à pago *Stoccken* aditum habet difficilem, qui primū per sylvas densas ducit: inde per pascua *ambach* & *Scrißly* ad occasum euntibus cornu ipsum occurrit.

Ab occasu alius ascensus est non minus difficilis, arduus ac præceps, per *Blüß menslein*/ qui pagus ab urbe est quinque horarum itinere distans, ad radices montium proximè politus. Inde statim per aspera loca montis iter exiguum, sinuosum serpentis modo huc atq; istuc per montis flexum & reflexum sensim ad cacumina subducit, unde arbitror ab incolis nomen ei inditum esse vber die *Not*. Verū & istud iter ad Meridiem procurrit. A Meridie lato, & sensim subleuante sese dorso herbido ad præceps ipsum cornu producit, quod à Septentrione ita præceps est, ut ne feris quidem ullis, etiam rupicapris, peruium sit.

Loci admiranda est amœnitas: subiecti ab Arcto campi & prata, disiectæ quoq; uillarum domus infra uisuntur.

Verū ea est altitudo, ut uix talparum tumulos adæquare uideantur. A meridie duo lacus adjacent Stocæ — hornio: Prior occiduus circularis & admodū profundus est: aqua ipsa nigricat dira & Strygia facie. Nam à meridie tenues quidam scopuli sylua densa coniecti surgunt, ita ut linus in medio efficiatur quodammodo à natura sic comparatā fossā, ut undiq; ex montibus defluentes aque contineantur ad aquandum pecus, nulli enim perennes torrentes hosce lacus ingrediuntur, ut uerisimile sit, aut occultis fontium meatibus cōseruari has aquas, aut pluuia undiq; collecta in subiectam hanc fossam recipi, Et ut *Homerus* dicit:

ὣς δ' ὅτε χεῖμα ῥοῖ ποταμοὶ κατ' ὄρεσιν ῥέοντες

Ἐς μισγάγκαν συμβάλλεται ὁ μὲν ἱερὸν ὕδωρ

Κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίτης ἐκ τοῦδε χαράδρου.

Absorbetur autem hic occiduus lacus ad occasum æstiuum ingenti murmurē, unde perpetuas aquas etiam uenis latentibus habere necessum est.

Alter ad orientem magis spectat cordis figura: surgit enim petra in medio ferè lacus, quam aqua undique ambit, excepto Aquilonari latere, qua parte monti cohæret scopulus, ut ad amussim aqua circumfusa cor referat. Habet & is recessum occultum: absorbetur enim per cauernas montis ad meridiem, ut *Erlebachii* limpida sima effundatur eius aqua. Vtriusq; eadem aquarum facies dira & abominabilis: quod sit uel propter profunditatem: aut etiam quia immobilis aqua stat, ac montanis flatibus horridior efficitur. Non alunt pisces, nec aliud uiuens, præter lacertas aquaticas & salamandras. Item ranarum soboles magno capite, cauda longa, quatuor pedibus, quos Græci *gyrinos* uocant: ranæ tamen omnino nullæ istic comparent. Insident hæc bestiola ripam ad solem sese apricantes.

Herbarum etiam multiplex & elegans uarietas toto monte reperitur: quia tamē nihil peculiare habet, quod in *Nello* montenon occurrat, herbas hic commemorare differemus, donec transgressi uallem in *Nellum*, de ipso loquamur. In præsentia autem quædam de ualle *Simeæ* addemus propter tabulas alpinas in quibus loca quædam transposita sunt.

Vallis *Simeæ* à montano torrente nomē habet. Nominatur autem is *Simmei* inde uallis *Simmenthal*/ ita enim omnino erat pronuncian- Vallis Ste.
mea. dum: nec desunt ex incolis qui sic appellent: nostri tamē *M.* in *B.* conuerso *Sibenthal* uocant. Tractus uallis obliquus est, & lunam quam Græci *ἀμφικύρτου* uocant exprimit. Nam à summis montibus *Vallesianis* ab oriente progreditur, *von der Leuck*/ sensim occupat. Inde recurrit in orientem uersus lacum *Thunensem*, imam uallem irrigat fluuiolus *Simma*, qui oritur in remotissima ualle apud *Lenkios* supra pagum *am obrenriedt*: monticulus nominatur *der Karlsberg*. Emergit autem septenis fontibus intra lapidis iactum, ac statim collectus in unum alueum, nominatur *Simma*

maior, *die grössere Simmen*/ & ab incolis *Das landwasser* usq; ad Dissimium, qui pagus est elegans & populosus in media propè ualle: ita dictus propterea quòd infra ipsum duo torrentes Simmæ concurrant.

Itaq; maior Simma ab orientali latere Lenckiorum affluit, cui infra iam dictum pagum minor miscetur. Descendit autè hic minor ex meridionali latere quâ itur Sa nam uersus, *von der Desch sitten*. Ac uno alioque uterq; riuus hinc per imam uallem perpetuò defertur, aqua perennis & limpida est: æstiuus quidem ardoribus & Favonii pluuiis mirifice exundat. Vallem egressus miscetur Arulæ nostræ. Ea facies est, & is tractus uallis: unde facile patet non errare eos qui à fluuio habere nomen dicant, non autem à Septenario numero, nam Septem ex ordine in hoc tractu nominare ualles difficile esset. Fluuiolum autem à septenario dicitur certum est. Quandoquidem septenis fontibus scaturit. Deinde satis patet ad hanc uallem non spectare fluuium *Randel* (uel *Rander*) quo loco tabulæ alpinæ eum reposuerunt: sed fluuiolus *Randel* ex altera ualle Cinerea effluit, *Durch das Frutiger thal*/ ubi tabulæ nullum habent fluminis nomen, & Simmæ fluuii nomen prorsus ignorant.

Deinde *Erlenbach* non in Cinerea ualle est, sed in hac nostra, & quidem cis fluuium Simmam in radicibus montium septentrionalium.

Præterea Vuimmis non in medio uallis, sed in faucibus, qua fluuius Simma uallem egreditur, positum est. Est autem uilla cum castro imposito ad radices montis Nessi trans fluuium Simmam. Et ut apparet nomen habet à uentorum flatibus quasi dicas *Windmiz*/ nam ab occasu per uallem perpetuò spirant Zephyri, ab Aquilone Boreas, & à lacu orientales uenti, ac quia angustæ fauces sunt in ingressu uallis, perpetuò isthic cōstantur uenti acerrimè: inde nomen loco inditum est. Hæc de iis locis & ualle, quæ descendentes à iugo Stoc—hornii *Erlenbachium* elegantissimè ante oculos posita sunt, ac multis quidem locis descensus patet, mitiore nunc monte hac parte quàm sit à Septentrione, compendiosior tamen est descensus, quamquam et difficilior, *vber das Chunne*/ quo & nos usi sumus: ac ea quidem post *Erlenbachii* quæuimus.

Sequenti die Nessum conscendimus: supererat autem multum laboris tum etiam itineris: eius enim diei uespera apud Recortauillanos conuenturi ad cenam, prius S. Beati Solitudines eramus ingressuri. Cæterum satis itineris superesse uidebatur, uel per imam uallem, præsertim defessis: & hesterni diei laboribus exhaustis, montis tamen tam uicini celebritas & amœnitas mouebat animos ut putarem non esse negligendam occasionem uicinitatis. proinde summa aurora comite tantum puero, quò minus esset impedimenti & more, (quod fieri plerumq; solet cum plures sunt in *ὁδῷ*) ita ad meridiem demum ad summum cacumen euasimus, tantum ad casulam pastoritiam exiguum morati.

Ab *Erlenbachio* autem *χρηματισ* ille Simma transeundus est ponte, ubi magno sonitu per scopulos decurrit, inde prata ad imam syluam sensim perducunt. Mons ipse ad medium ferme densissimis uestitur consuetis arboribus, Piceastro, Fago, Acere duorum generum, nec alias conspexi. Inde egressis syluam læta occurrunt pascua. Nam usq; ad uerticem tonsus est, & ab omnibus arboribus nudus mons, propter eximiam ut arbitror altitudinem.

Qui proximè montem habitant nominant eum *Den Stallden*/ præsertim lætus occiduus quo ab *Erlenbachio* scanditur. Alii quibus remotius cognitus est *Den Tiesen*/ ab *Ellebori* alibi, cuius magna est in eo copia, nomine. Non desunt tamen, qui putent nominandū *den Jesen*/ & inde articulo cum nomine coalescente, pro *Jesen*/ *Tiesen* dici ceptum.

Est autem duplex eius nominis Mons, superior & inferior. Superior plus ad meridiem alto uertice surgit: inferior longè est amœnissimus eorum montium, qui ex *Vallesianis* summis decurrunt, extremum promontorium decurrit in æquabilem planiciem ad Lacum.

Hic montium tractus uallem Simmeam habet ab occasu, quæ semicirculū refert, ut supra ostendi.

Ab oriente den Adelboden/uallem satis ex nomine cognitam, quasi fundū Aquilæ, aut nobilem dicas, hæc uallis & ipsa recurua est, ut cum Simmea ualle circum exprimat, cuius diametrum refert hic montium tractus medius, utranq; dirimens. Sed non de toto eo tractu scribemus: operosius enim istud foret quam pro instituti ratione.

Nesius, procul contemplantibus triquater surgit, uel trigonus. unus angulus orientem spectat, alter nobis Bernæ obuertitur, tertius in occasum dirigit. Hi omnes summo uertice obtuso concurrunt. Cæterum qui eum ex alto contemplantur, facile animaduertunt quartū latus in meridie decurrere: lapidosum ac minus frugiferū.

Multis locis superari potest longis decurrentibus lateribus in subiectam planiciem, occiduū tamen latus leuem ascensum præbet, ualle quadam interiecta, intercisum. Vertex summus ferini Andreæ nomen habet, *Züm wilden Andres*/quo loco inter scopulos & saxa requiescere solent, qui animi gratia ascendunt, id testantur tituli, rythmi & proueria Saxi in scripta una cum imaginibus & nominibus authorum. Inter alia cuiusdam docti & montium amœnitate capti obseruare licebat illud *ὁ τῶν ὀρέων ἑπὶ τῆς ἀγῆς*.

Non puto autem facile reperiri montem amœnitate huic parem, tum propter conspectum, qui longè lateq; pater: tum ob herbarum uarietatem, quæ sanè multiplex eo monte habetur. Nam ad ferinum Andreæ in scopulo sedentibus ad triginta Parochiæ, hoc est, uillæ uel urbes quæ proprio parrocho & templo utuntur occurrunt. Adde his ueteres arces complures, prædîa & lacus, præterea flumina, quarum rerum omnium uno intuitu conspectus est longè amœnissimus. Ego ipse ex eo loco numeravi expressè ut ne loco quidem pedem mouerem: Primum Oberwil/ secundo *Züm Closter*/iii. *Erlenbach*/iii. *Diempringen*/v. *Wimmis*/vj. *Röthigen*/vij. *Zeinigen*/viij. *Spiez*/ix. *Aeschi*/x. *Richenbach*/xi. *Frutigen*/xii. *Adelboden*/xiii. *Vndersewen*/xiiii. *Lätsigen*/xv. *Sigriswil*/xvi. *Hiltcrisingen*/xvii. *Thun*/xviii. *Stäffisburg*/xix. *Wichdoiff*/xx. *Kysen*/xxi. *Hoffstättchen*/xxii. *Anseltingen*/xxiii. *Turnen*/xxiiii. *Rügisperg*/xxv. *Münsigen*/xxvi. *Thierachen*/xxvii. *Seffingen*/xxviii. *Rüschdoiff*/xxix. *Gersensee*/xxx. *Hinderlappen*/xxxi. *Bern*. Ea loca omnia sereno celo facillimum est numerare. Ex his ciuitates sunt Berna, *Spiez*/ *Vndersewen*/ *Thun*. Valles præterea per circuitum plures amœnissimæ se aperiunt, & quasi ex alto uisui patent. Primum post Simmeam uallē à latere orientali proximè occurrit uallis *der Adelboden*/ Deinde magis uersus ortum *das Frutiger thal*. Hinc *das Kerithal*/ Inde *Cinerea uallis Aeschi*/ Inde *Luterbunnen*. Ac post hæc *Grindelwaldt*. Demum *Nasly*. Flumina etiam decurrunt plura, primum *Arula*, extractu ultimo *Nasly*. Deinde *Rander* ex ualle *Frutigen*, demum *Simma* ex sui nominis ualle, quæ cum *Randel* fluuio uno alueo recipitur, *Züm Kapff*, à quo loco breui tractu fluit donec *Arula* misceatur super pagum *Thieracher*. Lacus itidē spectantur *Bienzer see*/ *Thuner see*/ *Moretanus lacus*, & *Neocomensis*. Hæcerum uarietas incredibiliter spectantium oculos reficit, etenim res usque adeo naturæ discrepantes uno contuitu quasi in tabula profert, idq; uel sedentibus. Verum de his forsitan plus satis nec montis propria. Nūc igitur quid mons *Herbarū* habeat inspicimus.

Elleborus albus à quo mons nomen habet copiosus in eo est, *Germere* nō minant. Est & alia species *Ellebori albi* illic, & ut arbitror notha: superior per omnia respondens, nisi quod foliis minoribus sit prædita, acutè *Plantagini* similibus: & quod flores lutei caulem circumdant, singuli propriis infidentes pediculis autē instar.

Gentiana, triplex: Maior, uulgata. Minor itidem omnibus nota, ignitis floribus, tintinabuli instar. Et tertia huic similis luteis floribus, per omnia minori respondens,

Ff iij

*Alisma for
tè hæc est,
aut cognata*

tantum colore florum differens. His quarta accedit minima **Bitterwurgen**, Prioris duæ species mediæ erunt.

Anemone alpina, **Rüchschell**, flores sunt cœrulei, quibus cædentibus canities & lanugo prolixior subsequitur. Primo uerhi flores statim emergunt niuib; disfluentibus: pallidior tamen flos est & maior quam quæ eodem nomine ex Gallia adfertur. Nonnulli uocant **Des wilden mans kraut**.

Bigwurz, duorum est generum: prior cœruleus habet flores Campanulæ figura, totis Aclepiadem refert, caulis rubescit. Radix ei subest bifida, lutea, satis longa, amara, semen compressum, & hæc uideri potest Gentianæ species. In aliis locis nominatur **Schelmekraut**, utuntur ea pastores ad ubera uaccarum, si a muribus araneis aut aliis bestiolis uenenatis lædantur. Altera species **Bigwurz** radice nigra est, flore albo, quo cadente calix lanugine & canitie horrescit. Folium Ranunculi modo diuisum est, pilosum, albicans. Hæc species Ranunculus aliquis montanus aut Anemones species erit.

Aster Atticus qualem Fuchsius depingit, flore puniceo.

Sedum montanum maius, folio serrato, oblongo caule, erecto, gracili: floribus albis. Sedi minimi uariæ species reperiuntur, Luteum Igneum, Maculatum.

Wülblimen, flos odoratus est, folio Pilosellæ, circa supernum cauliculum folia multa imparia, candicantia, lanuginosa. medio orbe quinque uel sex flores: inter quos medius plerumq; aridus. ex singulis lutei apices emicant, radix arida, parua, summo cespite hærens. Fomenti speciem arbitror.


Satyræ species multæ: inter omnes una præstantissima & odorata præ cæteris, **Bändlin**.

Himmelsengel, pusilla herbula est: flores habet cœruleos, radículas amaras, ut Gentiana minima.

Kelberschis palmum altitudine æquat: flores cœrulei sunt, pallidiores tamen quam in superiori. uno caule plurimos fert flores, denos interdum, eoq; plures: herba tota amara est, superiori congener.

Bistorta minima, in medio caule uno foliolo.

Jegerkraut, herba caustica, flore albo, pusilla. Ranunculus montanus.

Balmenstritten, frutex est , nec enim florere, nec fructum ferre dicitur, inter saxa serpit, semper uirescens: etiam hyeme folia retinet, ramos intortos, fractu contumaces, folio Buxi.

Mutrina, huius radix minima digiti crassitiem quandoq; æquat, ut plurimum tamen minor. umbellam gerit, qualis est in Pimpinella rubescente, hac caecos nonnullos, præcipuè recocta, condiunt.

Welschwurgen, specie triplex, luteum, cœruleum, qualia sunt Aconita apud Bockium, sed tertium quoq; reperi purpureum, inuentu rarum.

Glüblimen, uariis coloribus: flore luteo, pallido, purpurascente, rubescente sanguinis modo, cinereo, nec desunt qui atro colore reperiri dicant, priores colores omnes uidi. Cum his emergitalia species Arthriticæ, quæ plurimos flores ex una radice profert, quemlibet autem suo proprio pediculo.

Basthartlee, quasi adulterinum trifolium dicas.

Schaffsuppen septenis constat ut plurimum foliis, uno pediculo. Heptaphytum dici potest montanum.

Groß Eberwurz, cubitum interdū ferè æquat caulis horridus. & ex uno sinu prædeunt infinita capita.

Walde glislin, auriculæ mutis (uulgò dictæ) puto speciem esse. Florem globosum, purpureum fert.

Witterwurz, flores habet luteos, grandes, Doronico similes. Folia Plantaginem amulantur. Radices subdulces, longæ ut in Plantagine.

Groß

Groß Spicant/Polypodio similis, *Lonchitis altera*.

Nirzwurz weiß vnd schwarz. Et sub eodem nomine alia herbula pusilla, folio *Chamedry* referens, flos ei albus est, qui euanescit in lanuginem, supernè folium uiret, subtus autem albicat, *Chamedrys alpina*.

Dönsj & Drolblumen/flores lutei sunt, tintinabuli modo rotundi. *Ranunculus montanus*, causticus si benè memini.

Gemschenwurz/radicem habet dulcem, nodosam: folium rotundum, flores luteos quales sunt in *Doronico do mestico*. *Doronicum Germanicum*.

Sigwurz/Albium redolet, *Sibenhemleren* & *Nünhemleren*/ab inuolucris quibus tanquam reticulo inuoluitur radix. *Victoralis* longa.

Gäle violen/per omnia *Violę martiæ* respondet, solo colore luteo ab ea differt; *Viola lutea*.

Bergrosen/alibi **Bärenblüß**/nonnullis **Hänerlaub**: frutex folio *Oleę*: floribus odoris, purpureis.

Keyserlin/herba pusilla, albicans bellidis minimę forma, oblongioribus foliis: Cauliculus tenuis, in summo plurimos confertos flores purpureos habet, tota herba candicat, & attrita manu puluerem exuit, aspectu elegans, *Cęsar* inter herbas aus regulus.

Auckenballen/cubitum fere æquat, folio *Plantaginis* aut *Ellebori* albi terna aut quaterna per caulem folia habet, ex quibus erumpit ut in perforata, in summo unus flos, raro duos luteus est, oblongus, luteum oui exprimens, concavus: quem ambiunt apices, seu folia potius, ignita, rutilantia morionum habitus procul contuentibus refert, aut *Dæmonum* laruas. cadente flore semen in spica (siliqua) continetur. *Damasonii* aliqua species. **Aliqui Lonchitin primam faciunt.*

Christoffels kraut/aliis **Wolffswurzen**/fructus racematim uuarum modo coheret, flores albi sunt, folium incisum, radix nigra. *Aconitum* racemosum, uel *Christophoriana*. **Nullum quidem ei uenenum inesse arbitror.*

Guldin kraut/herba gracilis folio *Hysopi*, subtus albescente, *Polium* uidetur montanum, aut eius species.

Bergmünz/Calamintha montana, & (ut arbitror) uera. Nam quę ex semine *Mompeliensi* mihi prouenit, ab hac nihil differt.

Waldschiben/herba tota folio & floribus *Saxifragam* albam exprimit, radice tantum ab ea differt, quę in hac nigra est & pilosa.

Glübirlin/arbutum est primo uere floret, folio *Piri* per orbem tenuiter inciso, fructus nigros fert, plures confertim, paruos, quale est *Sorbum torminale*. *Piraster*.

Garlobsstuden/folio *Buxi*, parum à rosa montana frutice (hoc est *Bergrosen*) differens.

Edelstfel/carduus, inter carduos speciosiss. folia habet mollia, ab una radice, per caulem rara, quę referunt folia herbę, quam **Mosblumen** nominamus: altitudine cubiti in altum assurgit caulis. Capita in summo sunt singula, interdum bina, cęrulea, quandoq; alba, interdum purpurea, color collucet mixtus uiridi, tum in capitibus, tum in supremis foliolis. Mollis est tota, & etiam spinis, quas æmularur, nam non pungit. Radix nigra subest, longa & bifida. Antehac mihi nunquam uisa herba. *Eryngium alpinum.*

Hütreiß/Crocī syluestris seu montani species est. flores quidam cęrulei, alii candidi, nonnulli utroq; mixti, tenuis radix, bulbacea, sub dulcis, grata suisbus, rubescente lana inuoluta. Herbaceum capillamentum quod foliorum loco habet, in lura monte præsertim supremo iugo *Gestlero Leisrat* nominatur.

Wilder senff/herba eius nominis duarum specierum reperitur. Prior uno pediculo septena habet folia, supremo caule multi flores purpurei, & partim albi post quos

cornicula subnascuntur semen continentia minutum, compressum. radix subest alba, alabastrum modo splendens, squamea. Altera quinque folia habet uno pediculo, alias superiori non dissimilis, tota substantia utriusque acris est, Sinapi æmulans, aut Raphanum. Ad cubiti altitudinem crescunt; umbrosa loca amant, & latices. primo uere statim emergunt.

* Aliqui Pulmonariam hanc uocant.

Hæc in eo monte quantum temporis ratio permittebat obseruavi. Non deerant alia multa, sed partim notiora quam ut huc referri debeant; partim uero ita ignota, ut ne pastoribus quidem nomina constarent. Quod si oculos diligentius omnia in iis scrutarentur, dubium non est, quin hisce multo plura reperiri possent. Habet inter cæteras quoque Sambucum montanā uua rubescens, Benedictam montanam odoratissimam, &c.

FINIS.

GALANDÆ MONTIS LONGE ALTISSIMI, QUI DITIONIS EST

Rhetorum inter Helueticos, Stipitum enumeratio, ex literis clarissimi & doctissimi

uiri Ioannis Fabricij, Ecclesiæ ministri Curie ad Conradum Gesnerum,

datus Curia anno M. D. LIX. Iunij die 26.

SUPERIORIBUS diebus montem Galandam nomine conscendimus: in comitatu fuerunt Belinus medicus, & Pontifella Ludi literarii rector, uiri doctrina & morum suauitate eximii: & alii quidam, &c. Non sine summa difficultate ad uerticem montis peruenimus. Utinam Gesnere uel unam aut alteram horam nobiscum fuisset: id certe optauimus omnes. Nihil hoc monte est herbarum feracius.

In medio montis nascebantur hæc ferè.

1. Gentianæ genera diuersa: ea præcipuè quam rubram cognominant,
2. Ranunculus quidam cubitalis, foliis quibus flos Trollius uulgò apud uos dictus, cui etiam cognatus uidetur: floribus albis, mediocriter odoratis, Sed & flos ille Trollius ualde est in locis illis odoratus.
3. Ranunculus quidam paruus, flore albo. Jägertraut.
4. *Mütterwurze*: à quibusdam dicta: ueluti Plantago quædam alpina: foliis Plantaginis, leniter hirsutis: flore Doronici, radice aromatica.
5. Lunaria illa nobilis, quam olim ad te misit Belinus, in pratis illic exilit.
6. Lunaria Græca, quam quidam *Flitterer* appellant, floribus admodum odoratis, ad latus montis in præcipitio (nostri *ris* uocant) quodam.
7. Centaurium maius, Rhaponticum uulgò dictum, non procul à iam dicto loco.
8. Phylliris tam copiosa, ut uel plaustro onerando satis esset.
9. Sanicula alpina guttata, ubique obuia.
10. Viola alpina quædam, nunc primùm florens.
11. Aconitum luteum & cæruleum.
12. Elleborus albus.
13. Lilium purpureum radice lutea: quo pro *Asphodelo* quidam abutuntur.
14. Conyzis, ut uidetur, cognata herba procera, flore Doronici ferè.
15. Medicæ species, ut quidam putant, eadem, ni fallor, uel cognata illi, de qua Dodo næus Iconum Tomo ii. pag. xxxii. Anonymus est (inquit) nec ad cuiusmodi genus referri debeat, certò statui potest uidetur nonnullis esse *Glaux*, aliis *Onobrychis*. feritur in hortis ab herbariæ rei studiosis.
16. Sedi genera quinque, à uulgaribus diuersa.
17. Christophoriana, quæ quò in loco nascitur editiore, tantò est exilior & pressior: ut & reliquæ pleræque omnes herbæ.
18. Caryophyllata montana: & aliæ quædam.

In summo uertice montis.

19. Doronicum: & fruticum genera uaria nobis incognita. Hæc ego obiter tibi Gesnere uolui consignare. Sed quot tu putas conspectum nostrum effugisse, qui inter undum in hæc incidimus?

FINIS.

HORTI GERMANIAE,

authore Conrado Gesnero.

LIBER NVNC PRIMVM EDITVS, IN QVO STIRPIVM QVAS
diligentissimi quique rei herbariae per Germaniam studiosi suis in hortis educant, tum
nomina literarum ordine percensentur, tum natales plerumque, duratio, & ad cultum
aliquid, aut alia quaedam explicantur.

Ad Lectorem.

Mensibus hybernis poteris decerpere flores,
Fructusq; hinc uarios, Lector amice, Vale.

CLARISSIMO VIRO STEPHANO LAVRAEO

Amorfortio medico Casareo, doctrina & experientia
summo, Conr. Gesnerus medicus. S. D.



IS MENSIBVS HYBERNIS, CLARISSIME LAVRAEE, DE
lecia ruris & horiorum natura negante, ut aliquid genio meo indulgerem, non sine
aliqua spe oblectationis, etiam & utilitatis ab harum rerum studiosis qui legere hae
uoluerint, percipiendae: omnes quas meminisse poteram habere me in hortulo meo,
aut olim habuisse stirpes, aut quae in amicorum hortis provenirent, (quorum aliqui
propter missos ad me catalogos à principio libri à me nominantur,) uno volumine
iuxta literarum ordinem complexus sum. Non tamen solum nomenclaturas posui num-
das, ut ab illis acceperam: sed plerumque aliquid, quod uel ad nomina rite imponen-
da, uel natale: cultumue saceret, adiunxi: ut qui hortum instruire cogitaret, non qui-
dem uulgarem, sed omni stirpium genere ornatum, exemplum hic & inquirendi oca-

casione haberet: ac olim, quoniam in Germania stirpes nostro seculo cognite in hortis plantatae fuissent, quaeque
durare in eis possint & quantum, intelligeret posteritas: denique Galli & Itali Germanorum in tam frigido caelo sum-
mum in his colendis, proueniuntque, & nominum ex antiquitate repetitorum cognitionem, admirarentur. Huic
librum quamquam imperfectum (nam specierum infimarum numerus propemodum infinitus mihi uidetur) argu-
menti tamen hactenus ab alio nemine inchoati, praestantiae tuae nuncupandum destinaui: primum ut amicitiam mu-
tuam feliciter superiorem annis Augustae Vindelicorum, cum ad mensam illustis uiri Ioan. Iacobi Fuggeri conue-
nissemus, inceptam, hoc ceu uinculo inter nos obstringerem: deinde ut in hoc argumento, circa uetera praecipue stir-
pium nomina imponenda, tam difficili & periculoso, ac multorum hodie animaduersionibus, censuris, controuer-
sijs, emulationi, certaminibus, & calumnijs etiam exposito, patronum mihi deligerem, qui his de rebus & recte iudic-
are posset: & ueras aut uerisimiles opiniones meas sincere contra ambitiosos quosdam defendere, in ijs uero ubi
errarem candidè & amice monere dignaretur. Accipe igitur uir praestantissime hoc meae erga te beneuolentiae obser-
uantiaeque (ut uirtus & doctrina tua meretur: ac propter multa maximaque quibus me obligasti beneficia, gratitudi-
nis ratio postulat) pignus & monumentum, quantumuis exiguum: idque tam hilari animo, quam ego & liberrimè
offero, & longè maiora me debere libentissimè agnosco. eo enim in te amore & ueneratione ducor, ut si beneficijs
aequare te, nedum uincere, conarer, amplitudini tuae iniuriam aliquam fieri putarem. Quòd si etiam in Caesareis
hortis, aut aliorum principum, quibuscum subinde uersaris uiuorum, quaequam in hoc libro nostro uel praeteritum,
uel melius exprimendum, tibi occurrerit, circa stirpes inprimis raras & peregrinas, quas homines priuati non facillè
habere possunt, eius ut me certiorem facias iterum atque iterum peto. Noui clementissimum Caesarem Ferdinandum,
in cuius conspectu quotidie uersaris, harum quoque rerum, ut reliquarum naturalium omnium cognitione tum oble-
tari, tum eruditissimos quoque de rerum naturis disserendo excellere: nec dubito in hortis maiestatis eius, rara quae-
dam & peregrina naturae spectacula uisi: & eiusdem doctrinae exemplo incitatos procures ac magnificos uiros in
hortis etiam exornandis magnificentiam praeseferre. Itaque si celebriorum quorundam in Austria aut uicinis regio-
nibus hortorum rariore aliquas stirpes mihi nominaris, hoc est, alicui studioso harum rerum iuueni ut id perficiat im-
posueris, de praesentio tuo in me amore nihil dum remississe te intelligam. Vale Tiguri. Ianuarij die XXV. Anno
Domini M. D. LX.

1. DE HVIVS LIBRI RATIONE.

2. De hortis in uniuersum, eorumq; laudibus.

3. Singuli quidam hortorum cultores præstantiores nominantur.

4. Regule quædam ferendi, colendiq; hortos.

QVAM occasione & ratione ad hunc librum describendum accesserim, in epistola nuncupatoria satis explicui: hic pauca adiciam. Nominis igitur hoc in libro plantas hortenses propriè dictas seu sativas, & Germanis quidè notas in primis. Deinde & peregrinas per multas, quæ uel olim, uel nostra memoria, ut pleræq; in hortis feri cœperunt, tertio syluestrium etiam quænam in hortis uiuere, quomodo & quandiu possint, quæ non, singillatim expono. Non tamen de singulis istis tribus generibus seorsim agere, sed omnia in unum literarum ordinem redigere uolui, ut quæque inuentu quàm facillima essent. Denique cultus ratio aliqua in plenisque exprimitur, quo modo scilicet feri colue debeant, quo tempore & loco: & hyeme quænam ex eis reponi intra domos, aut in horto saltem contra frigoris iniuriam muniri. Hæc omnia persequi in institutum quidem mihi fuit: sed quàm exiguam propositi mei partem sim consecutus facile animaduerto. Omnia cerè complecti infinitum & supra humanam conditionem est: & uoluit fortè Deus Opt. Max. dum rerum naturalium in tantillo mundi centro species nobis innumeras proponit, per hanc ueluti infinitam naturæ uim, qualis quantusque ipse sit, omnis naturæ elementaris atque cœlestis dominus insinuare. Putabam ego iuuenis adhuc, per paucas tempore aliquot regionibus, & permultis quæ in meis & amicorum hortis satæ excreuerunt cognitis plantis, & maximo ab amicis numero rariorum misso, & perfectis omnium quos habere potui ad hoc tempus huius argumenti libris, Græcè, Latine, Italicè, Gallicè, Germanicè, Anglicè, Hispanicèque editis, ea quæ noui per exiguam sane partem ignotorum mihi esse uideo. Itaque libenter cedo naturæ: quæ, ut uideo, æqualem sibi creanti in cognoscendo uim, ne nominibus quidem tenuis aut numero admittit in illis quorum ipsa parens est. Sed hæc contemplati non est hominis *πρὸς φύσιν καὶ ὕλην ἀχολουμένον*. Potuisssem tamen multò plures enumerare stirpes in hoc libro: imò non discessissem. quoniam omnes aut aluntur in hortis, aut ali possunt: aut si non possint, id quoque breuissime indicare liquisset, tum ueluti condimentis, tum admonendi gratia ne quis frustra in accersendis quibusdam aut plantandis laboraret: tum obiter nomina quorundam explicandi gratia: neque enim ita multa desunt, quò minus stirpium ferè omnium nomenclatio hic contineatur. Sed aliis rebus occupatus, satis existimaui in præsentia librum hunc inchoare: quem aliquando diligentiores perficiant. Id autem feci partim lubens, & ut gratificarer harum rerum studiosis: ac eorum qui hortorum suorum catalogos ad me miserunt, nomina celebrarem ut par est. commune enim quoddam hoc bonum est, in patriam stirpes peregrinas inuhere. partim in gratiam Typographi, qui Cordi operibus ante annos ferè xviii. scriptis aliquid recentius accedere cupiebat: & mihi quoque iucundissimum erat hac saltem ratione Cordo meo, quoniam aliter fata non permisere coniungi. Neque uerò est quòd hanc aliquis absolute tanquam curiosam & inutilem cognitionem damnet. talis enim est illis qui diuersum propositum sequuntur: & quanquam medici omnium maxime diligentissimæque hanc naturæ partem excolant, non tamen eis necessarium est tam multa nouisse, cùm intra pauca, certa meliorâque remedia tutius se contineant. At Philosophus physicus nullis huiusmodi terminis coercetur, neque utilitatem aut lucrum quærit: nec ulla in eo rerum naturæ etiam minutissimæ

minutissimarum cognitio curiosa existimari debet, Huius ego hortum liberalis & multiscii uiri, instruere proposui: non olitoris, non Adonidis aut Epicuri, non medici aut pharmacopolæ. Hortenses quidem, urbanæ aut sativæ plantæ propriæ sunt & dicuntur, quæ cibi condimentive causa in hortis à plerisque feri & educari solent: deinde quæ propter uoluptatem aliquam coluntur, ut quæ uel odore delectant, uel colore, aliæque specie oculos iuuant, sicut pleræque coronarii generis: tertio quæ ad medicinam faciunt, quæ omnia tum magis propriè hortensia dicuntur, si syluestria & suæ spontis uel omnino non reperiuntur, quod nobis constet: uel non in nostris regionibus: uel reperiuntur quidem, sed specie diuersa. Magno certè liber hic utcunque imperfectus, nec adeò magnus, labore mihi constitit. Multitudine & uarietate rerum obrutus, quàm plurima aliis post me dicenda reliqui. Hominem unum nomenclaturas tam multas proferre, & proueniendi modum in tam multis obseruasse, multum est, nimium quidem ad alià utiliora & grauiora festinanti. Itaque ut os Momis & blateronibus ineptis obstruam, nō quòd multa omiserim, quòd non accuratius quædam obseruarem, neque diutius librum hunc premere & expolire uoluërim, ueniam ab illis petam, quibus hac in re nihil debeo: sed potius doctiores uiros & maioris iudicii, quòd tam prolixè, ne dicam ambitiosè, in hoc argumento uersatus sim, ut ignoscant, rogabo, trahit sua quenque uoluptas: cui nimium quis non indulget? Prolixitatem hanc tamen excusat ordo, sicut & in plerisque scriptis nostris, ita institutus, ut quod quis nosse uelit, statim inueniat, cæteris omissis. Breuitatis certè studio multa simpliciter protuli, nec inquisiui in opiniones quorundam quæ mihi parum probantur: facturus id aliàs in maiori uolumine, quod de Stirpium historia, si Deus uitam & reliquas commoditates largiatur, aliquando edam. Interim hoc ceu progymnasmatè præcludere, atque hoc specimine aliarum etiam gentium homines eruditos ad suarum regionum hortos describendos excitare uolui.

Quoniam uerò quot homines tot sententiæ, & aliquibus fortè hæc minime prolixa, sed breuiora quam uellent uidebuntur, cum aliàs, tum circa colendi rationem, qua præcipuè accurata in nostris regionibus frigidis opus est, ut stirpes peregrinæ & callidioribus locis allatæ conferuentur: illos ad aliorum hæc de re libros, aut librorum partes, ueterum atque recentiorum remiserim. Theophrastus in suis libris De stirpibus, præcipue quidem etiologicis, plurima huius argumenti diligentissime docuit: ex quo permulta transtulit Plinius. Multa apud rei rusticæ scriptores eiusmodi leguntur, Columellam, Palladium, Varronem, Catonem, & illum qui Geoponica græca composuit. Ex recentioribus Petrus Crescentienis pleræque ex ueteribus repetiit, & insuper suarum obseruationum non pauca ad cultum, plantationem, & curam omnem arboribus aliisque plantis accommodandam pertinentia adiecit: Aristotelis de stirpibus extant quidem libri duo, sed corruptissimi, ut nihil fere utilitatis inde rei hortensis studiosi homines referant: non nihil uerò è doctissimis Scalligeri in eos libros commentationibus. Problematum quidem Aristotelis sectione xxxvi. leguntur quædam ad hanc rem non inutilia. Circumfertur & Caroli Stephani typographi regii Lutetiæ eruditissimus liber, hoc titulo: Prædium rusticum: in quo cuiusuis soli uel culti, uel inculti plantarum uocabula ac descriptiones, earumque conferendarum atque excolendarum instrumenta suo ordine describuntur. Eius partes sunt octo: Hortus, Seminarium, Vinetum, Ager, Pratum, Lacus, Arundinetum, Sylua, Frutetum, Collis. Liber est sane utilissimus ad rerum simul ac uerborum huius argumenti cognitionem, magna parte ex Ioan. Ruellii Commentariis desumptus. Bartholomæus Maranta Venusinus medicus certè elegantissimus methodi cognoscendorum Simplicium med. libros tres nuper edidit, ex quibus secundi libri cap. xi. totum satis copiose de cultu stirpium pertractat. Vidimus et Gallicum librum Petri Bellonii totius naturæ scientissimi uiri, quem de colendis arboribus syluestribus edidit, Hieronymus Cardanus summus philosophus, Operis de uarietate rerum lib. vi. cap. xxiii. de plantarum cura inscripsit, &c. Ex his & aliis fortè olim aliquis Rei hortensis uolumen perfectum nobis concin-

De rehortensia scriptores.

Natales stir-
pium.

nabit: mihi interim si principii ratione quantulumcunque culturae stirpium studiosi homines debere se fateantur, Germani praesertim mei, quibus haec praecipue scripsi, (utinam uero etiam alius prosint,) satis magnam laboris mei mercedem retulisse mihi uidebor. Alius quidem nostro seculo re hortensem nemo ex professo descripsit: Carolus Stephanus excipio, qui tamen nomina et descriptiones stirpium magis, quam cultum earum docuit. Ego plerumque aliquid ad cultum utile in singulis addidi: & si nihil aliud, saltem natale solum cuiusque syluestrium peculiare indicavi ut plurimum, ut in hortis plantaturi locum singulis commodiorem eligant. Interim animaduertendum natalis locos plantis non semper eosdem, sed ut plurimum conuenire: in quibus uidelicet plures ac lactiores eiusdem generis plantae prouenire solent. quod si in diuersis aliquando reperiantur, cogitandum est uel coeli, uel aliam esse causam: rapiuntur enim saepe a uentis semina, & ab aquis deferuntur. Loca olim humida & rigua, paulatim, aut etiam breui exsiccantur, in quibus forte stirpes humidis locis proprie remanent: et quae nasci in aquis solent, possunt plerumque etiam in umbrosis. Quaedam tam ualida constant natura, ut ubique fere uiuere queant. nam & extra terram sunt quae aliquandiu uiuant ut in Bulbaceo genere, et Seda, & Anacampseros, et Aloë. Multae quidem in nostra regione hortenses tantum stirpes sunt, alibi syluestres & suae spontis. & aliquae nobis montanae: quae alibi, ad septentrionem praesertim, fallente sensim terrarum altitudine, in planicie nascuntur. Haec de stirpium natalibus dixerim: in quibus etsi in uniuersa fere natura, quod ad ortum ac generationem rerum imprimis, nihil necessarium, nihil perpetuum est, nos tamen iis quae frequentius, & ut plurimum eueniunt, ac quiescere par est. Quantum ad G. nominis mei notam, sunt quae non in meis quidem hortis (quos hoc tempore duos colo) sed amicorum uiuant stirpes, quas illic demonstrare possum. Quaedam alias in hortulo habui, nunc careo, inter tot occupationes & tanta soli angustia, praeventu & naturam quorundam semel aut aliquoties obseruasse contentus, ut locus ac tempus etiam aliis suppetere. Herbae ex editis montium atque alpium in hortos translatae, quaedam forte ne apprehendunt quidem: aut caules, flores ac semina non fundunt in hortis nostris, ego Gentianam, Elaeborum album. & alia quaedam multis annis in orto habui, quae nunquam caules ediderunt. quaedam perfecerunt quidem semina, sed annis aliquot interiectis. ex motibus etiam ipsis semina habere nobis difficile est: quoniam eo tempore quo sperare maturitatem eorum poteramus, niues plerumque iam ingruerunt, & incolis (qui per paucos, lactarii & rudes quidam homines sunt) sub id tempus ad ualles se recipientibus destituntur. Haec ideo scribo, ut si qui uel hac transseantes, non omnia quae scripsi apud me reperiant, aut semina in alias regiones ad se mitti petentes frustrantur, quod non raro contingit, non mirentur. Nominaui etiam aliqua, in alienis praecipue hortis, quae forte prima tantum a satu aestate apparuerunt, non duratura per hyemem: aut non nisi summa diligentia ad aliquod tempus conseruanda.

NOMINA QUORUNDAM REI HORTENSIS STUDIOSORVM

hominum, in Germania primum, deinde Gallia, Italiaque, &c.

Et primum de differentiis horticorum in genere.

Horti utiles.

Medicinales.

Varij.

Elegantes.

HORTORVM alij uulgares sunt, utilitatis tantum gratia consiti: in quibus olera, legumina, uites, fructus qui edendo sint, & gramen, usum homini aut pecori praebent. Alii medicinales, ut Medicorum & Pharmacopolarum: in quibus non hortenses tantum stirpes, sed etiam syluestres omnis generis, & peregrinae quoque coluntur, propter remedia quae ex ipsis earumue partibus homini fiunt. Alii similes istis, sed magis uarij, in quibus non solum plantae remedijs nobiles, sed aliae etiam quae uis rariores praesertim coluntur, propter admirationem & contemplationem naturae. In alijs nulla utilitas ad cibum aut remedia, neque naturae uis spectatur, sed ornatus tantum & elegantia: quales sunt matronarum & opulentiorum hominum, praecipue quidem monachorum: qui floribus diuersis conseruntur,

runtur, aliisq; herbis & fruticibus, quorum aliqua in ipsa forma, aut colore odore u. gratia est, aut adserta & coronas usus: & pergulis, scenis attingitur, aut labyrinthis apti frutices & arbuta ad inumbrandum, & quaecumq; anno toto uireant, nec frondes amittant; ac omne copiarium genus quod ita necessitatis potest, ut certam aliquam figuram præ se ferat: & herbae fruticesq; consiles propter eandem causam, ut Buxi, Myrthi, Hyssopi, & alia. & arbores quarum pulchriores sunt fructus: aut quarum folia latiores, ut Platani, Tiliae: aut aptae, ut earum brachia quae uersus distendantur, sicut in Quercu, Tilia & Malo diximus. Alii denique magnificentia spectabiles sunt, ut quorundam diuitiis affluentium, & principum uirorum, aut rerum publicarum: quorum & aedificia magnifica sunt, & a quarum spectacula iucunda in stagnis ac fontibus: & colles forte in eis excitati, & nemora adiuncta, & exercitiorum areae: & arbores quaedam peregrinae, achuiusmodi quae magno sumptu indigent. Simples hae differentiae sunt: quarum duae interdum aut plures coniunguntur. Ex his quas dixi differentiis, (uulgaribus tantum exceptis,) paucos aliquot mihi cognitos, celebriores tantum commemorabo. Quod si copiosos aut nobiles aliquos praeteriero, excusabit me ignorantia, optarim enim quam plurimos nominari à me posse. Quoniam autem genere, ut indicatum est, differunt, comparari inuicem rectè non possunt: & in suo quicq; genere excellere. quoniam nemo mirabitur, quod non magnificos tantum, & elegantiores, sed priuatos etiam angustosque quorundam hortulos hic praedico. Magnificentia arte & hominum opere constat: cui nos uim & uarietatem naturae antepone non dubitamus. potest illa etiam extra hortos ostentari, sicut & elegantia: at hortorum uis ab eo praecipue est, unde & appellantur, si multa uariaq; in eis oriuntur & terra eduntur. Dicam igitur primum de hortis Germaniae quae circa Rhenum est, à capite eius exorsus: deinde illius quae longius abest Septentrionem uersus.

RHENI fontes duo paulò supra Curiam Rhaetorum sunt utrinq;. Curia oppidum celebre alpibus proximum est, ubi si quis hortum institueret, stirpium genera quam plurima commodè haberet, cum aliarum, tum alpinarum & trans alpes nascentium in uallibus Rhaetici foederis, & ex Italia uicina. Est illic Ioannes Fabricius Montanus, ecclesiae pastor, uir, omni literarum genere doctissimus, sicut & Ioannes Pontifella Ludi magister pereruditus, ac medici praestantissimi Hieronymus Brixius & Zacharias Belinus: omnes rei herbariae non uulgariter periti, quos honoris gratia nominare huiusmodi, inuitante Rheno principio, & simul eorum in me beneficentia, Fabricii mei in primis, qui per multas ad me stirpes ac semina quot annis mittere solet ut hortulum meum locupletet.

Infra Rhaetiam Rhenus in lacum Brigantium diffunditur ad sinistram eius latus cum impetu se immittens: è regione dextro latere Lindauia amoenissimum oppidum in peninsula situm est: cuius ciuis Matthiae Curtii mercatoris, hortum egregium stirpibus rarioribus non paucis consitum olim spectavi. Aiunt & fratrem eius uirum nobilem non procul Lindauia habitare, & arborum praecipue genera quamplurima colere. Ad lacum illum maximum oppidum est Constantia, in quo horti aliquot elegantes & ampli non desunt: in quibus tamen hoc tempore nihil rari aut peregrini esse audio.

E Brigantino lacu & altero minore infra Constantiam (Veneto, ut ueteres uocant: nostri à Cella oppido) postquam emerit Rhenus, minora quaedam oppidula cum alia praeterlabitur, tum Eglisouiam Tigurinorum ditionis: à qua Tigurum patria mea quatuor horarum ferè itinere distat. Fuit autem hortorum apud nos hactenus uulgaris tantum cura. Primus ego peregrina semina inuexi, & syluestres montanasq; stirpes alere coepi. Est & Pétri Figuli Chirurgi ac lithotomi egregii, hortus uarietate stirpium commendabilis: & apud Iacobum Funccium prætorem, optimum Citri ac Lauri in uasis: & in publico urbis loco

ad limagum fluuium editiore Tiliarum nemus, in quo etiam Larices duæ uisuntur: & proximè infra urbem ad eundem fluuium Tiliæ duæ, brachiis & ramis in attegias supra truncum elegantissimè digestis: quales, aut elegantiores quocq; Scaphulariæ etiam (quod liberum & Helueticum ad Rhenum oppidum est) conformatae sunt. Incommodum illud regioni nostræ commune, quod ferè de Asra conqueritur Hesiodus: ἀκρὸν χαίμα κακὸν, ἕρπυς ἀργαλέη ὀνδύπορ' ἰδλή. Propter alpium enim uicinarum iuga, perpetuis opera niuib; hyemes nobis longissime, æstates uerò breues sunt, & qui tepere debebant austri, nobis plerumq; frigent, frigore ab eisdem, quas pertranseunt, niuib; contracto. Quamobrem & plantæ peregrinæ uix educari aut durare apud nos possunt: & uina nostra acerbiora sunt, non solum uicinis illis quæ propius meridiem nascuntur, sed etiam aliis, quæ locis ad Septentrionem paulò remotioribus proueniunt ultima Longius enim si procedas, nullæ amplius uinææ occurrent: ita ut diè ferè iter ultra Rhenum uineta omnia terminet. Ergo, si montes non impédiant, & uina generosiora semper, locis ad meridiem propioribus fiunt, & alii etiam quidam fructus uel noui, uel iidem sed melius feliciusq; crescent, quò magis ad meridiem progredimur: ita ut in Narbonensi tandem Gallia, alibiq; ad mediterranei maris in Europa limites, uineta & oliueta, & alia quædam, omnium optima habeantur. Itaq; frigoris, tempestatum, soliç; ratione peregrina multa uel non proueniunt nobis, uel certè ad maturitatem nò perueniunt. Aliquid est tamen, quædam ita prouenire, ut à medicis & pharmacopolis cognosci possint.

Basilea, quod infimum Helueticorum oppidum Rhenus interluit, Cælius secundus Curio uir doctissimus & Latina eloquentia summus, hortù peregrinis aliquot plantis instructum habet, sicut & Conradus Lycosthenes in eadem urbe ecclesiæ minister uaria eruditione clarus: cuius priuignus Theodorus Zuingerus nuper ex Italia reuersus, iuuenis egregius, medicus & philosophus pereruditus, optimi patris hortum seminibus italicis, quæ secum attulit, parte etiam mihi communicata ornare & nobilitare pergit. In suburbio S. Ioannis, Ioan. Iacobus Lofs uir magnificus hortum se dignum colit: in quo Citrorum arborum generis differentias aliquas uidi, ut Arantias, & Limones adultas: & Prunos Vngaricas: & Libanotidis coronariæ plantas pulchrè digestas: & acetosam Gallicam, &c. De Quercu in aëra seu nemore D. Petri leges Q. litera.

Argentina ciuitas propè Rhenum magna, & multis nominibus excellens, hortos etiam quàm plurimos & amplissimos habet: quorum præcipuus est, quod ad uarias & peregrinas stirpes Didymi Obrechtii medici hortus: deinde Hieronymi Massarii medicinæ professoris. Magnificentia quidè & elegantia primas tenet Israël's Minkeli's foëdinarum metallicarum quarundam domini hortus in suburbio, quod uocant *Steinsstrass*: cui hortulanum Gallum præfecit, qui topiario tonsiliq; artificio herbas & frutices uarios distinguit: et areas herbis floribusq; non uulgaribus in literarum aut animalium aliàsue figuras graphicè digestis, Cepographiam dixeris, pulcherrimè depingit. Arearum margines, densis ex hyssopo aut saluaceo sepimentis tonsilib; aditu per interualla relicto, ad pedis aut cubiti altitudinem cingit. Cælum certè Argentinæ multò mitius nostro est, & plantis peregrinis educandis aptius.

Infra Argentinam cùm alia oppida nobilia Rheno alluuntur, tum præcipuè Spira, Vuormacia, & Moguntia: è cuius regione Mœnus fluuius Rheno se miscet: & ad iter ferè dièi, Francordia celebre emporium abest: ubi medici quidam & pharmacopolæ hortos uariis & rarissimis plantis instructos colunt: è quibus præcipuè mihi noti ac de me benè meriti sunt, Iacobus Oppenheimius pharmacopola, & Io. Rurpodius Chirurgus.

Reliquorum deinceps ad Rhenum oppidorù horti mihi prorsus incogniti sunt: non dubito tamen quin & alibi, & in primis Colonia Agrippinæ egregiè instructi reperiantur. Antuerpia non procul Oceano distans, emporium longè nobilissimum copiosissimumq; ad Scaldim flumen, ab altero Rheni ostio inferiore, ut ex tabulis

bulis apparet, unius aut alterius diei itinere abest; in ea urbe cuius Petrus Condensbergius pharmacopœus percelebris ad insigne Campanæ veteris, omnium simplicium medicamentorum diligentissimus inquisitor, hortum uariis & raris stirpibus suo studio refertum excolere & augere pergit.

AT IN IIS QVAE LONGIVS A RHENO DISTANT

Germaniæ regionibus.

IN Heluëtiis quidem Bernæ Benedictus Aretius bonarum literarum professor eximius, & in Bernensium agro Sigrisfuilla, Christophorus Piperinus ecclesiæ stes doctissimus, hortos plantarum uarietate instructos habent.

Augustæ Vindelicorum magnifici horti sunt Fuggerorum, & in eorum plerisque etiam stirpes quedam peregrinæ: sicut & aliorum quorundam ciuium opulentiorum. In eadem urbe clarissimus medicus Adolphus Occo præcipuè peregrinas quasdam & raras stirpes alit.

In Bauraria Monâchi hortus illustrissimè ducis à magnificentia, & peregrinarum quarundam arborum spectaculo laudatur.

Schorndorfii quod oppidum est illustriss. ducis Vuirtenbergenfis, cuius & mercator egregius Ioannes Schmidlappius hortum copia ac raritate stirpium insignem possidet. Ibidem hortum arci adiunctum magnificum, & plantis raris, inter alias etiam piperis, spectabilem esse audio.

Eislinga ciuitas est Imperialis, quanquam in Vuirtenbergenfis ducis regione sita: cuius ciuis Ioan. Volmanus pharmacopœus, diligentissimus simplicium medicamentorum indagator, hortum egregiè colit.

Norimbæga celeberrimus est Ge. Ollingeri felicis memoriæ hortus.

Vratislaviæ in Silesia clarissimi ciuis Vuoisseli, qui præstantissimi medici Sigismundi pater est, hortus copia, uarietate, elegantia & raritate stirpium omnis generis summè commendatur.

Apud Misenos Lipsiæ Ioan. Rallæ pharmacopolæ hortus est copiosissimus.

Torgæ uerò Ioachimi Kreichii pharmacopolæ longè refertissimus stirpium uario genere, ordine etiam & structura elegantissimus: cuius picturam hic addidissimè, quam ipse ad me mittere dignatus est, nisi pars eius in itinere, nescio quorum negligentia aut improbitate, periisset. Ibidem Ioan. Kentmannus medicus artis usu et eruditione summus, raras & peregrinas stirpes non paucas educat: sicut & Misenæ (quod oppidum regioni homonymum est) excellentissimus medicus Christophorus Leuschnerus.

Stolbergæ in Hercynia sylua Ge. Aemylii ecclesiæ pastor & uicinarum inspector, theologus omni literarum genere doctissimus, hortum quàm plurimis & raris etiam stirpibus ornatum possidet.

DE HORTIS GALLIAE.

GALLIAE horti mihi incogniti sunt, paucis quos homines eruditi suis literis celebrarunt exceptis.

Celeberrimus est hortus S. Mauri prope Luteciam, Bellonio teste.

Hortus Renati Bellai Cenomanensis episcopi, nunquam satis in herbarum & arborum rariorum cultura laudati, nobilissimus est omnium qui hodie tum apud Germanos, tum etiam Italos uisuntur, ut nihil addi possit ad absolutam horti bene exculiti, & innumeris uariarum plantarum diuitiis refertissimi curam ac diligentiam, ut scribit Carolus Stephanus in horto & in Seminario. Puto autem hortum illum Luteciæ esse: in qua urbe laudatur etiam hortus ædi diuæ Mariæ adiunctus, propter peregrinas quasdam stirpes: & pharmacopolæ cuiusdam à Car. Stephano celebrati, cuius nomen iam non occurrit. A Cardano de rerum uarietate libro 13, capite. 66. describitur hortus magnificus Ioannis Baptistæ mercatoris Florentini Luteciæ.

Petrus Bellonius Cenomanus medicus, ex longinquis peregrinis

tionibus semina uaria congeffit, omnis stirpium generis, ex quibus Lutece satis, uariae ei stirpes prouenerunt: non solum uero paucas singulorum generum, praesertim arborum, quae Lutece nasci ante hac non solebant, educare contentus est, sed etiam sylvas quarundam, quod ei felix faustumque sit, meditatur.

DE HORTIS ITALIAE.

ITALIAE horti plures instructioresque proculdubio sunt, quam ullius alterius regionis hoc tempore. nam & solum eius fertilissimum est, & aer temperatus: & diuitis affluentia, uoluptatumque studiosi homines: & magnus rei medicæ usus. Ergo paucos aliquot nominabo.

Caspar à Gabrielis uir inter nobiles Patauinos longè nobilissimus, omnibus animi atque ingenii dotibus excellit. Cui præter omnium bonarum ac liberalium artium perfectam cognitionem, hoc etiam laudis & gloriæ accessit, quod omnes facultates suas (quibus inter cæteros contentissimus uiuit, nihil ut amplius exspectat præter id quod habet) in hortuli sui diligentissima cura insumat, &c. Carolus Stephanus in Horto. Ibidem Priulanus hortus magnificus, plantis uariis & raris è Syria etiā accersitis admirationi est. Omnes uero omnium, ni fallor, hortorum magnificentia simul, & stirpium in eo uariarum omnis generis, è Creta etiam & aliunde peregrinarum, numero laudes facillè uincit publicus ille Patauii in medicorum gratiam inelyti Senatus Veneti liberalitate institutus hortus, cui hoc tempore Aloisius Anguillara Romanus, uir in stirpium historia nostro seculo exercitatus atque peritissimus omnium, magna cum laude præest.

Venetis Murthani nobilissimus est hortus senatoris Hieronymi Cornelli, uiri illustris, qui Cypri insulæ præfecturam gessit, ex qua, ut etiam Creta, Alexandria, aliisque regionibus, multa pulcherrima rarissimaque Venetias sibi adferri curauit. In eadem ciuitate prædicatur etiam summopere Maphei de Mapheis medicis hortus: & Pasqualini, & Petri Antonii Michaelis Patricii in uico S. Georgii: & cœnobitarum quorundam, præcipuè Franciscanorum, ni fallor.

Illustrissimi ducis Florentini hortus magnificentia structuræ, & stirpium peregrinitate excellit.

Arimini uisendus est Iunii Moderati pharmacopolæ hortus excultissimus.

Romæ in cœnobio quod Aram cœli uocant, hortus est plurimis & egregiis plantis confusus, præcipuè ab Angelo Palea & Bartolomæo ab Vrbe ueterum cœnobitis, qui de medicamentorum compositione librum Mesuæi interpretati sunt. In eadem urbe ciuis Scipio ad S. Apostolum hortum nobilem possidet, ut in Rhabarbarici mentione indicauimus. Ioan. Vincētius Pinellus uir genere & doctrina clarissimus, cui Bartolomæus Maranta Venulinus medicus eruditissime scriptâ nuper cognoscendorum Simplicium medic. Methodum nuncupauit, Neapoli (ni fallor) in suis hortis quam plurimas plantas ex uariis remotisque regionibus, magno impendio aduectas (ut ipse Maranta scribit) perpulchrè alit.

T V R C A S hodie rei hortenensis per quam studiosos esse refert Bellonius Singularium 2, 51, ubi raras etiam aliquot stirpes quæ colī ab eis solent, recenset.

DE HORTIS QVIBUSDAM APVD VETES
res nobilibus.

DE Hesperidum, Adonidis, Alcinoi, Epicuri & aliorum quorundam hortis factam à ueteribus mentionem, ne sim longior, prætereo.

Horti pensiles Babylonii describuntur à Q. Curtio lib. v.

In Syria fuisse duos paradisos in quibus solis Balsamum coleretur, idque nusquam agrestem nasci, Theophrastus tradit historię 9. 6. & eiusdem libri cap. 4. Arborea (inquit) thuris ac myrrhæ, aliæ in monte quodam Arabiæ editissimo sponte nascuntur:

scuntur: alia cultura adhibito *ἢ τὰς ἰδίαις γεωργίαις ὑπὸ τῶν ὑπόδηται.*

De Theophrasti horto, & Ant. Castoris quem Plinius uidit, in sequentibus dicemus.

De hortorum laude & utilitate.

C V R A cultusq; hortorum, non modò honestam secum uoluptatem, sed etiam utilitatem, cum ad opsonia, condimenta, cibos, tum ad sanitatis tutelam & morborum depulsionem, adfert. Seruntur enim, aluntur, & seruantur in hortis uaria fruticum, suffruticū, arborum, herbarumq; genera, quarum alia per se sunt edendo, alia acetariis aut condimentis idonea, alia remediis tantum adhibentur. Est sane hortus, in quo stirpes eiusmodi oriuntur, ueluti penus quoddam: è quo ad usum nostrum quoties libet depromimus radices, olera, semina, fructus, herbas & huiusmodi: quæ cum in promptu ex hortis suppetant, non opus est longius è rure, agris, montibus aut syluis petere, nec emere aliunde, quod non modò sumptuosum est, sed etiam sepe inutile aut noxium, cum falsa pro ueris, & uenena interdum pro remediis, in ueterata quidem pro recentibus sepe numero ueneant. Horti (inquit Plinius) maxime Lib. 19. placebant prisca, quia non egerent igni, parcerentq; ligno, expedita res & parata cap. 4. semper: unde & acetaria appellantur, *(ab accipiendo nimirum, quod ex ipsis hortis herbe semper in usum nostrum accipi possunt,)* facilia concoqui, nec oneratura sensum cibo, & quæ minimè accendant desiderium panis. Quamobrem sit aliquis & his honos, nè ue autoritatè rebus uilitas adimat, cum præsertim etiam cognomina procerum inde nata uideamus: Lactucinosq; in Valeria familia non puduisse appellari. Antiquitas nihil prius mirata est quam Hesperidum hortos, ac regum Adonidis & Alcinoi: itemq; pensiles, siue illos Sciramis, siue Assyriæ rex Cyrus fecit. Romani quidem reges ipsi coluere. Iam quidam hortorum nomine in ipsa urbe delicias, agros uillasq; possident. Primus hoc instituit Athenis Epicurus, hortorum magister. Vsq; ad eum moris non fuerat in oppidis haberi rura. Romæ quidè per se hortus ager pauperis erat. Ex horto plebei macellum, quanto innocentiore uictur: Hec Plinius. Epicurum quidè Athenis primū ad uoluptatē & delectationē hortos intra moenia instituisse, meminere etiam Cicero in libris De natura deorum. Cyrus minor ex hortis, quos purpuratus ipse et gemmis ornatus, sua manu cōseuisset, gloriam magnā cum apud omnes Græcos, tum apud Lylandrum Lacedæmonium, cum is in Lydiam ad eum uenisset, adeptus est, ut Xenophon & Aelianus tradunt. Theophrasti Eresii qui Aristotelē audiuit, hortum fuisse amplissimum ex testamento eius constat, in quo sic ferè legimus. Hortum & circumiectam ambulationem, & omnes ei adiectas domos, do & relinquo amicorum in hoc testamento nominatorum illis, quibuscunq; in eo uersari, simulq; philosophari libuerit, ita ut cōmuni studio colendū & custodiendū curent, neq; uel alienare, uel uendicare sibi illum quisquam possit, &c. In hoc nimirum prædio ille multa ac diuersa stirpium generatim uernacula tum peregrina colit curauerat, ut eruditos illos & accuratos, qui etiam nū doctorum manibus teruntur, Plantarū historiæ causarūq; libros conscriberet. Antonii Castoris hortum Plinius celebrat in quo plurimas herbas uidit. Huic (inquit) summa autoritas erat in ea arte (cognitione herbarum) nostro uero, uisendo hortulo eius in quo plurimas alebat, ceterisimū etatis annū excedēs, nullū corporis malū expertus, ac ne etate quidè, memoria ut uigore concussus. Columella autor est cultum hortorum insigniter neglectum fuisse ueteribus agricolis, suo autē tempore quā celebrerimū. Ego apud Græcos semper quā Latinos celebriorē fuisse puto, quā diu libera fuit Græcia, quā plurimos enim scriptores Georgica & Cepurica (hoc est, De rustica, deq; hortensi re) libros condidisse constat: & rerum, præsertim stirpium nomina, quorum maximam partem à Græcis mutuati sunt Latini, idē latentur. Post Græcos uerò Latinis præcipuū fuit hortorum culturę studium,

Hh

Germanis omnium minimè: partim quæ armis semper magis dediti fuerint: partim quæ soli natura durior, et cœli tēperies inclementior, in locis Septentrioni expositis, hortorum cultui non parū incommodet. Quod magis institutū illorū laudandum est, qui in nostris regionibus nulla rei difficultate territi, hortos instruunt: id quod non ita ad uoluptatē priuatā, quā ad utilitatē publicā faciūt, ut & remedia in promptu habeantur, sicut dixi: & multa hæcenus ipsis etiā summis medicis ignota certius cognoscantur: & optimi quicquid ueterū libri, cū fructu simul et uoluptate legantur atque intelligantur.

OBSERVATIONES QVAEDAM ET REGVLÆ AD
hortorum cultum in Germania utiles. Primum quæ consideranda sint ante plantationem aut sationem: deinde quæ in ipsa plantatione: demum, quæ postea.

PARS I.

Locorum
differentia
et natales.

Si in horto sint plures differentiæ locorum, (ut collis, saxa, riuus, stagnum, arena, &c.) multa crescere & durare poterunt, suis plantata locis: quæ aliter aut non crescant, aut non durant.

Quod singulæ plantæ terram propriam, cœlique accommodatam temperiem quærant, eo sane manifestum est: quod quædam in quibusdam locis proueniunt: in quibus alia quædam nec sponte nec sata facile exeunt, et quamquam apprehenderint, fructum nullatenus pariunt, (ut de Palma & Moro Ægyptiā, aliisque quibusdam retulimus:) & neque augentur, neque fructificant, sed uitiata (maligne) omnino proueniunt, Theophrast. hist. 4.1.

Ut aquaticæ & humide riguoque solo assuetæ plantæ non facile in hortis siccioribus uiuunt, nec diu durant: nisi in umbroso loco, qui humido similis est: quem tamē uentis expositum esse uelim, & sæpius rigari: humidus enim locus si non perficitur, putredini & herbarum generationi obnoxius est. Sic & montanæ stirpes, humiliori ac pingui solo, locis umbrosis, & uento minus perflatis, uix nascuntur: aut certè fructum non perficiunt. Sic & maritimæ ut Soldanella, Ben rubrum, in hortulo meo facile quidem natæ sunt, sed flores & semina nunquam protulerunt.

In diuersis plantis plurimum referunt sol aut umbra: locus altus, aut humilis: siccus aut aquosus, pinguis aut macer, perflatus aut non perflatus.

Solis calor augetur reflexione radiorum eius ad parietem. sic Ficus apud nos melius ac citius maturescunt.

Ad parietes quædam plantare prodest, uel propter soli reflexionē, uel ut loco saxoso sint, uel ut innitantur: ut Ficum, Ribes uulgò dictū fruticē, & lasminū. Ficus quidē uel circa Cracouiam maturescere audio, tali nimis situ plantatis arboribus.

Plantæ uicinæ sæpe impediunt, cum uel inumbrant, uel aërem auferunt: uel premunt, aut se circumuoluunt, siue superficie, siue radicibus reptando: aut succum ac alimentum terræ præripiendo.

Carbonum puluis & partes minutiores à fabris ferrariis, terræ siccæ & duræ nimium misceantur in hortis.

Solum uere obserendum, præparari prius autumno debet, fodi scilicet, arari aut pastinari & stercorari. sin conferendum est autumno, præparetur uere.

Semina peregrina pleraque uasis committenda sunt: in quibus etsi omnia nascantur minora, certius tamē proueniunt, et melius tutiusque seruantur, ne conculentur, uel aliter ledantur: tempestatibus etiā subtrahi possunt, et uel sub tectū inferri, uel offerri pro commoditate, & uel ad umbram, uel solē transferri ut doliū Diogenis. Minus etiā ab animalculis infestantur, ut pulicibus, pediculis, cochleis & crucis: quæ germina & folia teneriora erodunt. Cochleg quidē etiā Februarii initio apud nos aliquando germina, cymas, et rudimēta aut spem florū subito uorant. Sphondylos et alios noxios radicibus, tū Augusto mense præcipue animaduerti: cum enim subito egregiæ quædā plantæ mihi perirent, nec ulla esset manifesta causa, solo modicè effosso, latrunculos illos circa radices deprehendi. Nocēt etiā mures quidam rizophagi, tum uoracitate sua, tum cauis excitatis, per quæ uel nimius calor penetrans, aut humor aut frigus radices lædit: quo nomine etiā talpæ noxiæ sunt, quæ non

radices

radices sed lumbricos sectantur: & ipsi similiter lumbrici, dum terram circa paruas ac teneriores plantas multipliciter perforant. Hæc omnia ferè in uasis uitantur.

In uasis fata quædam, ubi adoleuerint, uere aut estate transferentur in aream, id quæ contractis uasis, si aliter curari non possit, ne terra à radicibus discedat: uel una cum uase in terram imponentur, præsertim sub magnos æstus, perfracto fundo, aut in eo foramine dilatato, ut subeunte humore uaporeque terræ, radices humectari & refrigerari quæant.

Plantæ omnes quæ ab hominibus coluntur, alicubi sua sponte oriri uidentur: nã & hordeum in Scotia sponte nasci aiunt. Quæ in frigidis regionibus coluntur; ea in calidioribus ferè syluestria sunt: & contra.

Ad plantationem uel sationem pertinentia quedam.

Ex peregrinis seminibus plurimis uariisquæ, plerumquæ uix perpauca nobis proueniunt: nisi & cœlum faueat, & cultoris studium singulare sit. Aestate superiori: quæ solito calidior sicciorque fuit, amicus quidam (Francfordiæ ad Mœnum ciuis) è seminum generibus ducentis ac uiginti duobus, uix uiginti genera sibi prouenisse mihi conquestus est: sicut & alii aliàs, quamuis non in simili siccitate. Mihi etiam non raro è decem generibus satis uix unum prouenit: & eorum quæ prouenerunt multa breui, uel eodem, uel anno sequente interierunt.

Semina omnia crescente Luna tepidisquæ diebus sunt ferenda. Cardano teste, aliqui è uulgò, Luna ascendente, ea putant ferenda, quorum superficiem, (ut caulem, folia, fructus,) maiorem optauerint: contra, descendere, quorum radices auctiores.

A fatu quædam citius, ut intra tres aut quatuor dies, germinant: alia tardius. Batiss ferè post quadragesimum diem apparet: alia fortè post menses aliquot, aut etiam annum. Ex præduris & corneis quædam nasci possunt, ut Asparagi & Xyridis semina: quædam non possunt, ut Polygonati erecti, (& fortè alterius quoque) & Lilii conualium, & alia quædam fortè: quorum radices natura uiuaces sunt & sese propagant. Lithospermi utriusquæ, & Lachrymæ lobi semina, & si lapidea crusta tegantur, facillè prouenire puto.

Semina quædam, præsertim quæ pingui, calido & humido solo gaudent, ut Cucurbitarum, committenda sunt terræ, cui multum stercus bubulum substratum sit, ut uapore pingui subeunte uegetentur: id quæ primo ueris initio, ut postquam parum excreuerint, in hortu deponantur. Sed de Cucurbitarum & Batidis satione, plura & accuratius scripta leges inferius ex epistola Massarii.

Quænam radice feri & transplantari possint, quæ non, leges apud Theophrastu De causis plantarum. 1. 4. Ea quidem maximè radicibus commodè feruntur, quorû radices carnosæ sunt, ut bulbacea imprimis: uel geniculatæ, uel nodosæ, quæ etiam diutius durant: uel pluribus ceu ab uno principio fibrissisquæ neruosis potius quam mollibus. nam quarum singulares aut simplices sunt radices, aut lignosæ potius quam carnosæ, non facillè apprehendunt. Mei, quod ursinam radicem uocant non siri, radicem etiam capitarescissâ si plantas, facillè nascuntur: sicut & Cymæ radicem quarundam separatæ, ut Inulæ & Raphani maioris.

Quæ coliculis geniculatis repunt, ut Pulegium, Nummularia, Fragaria, Pentasthyllum, ubicunquæ terram contingunt, articulis suis radicantur. Quæ non facillè apprehendunt, cum cespite suo terra hærente eruenta sunt. Ficus Indica è folio radices emittit: sed folium in ea caulis quoque ramique & surculi uim habet confusam.

Surculis quibusdam plantatis, ut Betonicæ altis, aliqui grana auenæ addunt. Apiis (inquit Theophrastus de causis 5. 6.) cachrylium iungunt: quia calidum densumque est, & ad alimentum trahendum iuuat.

Cum radix plantatur, aut surculus taleæue pangitur, terra circum quæque ab imara dice paulatim ad summam, & demum etiam superficies terræ, diligenter condensatur, ut minimè laxa solutæue sit: lapidibus etiam eam ob causam proximè impressis, sic apprehendet citius, minus à uentis mouebitur, minus ab animalculis infestata.

H b ij

bitur: et pluvia minus subibit, quam subire non prodest, donec apprehenderint: nisi aquatica aliqua planta sit: ad cuius radicem nihilominus stipanda est terra, aqua uero per caua bacillis infixis & extractis excitata, admitti potest.

Folia omnia à terra liberentur, quæ si obruas, ea putrescunt, & uitium forte ad germen serpit, & paululum prominentes radices ab initio relinquuntur: post aliquot dies terra aggeratur quantum satis est.

Semina eligantur matura, plena, & potius è caule quam ramis aut surculis nata. In Cucurbitarum genere, quæ de collo sumuntur, fructus longiores producere putant: quæ de uentre, maiores & crassiores.

Florum multiplicium semina non omnia (sed pleniora tantum puto) eandem naturam retinent.

Florum multiplicium alii semina producant: alii non, omni succo natali in florum folia insumpto.

Seminum quæ maiuscula sunt, & partem alteram magis mucronatam habent, ea ipsa pars in terra sursum tendat.

Semina quædam ante sationem lacte aut aqua præmaceranda sunt, ut citius in germen erumpant: quorum scilicet durior est cortex, ut Cucurbitarum, Cucumerum, & huiusmodi. Amygdalarum ossa octo diebus in aqua præmacerari iubet. Nonnulla in dulciore succo aut liquore præmacerata, fructus dulciores producant, ut Cucumerum genera. Quæ lignis uel ossibus duris continentur semina, integra cum illis serantur: nam ossibus suis aut crustis nudata, uix proueniunt.

Argentina (ubi longè maxima hortulanorum tribus est) in eodè agro anno uno tria seminum genera serunt, quorum tertium sequente demum anno maturefcit: ita ut intra biennium quinque genera deinceps sata perficiantur. primò forte ceparum radices pangunt, *serz—zübel*, circa Cal. Februarii: deinde olera, uel Cannabim aut trapa: tertio triticum, aut hordeum hyemale. uel primò radices ceparum aliis cepis interserunt, circa Cal. Ianuarii, & simul Anisum serunt, Brassicam capitatam, Petroselinum uulgò dictum, Spinaciam, deinde Rapa, aut Cannabim, aut Hordeum album, denique triticum. Aliquando Rapa aut Raphanos primò serunt, *frü Rüben*, habent enim Raphanos quatuor generum, breues, longos, orbiculatos, & quos præcoces appellant, item Pisorum genera quatuor, alba, rufa, fusca: & quæ *Heiraterbs* uel *Zylerbs* uocant, Fabarum genera tria. Linum aliud æstiuum, aliud hyemale: & Cannabim similiter. Est quando primò pangunt radicem Raphani maioris Cymas, uel Betam serunt: & Cnicum aut Papauer interserunt. Serunt & Pastinacas, tum cæteras, tum maiores: & Fœniculum, Anethum, Coriandium, Fœnogræcum, Cicer, *Möntenboim*, etc. quæ omnia uidentur ad secundam sationem pertinere: Fœniculum fortè ad tertiam quoniam altero demum anno commune nostrum Fœniculum semina fert, dulce primò. Hæc etsi ad agendum ferè magis quam hortum pertineant: proponere tamè ut olim accepi, uolui, quanuis non satis distinet forsan.

Semina ad duos aut tres annos, ut plurimum bona sunt, quarto inutilia. Rapæ ueteris in Brassicam transire, & contra, Plinius author est.

Serentur quædam felicius quam eruta transferantur, translata enim aliqua uix aut malignè crescunt.

Rapis infixi surculi arborum in ferendi, commodè ad alienas regiones transferuntur, ut Plinius alicubi tradit, si benè memini, aliqui in argillam immittunt partem sectam: uel in arundinem magnam cum argilla, &c.

Terra pro uasis quibus semina mandentur, pinguis & pura sit à uermibus, lapidibus & omni aliena materia purgata: aliqui à talpis effossam probant, pinguis est, nec urit tamen, quæ à solo havis subiecto demitur.

Postquam prognatæ sint uel apprehenderint stirpes, earum cura & duratio.

Herbæ quidem peregrinæ complures apud nos proficiunt: frutices & arbores, quæ maiori calore ad perfectionem indigent, non item: quanquam diligenti cura adhibita in uasis educari quædā possint ad quatuor cubitos aut quinque ad summum, quod ego hæcenus uiderim, ita ut florem proferant: sicuti genera Citri & Laurus. in qua magnitudine posita consistunt per annos aliquot, uel donec pereant.

Cu-

Cucumeres & cucurbitas si quis paruos absconderit, plurimum augentur: quòd ita nulla pars alimentis à sole detrahatur, nec flatibus resiccetur. His illi quoq; respōdent, qui in ferula uel tubo fictili (ut racem apud nos aliquando phialis uiridis) includuntur. creſcunt uerò in longitudinem, & quia nutrimentū facilius recto tramite fluit, & quia nihil eſt quod auocet aduerſeturq;. Ratio ſimilis facit ut uirides quoq; ualeant perdurare, ſi quis apud puteum ſerat; cunq; tempeſtiuū iam ſunt, demifſos in puteū bene operiat. Quod ſi quis poſtquam fructificauerunt germina decidat, & radices terratū operiat atq; conculect, rursus ex eiſdem radicibus cucumeres depromentur, & multo maturius quàm qui ſemine ueniant. Argumentum hoc quoq; euidentifſimum, quòd ſi quis hyerno tempore ſemina cucumeris ſerat in calathis, rigetq; aqua tepida, & ſoli exponat, & igni admoueatur poſtea cū tempus ſeminandi fuerit, totos cophinos demittat in terrā, præcoques admodum faciet. Hec Theophrastus, ex cuius libris multa alia huiusmodi harum rerum aliquis ſtudioſus colliget.

Si quæ interiſſe prima fronte uidentur, non ſtatim eruenda uel abſcienda ſunt. Reuiſeſcunt enim quædam aliquanto poſt, præſertim in lignoſo genere, in quibus forſan radix adhuc uegeta eſt, etſi ſuperficies omnis perierit.

Quæ ex arcis autumnō in uas transplantantur, nō ſtatim ſub tectū referantur: ſed transplantata maturius, aliquādiu adhuc ſub dīo detineantur, donec urgeat hyems.

Hyeme cellis in quibus plantæ ſunt, aër tepidior aliquando admittendus eſt: & aliquando niuis aliquid adponendum, qua paulatim liqueſcente rigentur radices, hoc enim faciunt aliquando in uas Libanotidē coronariam continentibus. Citrorum arbores bis ſerē per menſem hyeme rigant aqua. Ea quarū folia ſucco abundant copioſo, ut Sedū maius uerum, Aloē & Ficum Indicæ, rigatione per hyemē perire aiunt. Mihi dū hæc ſcribo circa octauū Februarii diē folia Indicæ ficus meæ, quæ cunq; æſtate ſuperiore prognata fuerant, deciderūt: quod & ſuperiori anno contigit. cauſam eſſe puto ſiccitatē quæ foliorū iuncturis accidit, & magis quidem recentiorū. Hac hyeme nunquā rigauī: ſuperiori ſemel modicē. Fortē & cōcuſſio in cauſa eſt, uas enim locatū eſt prope ianuā, quæ non ſine concuſſione aliqua claudi poteſt.

Principes & prædiuites quidā, arboribus aliisq; peregrinis ſtirpibus hyeme conſeruandis zetas conſtruunt: in ipſo horto extructis aliquot pro eius magnitudine fornacibus, qualibus in digitis ſuis ſeu hypocauſtis uulgō dictis Germani utuntur: & tabulatis parietibus circumiectis, &c. Talem Auguſtæ uidi.

Quædam ſi per hyemes terra obruantur, ut ficus minores adhuc, & rursus medio uere eruantur, ne frigore pereant, cauetur: idq; feliciter, quàm paleis aut alia materia circum aggeſta. Herbæ etiam quædam, uel totæ, uel parte circa radicem, cōmodē terra, aut uinaceis, aut coriorum ramentis protegentur. Cinis & lixiuium quibusdam appoſitis prodeſſe uidetur, ut abſinthio: & ſal fortalliſ circumpoſitus nonnullis, ut audio: ſed nondū ſatis mihi cōſtat. animalcula fortē is repulerit, aut maritimis quibusdam plantis proſuerit. Ficus Indicæ foliis terræ proximis, arenam ad palmi altitudinē aggerendam quidam putabat, quamuis in uas intra cellam tepidam. Lauri & calidioribus extra Germaniam locis etiam citri, ramis uno aut altero è funibus circulo uerſus truncum adductis, hyemem ſuperare poterunt uel dolio ſuper eas inuerſo.

Annue herbe, alię ſemēſtres ſunt, quæ uere ſerūtur aut ſpōte creſcunt, & ante hyemē eiſdem anni pereūt: *Suſſinter creſcit*. Alię in ſine æſtatis uel autumnō ſerūtur aut ſpōte naſcuntur: & per hyemē durant, ita ut anno ſequente demū floreant, idq; citius, & perficiantur, &c. *Winter creſcit*.

Herbe quædā in calidioribus regionibus naſci ſolite ſua ſponte, eodē anno perſiciuntur, & floribus ſeminibusq; editis, emoriūtur. apud nos uerò plerūq; (niſi & bene aprico loco, & maturē, & anno calidiorē ſolito ſerātur) cū ante hyemē perſici nequeāt, hyerno frigore pereūt in hortis. At ſi in uas ſerātur, quāuis Aprilis aut Maiis demū id fiat, & in ſine autumnī, in locū ſubterraneū, aut cellā contra frigus munitā condantur: ſequentis anni (ſiue in areas translata, ſiue in uas relicta) æſtate optimè perſiciētur, et ſemina mature edēt: q; ego circa cucumerē ſylueſtrem & alia quæ

dam obseruauit. Forſan & circa Cal. Septembris quædam recte ferentur, in uas præſertim, aut etiam in areis hortorum, ſi terra bona & locus apricus fuerit.

Eſt quando eorum quæ ſecundo anno florere debebant, quædam præueniunt, & florent primò, ſemine nullo ſere aut inutili.

Hyeme aliquando cum cœlo tepidior terra regelatur, eleuatis radicibus herbæ ſuſpenduntur: & facile pereunt. quamobrem retruſæ operiendæ ſunt terra, uel alia materia.

Aloën in Cyp̃o ſub hyemem eruunt, (ut noſtri Cepas, & tertio quoq; anno Croci bulbos,) ac ſuſpendunt, uere iterum plantant.

Sylueſtria quædam in hortos translata facillimè creſcunt, & cultu gaudent, fruſtificant, durant. alia uerò breui intereunt. Sunt quæ cultum omnem aſpernentur: ut Gentiana minima, quæ in alpium iugis creſcit. Alia creſcunt quidem, ſed ſoliis tantum, cum neq; caules, nec flores edant, ut Ben rubrum maritimum. Quædam cauſeſcunt quidem, ſed abſq; flore. alia florent, ſed abſque ſemine. Ruſcus iam plurimis annis in hortulo meo uiuens, flores aliquoties, & germina noua quotannis, ſemina nunquam oſtendit. Sunt quæ proſus degenerent. Roſa ſylueſtris minor, cuius frutex totus ſuauiſſimè olet, odorem cultu amittit: ſed forte tum ſolùm, cum humidior umbroſiorq; et parum perſtato loco plantatur, ut mihi contigit.

Rigari conuenit ueſperi potius quàm mane aut in Sole: & quædam guttatim, ſerreſcantibus guttis. itaque faſciolum panni in uas aqua plenum imponunt, ut aqua parte panni prominente paulatim extillet. Talis rigatio Cucurbitis maxime conuenit. Vide in trā epistoſa Maſarii.

Rigatio ſæpius fiat, ſed modice, cum clepſydra aut aſpergillo: non rarò & copioſius: nullo impetu è uale aut manu fundendæ aquæ, ne ei uſitibus plantæ teneriores lædantur: aut terræ ſuperficiēs nimis denſetur. Herbæ aut aliæ ſtirpes cum plantantur, ſcrobe excitata, primum aquam inſundunt, aliqui et auenam ſubiiciunt: deinde plantæ immiſſæ terram aggerunt, & rui ſus aquam affundunt ut terra diſtribuat & unā cum aqua ad radicem partes & fibras conſuat: demum complanant & comprimunt ſuperficiem ſoli.

Satis quibuſdam contra iniuriā animalculorum inſpergitur fuligo camini, aut potius circumquaq;: nos ſale circumſperſo à cochleis interdum uindicauiſus plantas.

Vrina arborum radicibus affuſa utilis eſt.

Fimus bubulus urit plantas: ſuillus non item.

Sylueſtrium quæ locis aquoſis proueniunt, quædam in ſiccis etiam hortis, mediocriter umbroſis, plurimum durant, ut Eupatorium Auicennæ dictum: & Liſium flauum: alia breui pereunt, ut Gratiola, & ipſa nimirum duratura, ſi loco aquoſo plantaretur.

Hyeme quædam omninò intereunt, ut herbæ annuæ, ex quibus & umbelliferæ quædam ſunt. Nam umbelliferæ quædam generis ferulacei ſunt: quibus caules tantum hyeme pereunt, herba uerò & folia circa ſolum ſeu radicem manent, ut Fœniculo, Fabæ inuerſæ, & aliis quibuſdam.

Sphondyli ſubterranei uermes, *Jnger* uel *Enger* à Germanis quaſi *zyen* dicti, quos anno ſequente ſemper in ſcarabeos Maii, ut uocāt, mutari aiunt, rhizophagi ſunt, & radices quaſlibet, etiam fruticum & arbuſcularum arrodunt pernicioſiſſime: ita ut ſubito herbæ totæ, aut folia ſaltem flacceſcant: quod cum apparet, terra circa radices eruenda eſt, ut extrahantur. Aprili menſe & Maio plurimum nobis nocent: ſed Iulio & Auguſto reperiuntur.

Florum folia arte cultuq; multiplicantur, nimirum ſi primis annis florere prohibeas, duobus aut tribus. Dodonæus ſcribit Ocimoides noſtrum (*Lychnidem* ſylueſtrem ipſe uocat) ſi frequenter plantetur, folia multiplicare.

DE BALSAMINAE, BATIDIS, ET CUCURBITARVM

fatione, ex epistola Hier. Massarij.

S E M I N A] Balsaminæ, ac Crithmi, seu Batidis, quam primum acceperis, terræ committas, non quidem in horto, sed in uase aliquo, in quo pingue sit solum: diligenterq; animaduertas ne gelu corripiantur, & uas quàm maximè poteris soli per diem exponito: nec per noctem extra tectum manere patiaris, nisi dū hyems omnino præterierit, facillimè enim à gelu corrumpuntur hæc semina. Per diem præterea poteris aliquando leuiter uas ipsum aqua perfundere, ne solum nimis arescat. de his te admonui, scio enim quanta cum difficultate, etiam Italiæ multæ partes huiusmodi plantas alant: et in Italia è terra non apparent nisi post 40 diem. Hinc cōiectarilicet, huiusmodi semina tardiorē habitura ortum in frigidioribus regionibus, Cucurbitarum autem semina optimo solo ac admodum pingui committito, donec germen proferant & ex terra cum duobus foliis appareant, & dum sex uel septem dies sic teterint, robusteq; aliquantulum factæ fuerint: singulas plantas ex loco illo unâ cum terra quæ radicibus annexa est educito: & fossulas in loco aliquo spatioso conficito, quæ ad unius palmi mensuram profundæ sint, & tantundem latæ: has fossuas terra pingui impleto, optima illa est terra qua ouis simus cōmixta est, & optimè trita et cōminuta. In singulis fossulis singulas plantas collocabis. si in loco qui soli expositus mediocriter sit collocaueris, bonum erit: in harum plantarum custodia duo hæc curabis, si pulchros fructus habere optas: primum ut plantæ in terra defigantur usq; ad folia ipsa, unâq; curabis ut semper terra folia ipsa ferè attingat: secundo ut terra ipsa perpetuò madefacta sit. Referam tibi modum quo nos in Italia utimur in huiusmodi cucurbitis irrigandis: Cum plantas ipsas in suis fossulis collocauimus iuxta plantas ipsas uasculū aliquod ponimus, quod perpetuò aqua plentū seruamus, accipimus præterea ligulam unâ ex panno laneo quæ ex ipsius panni transuerso concisa sit, hanc longâ ad mensuram unius palmi cū dimidio accipimus, eiusdemq; caput unū in uase locamus, alterū uerò ipsi plantæ circumuoluimus, ita ut & plantam & terram attingat: hac enim ratione fit ut semper terra madida sit. Cum uerò fructus aliquantulum grandes erunt, tunc singulis diebus, manibus plantas optimè irrigare conuenit. quod si tum auferatur uas illud, quod eas panni auxilio irrigabat, nihil refert. sicq; certò scias te optimas cucurbitas habiturum, (si tamen aqua optimus cibus dici potest,) ac notabilis magnitudinis, sicut & nos anno præterito habuimus, ita ut omnes mirati sint.

FINIS.

HORTI GERMANIAE.

HOC EST STIRPIVM HORTENSIVM, QVAE IN HOR-

*is quibusdam Germaniæ reperiuntur, Enumeratio**iuxta ordinem literarum.*

NOMINA illorum, qui in Germania Hortos Stirpibus raris excultos habent, (quorum catalogos accepimus,) literis initialibus plerumq; tantum à nobis designantur: quod idcirco fecimus. ut & laude dignum hoc eorum studiū prædicetur: et ubi, uel apud quos Stirpes quæq; hoc tempore inueniantur, non sit obscurum. Sunt autem hæc.

A. Benedictus Aretius Bernensis Gymnasii professor.

AE. Georgius AEmylius doctor Theologiæ, Ecclesiæ Stolbergensis pastor, & uicinarum inspector.

C. Petrus Condenbergius pharmacopœus Antuerpianus, ad insigne Campanæ ueteris. Is in Catalogo suo, ut omnia mihi clariora essent, Dodonæi nomenclaturas & sententias de plantis singulis sequi uoluit.

Hh iij

D. Didymus Obrecht Argentinenſis medicinæ doct̃or.

F. Franciſcus Follietus Sabaudus pharmacopola: quanquam is non in Germania, ſed uicino Heluetiis Germanis Sabaudie oppido Viueaco ad lacum Lemmanum degit; niſi iam inde in patriam Cluſium migrarit, ut audio.

G. Con. Geſnerus: cuius hortulus quidem perangultus eſt, ſed variis plantis reſertus: & omnia ei cum amicis acciubus ſuis, Petro Figulo chirurgo & lithotomo, & Io. Iacobo Clauſero pharmacopola (quorum maiores ſunt horti) cõmunia. Clauſerus noſter hæc dum conderem, uitam hanc mortale magnò pioq̃ animo reliquit.

K. Ioachimus Kreichius Torgenſis pharmacopola.

O. Ge. Ollingerus pig memoria, Norimbergenſis Simplicium medicamentorum mercator: qui & ipſe multo tempore magnoq̃ ſtudio hortum coluit, & iconibus ſtirpium uariarum elegantiffimè pictis, uolumen ſibi confecit, & filios (ut audio) eruditus reliquit: qui pulcherrimum hoc optimi parentis propositum doctrina ſua peregrinationibus confirmata, Deo fauente, illuſtrabunt.

R. Io. Ralla Lipſenſis pharmacopola.

Vu. Vuoyſſelus Sileſius ciuis Vraſlawayæ: cuius filius Sigismundus, dum hæc ſcriberem, Bononiæ publico & illuſtri testimonio artis medicæ inſignia perhonoriſicè accepit.

Hæc nomina quia ſæpiſſimè repetuntur, literis notauiſmus: alia nonnulla quæ rariſ occurrunt, integra ſcripſimus: ut Ruſpodii nomen, qui Francfordiæ ad Mœnum nunc habitat medicus, chirurgus inſignis: & cum Iacobo Oppenheimio pharmacopola præclaro hortum autẽ in eo ſtirpes aliquot rariſſimas communes habet: & Chriſtophori Piperini Signifullæ in agro Bernenſium Heluetiorum eccleſiaſtæ doct̃. T. m. denig. Chriſtophori Leuſchneri medici Miſenæ pereruditi: & aliorum forte paucorum.

IN Catalogis quibuſdam inuenta ſtirpium nomina reliquimus: eſſi in aliquibus an rectè poſita ſint, dubitari poſſit eſt ubi cenſuram noſtram breuiſſimè addidimus. Singula quidem examinare nec ocium ſupp̃tebat, nec inſtituti huius erat. Plantis quibuſdam minus raris non omnium qui alerent nomina addidimus: ſed unum aut alterum, admonendi tantum gratia qui hortum inſtructurus eſſet.

A.

ABIES, G. Hac arbore paſſim pleriq̃ omnes Heluetiorum montes ſylueſq̃ ſcatent. Facile autem nouellæ Abietes plantare creſcunt: quamuis Theophrastus Hiſtor. 4. 6. cultu deteriore reddi ſcribit, ſicut & Pinaſtrum.

Abrotonum (uel ut Grammatici ſubtiliores ſcribunt, Habrotonum) mas, G. R. Fœmina, R. G. Virumq̃ auulſis aut fractis ramulis pangitur, & facillimè comprehendit. Neutrum hætenus ſue ſp̃otis inueni. Mas pleriq̃ hortis communior eſt. Nuper in Sueuiæ parte ad Hercyniam ſyluam non procul Roteuilla, maris ſpeciem alteram inueni, per omnia ſimilem uulgarī noſtro, ſed candidiorem, foliis latiuſculis, minus effacem: unde ueram fœminam eſſe exiſtimo. eam in hortu Io noſtro plantaui. Fœmina à Cordo exiſtimata (Abſinthii genus potius, odore Chamæcypariſi) in noſtris regionibus hætenus ſerè ignota fuit: quam tamen in ælius Germaniæ regionibus ſylueſtrem inueniri audio. Radiculis ſerpit & ſe propagat. Abrotonum radice aut auulſione potius quàm ſemine germinat, ſemine enim diſſiculter exit: & hoc teſtis primùm commiſſo, Theophrastus.

Abſinthium commune. Hoc etiam ſponte naſcitur (quod ad remedia utiliſ eſt) locis aliquot Heluetiæ arenolis, ut circa Rhenum ſuperiorem: & faxoſis montibus, ut ſupra Riuarium lacum Vualleſtadii alibiq̃. item in altis quibuſdam montibus Bernenſium, ſed multò mihius, frigore aut alimenti inopia, ita ut ſpecies diuerſa uideri poſſit: ſicuti & aliæ multæ herbæ in montibus altis natæ, iſ quæ humilius naſcuntur, minores ſolidioresq̃, & craſſiuſculus foliis ſunt, ut Violæ nigre, Bechiũ, &c.

Abſin.

Abfinthium alpinum, de quo iam dixi, non ultra palmi altitudinem, in hortulo meo iam per aliquot menses, non satis bene uiret potius quam crescit.

Abfinthium Meliæ, R.

Abfinthium Romanum, & alia *Abfinthii* genera, Patauii in horto medicorum femina producere negant, siue quod à tyronibus rei medicæ subinde carpantur, siue aliam ob causam.

Abfinthium Seriphium, R. K.

Abfinthii genus quod in Vallesia (Heluetiorum regione, inter Rhodani ortum & Lemannum lacum) in collibus apricis circa Sedunum (herbæ albæ nomine uulgari notum) nascitur, caphuræ quodam odore. Id ex semine hoc anno facile & pulchre mihi peruenit. Floret eodem anno, sed sero: nempe autumnò, si uere seratur, unde herbam annuam esse suspicatus sum: sed hæc dum scriberem in Iunii mensis fine anno superioris uere satæ plantæ nondum florebant: ut illas quæ primo autumnò floruerunt, præcoces & præproperos flores edidisse existimem. Sata in fine ueris, ad florem non peruenit. *Abfinthium seriphium* fœminam hoc appellârim, uel mediterraneum: nam color albus, & uis aliquantò minor quàm maritimi, alioquin similis odore saporeque, fœminam mihi designare uidentur. Huius quod sciam hæcenus mentionem nemo fecit, multis quidem modis in re medica felicem eius usum esse posse experiundo didici, Hyemes nostras quamuis asperas bene ferè in hortis.

Abfinthium Romanum, & genus aliud *supinum, C.* Is in epistola ad me *Abfinthii Romani* (inquit) ramulum, dedioli Guil. Turnero: qui Anglico suo herbario eius imaginem inferuit: sed perit mihi tum planta absque semine, Hyemis iniuria, nec id deinceps quauis diligentia licuit recuperare. Forma tota cum uulgato *Abfinthio* conueniebat, foliis tantum paulò minoribus. Roma semen acceperam. Verùm aliud genus in horto meo uiret hodie, hyemis quoque impatiens, nec in rectum assurgens, sed in obliquum super terram sese extendens: ab eo quod Romanum officinis dicitur, diuersum. Hoc enim *supinum* summo cespite radices spargit: illud Romanum minimè. Estque aromaticum admodum, amaritudinis moderatæ: cuius ramulum mitto. Vidi præterea (inquit idem Coudenbergius) aliquando in alieno horto *Abfinthium*, uulgato tota facie ac colore adeò simile undiquaque ut ouum ouo, planè tamen insipidum. At uerum illud *Abfinthium Ponticum* ueterum, ægrotis tam salutarem herbam, hæcenus desidero. Sunt qui pro eo uulgare nostrum horridæ amaritudinis, & astrictiōis manifestæ nullius, accipiunt: alii uerò Romanum. Hæc C. Ego diligentiorẽ *Abfinthii* generum considerationem in aliud tempus differo. *Supinum* quidem illud minutis foliis, & flore Chamæmali ferè, si benè memini, Basileæ etiam in horto Ioan. Bauhini medici & chirurgi præstantissimi uidi.

Ac

Acanthus sativus, id est, Brancha ursina uulgò dicta O. C. Idem in nostro hortulo aliquoties satus prouenit, incaulem tamen nunquam excreuit: & quamuis duos aut tres annos duraret, æstatis tamen bona parte occultatus sub terra, autumnò fere redibat. Sic & *Cyclaminus*, *Mandragoras*, *Centaurium maius*, & *Asphodelus*, postquam aliquandiu foliis & superficie tota amissis, (ut periisse uideantur) latuere, rursus exilire in hortulo nostro obseruauimus: quod an omnibus istis secundum naturam ita accidat, querendum est. *Cyclamino* quidem naturale id esse constat. Norimbergæ in hortis *Acanthum* & *Asphodelum* bene prouenire, & flores fructusque maturare accepi. Leuschnerus medicus superiore anno fœcundissimum habuit Misenæ, hoc etiam anno Bernæ Aretio floruit.

Aceris species tres apud nos inueniuntur in syluis ac montibus, inter eas etiam *Zygia* à Theophrasto nominatur: *Carpinum* Gaza uertit nescio quàm re-

Est Bellonius Luteæ inter alias arbores Zygiam montanam sibi prouenisse ait. Aceris species duæ, maior & minor quam Opulum & Rumpotium appello G. Expecto & tertiam speciem acutioribus foliis & Clara mittendam. Ruelius Acer montanum quoddam pro Sycomoro descripsit.

Achillea alba, R.

Aconitum primum siue Pardalianches, G. sic autem uoco non illud quod Leonardus Fuchsius pinxit, neque Doronicum, ut quidam, neque depictam à Matthiolo herbam : de qua dubitamus, etiamnum an in rerum natura extet : & si extat, an rectè ab eo pingatur, nullis penitus in radice fibris : quod ego in nullam plantam cadere dico. ipse uero & qui eius sententiam tueretur, in suis ad me epistolis radices eiusmodi aliquas inueniri ait, sed non ostendunt, ut nec Aconitum suum. Quod si & extare, & quale pingitur conuerit (hoc est, ostenderit) Matthiolus, restabit ei adhuc probandum ueneni uim eandem ei esse quam ueteres Aconito primo tribuerunt. Ego Aconitum primum Toram uulgò dictam à Valdensibus, ut semper & quidem primus existimaui : ita magis ac magis in ea sententia confirmor : idque primo quoque ocio multis ac uariis argumentis astruam. Scio & alias quasdam herbas diuersis in locis Toræ nomine uocari, ut in Italia alicubi Napellum. Ego de Tora siue Toxico Valdensium loquor, quo circa Taurinum & alibi utuntur : quam in nostro De Lunariis libello depinximus, folio circumato ferè, & aspero, non hirsuto, ut Plinius male transulit, &c. Nascitur sponte in montibus quibuldam Sabaudia, & Vallesia nostra. unde nuper Caspar Collinus eruditus & diligens pharmacopœus Seduni plantas eius aliquot recentes (unâ cum aliis quibusdam) ad me misit : quæ per hyemem benè durarunt, amissis tamen foliis : & nuper principio æstatis flores Ranunculo similes : deinde etiam semina prouulerunt : radiculis cum recentibus sunt, omnium candidissimis, Scorpionum specie, præsertim caudæ, in quibusdam manifesta. Folium aliis plantis singulare est, aliis bina, terna, quaterna, aut etiam quina ab una radice, ut nunc quotidie in hortulo meo uidere est. Non enim uerum est quod scribit Matthiolus folium ei semper singulare esse, &c. Habeo & folium à Generoso monte Insulbræ, magnitudine & figura terè Cucumeris folii. Genera duo sunt maius & minus.

Aconiti secundum uel Lycocstoni duæ species, utraq; cubitos quatuor alta, G. tres, O C. Nostri Lupi radicem uocant speciem illam cui flores lutei sunt, ceu effiacaciorem. Alteram cui cœruleus flos est, *Rappenblumen* / quidam *Wysenhûtle* : Itali quidam Toram, alii Napellum hæc etiam purpureo flore inuenitur. Sueui aliq; Germani speciem utramq; *Wolffswurz* / id est, Lupi radicem nominant. Matthiolus Aconitis adnumerat etiam quoque herbam, quæ propter elegantes florum luteorum globos à nostris colitur in hortis *Trollblumen* nemine : nam *Trollen* nobis est in orbem uoluere. Ea sponte nascitur abundè in montibus nostris, cum alibi tum circa Eremum Duæ uirginis à pecore non attingitur : uenenatam tamen esse non puto. Viuacissima est, flore in alius montibus suaue olenti. Vide inter Anemonas.

Aconitum cœruleum aliud, luteo illi quod nostri priuatim Lupariam uocant, congnatum, in montibus quibusdam Bernensium ditionis *Grosse berg ritter sporen*. A. In nostro etiam hortulo nunc floret circa medium Iunii. Radix ei amara est sicut Antitoræ, & uiribus, uti consicio, eiusdem, non ita uenenoſa ut cætera Aconita.

Aconitum saluiferum, quod Antoram uel Antitoram uocant, radice semper gemina, amara &c. in montibus non procul Geneua nascitur : unde ab amicis recens mittendum expecto. Vide infra in Antora.

Aconitum secundum, flore albo. Napellus albus in orto ciuis cuiusdam nostri.

Aconito cognata uidetur etiã herba, quã in montibus Heluetii alicubi Schneebliumen appellant, flore albo Ranunculi, radice ut in Lycoctono dissecta: cuius hoc anno à me plantata radix interiit.

Acoris falsã, G. id est Liliũ aquaticũ, flore luteo. Diutissimè in hortis durat, quamuis non humido loco, quod radix ei solida & geniculata sit.

Ad

Adiantũ nigrũ, ut aliqui putant: G. Ruta parietũ uulgò dicta: quod in muris, parietibus & faxis ubiq; apud nos proueniat.

Ae

Aegilops O. intelligit autẽ, ni fallor, graminis genus, quod floribus & fructu suo subinde tremulum mouetur: unde & Sydera à Germanis quibusdam uocatur. Hanc enim Aegylõpẽ Plinii & Diosc. Tragus appellauit. Nos Matthiolo assensumur Aegylõpẽ ueram esse, quã ipse depingit ac describit, Italis alicubi Squalam uulgò dictam, frequentẽ inter Hordeum et Zeam. Fit enim Hordei uitio, sicut Lolium Tritici, nimia uliginẽ, aristis longis & capillaceis: Dodonæus Aegilõpẽ aliam facit, similem tamen, ut ex pictura uidetur herbam, aristis breuissimis, & fere nullis: **Dort** Germanicè dictam: quam libro 2. imaginum pro Lolio pingit: circa finem uerò eius libri, emendans, Aegilõpẽ nuncupat, & pestẽ secalis esse dicit hanc herbam, sicut Lolium Tritici pestis est. Eandem herbam Tragus tertio inter Loliã (sic enim appellat omnia frugum uitia, & Germanicè **Dort**) loco describit, & Germanicè **Quecken** nominat, spica multiplici multifariãque diuisa, & ueram Galeni Aegilõpẽ esse putat, ac simul etiã Lolium uerũ uel priuatim dictum: eiusq; picturam primo inter alia quę Lolia uocat loco, exhibet. Ad remedia forte, præsertim extra corpus, Aegilõpẽ pro Lolio ponas, an contra, parũ interest. Videtur enim ex æquo fere calefacere utrũq;. Lolium uerũ Matthioli pingit, &c.

Aethiopis O. R. Ae. C. G. Rurpodius. Dodonæus eandem depingit quam & Matthioli, nec alibi quàm in hortis apud inferiores Germanos reperiri tradit. Semen è Creta in Italiam allatum audio.

Ag

Ageratũ, uulgò Italis herba Iulia, à mense quo florere incipit, K. C. Ae. G. Hanc aliqui Eupatorium Mesuæ faciunt: alii aliud. Facile crescit, & bene fert hyemem. Anno secundo (ni fallor) caulem & flores fundit, in Germania nusquam sua sponte nata, quod sciam, inuenitur. Omnino cognata est Costo hortensi siue Mentæ Græcæ uulgò dictæ, odore, sapore, tota specie, sed minor.

Agnum castum, ut uulgò uocant: id est, Viticem, peregrinam Germaniã arborem, ex semine natum iam biennio fere in hortis habet: longitudine supra cubitum, caule quadrangulo, recto, rubente: foliis est quinis, tanquam in digitos digestis ab uno pediculo: qualia fere sunt in Trifolio ceruino aquatiko, quod Fuchsius Eupatorium adulterinum uocat. Hyemẽ in locum hypogæon cum uase deponit. Hoc anno 1559 flores in easẽ uisurum sperabat. Idem prouenit Ae. G.

Ai

Albutilon Auiennæ O. G. K. C. Theophrasti Althæa uidetur, flore melino: facillime nascitur & mature eadem æstate fructum perficit. Peregrina Germaniis, nec nisi in hortis quorundam querenda.

Alcæa G. prouenit ea quidem passim ruri, locis siccis & apricis.

Alcæa peregrina uocati potest, quam pro Hypecoo Matthioli non rectè pinxit, herba æstiuã est. Aliqui Alcæam seu Maluam Venetam nominant: G. placet florum suorum specie & colore, quodque eos in meridie tantum aperit. Semen tempẽstiuẽ maturat.

Alcali maritima planta, pinguißima, foliis oblongis, carnosis, teretibus, Hieronymus Massarius, medicus Argentinæ in hortis alit, aliud quàm Matthioli

pinxit ac descripsit in Attriplice. Est autem Kali Arabicę linguę uocabulum, et cum articulo Alkali, Aliqui Anthyllidem secundam Dioscoridis esse putant; quibus con- tradicit Matthiolum. Nascitur Kali etiam in horto K. & sponte ē semine quoran- nis ei propagatur. Vide Anthyllis. Mihi etiam hac æstate prodiit, seminibus à Massario communicatis, foliis tres digitos aut quatuor longis, teretibus, nisi ob- staret canaliculus, qui medium folium carinat, albidus & translucidus, sapore Bere- ferē, &c.

Alcalt minus, AE.

Alisma (seu Damafonium) bifolium, Ophrys Fuchsi. uno alterōue anno in hor- tis durat: sicut & Testiculorum genera quibus cognatum uidetur. Sponte crescit in syluosis, pinguibus & opacis locis. G.

Alismatis species, ut quidam putant, Calceolus diuæ uirginis uulgò dictus, à flo- ris forma, quæ oui testam aliqua ex parte apertam refert, ut de arbuti flore Theo- phrastus scribit. G. AE. diu durat. nititur enim radix multis fibris. Aliqui hanc Lō- chitin primā putant. Nascitur locis montanis apud nos, solo opaco & pingui, ut in Albio monte nostro.

Alismatis pulchra species, flore ferrugineo, (fortē luteo,) uulgò *Fräwēschüh/K.* Alisma C. uidetur autem de Alismate Dodonæi sentire: qui Saponariam uulgò dictam, sic nominat. Vide in Saponaria.

Alisma alpinum fortē nominari meretur, herba à prædictis omnibus diuersa, fo- liis plantaginis, flore Doronici, sternutamenta mouēte, &c. G. *Mitterwurz.*

Alliastrum uel Alliaris recentiorum O. G. Exilit sponte locis umbrosis & circa sæpes, foliis uiolæ nigræ ferē, &c.

Allium satiuum in hortis olitoriis nullis non halat.

Allium syluestre foliis angustis, floribus puniceis, G.

Allium montanum, Petroscorodon dixeris, G. radice oblonga, &c. in faxis col- lium circa Badam nostram nascitur. in hortum translatum prouenit mihi quidem, sed non durauit, nec floruit.

Allium syluestre bifolium, quod locis umbrosis & circa sæpes, apud nos copio- sum reperitur, G. *Kamseren* uulgò uocant. Viuax in hortis, ut & alia pleraq; syl- uestria quæ bulbos propriè dictos habent. De Scorodopraso leges infra.

Allium alpinum uoco, foliis ferē Ellebori albi, radice lōga, pulcherrimè reticula- ta, &c. Christoph. Piperinus & G. Vulgò *Sigwurz*/id est, Victoriæ radicem su- perpositione quadam nominant. Hoc quanquam non nisi in altissimis alpium iugis inueniatur, facillimè tamen in hortis crescit, & plurimis annis durat: sed rarò floret. Mihi quidem toto septennio bis floruit, & semen maturauit. Vide in Gladiolo.

Allium Hispanicum R.

Allium porcinum R.

Allium Vlpicum Laufannæ in horto habui.

Allium ursinum hodie nonnullis dictum, (hoc est, Arctoscorodon,) K. *Kam- seren*/quod locis umbrosis circa syluas & sæpes nascitur.

Aloë (Indica herba) C. & O. stirpes tres. Facile crescere audio: (neq; mirum, cum extra terram etiam nuda plurimis annis eduret uiridis & succulenta:) caulem emit- tere tanquam Asphodeli, flores luteos: pangendam esse radicē, uel potius herbam cum radice. Franciscus Follietus etiam Viueaci ad lacum Lemannum, in horto a- lit aut aluit Aloën. Hyeme rigari non debet. In Cypro sub hyemem erunt eam, & suspendunt: uere iterum plantant. Eadem Venetiis in horto Maphæi floruit.

Asine, morsus gallinæ uulgò, in omnibus ferē hortis: & passim locis cultis nasci- tur. Differentiæ eius plures sunt: lauem & candidiorem dixerim fœminam: hirsu- tam & nigriorem, marem, &c.

Althæa, ibiscus, in plerisq; hortis uiuacissima est: magnæ enim eius & glutinosa humore plenæ sunt radices,

Althæa Theopraستي. Vide Albutilon.

Althæa

Althæa crispa & maior *O.* uidetur autē *Maluam crispam hortensem* intelligere. *Alyssos C.* intelligit autem puto eam herbam, quæ à *Dodonæo Alysson Diosco-*
ridis uocatur: quā aliqui *Lunariæ* maioris speciem faciunt, propter filiquas fere simi-
 les, minores, asperas, &c. quæ in meo etiam hortulo nascitur (vide inter *Lunarias*) si-
 cut & alia quædam herbula, *Alyssos* à quibusdam putata, & *Rubia syluatica* illa,
 quam *Dodonæus Alysson Plinii* uocat: & aliis nominibus *Asperulam cordialem*,
Spergulam odoratam, *Hepaticam nostræ Waldmeister*.

Am

Amara dulcis. Quærè inter genera *Solani*.

Amaracus, ueteribus Græcis tum *Sampfuchum*, id est, *Maio ranam*: tum *Par-*
thenium significat: utrumque in omnibus ferè hortis frequens. *Tonderigau-*
det Sampfuchum, & faciliè regerminat, etiam ter æstate una. Seritur surculo & se-
 mine, præsertim è *Gallia Italiæ* uel misso.

Amaracus syluestris, *Sampfuchum syluestre*, *G. Ae.* etsi apud nos *syluestris*
 non est hæc herba, sed *hortensis tantum*, maior & ignauior *Amaraco simpliciter*
 dicto, cuius ceu nobilioris comparatione *syluestris* cognominatur à nostris mul-
 tiserulis. Videtur autem *Origano* cognata herba. *Wilder Maieron*.

Amarantus Plinii maior & minor, *G. O. R. Köhle/Samat blümen*, *Gelos-*
siam Galli uocant, *Cardanus Italus Galeam*.

Amaranti species alia, maxima, oblongis florum paniculis, semine albo. Hæc
 forte est *Pennachia Italica* dicta, *G. K. Ae.* arborem aliquid cognominant. Huic
 simile est *Blitum maculosum*, foliis, eorumque colore: flore dissimile.

Ambrosia Dioscoridis uera, *A.* Alia à quibusdam *Ambrosia* dicta, *Artemisia*
 forsan species, aliquibus *Conyza Hippocratis*, *K. G.* Recentiores aliqui *Ambro-*
siam uocant eam herbam, quam nos *Scordium maius Plinii*: quæ & ipsa in hortu-
 lo nostro uirot.

Ammi maioribus & serratis foliis, semine Apti, *G.* perfacile nascitur, & restibili
 fecunditate in hortis seipsum propagat.

Ammi uerum, cuius semen aromaticum est, & acre, *K.*

Ammi Fuchsi, *Vu.* *Ammi Venetiis* habent ex *Alexandria*, nomine *Amomi*,
Aniso simile, *Amatus Lusitanus*. Prouenit & *Patauii*, ut audio, *Ammi uerum* ex
Aegypto allatum.

Ammeos genera tria, *O.*

Ammi paruum. Vide *Sison*.

Amomum, *Vu.* suspicor autem pro *Amomo* eum habere genus quoddam *Sola-*
ni, cubitale (aut maius:) quod in Italia quidam *Amomum Plinii* nominant, mihi
 quoque hoc anno è semine natum, acinis (ut audio: meum enim nondum adoleuit) ru-
 bentibus, Ceraforum instar, flosculis albis, paruis: foliis oblongis: odore & sapore
 fere & acinis, quos siccos uidi, ac semine *Solanorum*. Vide inter *Solana*.

Amomum falsum, *Pseudamomum*, *G.* aliqui *Piper* nominant, (*Ruellius* etiam
 pro *Pipere* describit: folio *Ribes fruticosi*.) Nascitur apud nos circa margines fossa-
 rum quarundam aquas continentium.

Ampeloprasum, *G.* non diu durat. Nascitur in uniuersa *Hetruria* (inquit *Mat-*
thiolus) non solum in uinetis, sed etiam frequens admodum in agrorum margi-
 nibus, & in amœnis collium locis. Rura nostra ipsum uulgo appellant *Porrandel-*
lo, estur à rusticis in acetariis erudum, recentis *Allii* uice: quanquam mansu durius,
 & gustu acrius.

Amygdalus ciuibus quibusdam nostris fructum maturat. Eadem in hortis
K. & Lindauia Matthiæ Curtii egregii mercatoris uiuit, & *Vratislavia Vu.* Cir-
 ca *Argentina* complures sunt.

Amygdalus nuces rotundas ferens: & alia *Persico insita*, *Lindauia* in horto
Matthiæ Curtii:

Anacampseros, vulgò Faba inuerfa, Telephiū quibusdam, G. Bellonio species umbilici Veneris. Sponte etiam locis quibusdam saxosis, circa vires & lacum, non deest nobis.

Anagallis utraq; G.

Anagyris, quæ & Anagyrus & Onogyrus, G. C. AE. Mea hoc anno primū ē semine prognata pedem æquat, amico cuidam meo per annos duos durauit: hys me perit superficies, quæ utere repullulauit, Basileæ cuidam ciui ad mediocrem proceritatem peruenit, & siliquas maturauit. Eadē uiget in hortis, Rurpodii, A. K. Anno 1553. (inquit Aretius in epistola ad me) cum Valefiam peragrarem, redibam inde domum per montem Sanetsch/is Sanenses separatā Valefiis, in eo primūm repeti plures eius arbores, partim scapo adhuc pendulo, partim siliquis, nec non (opinor prioris anni) maturo semine. Inde in horto meo alo, sed admodū tardē semen enatum est, nam ante triennium primum apparuit: & iam duos ferē cubitos æquat. Primūm iudicabam Laburnum esse: sed rustici uim illi esse purgatoriam æbant, uotum mihi concitare, & per alium purgare certo experimento. Ligno materies est æternā: nam inde palos, & quicquid diuturnum cupiunt, conficiunt. Cætera etiam quæ de Anagyri à Dioscoride & Plinio traduntur, cōueniunt: Sicille. Sed Laburnū etiam Anagyris species uidetur esse minor, & eadem ferē omnia præstare. Natales certē in alpinis, materia durissima & palis conueniens, natura apibus inimica, quæ tria nemo Anagyro, quod sciam, Laburno autē attribuit Plinius, hodieq; de hac arbore à rusticis & montium incolis prædicantur, Laburnū hanc arborem esse testantur: quā & Anagyrin alpinam rectē uocari posse, crediderim. Laburnum igitur hanc esse ut primus olim scripsi, ita in sententia persisto. & facile suo loco cuiusdam contra me partim argumenta, partim calumnias dissoluam. Trifolia arbor (inquit Val. Cordus) sentit autem de Laburno nostro, transferitur à quibusdam, propter florum decoram speciem in hortos, præsertim Oeniponti, & Francoforti ad Mœnum fluitium siti.

Laburnū.

Anagyris prope Arelaten locis paludosis gignitur, Matthiolo ignota, ut qui pro ea Laburnum duplex ostenderit, ubiuis in montibus nostris frequens. Jac. Dalechampius in epistola ad me. Ego Anagyrin in hortulo alo, folio scetido & mādenti trifido: & aliam eius speciem, quam Laburnum existimo, folio non foetente, nec ingrato sapore, sed trifolii pratensis ferē.

Anchusa K. in Gallia Narbonensi & circa Monspelium sponte exeunt Anchuse quædam, in Germania uix puto.

Androsæmon, ut quidam putant, & Matthiolus pingit, herba Hyperico similis & cognata, palli crescit, at Bellonius Sicilianā uel Cecilianam, Italici uulgò dictā, Androsæmum interpretatur, sponte natum in Ponto sibi uisam scribens. In Italia memini in hortis uidere.

Anemone R. Anemones apud Italos multæ sunt differentie: omnes à florum figura & colore laudantur, non ab odore: medicis nullo in usu. Commune autem aliquid uidentur habere pleræq; cum batrachii hortensibus, florum scilicet speciem. Cum stamina in medio lutea, aut apices saltem, folia latiuscula ambiant: & seminum congeries aspera relinquitur. folia etiam herbæ ferē similia uidentur, in plerisque speciebus. Flores colore differūt, & quod alii simplices, alii multiplices sint: aliqui benè magni, radix in plerisque crassa & tuberosa. Hæc ad picturas quas Kentmannus misit in Italia depictas notauit: nam ipsas uiuas nondum uidi. Putārim autem facile in nostro etiam cœlo prouenire ac durare posse. Audio & saporem plerisque acrem esse ut Ranunculis.

Anemones genera semina non proferre (fortē in horto Patauino) amicus quidam Patauio ad me scripsit.

Anemonis adnumerādis uidetur Ranunculus ille phragmites, hoc est, qui passim inter sapes crescit, radice transuersa, paruus, flore albo, uel roseo: audio & luteo inueniri. Dodonæus quartum hoc Ranunculi generis facit, G. Kentmannus inter

Aae.

Anemonas genus unum flore rubro phragmitis istis simillimum, depictum nobis communicauit.

Anemone quædam uideri potest etiam illa herba, quam Itali uulgò Pulsatillum nominant: Germani *Ruchenschell*, Matthiolus diuersi omnino generis facit. Dodonæus Ranunculum secundum, uel herbam Sardoam, C. Christoph. Piperinus, G. nascitur sponte in collibus siccis & apricis: ut ultra Schaphusiam in Rando monte. Heluetii quidam *Wigwurz*, id est radicem contra morsus uenenatos utilē appellant: & similes ei plantas, quæ in montibus altioribus Valchiæ alibiq; nascuntur, propter globos cana lanugine insignes, quibus semen subest, *Græue Bergmännle* Græce *ἀγρυπνίας* dixeris: horum alii albo, alii luteo colore inueniuntur.

Anemone montana quædam forsitan & illa fuerit, luteo & in globum collecto flore, quam Aconitis à quibusdam annumerari (immeritò nimirum) suprà diximus, &c. caret huius flos calyce, ut in plerisque aliis Anemonis, ni fallor.

Anemone quædam, aut uerius Chamæmalum rubrum. Vide Chamæmalum Eranthemum.

Anemone limonia Theophrasti, Narcissis uulgò dictis cognata uidetur: ea nimirum aut similis, quam nostri Lilia diuæ Virginis uocant: *Unser Fräwen Gilgen*. G. Sponte natam inueniri puto in pratis quibusdam montanis. Olim etiam Leontopetalum, aliqui Anemonem uocabant: uide infri.

Anethum G.

Angelica uulgò apud Germanos dicta: Laser Gallicum quibusdam, Silphio ueterum cognata planta. R. G. In hortis diuersis Germaniæ colitur: sed nusquam copiosius & felicius quàm in hortis monachorum quorundam Friburgi. Sponte nascitur in Pomerania, ut audio, & aliis quibusdam oris, Germaniæ aut Scandiæ, non procul Oceano. Seritur hoc modo: Semen per noctem in aqua pura præmaceratum, bono & nigro solo cõmittatur, ita ut digiti crassamento terra occludatur, idq; circa sancti Martini diem, sic satum uerno tempore emicabit apii satui similitudine, has plantas in nouilunio Maii mensis euulsas ordine panges, ita ut distent undici quæq; pedē aut sesquipedem, sub annum quartum, id est exacto triennio (nā quartum anni æstate caulem, flores & semina producit, & postea lignescit) radicem exemplam lauato aqua pura, & in hypocaufto diligenter sicca: secus enim facili situm trahit, utpote crassa: & loco sicco reponet: sic diu seruiatur.

Angelica aquatica, ferulacea herba, hortenli similis, G. circa riuos sponte crescit, & restibilis: fecunditate durat.

Anguria uera, O. Cardanus Melopeponem interpretatur. Vide in M.

Anisum G.R.

Anthyllis pulchra & rara, lanuginoso folio, K. Vide Alcali.

Anthirini species quædam, G. floribus aliæ luteis, aliæ albis, rubris, roseis, O. K. AE. Maius & minus, utrumq; flore purpureo. Vu. Quædam istarum apud nos sponte proueniunt.

Anthirinum minus, Germanis *Stant*/O. sed aliud est *Stant* Hieronymi Tragi.

Antoniana, uel S. Antonii herba: aliqui filios ante patrem uocant, alii *Lychnides*. G. Species sunt tres aut quatuor, quarum minor à nostris *Schoßkraut* uocatur: quoniam impetus dolorū, præserim dentium, sedare creditur, alia maior est, hirsuta herba, alba, & inuenturarior & rursus alia maior, læuis ut etiam reliquæ, leuiter odorata. His similis est maxima, non omnino tamen eiusdem generis, foliis Rododaphnen referens, &c. Omnes apud nos ad riuorum aut fossarum aquas continentium, margines crescunt, omnes etiam in hortis facili: sed cæteræ breuius, maxima diutissime durat, & longo quotannis tempore perpulchrè floret. G.

Antora, uel herba trinitatis, AE. Lege inter Violas, Italiam trinitatis herbam uocant, quam alii Hepaticam nobilem, à folio trifido. Antora etiam,

uel potius Antitiora, uera, diuersa est herba, quæ in alpinis Sabaudia Italiaeque fodiuntur: Aconitis cognata, radicibus bulbosis, aut exiguum Naporum specie, amarum: flore Aconiti Lycoctoni specie & figura, colore etiam luteo, foliis minoribus & minutius sectis, pingit eam Matthiolus Antore & Napelli Moyfi nomine. Vide superius inter Aconita.

Ap.

Aphaca, quære in Vicia.

Apios uera, folio ruta, AE.

Apium commune, uel mas Plinii, ut quidam coniciunt, quod uulgo non recte Petroselinum uocant, uix ulli usquam horto deest.

Apium etiam communis uitium, quod à nitore Glyssen appellat nostri, uulgarius est areis hortorum, quam olitores uellent: cum & inutilis herba, & foetida sit, & forte non sine ueneno, quo ad Cicutam, accedere uidetur.

Apium palustre, circa paludes maritimas Monspelii alibi frequens: pharmacopolis hactenus simpliciter pro Apio in usu fuit: eoque in hortos translatum nusquam deest, & restitubili fecunditate seipsum multiplicat. Hoc aliqui apium foeminam Plinii esse putant.

Apium montanum, id est, Oreoselinum, petroselino uulgari per simile specie saporeque nascitur in colle primo iuxta Rhenum, horæ ferè supra Basileam itinere ad sinistram, superficie simillimum illi quam uocant Ceruariam radicem nigram Germani: (quam, si libet, Oreoselinum nigrum uocemus, donec antiquum eius nomen reuocetur) sed hæc lacte caret, Oreoselinum lacteo liquore manat. Nascitur inter collem quem dixi, & Rhenum, in radice collis ad uiam. Reperi & alibi locis asperis, lapidosis, montanis, apricis: non multis tamen. Hoc nondum in hortum transiit.

Apium montani genus aliud amarum, ex Legerio monte ad Badam nostram, G. A.

Radix una multis annis durat. Ad remedia quidem, & pro Oreoselino ueterum, prædicto uti malim.

Oreoselina duo priora, enopa, quod liquore resinoso imbuta sint: hoc anopum, quod eodem careat, si libet, nuncupemus: sicut ἑγχυλον & ἀγχυλον Græci dicunt: et ἑννοπον & ἄννοπον in usu non sunt.

Apocynum, K. Vide in Asclepiade.

Apocynum Itali Lupinum caninum uocant, & Hispani similiter sua lingua, ut scribit Amatus Lusitanus: sed uir quidam eruditus Apocyni semina in Italia non reperiri ad me scripsit.

Aq.

Aquifolium R. Niciis aquifoliae genus intelligo, quod nostri Palmam aculeatam uocant, *Stechender palmen*. Ea passim nobis in syluis nascitur, fruticosa plerumque, aliquando arborecens, margine folii spinoso. Est & alia species laui folio, extremitate solum acuminata: procerior, siue natura, siue cultu, aut temporis diuturnitate. Hanc in cœnobii aliquot uidi: Lutecia ad D. Genouesam: & Basileæ in suburbio D. Ioannis, &c. iuxta arboris magnitudine. Extat etiam Curia in cœnobio quod fuit Dominicanorum, pedes alta circiter triginta: trunco ad medium arboris uel uli, tereti, enodi, planeque laui: crassamento trium dodrantum. Hoc etiam genus syluestre non procul Lucerna apud nos reperiri audio.

Aquileia uulgo dicta, forte quasi Aquilina, à floribus in mucrones aduncos, quales aquilini ungues sunt exeuntibus. Sponte hæc nascitur in collibus apricis, flore cœruleo, & species alia spadiceis colore. Inde in hortos translata, multiplici flore passim à mulierculis aluntur: & insuper tertia flore albo, quam syluestrem nondum uidimus. In montibus altis memini speciem unam flore duplo maiore reperisse G. Vu. De hac sensi se Columellam suspicari in Horto, — & hiantes squalonis Oraferi. Græcè Leonrostomium dixeris. In Italia, ni fallor, alicubi hodieque à quadam cū hiant Leonis rictu similitudine denominant.

Arachus,

Ar.

Arachus. Vide in Vicia.

Aralda. Quære Digitalis.

Arbor ludæ, C.K. Galli Gueynier appellant, uel Geinier. Pingitur hæc à Dodonæo. Videtur autem (inquit is) uel Laburnum, uel eius species. Sunt qui sentiant Theophrasti Colyteam esse sic ille. Ego quamquam siliquata hæc arbor est, Laburno tamen Colytea plurimum differre sentio, an uerò sit Cercis Theophrasti, considerandū. Sponte provenit, ut audio, in Gallia Narbonensi, & circa Montepeliū, siliqua punicea, folio ferè Populi. Mihi etiā hoc anno è semine prognata est. Eadem est fortè de qua Ruellius scribit hæc uerbis: Ostenditur apud nos in cortibus arbor Sycomori (ut aiunt) nomine, frondosa, Moro nō dissimilis, conspectu, folio, magnitudine, sed neq̃ germinibus, neq̃ ramis quicquā provenire deprehendimus: nisi quippiam ineunte uere cum parturit, ueluti nucamentum prælongum. Fructum foliacea siliqua, inflexu ferè falcato, gerit. Sed scalptu uulnerata nihil remittit lactis, cum uera Sycomorus estate multa lactea sateat salua. Sic ille. Sed hæc fortè, ut quidam putant, Aceris species est. Arbor ludæ, ni fallor, plerumq̃ siliquas rectas fert, non falcatas: nec nucamentum, sed, ut Dodonæus pingit, florem quasi leguminis, uel ut Anagyris, quam obrem accuratius hæc perpendent, qui arbores istas Lutecia uiderint. Carolus Stephanus in Seminario suo: Visa est (inquit) nobis Sycomorus Parisiis in horto Gotofredi cuiusdam pharmacopolæ, diligentissimi herbarum & arborum, quæ apud nos rariores sunt, indagatoris & cultoris. Sed forsitan hic etiam non de uera (quæ Hierosolymis uulgò ficus Pharaonis appellatur) sed uulgò illic dicta Sycomoro loquitur. Aliam Itali uulgò Sycomorum uocant: de qua dicemus infra in Azadaracht. Arbor ludæ, Cucuuia in Observationibus Bellonii. Ceratia syluestris quibusdam hodie. Gaynera (Gainier uel Guainier) Gallis, à similitudine uaginæ. Carobaria Italica, quanquam idem nomen putato Ceratonius magis propriè tribuunt. Nascitur circa Bononiam copiose: floribus rubris, ut audio, pulcherrimis. Semina eius uix maturescunt. Videtur autem Cercis Theophrasti esse. Arbuscula syluestris Cerasi foliis, fructu uirgæ sanguineæ ferè: floribus multis, oblongo ceu racemo dependentibus, foliis ferè Persici foliorum sapor est. G. nominè Germanico quidem nota uulgò, quanquam non procul urbe nostra iuxta Silura torrentem & ad sæpes aliquas proveniat, sui omnino generis. Arborem uitæ à quibusdam uocari, Lutecia reuertens nuper amicus quidam mihi retulit: cuius ramulū ostendebat, ex America translata dicens: & in hoc quodam Lutecia à Petro Bellonio sibi demonstratam, quatuor cubitorum longitudine. Sabinæ genus, quā quidā Bruton esse uolunt, simillima Cupresso: sed hac cā fert dissimilem, odoratam tamen ac nigriorem, folia saluam olent, &c. Meminit Cardanus lib. 6. de uarietate.

Arbutus C. frutex qui fructus fragis simillimos producit, syluestris in Germania nullus: sylvæ Gallia Narbonensis & Italiae familiaris.

Argemone altera, uulgò Potentilla, Genferich/G. Sponte passim obuia est.

Argentaria petraea, è saxis uel locis saxosis montium nostrorum in hortu translata, quo uis loco facillimè diutissimeq̃ uiuet. Videtur autem species herbe Stellæ à quibusdam dictæ ob radiatam foliorum speciem, Bergsinnaw/Steinsinnaw/color foliorum argenteus est, corymbi flosculorum lutei. G.

Arisari duæ species, K. Hocaliqui Aron minus uocant.

Aristolochia diuersæ sunt. Rotunda, A. Longa & rotunda, K. R.C. Vu, & Leuschnerus. Pistolochia C.D. Nascuntur tres istæ species in Gallia Narbonensi incultæ: Germanis omnes, ni fallor, peregrinæ. ego omnium semina aliquoties frustra seui. Clematiti tantum in hortis nostris uisitur: quæ & sua sponte, ut audio, nascitur in uineis Asiae: ubi longa etiam an reperiatur inquirendum est.

Aristolochia rotunda vulgaris, (quam uulgò radicem cauam nuncupant, **Holwurz**: quamuis & altera eius species solida reperitur) genus unum flore purpureo, alterum albo, G. Faciunt hanc aliqui *Capnium*, id est *Fumariam phragmiten Aëti*: & alteram quoque eius speciem ostendunt radice oblonga, quæ *Capnus* uel *Pedes gallinacei* Plinii sit.

Aron uel Arum, G. R. nascitur passim locis umbrosis & pinguibus, ut circa sepes. Maius & minus, O. Vide *Arisarum*.

Aron palustre, C. est autem opinor, *Dracunculus* Plinii tertius à *Fuchsio* exhibitus.

Aron Aegyptium eruditiores quidam, ut *Guilandinus* & *Maranta*, esse docent: quod aliqui nuper pro *Colocasia* habuerunt. Hæc in Aegypto, nec non in Sicilia (ut audio, inquit *Maranta*) perfectissime crescit. in Italia uero neque semen, neque florem, neque etiam caulem unquam (quamuis diuersis locis confita à multis sit) uel cerè rarò proferre est uisa. est autem omnino species *Ari*, quod ex foliis constat, & (magis) flore: qui præter magnitudinem, nullam ab *Ari* flore dissimilitudinem habet. Hæc ille. *Dioscorides* *Aron*, à Cypriis *Colocasion* dici tradit. Hanc plantam *Augustæ* dum hæc conderemus, amplissimus uir *Vdalicus Fuggerus* in magnifico horto suo *Augustæ* habebat. Facile quidem semine prouenire aiunt. *Mathioli*us, qui hanc solum Aegyptiam existimauit, facile (inquit) in quibusdam hortis *Veneris* & *Neapoli* crescit, quamuis non in aqua.

Artemisia G. Species eius duæ, F. Passim apud nos in agris (in aquosis, incultis asperisque locis, ut *Fuchsius* scribit) *Artemisia* nascitur, frutice una candido: altera rubicundo, quæ à medicis præfertur. Vide supra in *Ambrosia*, & infra in *Erigeronte* scetido. His diebus uidi matronam quandam carbones circa radicem *Artemisie* legere, pridie festi diui *Ioannis* in ipso undecimæ horæ signo, in meridie: prius enim & posterius nullos aut minutissimos reperiri aiebat, comitialis morbi amuletum. Superstitio.

Artemisia Leptophyllos quædam, circa *Basileam* sponte nascens, G.

Arthritica, *Primula ueris*, herba ad *Paralyfin*, herba *Petri Nicolai* *Myrepso*, *Schlüsßblümle* uulgò. Species eius diuersæ in horto mihi proueniunt. Una, quæ in fine hyemis erumpit, pallidior, minus odorata, alia uero, magis colorata & odoratior, quæ uere floret. huius etiam genus *dasypodium*, seu densi folium habeo, quod semen non fert. Vtræque in pratis humidis circa urbem nostram abundat, & diu in hortis manet. Minor uero illa quæ cœruleis flosculis in pratis multò humidioribus reperitur, breui in hortis euanescit. *Arthriticam* aliqui *Verbasculum odoratum* uocant, nescio quam rectè. Genus eius odoratum flore multiplici & florenti C. alit. Circa *Curiam Rhetorum* nascitur species peculiaris, flore singulari, non in corymbis: quæ *Ioan. Fabricius* *Ecclesiæ* illic minister doctissimus ad me misit cū aliis plantis multis & raris.

Arthritice præterea genus est alpinum, quod *Sabaudi* quidam *Lunariam* nominant: nostri à rupibus flores petreos, *Glüßblümle*/suauissimi odoris, & uiuacissimum in hortis, aliqui hanc *Saniculam alpinam*, alii *Auriculam ursi* nominant. Eiusdem species alia, minor, floribus purpureis, alius in alpibus nascitur: eam hoc anno plantaui, ut quantum duret experiar. conficio autem minus duraturam, utpote altiori cœlo affuetam. Inueniuntur & aliæ florum in montibus differentię. *Arthritice* alpinæ stirpes floribus diuersis, A. candidis, pallidis, rubeis, luteis, aurei coloris, cœruleis, diuersi coloris, guttatis, fuscis seu cinereis, *Christoph. Piperinus*. Vidi huius generis flores etiam albos (inquit *Aretius* in epistola ad me) & aquei diluti coloris, sanguineos: in luteis magna est differentia, prout magis soli expositi sunt, uel à niue conteguntur.

Arüdo (uel *Harüdo*) magna textoribus expetita, A. Radix una (inquit) ad me missa,

sa, diffundit se in multiplices arundines. Lausanne alibiq; in hortis Sabaudiae colitur: gemmis seu tuberculis radicum avulsis plantari solet.

Arundo alia in aquaticis tantum nascitur, ut Donax: sed multum praefertur quae in siccis provenit, Plinius. Lege Canna.
Arundo humilis, Vide Copia.

As.

Asarum uiuacissimum est in hortis, G. Sponte provenit in locis quibusdam opacis, in collibus non procul Basilea, & supra Tigurinum lacum, non procul Limago fluuii, alibiq;. Speciem eius diuersam, maiorem (si bene memini) circa Eremum diuæ Virginis in agro Suitensium reperiri aiunt quidam, nescio quam uerè.

Asclepias, id est, Hirundinaria uulgò dicta, ut pleriq; existimant, R. G. C. Locis asperis, circa pedes montium praefertim, sponte abundat. Cognata herba apocyno: hoc aliqui in Italia colunt. ex Aegypto (ubi hodieq; Amphocynon uocant) allatum, siliquis, & in eis lanugine, persimile Hirundinariae, rotundioribus foliis.

Aicyroides, Androsæmon maius, G. Collibus & pratis sua sponte familiare, siccioribus praefertim; uel, ut Dodonæus scribit, locis asperis, circa saxpes & syluas. Aspalathus. Aretio ex enatis è semine plantis duabus, una in horto relicta, hys me perit; altera in hypogeo seruata est, & postea floruit. In Gallia Narbonensi sponte nascitur. Matthiolus hunc fruticem pro Acacia secunda pinxit: sed uidetur potius Aspalathus secundus, ut doctissimus Maranta monet. Passim (inquit) Neapoli & Puteolis uisitur ueris initio luteum florem genistæ similem proferre, siliquis pilosis aurei coloris, splendentibus. & uulgò quidem Spalatrone dicitur, sicut & in Graecia hodieq; Spalatro.

Asparagus G. R. Maior & minor, O.

Asphodelus, Haftula regia, herba Germaniae peregrina, R. Vu. G. Satus à me, aliquot tantum folia emisit intra biennium: nunc tertio anno quamuis multa folia habeat, caulem nondum ostendit. Occulit se aliquando, sub Cane praefertim, ut in teriisse uideatur. Vide supra in Acantho. Asphodeli floribus diuersis: albus & luteus: luteus, in horto Zuvinggeri Basileæ. O. K. C. Asphodelus annuus, C. Asphodeli omnes propriè dicti Germaniae hactenus peregrini fuerunt. In Prouincia Galliae, & Italia sua sponte abundant.

Asphodelus foemina C. Hunc esse puto quem Dodonæus pingit, radice una, bulbosa, &c. qui fortè Bulbus potius fuerit.

Asphodeli species (ni fallor) duæ peregrinae, foliis diuersis, multis similiter ab una radice: quæ in una specie lutea & oblonga est, in altera breuior, fibrata inferius, &c. G.

Asplenus, Ceterach uulgò, K. G. A. K. AE. & Rurpodius. Duobus aut tribus annis in horto mihi durauit, in muri fissura plantatum. Sponte in Sabaudia nascens uidit: reperitur & in Vallesia non procul Seduno: & ut audio, alicubi ad Rhenum Germaniae flumen, in montibus & muris pagorum.

Aster Atticus uerus, flore luteo, foliis circa ipsum in aculeos exeuntibus, Vu. Monspelii sponte natus abundat.

Aster Atticus, (Fuchsi nimirum,) AE. Nascitur passim locis siccis, asperis, & apricis.

Astragalus duplex, AE.

Astrantia uulgò dicta, uel imperatoria, Astrenz/Weisserwurz. Laspitium Gallicum quibusdam, G. Viuacissima in hortis: in alpium nostrorum atris & praeruptis locis spontanea.

Astrantia nigra uulgò dicta, Schwarz Astrenz oder Witterwurz, radice nigra, Astracæ simpliciter dictæ cognata figura & liquore luteo. G. Fuchsius Saniculae sem. facit, quod non laudo. in montibus sponte provenit: in hortis bene durat. Dodonæus hunc uerum Elleborum nigrum Dioscoridis esse putat: sed fallitur.

Atractylis media, K. Cardui quoddam genus collibus siccis & apricis apud nos nascitur, quod multi *Atractylidem* putarunt. ea pingitur à Fuchio: qui etiam Carduum benedictum uulgo nominatum, *Atractylidem* hirsutiorcm appellat.

Atriplex alba & rubra, G.

Atriplex sylvestris exilit apud nos passim ad uias et parietes, sicut *Basileg* alibiq; etiam alia species impudico uel putris gari odore insignis, *Garosmen* dixeris.

Auellanæ, id est, Coryli fructus, syluestres in scæpibus & syluis præsertim humidioribus locis, copiose nobis nascuntur: minores, albiore, rotundioresq;. *Urbanæ* oblongæ & rubicundæ sunt, Lombardicæ aliqui cognominant, G. Vu. *Urbanas* & rotundas etiam satis magnas in Sabaudia uidi, ut *Lausannæ*, in arboribus etiam proceris nascentes. Circa Lugdunum hoc genus abundat, fructu duplo ad syluestrem. Coryli urbani atque scenis opere topiario texendis, & in altum etiam eleuandis conueniunt: tales in Gallia, Biturigibus præcipue, construunt. Corylus Macedonica describitur à Cordo, cuius nuces in grandem racemum congerantur.

Az.

Azadaracht Auicennæ, Ae. C. Meminit arboris hoc nomine *Auicennalib.* tract. 2. cap. 17. & tursus cap. 750. ubi *Zerindaracht* nominat: ab aliis arborem *Myrobalanorum* uocari scribit: eamque magnam esse: fructum uenenosum esse suspicatur, similem *Nabach*: in Syria *Nabach* uel *Alnabac* uocatur fructus magnitudine *Sebesten*, uel paulo minor: sapore pontico, dulci, ut tradit *Bellunensis*. Hanc arborem hodie in multis Italiæ hortis, Monachi præsertim ferunt & falsò *Sycomororum* nominant, ut *Bellunensis* docet. Porro *Sedar Arabicè* *Lotus* arbor est, apud *Serapionem*, *Auicennam* & *Rasim*, cuius fructum *Nabach* appellant, ut *Monachi Mesuæi* interpretes coniiciunt. adduntque sibi uideri eam arborem esse. quæ aliter *Faba Græca*, uel (ut *Seruius* habet) *Syriaca* dicatur, uulgo autem *Romæ* *Pulsaraca*, quasi *Puls Syriaca*, uel (ut *Hermolaus* docet) *Bacca Syriaca*, in Sicilia uerò *Faba inuersa*. Ergo si *Zedar Lotus* est, *Azadaracht* autem similem ei fructum habet, sic fortè dicta fuerit quasi *Zedaracht*, i. *Zedarago*, uel *Loraster*. *Lori* quidè arborescens sunt, &c. *Azadaracht* arborem *Bellonius* *Siliquam* nominat, quod mireris, cum *baccas*, non *siliquas* ferat. Lignum in eius fructu durissimum est, sexangulum (si benè memini) ut *Myrobalani Belliicæ*, in co semina aliquot continentur. Eruditi quidam *Sebastum*, seu *Myxum* albam nuncupant: alii, ut audio, *Laurum Græcum* *Plinii*. Hæc & mihi & A. è semine produnt: sed meam iam dodrantalem, *Sphondyli* erosa radice, perdidit. *Argenting* in *Obrechtii* medici horto duos aut tres pedes longam uidi. Hyeme reponi debet sub tectum. *Bellonii* cura *Lutecæ*, aliquot huius arboris plantæ spectari nuper ceperunt. Germanicè, si libet, appelleretur, ein *Pater noster baum*: quoniã & mulierculæ in Italia sic nominant, eò quòd ossa fructuum ad preces numerandas filo trafriciantur. Alia est quæ in Gallia hortis uulgo *Sycomorus* dicitur: de qua diximus supra in arbore ludæ.

Ba.

Baccharis Monspelii existimata falsò, A. Est autem *Coryzis* cognata herba. Primo anno (inquit A.) diffunditur in folia: altero demum caulem & flores profert: inde tota planta perit. hyemem facillè fert. Folium *Verbasci* habet, multis adnatis et appendicibus. Caulis est cubitalis. Floribus & radice, immò undiq; odorata est.

Balsamine uulgo dicta, peregrina planta, & nuper cognita, nescio undè allata prium: foliis oblongis, *Salicis* fere, simplicibus, crenatis, herbæ *Noli me tangere* cognata, ut suspicor. Hanc nuper *Basileæ* & *Argenting* lulii initio in hortis aliquot pulchre florentem uidi flore rubro in calcar fere desinente. Aliqui *Balsaminū* hanc genere neutro uocant: & sceminam cognominant, ut eam quæ sequitur, marem: quod non admodum probo, cum toto genere differant. Hoc anno mihi etiam copiose nascitur. Herba est annua, succi plena, & facillime provenit.

Balsa-

Balsamine alia, quæ Garancia quasi Charancia, uulgo Gallis dicitur, ab aliis mirabile Pomum, Hierosolymitanum Hetruscis, Italis Viticella, Momordica, Garanza, foliis Bryoniae, pomo flauescente, amplexicaule, &c. C. G. sed difficulter nobis prouenit, & uix maturefcit. Balsamine utraq; Basileæ in horto Cælii Curionis per-eleganti & benè instructo. Balsamine quomodo colenda sit, leges intra in epistola Massarii ad me. Fert poma admodum egregia & uisum oblectantia: quæ dum ma-tura sunt, sese miraculo quodam naturæ aperiunt: ostenduntq; semina, ueluti pre-ciosissimis quibusdam smaragdis similia. Carolus Stephanus.

Barba caprina ab Hieron. Trago dicta, G. frutex (uel potius herba fruticosa) æ-stiuus; hyeme enim superficiem amittit, radice magna, ualida. annis quàm plurimis durat in hortulo meo. Luxuriatur in syluis nostris passim. Vide in Christopho-riana. Tragus etiam Vlmariam quorundam Barbam capræ nominat. Alia est Barba caprina minor inferioribus Germanis, nempe Saxifragalutea aliorum. hanc enim (Christophorianam dico) Barbam cap. maiorem, & Reginam prati uoci-sant.

Barba hircina. Vide Tragopogon.

Barba Iouis Plinii, G. arbuscula Terebintho cognata. Sponte circa Verbanum nascitur, coriariis in usu. fortè Coccygia Theophr.

S. Barbaræ herba, Carpentaria Gallis uulgo dicta, aliquibus Scoparegia, no-stris *Käbberesch*. G. Crescit quidem & sponte sua inter uineas, & locis arenosis cir-ca aquas.

Basilicum, Lege Ocimum.

Batis quære Crithmus.

Be.

Been album, O. nimirum Polemonium nostrum intelligens, quod passim apud nos nascitur. Lege Ocimoides.

Been rubrum, herba maritima, Limonio seu Bistortæ cognata, G. iam quinto aut sexto anno in horto meo durant plantæ duæ è semine natae, sed neutra in caulè exit, nec florem edidit: maris fortè assilatum desiderant. Haud scio idè ne hoc an aliud Been rubrum O. in horto sibi natum intelligat. Vide Ocimoides.

Belle uidere, (Bel uedere) uulgo Italis dicta herba, quod bellè densissimeq; fruti-cet, uireatq; per æstatem, non solum in hortis & uiridariis sata, sed etiam in fictili-bus, ornandi fenestras gratia, ut scribit Matthiolus. Aliqui Scopariam uocant, (alii herbam studiosorum) & Osyrin esse existimant: sed obstat illis multitudo folioru: & quod amara non sit. Osyridi enim amaritudinem tribuit Galenus, &c. G. Ger-mani inferiores quidam Campanulam cæruleam (de qua infra) Belle uidere nun-cupant.

Bellis (Consolida recentioribus, nimis communi nomine) syluestris: maior, quæ in pratis emicat: media, circa syluas, cæteris rarior: minor, in collibus & alibi passim. Eadem minor in hortis colitur floribus multipliciter densis, albis, uel rur-bis, uel mixti coloris, G.

Benedicta. Quære Geum.

Berberis G. R. *Erbselen*. Passim circa syluas nostras abundat.

Betæ quatuor species, nimirum alba, nigra, seu rubra duplex & flaua: qui co-lores ad radices præcipuè pertinent. O. G. *Roter weisser / vnnd gälber Mang-golt vnnd Beyersche rüble / oder rote Salarwurz*. Postremam hanc Seute-lostaphylum dixerim, *Rübenmangolt*. In Syriæ hortis appellatur Suandar: & ab Ebenbitar numeratur in specie raporum, &c. Eadem, sicut relatum est à fide di-gnis, oritur in Macedonia circa ciuitates Durachii & Alexii, in locis campestribus, &c. Bellunenſis in glossis Auicennæ in Sidæ nigræ mentionem facit.

Betonica, quæ sponte circa syluas ui-ret, in hortis etiam benè durat, G.

Betonica Aeginetæ, secundum Guil. Turnerum. Locis ferè cultis, ut areis horto-rum, sponte prouenit, pulegio similis, sed insipida & inodora, G.

Betonica diuersi generis, cuius flores ab odore uulgò Cariophyllos nominant. Vetonicae nomine dicitur in V.

Bl.

Blattaria cum Verbascis est.

Blitum syluestre & satium, utrumq; tum album tum rubrum.

Blitum maculosum, foliis ceu Amaranti maioris, C. G.

Blitum peregrinum Corchoro cognatum dixerim. Sunt qui Theombrotium Plinii uocent.

Bliti syluestris alia species, foliis subrotundis, in summo retusis, Corchorus forte, G. Hoc etiam sua sponte locis cultis apud nos inuenitur.

Blitum Indicum uel Topiarium. Nuper ex Indiis allata est planta, cui à similitudine foliorum Blitum Topiarium nomen imposuimus. Nullo enim nomine eam accepimus. Habet hæc folia Betae, siue, quod idem est, Bliti, (confundunt) sed ualde rubentia, planè ut Beta rubra. Caules emittit plures, pollicis crassitudine, teretes, cocci seu rubro colore, quindecim aut amplius cubitorum longitudine, ut in nostro Arae coeli conuentu uidimus. Semen producit in racemulis Coriandro noto simile, obnigrum, &c. Sapore & odore etiam æmulatur Blitum, Monachi Romani interpretes Mesuæi.

Bo.

Borrago floribus cœruleis nusquam deest in hortis, R. etiam albis floribus habetur: quam ego quoq; Argentinae uidisse memini.

Botrys, quæ semine maturo ferè myrrham redolet, R. G. facillimè crescit, & restibili fecunditate seipsam profeminat.

Br.

Brassica candida, rubra, crispa, capitata, G.

Brassica marina, uulgò Soldanella, K. O. A. G. hyemem apud nos asperiores non bene fert: diuum aut trium annorum in meo horto plantæ nondum floruerunt. Hæc me fere perit, nisi in uasis seruetur. Nascitur in litore maris, tum mediterranei, tum Oceani, in ora Selandiæ & Flandriæ abundè. *Wœrwinde*: maritima, non marina.

Brassicarum differentia nobis notæ sunt hæc: Alba, nigra, crispa, thyrsuta, & rubra, quæ non multum differt à nigra, ita ut sæpius una in alteram mutetur, quod olitores testantur. Item capitata. Et genus quod à Syria desertur, Canabit seu Canauit uulgò dictum, à Pandectario Caulis imperialis, Monachi Romani in Mesuen. Puto autem eos Thyrsutam (sic ipsi loquuntur) appellare, genus illud cuius meminit Matthiolus tanquam ueteribus ignoti, cuius caulis (inquit) rapum in morem extuberat, manditurq; subinde medulla, pingui iure incocta, Raporum modo. Sed nec illius, inquit, uidentur meminisse ueteres quæ foliis admodum per ambitum laciniatis minutimq; intercisilis assurgit. Caulorapum uidimus, hæc est Cinnum duplicis naturæ, ex caule, id est Brassica & Rapo. Sed Brassicæ radix sub terra condita fuit: Rapum supra terram in stipite turgescerebat, Scaliger. Brassica hortensis ubi nam sponte nascatur, nescio, ea quidem quæ à medicis dicitur syluestris, succum asperum habet & alium purgat, ut scribit Theophrastus. Marina etiam toto genere differt, nec aliud quàm nomen commune habet.

Britannica. Vide in Cochlearia.

Bryonia. Quære Vitis alba.

Bulborach. Quære Lanaria.

Buglossus minor, uel communis: & Italica, uel Gallica, maior, R. G. Ac:

Buglossus uera, O.

Bulbine, flore cœruleo, pulchro: *Blawe Wœien rysle*/G. K. Aliqui Hyacinthis adnumerant, ut Tragus Hyacinthum uernum exiguum nominans.

Bulbocastani è Chio radicem misit ad me Patauio Melchior Guilandinus: quæ cum terræ mandata à me folia pauca, exilia & multifida ostendisset, paulò post interit, Vide Bunium.

Bulbus

Bulbus, F.

Bulbus sylvestris quidam, bifolius, cœruleis flosculis, Hyacinthi species, ut multi putant, G. Alius bifolius, flosculis luteis, stellatis, radice grata & suavi, nascitur circa Kiburgum arcem agri Tigurini, G. Vterq; ætate se occultat.

Bunium Dodonæi, uerius Bulbocastanum, de quo proxime diximus, C. Crescit multis in locis Hollandiæ & Selandiæ inter segetes, & iuxta uias. Abundat etiam Angliis. Brabantii quidam in hortis colunt, Dodonæus. Mihi etiam iam per duos aut tres annos in horto floruit, incognitum, donec forte erutam radicem globosam uidi. Nunc media ætate latet, tanquam interierit.

Buphthalmus uera: flore ut Bellis maior, sed toto semine peramaro, G. Eiusdem altera species, flore partim candido, partim luteo, nullo alio discrimine, G. Vtriuscq; semina Monspelio accepimus, ubi sponte proueniunt. Herbæ sunt annuæ. Dodonæus non recte Buphthalmum facit herbam illam, qua pro Elleboro nigro quidam utitur, C. G. Vide infra in Elleboro nigro. Chrysanthemum Dioscoridis eandem esse Buphthalmo demonstrabimus infra.

Bupleurum Dodonæi utrumque, C. Maius quod aliqui Elaphobosum faciunt, Galli uulgo Gratiam Dei uocant: & minus, magnitudine tantum (ni fallor) differens. Maius circa Basileam sponte nascitur.

Bursa pastoris, *Teschletraut*, maior & minor, adeo ubiq; abundans & calcatur, ut in horto ferere nemo dignetur. Vide Thlaspi.

Buxus in plerisque laetioribus hortis alitur: tonderi ac topiario operi facilis, & perpetua uiriditate amœna, sylvestris in Sabaudia passim ad uias et sæpes occurrit.

Ca.

Cachrys, K. Intelligit autem puto Libanotidis speciem, cuius semen ueteres Cachryn appellabant.

Calamintha montana, O. G. Hæc cæteris acrior, collibus saxosis & apricis prouenit. In hortulo meo iuxta murum plantata uersus meridiem commodè crescit: ad tres annos durare puto.

Calamintha Italica Pulegioidore, acris. Pataulii sponte nascentem uidi, foliis subrotundis pilosis modicè & leuiter crenatis, mollibus.

Calamintha aruensis enoualibus, G.

Calamintha fluuiialis, rara, G. Circa Silum torrentem nostrum uno tantum loco inuenta.

Calaminthæ species, ut quidam putant, herba Catiuulgo dicta, Italis alicubi Nepeta, G. Ad tria uel quatuor miliaria supra Argentuinam, locis incultis crescit.

Calathianæ uiolæ autumnales, duorum aut trium generum in pratis montium: cultum detrectare mihi uidentur. Ex his quæ amaræ sunt & humidioribus pratis exeunt, ad Gentianæ genus pertinent, una profundioribus radiculis, cœrulei coloris saturati flore. alia minor undiquaque, flore nonnihil dilutior est: radice inutili. Tertia etiam inutili radice, calathis florum puniceis, multis confertisq; ad uias in collibus asperis exilit, subacris, &c.

Calathiana uerna dici potest uiolæ genus, quod equinum cognominant Sueui, Hippium Cordi. In pratis humidis nascitur, herba annua ut puto. In hortis non facile nascitur aut durat. Cum cespite plantata uere per ætatem forte durabit, G. Vide in Gentiana, potest autem Gentianula dulcis uocari.

Calendula uulgo dicta, flore simplici, & alia multiplici, G. Caltha hortensis. Circa Monspelium suæ spontis.

Caltha Africana. Vide flos Indicus.

Caltha palustris, ut sic appellem quæ a nostris *Mosßblümen*, id est, Flos palustris dicitur, floribus densis, G. Palustribus quidem locis simplici flore nascitur: aliqui Ferrariam uocant, forte quod folium ferream equi solem uideatur referre.

Caltha alpina uocatur, herba radice acris & aromatica, flore Calthæ aureo, sterutamenta ciente foliis Plantaginis. Nascitur in summis montium pratis copiose. Aliqui Doronicis non recte adnumerant. *Mitterwurz* K k iiii

Campana Lazura Italica dicta. Vide *Conuoluulus cœruleus*.

Campanula cœrulea C. sic autem uocat *Rapifyluestris*, quod *Rapunculum* uulgo dicunt, speciem minorem, eamq; in alias duas species subdiuidit, unam hortensem, quam aliqui *Belle* uidere nominant; aliam agrestem, iuxta sepes & in marginibus agrorum nascentem.

Canna Indica, *Basilica* in horto Theodori Zuuinggeri medici, mihi fata nō prouenit.

Capnus Plinii C. ea nimisrum quam *Dodonæus* pingit libro 1. Iconum suarum pag. 21. mihi adhuc incognita. Vide *Fumaria*.

Capparis, *Rurpodius*.

Caprifolium. Vide *Peridymenum*.

Capficum. Lege *Piper*.

Caput monachi in Gallia dictum: quod *Fuchsius* & alii *Solanum uellicarium peregrinum* uocant, G. mihi *Solani* genus non uidetur, cum acinos nullos gerat, nam *Acinos* ferre *Solani* generibus commune esse puto.

Cardamomum Arabicum. Lege *Piper*.

Cardopatium uulgo dictum (uel *Carlina*) nonnullis herbariis, genus est *Cardi* di, qui & sponte in montibus collibusq; nostris prouenit: *Eberwurz*. G. R. Eius differentia quædam sunt: à magnitudine, & floris colore, in aliis albo, aliis purpureo. Item caule, quo alia carent, alia habent. Ex his *Chamaeleo* albus uidetur, cui flos purpureus, caulis nullus. *Silybus* uero cui latior albiorq; spina (seu flos spinosus) est: isq; rursus uel cum caule, uel sine caule. In Baldo monte Italiae flore maximo pilei instar nasci audio. Ex eodem genere esse audio *Xinen spinam*, quæ *maistichen* in radice fundat, Hispanis cognitam, *Spanische Eberwurz*. Huius floris calycem, tum recentem, tum etiam siccum, noctu claudi, ad solem uero aperiri, nuper in hortulo meo miratus sum.

Carduus Benedictus G. in plurimis apud nos hortis ad remedia colitur. Hyemē benē fert, si autumnī principio (ni fallor) seratur: & lætior ita prouenit, quam uere satius. Vide in *Atractylide*.

Carduus hortēsis, *Scolymus*, *Cactus*, uel *Cinara*, uulgo *Artischa*: duplex, unus foliis spinosis, alter sine spinis, ut *Tragus* & *Dodonæus* pinxere, C. Vu. O. G. Carduos sine spinis nascituros pollicentur, si cacumina seminum confringantur. Id olim fabulosum existimabam: sed postquam *Lutecia* et in *Scotia* carduos omnes ferme sine spinis esse cernebam, non dubitauī fieri hoc posse. uerū sunt multo aculeatis insipidiores. Addunt, saporem semina in carduis ipsis quem combiberint, multum referre, *Cardanus*.

Carduus Mariæ uulgo dictus, foliis latis, maculis lacteis, G. nascitur autem sponte ubiq; aliqui *Silybum ueterum* putant, à quibus ego dissentio.

Carduus pratensis *Tragi*, qui passim in pratis humidis nascitur, G. fortē *Limosnia* *Theophrasti* G. ubi *Gaza* non rectē *Betam syluestrem* uertit.

Carlina. Vide *Cardopatium*.

Carus, *Caros*, uulgo *Carui*, in omnibus ferē pratis apud nos copiose crescit.

Caryophyllata. Vide *Geum*.

Caryophyllus Indicus uulgo dictus, flos, non aroma. Vide *Flos Ind.*

Cassia fistula seu *nigra*, *Alexandrina*, arbusculæ quinque seminibus mihi emicuerunt in uase hoc anno 1559. sed uix ultra digitum prouectæ, interierunt, fortē quod tardius seminārim. Initio hyemis semina in uasis domi terræ committenda putārim, &c. Est & in horto *Leuschneri* hæc arbor *Misena*, aut fuit, nescio quando dum aut quando iam. *Siliqua Indica* seu *Cassia* nostra iuxta aquas prouenit, aut aquam subesse indicat, *Cardanus*.

Cassytas Plinii uel *Theophrasti*, O. Ego *Cuscutam* uulgo dictam, *Cassytam* uel *Linosymon* nomino, herbam ubiq; uulgarē, & quæ cum radice careat, feri coliq; non possit.

Castanea,

Castanea, Vu. Eaprouenit syluestris, nemoroso & saxoso solo, ut circa lacum Verbanum Italiae, & Lemanum Sabaudiae, & alibi. Apud nos perpaucæ habentur, plantatæ nimirum olim. Mihi hoc anno arbuscula maioris Castanearum generis e glande prouenit.

Catanance Dodonæi, herba mihi ignota, C.

Caucalis Dodonæi, C. uidetur autem herba quædam aruenfis, & uulgaris ubique, Daucorum generi cognata, seminibus magnis & hirsutis admodum: floribus albis, & similibus Caulicidi Bellonii, nempe in ambitu maioribus.

Caucalis, G. quæ in Helleponto hodie uulgò Græcis Cascalitra dicitur, quasi Caulicida ut Bellonius scribit, & herbam quoque pingit: cui sanè conuenit descriptio Dioscoridis, nisi quod folia eius extrema non sunt Fœniculi modo multifida. Itali quidam corrupto nomine Cazaopra uocant. Cruda in acetariis estur. Qui hoc Seseli Creticum putant, aut Tordylium ut Dodonæus, propter semen duplex clypeorum instar, falli putarim. Herba est annua, facillimè fata prouenit, & semen citò maturat in umbellis, margine eleganter crispo, &c.

Caules de Rapa, O. intelligens opinor Brassicæ aliquam speciem, uel ex Brassicæ & Rapi natura mixtam plantam. Vide in Brassica.

Ceanothus spina Theophrasto memorata, hoc est, Vua crispa uulgò dicta, (ut mihi quidem uidetur) passim apud nos obuia est, sepibus hortorum inprimis commoda: facillimè enim nascitur, dense fruticat & propagat seipsum: & spinis suis tractum prohibet: & acinis iucundi saporis placet. Huic cognatus est, tanquam altera eiusdem generis species, qui uulgò perperam Ribes appellatur frutex. is quia spinis caret, Ceanothus leuis dicatur, ille asper. Retulit nobis quidam Florentiæ se uidiisse Ribes uulgò dictum, acinis Auellana maioribus, acidissimi saporis: et alius quidam, se hunc fruticem tum rubris tum nigris acinis obseruasse. Ceanothum asperum nostrum Cardanus de uarietate rerum libro sexto Rocellam (malim Roncellam, seu diminutiuum à Ronce Gallico nomine Rubum significante) uocat. Rocella (inquit) humile arbutum est, folio angusto (mihi angustum non uidetur) actenui quasi uitis, spinosa, baccam ferens, quæ cum maturescit, uiridis & subflaua est, rotunda admodum, magnitudine Lupini, gustu ex dulci adstringente. Huius plantam uidi Diepæ in Gallia, quæ in arbusculam euaserat, & fructum Cerasi magnitudine ferebat. hæc cum ramosa atque frondosa esset, circumduxerant illi rete, atque ita auiculas in ea pulchro spectaculo nutriebant. Gaudet hic frutex regionibus frigidis, ideò plurimus in Gallia, estque uirens, salubris et gratus uisui. Ceanothi leuis genus syluestre, proceritate sesquicubiti, circa syluas quasdam ditionis Bernensium Helueticorum prouenit. Rustici Keozbeer uocant, quod tussi medeantur, G.

Cedrus minor, Cedrula uel Oxycedrus, Junipero similis, sed maioribus et rubentibus baccis, in callidis Galliae Italiaeque tractibus sponte nascitur. at Cedrus arbor conifera, in Libano monte Syriae nascens, in Europam, opinor, nondum transiuit. Oxycedrum Bellonius aliter Phœnicæ Cedrum nominat, eiusque speciem alteram in Gargano monte Calabriae nasci scribit: Lyciam uerò Cedrum pumilam, cui obata sunt folia, circa Massiliam affatim.

Centaurium maius, uulgò Rhaponticum, G. R. Et Rurpodius. Hoc duorum aut etiam plurium est generum: nam humilibus etiam locis & collibus, minores quædam eius species nascuntur, ut laceæ uulgò dictæ, in nullo ferè usu, quod radices minores, aut potius aridiores sint, &c. Pratenfis species minor est, & simplicibus foliis: collina maior, foliis dissectis, quædam in muris & asperis locis nascitur, ut circa Basileam. Montana uerò genera, & quæ Rhapontici nomine uulgo agnoscit, duo sunt: unum maioribus foliis, Lappathi aut Inulæ ferè. Hoc in montibus nostris, altioribus duntaxat, pingui solo luxuriatur, ut supra Glaronam. ubi suæ spontis est, semen maturat, quan-

quam frigidissimo coelo, & æstate breuissima: in hortis nostris durat quidem aliquantisper, & hoc etiam tempore in hortulo meo uiret, foliis ab una radice circiter uiginti, non ab uno tamen principio, sed triplici, subamaris, hircum olenibus, parte supina candidis, margine eminentibus punctis ruffis leuissime denticulato: sed caulem non fundit, tantum abest ut flores aut semen producat aut perficiat, K. G. Alterum foliis minoribus, iuglandis ferè, binis, inuicem oppositis, quod ex Italico semine in hortulo mihi exortum, semel aut iterum occultatum rediit, & biennio (ni fallor) expleto, perit. Nasctur in Italiæ montibus, ut Baldo circa Bergomum: & in Apulia, ubi in hortis etiam plantari solet, ut audio. hoc Dioscoridis descriptioni, quod ad folia magis conuenit: & radicem pingui durabiliq; succo imbutam habet: qui in nostro aquosus est, quam obrè breui siccata radix, exucca, rigida & baculi instar redditur. Nasctur hoc etiam Basileæ nunc in horto Zuuinggeri. Centaurium si in bonam ac pinguem terram sedatur, & compluatur rigeturque, qualitatem naturalem perdit, & uim suam amittit. Gaudet enim squalore, Plutarchus in libro De facie apparente in orbe Luna. uidetur autem sentire non quidem de Centaurio minore, quod locis humidis gaudet, sed maiore. Hoc enim in hortis plantare aliqui student, &c.

Centi morbia. Lege Nummularia.

Centonia, R. Santonicum Absinthii genus fortè intelligens: aut Centunculum, id est, Gnaphalium: uel potius Chamæcyparissum: quam Galli quidam, ni fallor, Centoniam uocant.

Cepæ rubræ et albæ G. Albarum semè nescio an peculiare, ex Italia quidam accersunt. Cepa Martica simplex à rusticis Vnio nominatur, Barbarus.

Cepæ nostris olitoribus et culinis (Coloniarum) quatuor speciebus distinguuntur. Optimæ habentur albilimæ & rotundæ, omnis mordacitatis expertes: mox oblongæ, cortice ruffo, uulgo Spanisch Vlch, siue Aiuyn, aut Zwiibel, quasi Hispanicam dicas. Acerrimæ experiuntur rubræ, rotundæ. Est & quarta, cuius radices super terram extuberant, candidæ, magnæ, dulces, caule procero: per cuius fastigium semen in orbem colligitur, paucis hortis familiaris. Bern. Desfennius.

Cepa sterilis, fissilis, uel Afcaloniam quorundam, uulgo Eschlauch, in plerisque hortis apud nos reperitur.

Cerasia communis, rubra, nigra, albicantia: magna, Italica: duracina, uisula, laurea, G. Vngarica magna, dura, dulcia, figura cordis, Vu. Alba: & Italica, magna, Matth. Curtius Lindauia. Cerasus humilis, C. ualde humilis, frutex potius quam arbor, K. Ea nimirum Chamæcerasus, uel Macedonica Cerasus Plinii (15.25.) est. Alia est Chamæcerasus montana, ueteribus indicta: quæ in montibus nostris nascitur, cubitalis: fructu Cerasi, magnitudine, figura, colore rubro, & petiolo simili: sed amariore. Hanc non semel frustra in hortulo meo ferere conatus sum. Alia etiam Chamæcerasus montis Generosi Insubriæ: alia deniq; quam Punice Mahaleb uocant, sponte apud Vallesios circa Sedunum crescens arbuscula.

Cerisfolium, R. G.

Ceratia agrestis. Vide arbor ludæ.

Ceratoniam, id est, Siliqua arbor, S. Johans Brot/O.R. Vidi & ego hanc arborem ex semine natam apud ciuem quendam nostrum: quæ ad breuem altitudinem cum peruenisset, interit. Longè alia est, Ceronia Theophrasti, Syriaca arbor, &c.

Cerinthe. Vide Cynoglossus montana.

Ceterach. Vide Asplenos.

Cercis Theophrasti. Vide arbor ludæ.

Ceruarum uocari potest, (quoniam Germanice Hirgen blümle nominatur,) Chamædrysalpina à quibusdam dicta, etsi Chamædryn ueram sola foliorum similitudine refert, Chr. Piperinus. Floribus albis, semine in globo pappaceo: radice oblonga, lignosa, amara, cortice ruffo.

Chamæcyparissus suffrutex hortensis odoratus, G. flores luteos profert sed non quotannis

quotannis, agrestis ubi nascatur, nondum rescui, G.

Chamaecephalus Plinii item nostra uel montana. Vide in Cerafo.

Chamaedrys, O. G. R. Loco nimis umbroso mihi consita, flore albescit. Nascitur passim apud Helucios, locis saxosis et apricis. nusquam prope Tigurum nostrum, nisi circa lacum forte duarum horarum itinere ab urbe.

Chamaedrys falsa, insipida, flosculis coeruleis, Schafftraut. G. Aliqui Teucrion uocat. luxae spontis est ubiq. Pseudochamaedrys eius etiam altera species in syluis & montibus nascitur.

Chamaeleon albus, R. Vide supra Cardopatum.

Chamaeleon niger, O. forte quem Tragus pingit: aut Carlina cum caule. Sed neuter uidetur uerus Chamaeleo niger: uerus ex Apulia, K.

Chamaemalum, uel Anthemis, R. G. Magna eius in aruis passim apud nos copia est, illius dico cui flos albus: quam equidem uerum Chamaemelum esse non dubito: quamuis Dodonaeus, Chamaemelum sylvestre hoc uocet. hortense autem duplex facit, unum Leucanthemum, hoc est, albo flore: alterum Chrysanthemum, hoc est, luteo: utrumque odore praestantius quam sylvestre, et ex Hispania primum allatum ad Germanos: quorum pauci in hortis duo haec genera colunt, solo (ni fallor) floris colore differentia. Aliqui Camomillam Romanam hanc uocant, & albæ luxæ uel discrimen adiiciunt. De Chrysanthemo plura leges inferius suo ordine.

Chamaemelum odoratum uel nobile, ut Tragus cognominat, hortense illud de quo iam diximus, in hortis alunt, Ae. K. & Basileæ Caelius Secundus, & Argenting Massarius medicus: sed illud albo flore duntaxat puto. Suauissimè hæc herba olet, unguenti alicuius preciosi instar. Sapore autem amaro est. Aradice statim (ut Massarius ad me scripsit Argentina) multos coliculos emittit, qui per terram repere uidentur, praefertim si quis eos secundo aut tertio quoque die manibus aut pedibus premat. Hyeme tota mihi uiret in horto: ab Anglis ad nos aduecta est. Semina uere seres, lato aliquo spacio, ne inter se compressæ herbæ putrescant, ut mihi aliquando contigit.

Chamaemelum eranthemum, (flore purpureo,) K. C hanc puto aliqui hætenus non rectè Anemones generi attribuerunt. Pingitur à Trago inter Anemonas. Nascitur, inquit, inter triticeas aut speltaceas segetes, flore minii colore, interdum candido, foliis quaternis constante, &c. Aliqui Adoniū uocant. circa Monspelium etiam in aruis emicatur.

Chamaepitys species una, O. G. R. Hæc in aruis quibusdam, non procul à Rhe no fluuiū ut Basileæ, & apud nos circa forum Tiberii prope Rhenum alibiq. sponte nascitur: et si Fuchsius in Germania sponte nasci ignorauit. Nunc (inquit) in hortis plantari cœpit. Plinius tertiam speciem in petris nasci tradit, nescio quā rectè: Hanc etiam Fuchsius pingit, ex horto nimirum aliquo nactus. Vidi ego aliam quæque speciem è Monspelio allatam.

Chamaesyce, K. Hanc in Germania sponte ortam nondum memini uidere.

Chamelæa, A. C. Vu. circa Monspelium in agro nascitur. Aliqui non rectè Chamelæam uocant herbam quam Germani Zyland, Itali Piper montanum. Vide in Pipere.

Chelidonium minus, G. O. In pratis humidioribus passim primo uere exilit & floret, Maio mense rursus se occultit.

Chelidonium maius ubique uiret, præcipuè circa muros & sæpes hortorum.

Chondrilla, C.

Chondrilla prima, G. quæ & sponte nobis oritur in collibus alibiq. & super muris aliquando.

Christophoriana (ab Italis, ni fallor, uulgò dicta, ab aliquibus Costus niger)

frondibus ferè similis est Barbe caprine uulgò dictæ, acinos nigros racematim cōditos profert Iulio mente, &c. G. Nascitur apud nos circa syluas mōtanas, & in hortis benè diu durat. Sed Parauit alibi in Italia, Christoph. horianā equius, utpote proceriorem multò uocari audio herbam illam, quam Hier. Tragus lib. 1. ca. 95. Barbam caprinam syluestrem nominat, *Waldegeißbart*, & pingit eiusq; asparagos, id est, coliculos teneros elixos, in acetariis ed.: uulgò Christophonariā dici, uel Barba de becco, Vide supra in Barba Caprina. Alii etiam aliam Christophorianam faciunt, (ut Ruellius meminit) quæ alio nomine Oculus consulis, & Filius ante patrem uocetur: flore luteo, ceu conyza, foliis rorismarini, latioribus, breuioribus.

Chrysanthemum dug species K. tres O. uerū ex Italia G. R. A. Chrysanthemum quidem ab aureo flore cognominatur etiā species una Chamemeli, ut paulò antè dictū est, & forsitan eadem herbā fuerit. Chamemalū enim Leucanthemū tantū Dioscorides describit: ac si cætera solo colore floris differant, Chrysanthemum quidem & Buphthalmum Dioscoridis, unam eandemq; herbam esse, minimè dubito, capite utroq; collaro, &c. Itaq; Galenus & Aegineta Chrysanthemum non meminerunt, sed Buphthalmum tantū: cui Galenus flores Ch. max. mali (nimirum Leucanthemi) sed multò maiores acrioresq; tribuit, & uim discutiendi tantam, ut sclerias etiam (id est duntias, uel steatomata, ut Dioscorides habet) discutiatur.

Ci.

Cicer satium arietinum, C. G. Cicer syluestre doctissimus Lugduni medicus Iacobus Dalechampius ad me misit.

Cichorium satium R. G. Vide Intybum. Hoc olus ut hyeme tota albis & carnosis foliis suis in acetaria ueniat, sapore gratissimo, coli sic debet. Circa finem lunii seret, non ad modum angustè: deinde cum ad duos palmos (seu digitos octo) excreuerit, tempestate sicca, euelles cautè, ita ut manu radicem inferius, id est, remotius à capite apprehendas: & simul corrupta folia si quæ sunt, separabis: & rursus plantabis, ita ut undiquaq; duobus palmis minimum inuicem distent: et folia etiam principio sui non nihil in terram mergantur. Postea initio hyemis, antequam mixtingruar, rursus euellas plantas in cella utinaria seruabis, hoc modo: Soli aliquot spatium ad duos digitos terra recenti operies: huic plantas Cichorii impones, duabus aut tribus cum suis radicibus coniunctis: donec spatium istud replueris: tum rursus eas terra operies & sic alternis. Aliqui in uili aliquo uase ligneo, cum terra ut dictum est alternis instrata seruant in hypogeo. Galli & Itali in hortis terra obruere & seruare solent: sed apud nos in hortis & gelatur faciliè & pluuiis deinde putrefcit.

Cici, Ricinus, Croton, Cataputia maior uulgò, *Wunderbaum*/G. R. Planta est annua: & formæ totius raritate admirabilis: & ad remedia utilis. Circa Mediolanum agri eo conferuntur, ut oleum è seminibus exprimatur ad lucernas.

Cicuta uera, herba grauis & foetidi odoris, coloris ferè cinerei, &c. G. Sponte nascitur & abundat circa forum Tiberii alibiq; ad Rhenum, circa oppida & pagos.

Cicutaria, similis cicutæ herba, innoxia, ubiq; in pratis & hortis abunde nascitur. Imperiticam pro Cicuta accipiunt.

Cicuta aquatica, herba uenenosa, *Bargenkraut* Saxonibus, G. Circa paludes & in paludum marginibus sponte oritur, ut ad lacum Felium agri Tigurini. plantare si quis uelit, in aqua aut loco palustri pangatur oportet.

Cicutam & forma aliqua ex parte & ueneno ferè referre uidetur herba, quam *Glyssen* nostri appellant. Vide inter Apia. Tragus Apii genus degener esse iudicat.

Cirsium Matthioli, Vu.

Cistus C. foemina AE. Mas & foemina, K. Vu. Rurpodius. Valerius Cordus etiam prognatum sibi è semine Cistum memorat. Benedicto Aretio tertio à saturo anno floruit: sed semine non perfecto tota planta interit.

Citrullus, Quære Cucumis.

Citri

Citri arbusculæ aliquot, Vu.

Citria & aurea mala K.

Citrei generis arbores in Germania octauo ferè anno fructificant: qui post solstitium prouenerint furculi, autumno sub hyemem refringi debent, hyemem enim non ferunt: & arescentes fortè etiam cæteris partibus uitium adferunt. Rigari debent, non recenti & tenui aqua: sed crassa, pingui, putrida, ut è foliis, & circa sieraquilina. Fimo equino optimè resolutò & in terram ferè conuerso gaudent. Hyeme in cubicula tepida, ut hypocaustis contigua, transferantur in uasis suis. In regionibus minus frigidis (in Germania quidem nusquam puto) relinqui possunt in hortis, si ramis tunc in angustius spaciū religatis, cupa lignea obtegantur. Functus uir illustis, prætor in urbe nostra, in hortulo pensili iam per quindecim annos Arantias & Limones aliquot alt, quinque cubitorum nunc longitudine: proceriores fortè futuras, si locum commodiorem & magis apricum habuisset, utpote singulis annis coluaret seu disrararet, operam dedisset. Sexto à satù anno flores in eis primùm apparuisse ait. Habet eas in uasis terra repletis, cubitalis tantum altitudinis: præstaret autem triū dodrantum altitudinè esse. Fructus ei ferunt, non tamen quotannis, tales tantosq, quales quantiq, ex Italia nobis mittuntur. Autumno antequam pruina ulla ingruat, in cellâ tepidam eas reponit: & per hyemè bis ferè per mensem, aquâ non nimis frigidâ radicibus affundit. Sub diò rursus exponit Aprilii medio, aut potius initio Maii. Decitorum cultu Iouinianus Pontanus libros 2. carmine condidit.

Citrum Romanum, O.

Limonum (ut uocant) arbusculæ aliquot, Vu:

Arantiorum arborum, ut uocant, arbusculæ aliquot, Vu.

Arantia poma Basileæ in uno alteròue horto numerosos fructus ferunt, Limones uerò nullos.

Citrus (inquit Nic. Monardus Hispalensis medicus in libello De Aurantiis) humilis est arbor, (uel potius arbutus,) omni tempore pomifera, semper prægnans fecundaq, ut trium anno rum fructum habeat. flores emittit iucundissimos, pomum oblongum, interdum rotundum, aliquantulum rugosum, colore aurei, odore gratum. Foliū ei lauri, aculei acuti & rigidi. apud Medos & Persas imprimis frequens: deinde Palladi diligentia in Italiam translata fuit. Postea uerò in Hispania in usum deuenit, ut nemora & campos occuparet. Magna hominum cura ex acri (acido) dulcem cibum fieri docuit. Huius pomis olim non uestebantur, sed propter odore tantum & medicamenta erat in usu: inculta nimirum adhuc arbore peramaros & acetosos fructus proferente. Postea (ut Constantinus Cæsar tradit) hominū cura, ouillò lacte semina, priusquā ponerentur, maduerūt: & sic ad dulcedinem mutata est pars interior edulis, cortex amaritudinē suam retinuit. Infitionis etiam causa ad diuersas formas peruenit, nam in Malo Punica inserta, ut agriculatores docent, in rubrum colorem & diuersam formam abit. Videntur enatè Aurantiæ, &c. siue ab auricolore dictæ, siue Arantiæ ab oppido. Sic & alia citriorum genera infitione multiplicata sunt. unde reperias tot generalimonum, & alia, quæ nec citro, nec limonibus conueniunt: quemadmodū Zamboas, Torongas, Limas, Limones, (Nebrissensis uocat Cidras, Naranias, Toronias, Limas, Limones,) quæ omnia nec præsicognouerunt. Sic magnificato infitionis usu Aurantiarū plura sunt genera: nam aliq, sic habent corticē dulcem, ut totè comedi possint: aliq, autem in uno pomo duo genera botrorum (acinorū) habent, aliq, uerò absq, semine sunt. quanta autem diuersitas saporum in eis degustetur, cōmuni relinquo iudicio. Citrus arbor in Aurantio inserta ad magnam proceritatem prouenit: Aurantiū uerò in Citro, in tam humilem formam, ut magnitudinem unius cubiti Aurantiū non excedat. Concludimus igitur Aurantias infitione ad nos deuenisse, ueteribus ignotas: nisi fortè commemorati ab Auicenna citranguli in Commentario De uirtutibus cordis, & libro primo de urinis, & libro 7. de antidotis, (sicut & à Mesue in oleo de pomis citranguli,) Aurantiæ fuerint. Hæc Monardus. Citrium in nostris regionibus

ad pondus librarum decem quandoq; peruenit, licet rarò, Cardanus Mediolanensis.

Citrago. Lege Meliffa.

Citrullus. Vide Cucumis.

C1.

Clematis Flammula quibusdam, in Gallia Narbonensis Italiaeq; sepibus ubiq; obuia, uiti syluestri caustice apud nos nascenti omnino cognata. AE. Duas eius species habet C. unam albo, alteram rubro flore.

Clematis Aegyptia, syluestris flore coeruleo passim: hortensis purpureo, G. transfili autem purpureum e Sabaudia circa Laufannam hortis Tigurum. Vulgò Vinca peruinca. Stryt.

Clinopodium uel Polycnemum, cognata Origano herba, floribus per uerticillos digestis, ita ut in summo etiam uerticillus unus, tanquam rotundum in lecti pede (seu fulcro) capitulum extet, G. Sponte circa sapes & fruteta nascitur, herba odorata, sed minus quam Origanum, magis uerò astringens, oblongior, &c. Alii pulegii petraei speciem quandam Clinopodium faciunt.

Clinopodium Dodonaei: quod aliqui Marum existimarunt, herba est Sampsuchocognata, nobis ignota: alibi etiam peregrina, & in hortis tantum uisa, usq; per paucis.

Clymenum utrunq; G. Braunnwurz oder Nachtschatt/weiß vnd Braun. Alterum nodos seu scrophulas in radice habet, quod marem dixerim: alterum iis caret, & semper in aquosis nascitur: idq; foemina uidetur. Sed ali aliud Clymenum faciunt. Vide Rhus Plinii, Clymenum siue Siciliana Plinii K.

Cn.

Cnecus uel Cnicus, uulgò Cartamus, G. R. Argentinae puto & alibi agri plenti conferuntur, propter florem tinctoris aptum.

Cnecus uel Atractylis syluestris, ut quidam uocant, Carduus benedictus, in plerisq; apud nos hortis colitur, propter magnum & multiplicem eius in remediis usum, ne uulgò quidem incognitum. Incultus ubi nascatur, nescio.

Co.

Coccygia, fortè Barba Iouis Plinii. Vide supra in B.

Cochlearia uulgò dicta herba, Köffelkraut/ (ut scribit Dodonaeus) habet initio folia lata & spissa, modicè caua instar parui cochlearis, & interdum angulosa instar rumicis minoris, què Romanum cognominant, dura. Caules dodrantes. Floresculi albi in summis coliculis secundum longitudinem eorum nascuntur. Semen paruum, rubicundum, in siliquis paruis. radix fibrosa. Crescit in multis locis Hollandiae, Frisiae & finitimarum regionum prope sapes & in pratis. Brabantii in hortis ferunt. Videtur autem esse Britannica Plinio memorata: aliis Telephiū, uires quidem utriusq; repraesentat. Calida & sicca est herba, sapore acri ut nasturtium ferè. Magnus ipsius ad stomacacem usus est apud Hollandos & Fnsios. Hæc ille.

Codianum uel Codiaminū, bulbus syluester quidam, flore Codii C. id est, Campanulae, calathi uel specie, magno, luteo, cauo, oblongo. Gäl Mergenblümen. G. Martio mense in latioribus pratis splendet apud nos uulgaris.

Colchicum, Hermodactylus Arabum, quo prata humida nusquam non abundant, autumno florem croci producit nudum, & nullis omnino foliis: quæ per aestatem, sicut & semen in folliculis, habuerat.

Colocasia. Vide Aron Aegyptium.

Colus Iouis, O. Apud Dioscoridem tum alteri Verbenacæ, tum Polycnemo, hæc nomenclatura tribuitur: nam Colus rustica, Atractylis est.

Colutea Theophrasti secundum aliquos: Sena syluestris quibusdam, non rectè, arbuti genus. foliis ut Pelecinus ferè: semine in folliculis inanibus: unde Germanice quidam Verbrüte Kuchle nuncupant. O. G. R. Vu. C. Facile è semine provenit, cœlum nostrū bene fert: quatuor aut quinq; cubitos altā uidi.

Con-

Con.

Confiligo, Enneaphyllon, Diapyron, Pulmonaria Vegetii, Ellebori nigri species *Leüßtraut/Süßtraut/Teüßfelskraut/Wolfszahn*. Itali quidam non rectè Elleborinen uocant. O. G. K. circa Basileam & alibi sponte nascitur, locis apricis ac lapidosis. Tres aut quatuor annos stirpē unam durare puto, flores & fructus ferre secundo. Profeminat sese sponte. Matthioli de Confiligine coniectura uana est.

Consolida regalis, Vide Delphinium.

Conuoluulus maior. G. Nascitur circa sapes & frutices, ubi aqua subest.

Conuoluulus minor, Helxine cissampelus, ubiq; in aruis nascitur: radiculis quā longissimē uagantibus sicut in litoribus Brassica marina, cui cognata uidetur.

Conuoluulum peregrinum uel cœruleum uocarim granum Nil Arabum, ut eruditi quidam uiri in Italia nuncupant, Auicennæ: qui tamen Isaridem quoq; Nil appellat, O. G. AE. Itali quidam uulgò Campanulam lasuram uocant, ni fallor, inuenio enim hoc nomen in Catalogo horti C. & aliud, Campanula cœrulea, de qua superius diximus. Genus hoc conuoluuli peregrinum, non floris tantum colorē, sed aliter etiam a nostro differre uidetur; folia enim alterius figure, & hirsuta habet: lactis nihil. semen longē uehementius sapore, tanquam cyclamini, si benè recordor. Hoc anno a me satum uariè prouenit. In uasis plantę aliquot, cū quatuor aut quinque folia protulissent, periēre, frigore ut conicio. aliæ infra palmi altitudinem confluxerunt, ac floruerunt tamen: aliæ altius excreuerunt. Vna in area ad cubitos ferè nouem pertiæ se circumuoluit: & semen initio autumnī maturauit. Flores ephemeri sunt: noctu enim se aperiant (unde florem noctis uulgò quidam in Italia nominant) postridie uel solis pereunt. Radix subest parua, fibrata.

Conuoluulo similis herba, sed minimo flore, semine triquetro, gustu subacido & glutinoso, G. est & suæ spontis passim in agris. *Schwarz winden*/id est Conuoluulus niger uulgò à Germanis dicitur. quidam non rectè Orobanchen putant.

Conyza maior locis lapidosis & in muris mœnium aut fossarum urbis nostrę nobis prouenit: foetidior & inelegantior, quā ut hortis eam dignemur.

Conyza species tertia, aquatica. G. non diu uiuit in hortis siccis.

Conyza Hippocratis, ut quidā nomināt. Vide Ambrosia suprā, & Cotula infrā.

Conyza alpina species, foliis oblongis, serratis, G. *Böni/Goldblüm auff den alpen*. uaccis intacta.

Conyza aquaticæ species, foliis oblongis, serratis, G. Stirps una iam quinto (ni fallor) anno, in horto mihi durat, loco umbroso.

Copia Elegia O. Videtur autem Copia uocabulum esse corruptum, pro quo forte legendum Canna, id est Arundo. Sic enim Plinius lib. 16. cap. 30. Est & obliqua harundo (inquit) non in excellitate nascens, sed iuxta terram fruticis modo se spargens. sua uisissima in teneritate animalibus. Vocatur à quibusdam Elegia. Sic ille, poster & Chamæcalamus appellari, sicut Chamæbatum dicimus.

Cor.

Corchorus quibusdam, Apii genus uitiosum, radicibus repens, areas hortorum passim replet. cacofelinon quoddam (ut ita dicam) non Corchorus ueterum, quam & ipse Ocimi ferè foliot (sed serrato & oblongiore) inter olera nascitur: sicut & Anagallis, quam alii ueterum etiam Corchorum nominabant. Lege suprā in Bliti syluestris mentione.

Coriandrum rusticæ quędam mulierculæ apud nos serunt, ad condimentorum usum. Argentinae agros eo plenos seminari puto. Semina maiora in calidioribus locis fert. Propter foetorem certè agros magis quam hortos decet. Syluestre reperiri Plinius negat. Amatus Lusitanus uerò in aruis & campis circa Anconem sua sponte nasci colligiq; scribit.

Coris A. K. sponte in Italia crescit, Matthiolo teste.

Cornus mas, Vu. A quibusdā etiā apud nos plantatur. Frequens est in dumetis inter Metensiu et Treuironū urbes, at in locis ad Mosellā et Rhenū fluuios sitis, et per

Alfatiam in hortis feritur uel semine uel surculo auulso, Tragus.

Cornus foemina. Quare Sanguinea uirga.

Coronopus uerus, qui Cornu Cerui nonnullis dicitur, O. G. Italis uulgò herba Stella, plerumq; Italiae hortis uulgaris, propter usum eius in acetariis, Huius & syluestris species reperitur, foliis multum differentibus, Serpentina quibusdam dicta, Vtranq; pingit Matthioli. Leoniceus graminis speciem, quæ Capriola uulgò dicitur (de qua leges infra in G.) non rectè Coronopum putauit. Herba stella Matthioli in Germania inferiore passim circa uias nascitur: sicut & Coronopus Ruellii. Vterq; pingitur à Dodonæo.

Coronopus uulgaris: & alter Theophrasti, puniceo colore, semen continens in spinosis capitulis, alii hanc plantam ad secundam speciem Atractylidis referunt, K.

Coronopus quorundam, ranunculo specie similis: syluestris, alba: & alia lutea, quæ pauperibus etiam inter olera recipitur. Hortensis, flore multiplici, luteo, albo, nam simplici utraq; syluestris reperitur, ut alia etiam omnia quæ multiplici in hortis flore placent, simplici reperiuntur syluestria.

Corylus. Vide Auellana.

Costus hortensis recentiorum quorundam, uel Menta Græca (aliis Romana, Saracena,) seu corymbifera. *Frauentraut/vnser Frauen Wüding/Sam Heidinisch wünderaue.* Viuacissima est in hortis. G. Alicubi circa Martiam syluam, ut non procul Lenzkilcho, in agris compascuis, syluestrem nasci aiunt,

Cotinus Plinii, AE.

Cotonea. Vide Mala Cydonia.

Cotula, Vide Parthenium.

Cotula (forè Conyza) foetida Hippocratis, nescio in cuius horti Catalogo reperi. Ea aut cognata, Senecioni ferè similis, pinguis tactu, (Artemisiis, ut quidã cõiiciunt, adnumeranda: ego potius Conyzis adscripserim,) in sylua Vuettingensi prope Badam nostram abundè nascitur.

Cotyledon C.

Cr.

Crithmus uel Batis, AE. C. Vu. Non facile nec diu nostrum cœlum fert: facile in hortis Italiae, quanquam nobis & alpiibus uicinae, ut Lucarni alibiq;, in multis annos durans, debet autem sub hyemem fimo equino alioue regi. Decultu eius plura leges in epistola Hier. Massarii ad me, huic libello præfixa. Batis hortensiana uocatur à Plinio.

Crithmus marinus, C. & Rurpodius, in uase G. non maturuit. Crescit copiosè in litoribus Hispaniae, Galliae & Angliae, Dodonæo teste.

Crocus R. G. Optimus colitur apud Vallesianos nostros circa Sedunum, et uenditur uicinis. Bulbi eius pangi debent circa diui Bartolomæi diem, trium digitorum intervallo. Tertio quoq; anno Martio mense, plantæ integræ euulsæ reponuntur usq; ad diui Bartolomæi diem, ut mediocriter siccantur: & tum rursus terræ mādentur, atq; ita deinceps. Folia per æstatem latent, hyeme apparent.

Crocus syluestris, flore candido, pulchro, prosiliente sub finem Februarii, K.

Crocus montanus siue alpinus A. Floret (inquit A.) in horto meo, sed nulla unquam protulit femina, quæ ubi sponte nascitur in montibus profert. *Leffrat* quidam alpium incolæ nominant. Triplex est, coloris tantum differentia: cãdidus, puniceus, & ex utroq; mixtus. Viret etiam in meo horto, è montibus circa Curiam à Ioanne Fabricio uiro doctissimo hoc anno primùm ad me missus, foliis graminis, angustioribus.

Croci Zizania, bulbus quidam nuper cum croco è Vallesia ad me missus. superficies, ut etiam croci, magnis interuallis latet, & redit, G.

Cruciata R. Gentianæ puto speciem intelligens, nam & alia Galio cognata, passim communis herba, eodem nomine dicitur.

Cu.

Cucumis, G. Lege Meloepones, & Pepones.

Cucumeres albi, Vu.

Cucumis citrullus uel citreolus, Vu. Apud nos uix maturefcit: difficilius opinor quàm Cucumis.

Cucumis erraticus uel asininus, O. G. R. Facile nascitur duratque in nostro etiam cœlo: & sparsis per maturitatem seminibus, quæ rupto pericarpio eiaculari solet, sese restaurat.

Cucurbita, G. Syluestris hæc species non reperitur, quod sciam: nam Colocynthis dicta, Cucurbita syluestris (nescio ubi sponte nascens, nisi in Græcia forte) est, ui & specie plurimum differens.

Cucurbitæ, quam Zucca marina Itali uocant, species, O. hanc esse puto quam Indicam aliqui cognominant, quæ in nostris etiam hortis pulchre prouenit. De tribus Cucurbitarum generibus, oblonga, marina & syluestri, lege Cardanum De uarietate lib. 5. cap. 23.

Cuminum syluestre, quære in Delphinio:

Cupressus. Vide Cypressus.

Cy.

Cyanus cœruleus, puniceus, albus, (qui in aruis passim emicat, sed cœruleus tantum) G. & in plerisque regionis nostræ hortis. Annua est herba, & restibili fecunditate seipsam propagans.

Cyanus exoticus, pulcher, K. sentiens nimirum de Cyano montano nostro.

Cyanus montanus uel syluaticus G. Ae. In Albio monte nobis imminente syluestris exilit, in hortos translatus longo tempore perennat. Apud Germanos quidem inferiores solet in hortis feri.

Cyclaminus nascitur copiose montanis locis, iuxta pedes montium prope Riuarium lacum, in saxis etiam: ut circa Vuesam, Vuallestadium, Feldekircum, & locis arenosis Curiam uersus circa Rhenū, et alibi. Ea species foliis est subrotundis. In hortis plantata diutissime durat, uere & autumnos florens suauissimi odoris purpureis seu colossinis floribus. Audio & albo flore circa Neocomū Sabaudie reperiri.

Cyclamini species duæ, prædicta, & alia foliis angulosis, cucumeraceis fere, F. Amicus quidam in Italia Cyclaminum folio quadrato sibi uisam nobis retulit. Radicum alia breues, & malum, id est, orbem radices, prope superficiem habent: alia oblongæ malo in fine adnexo: quæ itidem species in Italia reperitur.

Cyclamini speciem habeo, radice instar capitis arietis, C.

Cydonia mala, require in M.

Cynoglossus Italica, O. & Basileæ in horto Zuvinggeri. Vulgaris quidem circa urbem nostram locis fere arenosis non deest.

Cynoglossus mōtana à quibusdam nominatur: Telephium ab eruditissimis nonnullis existimatum: floribus oblongis, luteis, cauis, &c. Romæ frequens esse audio, à Græcis edi. Aliqui (ni fallor) pro Cerinthe ostendunt. Magna & oblonga folia habet antequam caulescat. Hanc in horto alit Chr. Piperinus meus in agro Bernensi, è montibus circa Dunum (puto) allatam. Nascitur & Romæ in monte Palatino: item in montibus inter Dresdam & Misnā. Eruditi quidā Telephium Diosc. interpretantur.

Cynorrhodon lilium. Lege inter Lilia.

Cyperella Cordi, G. passim in pratis humidis & circa fossas exilit: Pseudocyperus species pumila, foliis hirsutis: flosculis luteolis. Itali quidam Luciolam hanc uocant, alii forte aliam.

Cyperus longus, O. G. Hunc sponte natū reperiri audio in pratis humidioribus circa Rapperswiliam oppidum ad lacum Tigurinum nostrum. Flos Agalochū fere olet. Iam diu in hortulo meo durat. Semen nullū aut inutile habere puto. Longus et rotundus (quirarior est, ex Italia puto allatus,) O. R. K. C. Pseudocyperus uerū undiquaque mulatur, sed odore caret, nusquam non in aquaticis apud nos obuius.

Cypressus uel Cupressus, A. Vu. C. Rurpodius. E semine mihi quoque orta, ad drantalem longitudinem, hyeme quanquam in uase in cella uinaria reposito, inter

rit. Luteziæ in hortis quibusdam, Bellonii cura, uiuit.

Cytisus suffrutex lignosus, uel Cytisus minor (nam maior in Italia nascitur) è coleprope Scaphusiam (ad oppidum illustre Heluetiorum est ad Rhenum) mihi transplatus hoc anno, pulchre uiret. Idem è semine mihi prouenit, quod Petrus Bellonius misit, & in uase per hyemem seruatus, altero iam anno durat: nostrate candidior, hirsutiorq; & (ut apparet) procerior futurus. Hyeme folia amittit.

Da.

Damasonium. Lege Alisma.

Daphnoides, K.

Daphnoides Dodonæi, quæ circa Lemanum lacum sponte nascitur, foliis Laurifere, minoribus, crassius, C.

Daucus Cræticus R. F. In Italia monte Baldo sponte nasci audio.

Daucus quidam palustris, liquore lacteo resinoso turgens, radice amara, G. In pratis quibusdam palustribus suæ spontis est, ut circa lacum Felium apud nos, alibi uidere non memini.

Dei.

Delphinii tres species, O. sic autem eum uocare puto (sicut & Cordus primum, deinde Dodonæus, & alii quidam uocantur). Consolidam regalem uulgo dictam, quam Cuminum syluestre alterum Dioscoridis putarim. cuius apud nos in hortis genera quatuor reperiuntur, syluestre, scilicet uulgare, quod in aruis nascitur, cœruleo flore; & alterum rarius, candido: tertium, roseo: & quartum undiquaque maius, procerum, magnis floribus, in magna & oblonga quasi spica. Ritter sporen uulgo nominant. Aconiti etiam genus floribus cœruleis, simile alioqui Lycoctono luteo, Bernenses nostri uocant grossi Bergritter sporen.

Dentelaria nostra, quæ dentium dolori medetur: flores habet subcœruleos, qui illico in pappos soluuntur. herbæ sapor est acris, G. Sponte collibus siccis, saxosis & apricis emicat, Conyzoides quædam herba est, quam pinxi & descripsi inter quinque istas stirpes, Cordi Descriptionibus plantarum subnexas. Dentelaria autè Montpelii dicta, et alio nomine Flammula à uicauterii, alia quæ dâ est (Flammulas quidè alii alias herbas appellant) quâ non ipsis dentibus, sed carpo admouet, ut audio. Huius coliculû dū hæc scriberè, digitos octo altum uidi, aridû, sex per interualla foliis, simplicib; digitulatis, tres longis, sapore dulci cū acrimonia. Habeo & semen longiusculû, tunica fusca tectû, intus subruffû, una parte acuminatû, nullo eximio sapore.

Dentelaria alia, (drio quibusdam seu Erysimon purata) in Italia ut audio, sic dicta, quod siliquulas ferè dentibus similes toto caule emittat, modicè inflexas, G. Pedalis aut cubitalis est herba, annua, foliis dissectis, flosculis luteis, gustu acerrimo, sinapi cognata.

Di.

Dictamnus uera feritur in Italiæ hortis, seminibus è Creta allatis.

Dictamni loco usurpata hætenus planta, Pseudodictamni, Fraxinella Italis: hoc enim nomen magis ei quàm Lilio è ualium cõuenit. R. G. K. C. Rurpodius Chamæmeliam, hoc est, Fraxinum pumilam, Græcè dixerim. Hanc aliquoties è semine (quod rotundum, atrum, splendidumq; habet) frustra prodituram expectaui: immaturore forsan. hoc anno enim plantæ quatuor è semine mihi prognatæ, uiuunt. Diu & pertinaciter radix in hortis durat, etiâ neglecta & nuda aliqua ex parte. Vidi Argentinæ in horto quodâ ante annos quatuordecim, ubi etiam nû durat eadem planta, & flores fructusq; fert. Nascitur in collibus quibusdam saxosis prope Scaphusiam (ubi & Cytisus) inde in hortum meum transtuli. Weysser diptam.

Digitalis Fuchsii, floribus luteis uel pallidis, maior & minor. Maiori quidè flos minor est, & magis albicans: minori, maior, magisq; luteus, G. Eadè purpureo flore O. G. Aralda Bononia uocatur, cum eulógio chi tutte piage calda, i. quæ omnes plagas consolidat. Vulgò Spitz wundkraut. Locis saxosis & montanis nascuntur: purpurea nobis suæ spontis deest, circa Coloniam (ut ferunt) abundat.

Diospyros dicta ab eruditiss quibusdam arbutula, locis montanis ad nos prouenit, ut in Albio è regione statim urbis nostræ: foliis ferme Rosæ, uenosis, fructu rubente, umbilicato, magnitudine & figura Cerasi, per maturitatem ad subcœruleum

ruleum primùm, deinde nigrum colorem tendente: floribus albis: cubitos alta quatuor aut quinque, quamquam etiam ad octo cubitos proceram uidi, trunco non crassiore baculo. Circa Riuarium lacù Pyra S. Ioannis uocant, Bernenses *Glühbirten*, quòd locis saxosis gaudeat. Hanc euulsam aliquando in horto plantare frustra conatus sum. E semine aut teneriore planta forsàn melius succedet. Species duæ sunt, una foliis obtusis, altera acuminatis. Vtræq; in hortulo nuper mihi plantata spem aliquam suæ durationis facit. Vide infra in Sorbis. Videtur enim ad Sorborum aut Mespilorum genus pertinere.

Dipsacus satius, aculeis echinorum sursum uersis, G. Huius qui lanas expolant alicubi agros plenos ferunt. Sylvestris, cuius capitulorum aculei deorsum spectant, passim obuius est: sicut & species minor paruis globosisq; echinis.

Do.

Doria, si bene memini, uulgò dicta in prouincia, D. Vide Panaces chironium.

Doronicum, R. K. G. Ae. Hoc è summis alpibus bis aut ter in hortulum translatum, ubi per duos aut tres annos plantatum uixit & floruit. Circa Monspelium memini etiam in planicie reperire, nescio an omnino idem, an potius Romanum cognominatum.

Doronicum Romanum, F. duplex, A. prædictum scilicet, & tertium quoddam à Romano diuersum, foliis angulosis, radice ad scorpii similitudinem accedente, magis quam in aliis duabus speciebus. non tamen idcirco Aconitum esse potest, ut quidam putauerunt, uel hæc uel alia Doronici species: cum radices omnium longe dulcissimæ, & homini saluberrimæ sint. Alpino quidem etiam rupicapre suauissime uescuntur: unde & nomen apud Heluetios *Gaisfennwurz*. Nuper speciem Doronici pulcherrimam, plurimis in radice per interualla ceu scorpionibus admirabilem Franciscus Calceolarius totius rei herbariæ longè peritissimus, Veronæ ad Campanam auream pharmacopola, depictam ad me misit: eamq; in horto se alere scripsit.

Dorycnium à quibusdam falsò dictum, circa Monspelium in litore nascitur, flosculis albis, suffrutex astringens, &c. G. Eius planta una duos aut tres annos in hortulo nostro durauit, & semina probè maturauit. Benè fert hyemes. Argentine etiam in horto D. pulchrè prouenit.

Dorycnium Odi falsum, Ae. Aliqui suffruticem quendam montanum (uitis Idææ speciem puto) pro Dorycnio habent: Cordus Halicaccabum peregrinum à nonnullis dictum: neutrum probo.

Dr.

Draba uel Arabis Dodongæ, Thlaspiceticum quibusdam, C. Lege etiã Tarchon, Draco hortenensis seu acetarius, Vide Tarchon.

Dracunculus, Dracontium, Serpentaria, O. C. G. Species duæ, F. In Germania sylfrem inueniri non puto. Species altera, Venetiis in horto Maphei de Mapheis medici.

Dryopteris, Adiantum ferè cognata herba, G. In colle lapidoso ad Badam nostram sponte prouenit.

Dulcichini siue Trasi, K. G. Leuschnerus. Flores non ferunt, neq; caulè: sed folia tantum Caricis, seu Calamagrostis: radices geniculatæ, & ceu paruulæ quedam nuceæ (nucleo et crusta constantes molliori) ac seminum loco sunt: eæq; feruntur in Italia, ut circa Veronam. loco arenoso et ubi humoris aliquid subest, letius crescere putarim. Minores & sue spontis in Africa proueniunt, ubi Hab alzelim uocantur. Aliqui in Italia luncum auellanam uocant: quem Amatus Lusitanus Venetiis uendi scribit ex Aethiopia aduectum. Græcè Schoenocaryon nomen finxerim, &c.

Dulcis radix communis, Glycyrrhiza, R. Ae. Nascitur & in nostro hortulo: in quo duobus aut tribus annis absq; flore & fructu caulem edidit tricubitalem ferè, quarto primùm anno flosculos & siliquas ostendit. Hæc cum scriberem ad cubitos quatuor excreuerat, decem aut pluribus (aliquot enim rescueram) ab una radice caulis, sub finem Iunii mensis, neq; dum tamen flores ostendebat. Prouenit autem primùm plantata radice, quæ inter alias à mercatoribus allatas, ceu uegetior electa

fuerat, Folia tactu glutinosa sunt, & leuiter subolent nescio quid aromatici, Calami fere, sub noctem præsertim: quo tempore folia omnia demittuntur, interdum uerò surriguntur. Glycyrrhiza (inquit Fuchsius) multa, nec ignota; aliquot Germaniæ nostræ locis, Pabenbergen si præsertim agro, producitur. Et hodie nusquā ferè non feritur in hortis, his quæ semel comprehenderit tam pertinaci fertilitate cohæret, ut uix unquam possit radicitus extirpari, tam restibili fecunditate regerminat. Audio & Fullaci in Carinthia provenire: & illic etiam ut in Franconia Bambergæ, in agris colit: tertio aut quarto quoque anno effodi, hoc modo: sulcus longus, nempe per totum agrum ducitur, duos ferè pedes latus: profundus tres aut quatuor do-drantes, sic maiores radices eximunt, relinquunt minores. Glycyrrhiza Italica, ad Dioscoridis descriptionem melius accedens, O. & C. à quo etiam aridam cū fructu echinato missam accepi. Glycyrrhiza sylvestris, Ae. ea herba puto, quā Dodonæus libro 2. pagina 36. iconum suarum pro Hedyfaro pingit: quæ apud nos suæ spontis reperitur herba, aliud quidem, idque uerum Hedyfarum, eiusdem libri pag. 367 exhibet.

Ec.

Echinopus, G. A. Didymus Obrecht. Sic autem appello genus Cardui, quem aliqui Spinam albam, alii Crocodilium uocant, ni fallor: flore cœruleo in globū collecto & echini instar rotundo aculeatoq; capitulo, &c. Aliqui Germanice *Juncz frawen distel* appellant. Bellonius alium, ut uidetur, echinopodem, in Græcia hodieq; dictum, nouit.

Echium, R. Circa urbem nostram in sabulosis abunde nascitur.

Egani uel Thani arbores (ut Montanus appellat) similes ligno Guaiaco: septem uel octo in horto Vu. sentit autem forte de Laburno nostro.

EI

Elaphobosum. Vide Bupleurum.

Elleborine O. R. C. qui omnes puto Consiliginē nostrā hoc nomine intelligit, quā Dodonæus Pseudoelleborū uocat. Vide supra Consiligo. In catalogo quidem horti, K. Elleborinen aliam à Consiligine inuenio: quam & Sesamoides nuncupat.

Ellebori quatuor species, F.

Elleborus albus, R. O. G. K. Vide infra in Gentiana.

Elleborus niger uulgaris, (in collibus & montibus nostris sponte,) O. G. Eū qui circa Larium lacū in collibus nascitur, flore magno, purpureo, &c. foliis albiorebus quā noster sit, ut foemina uideri possit, nam et minus uehemens est: noster uerò, mas. cum Dioscoridis descriptione conuenientem Venetiis in horto uidisse memini. Ia nimirum est Elleborus niger uerus in horto, K. At qui à Dodonæo uerus creditur Elleborus niger, de quo dixi supra Astrantiæ nigrae nomine, toto genere ab Elleboris omnibus differt.

Ellebori nigri species (ut aliquibus placet, propter radicis in figura simul & uiribus similitudinem, nam folia Abrotani sunt flos Ranunculi, sed multò maior) ueteribus in dicta: quanquam aliqui Sesamoides faciunt, G. Est qui Consiliginem esse somniet. Vide supra in Buphthalmo. Quidam pro Sesamoides accipiunt, ne illi qui dem recte. Nos Elleborastrum nigrum appellabimus, donec aptius aut uerius nomen indicauerit alius. In hortis diutissime durat: floret Martio. Sponte nascitur in Vallelia inter S. Mauricii oppidum & Sedunum: propius quidem illud.

Endiuia, Vide Intybum.

Ephemerum R. Colchicum nimirum, quo prata nostra humidiora abundant: nisi Lilium conuallium intelligat, de quo leges infra.

Eg

Erino cognata herba, ut uidetur, uel Lactoridi, Militariue: Esula dulcis Trago, G. Reperitur circa pedes montium locis humidis: radicibus geniculatis, ideoq; uiuacissimis.

Eruca, O. propriè dicta flore albo, quæ perit quotannis, & altera luteo flore, uiuax in hortis, angustioribus foliis, Erysimon hortense puto, G. Sylvestris Eruca ab horten-

Elleborastrum nigrum.

hortensi genere differre uidetur: Erysimō non itē. Crescit hoc Bernē circa urbis muros, & in ruderibus, (& Luteciā similiter,) diuersum ab Erysimō Tragi uel Do-
donati, qui Verbenam fœminam à quibusdam non rectē dictam, cum sinapis sylue
stris potius genus sit, pro Erysimō exhibent: item à Matthioli Erysimō, qui herbā
S. Barbaræ uulgō dictam, pro eo pingere uidetur.

Eruca agrestis passim in nostris uitiis crescit, folio satiuæ simili, strictiore tamē
& minore, flore luteo, quæ præsertim circa Calendas Iunii erumpere uidetur ē terrā
nam alio tempore uix reperitur: eius enim semē diutissimē in terra asseruatur prius
quam germinet, Carolus Stephanus.

Eruum. Lege Orobus.

Eryngii duo genera, R. C. quorum alterum marinum esse coniicio: alterum medi-
terranæum, hoc est, procul à mari nasci solitum, quod circa Basileam plano & aspero
solo abundat.

Eryngium Aëtii, AE.

Eryngium cœruleum O. marinum flore cœruleo, O. K. D.

Eryngium alpinum, in montibus ditionis Bernensium Helueticorum, foliis ferē
rotundis, serrato ambitu, non aculeatis: flore ceu Cardui pulcherrimē cœruleo.
Elder distel. Huius ad me allatas radices aliquas plantaui in horto: quæ primo an-
no folia tantum produxere: secundo, etiam caulem cum flore, sed imperfectē. In hor-
to A. semen maturarunt. Tertio mihi perierunt.

Erysimum. Lege Eruca.

Erythrodanum. Vide Rubia.

Es.

Efula dulcis. Lege in Erino.

Efula maior R. foliis oleæ ferē, maioribus, duos aut tres annos durat, G. in colli-
bus quibusdam asperis, ut circa Scaphusiam & Basileam crescit.

Eu.

Euonymus illa quæ passim in sepibus apud nos crescit, pecori tamen & capris nō
letalit ut audio, G. C. Aliam eius speciem propē Genuam nasci, quæ ad Dioscoridis
descriptionem magis accedat, Pet. Bellonius mihi retulit.

Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum, hoc est, Agrimonia uulgō dic-
ta, ut passim circa nemora nascitur, ita in hortos transfertur facili: sed nō diu durat.

Eupatorium Mesuæ, O. R. puto autem eos Gratiolam Italici dictam intelligere,
ex Val. Cordi sententia. Eam nos quoq; ē palustribus ripis expariantis lacus nostri
in hortum transtulimus semel atq; iterum: sed parum durauit, quod aquam subes-
se desideret. Alii Eupatorium Mesuæ interpretantur herbam quandam odoratam,
Costo hortensicognatam. Vide in Agerato.

Eupatorium Auicennæ, ut quidam cognominant, nescio quam rectē: locis aquo-
sis prouenit, fruticosum, idem in hortis quanquam sicco solo plantatum, aliquot an-
nis durat.

Fa.

Fabæ albæ, rubæ, R.

Faba inuersa. Vide Anacamperos.

Fabago arbor, Bellonii cura Luteciæ iam crescit. sic autem nominat Lotum fortē,
quæ alio nomine Faba Syriaca dicitur.

Fagus G.

Fagus sepium à Germanis dicta, Vtmo opinor quā Fago magis cognata: Carpi-
nus (nisi fallor) ab Italici uulgō. nam Plinii Carpinus species est Aceris.

Fe.

Ferrum equinum, Italici uulgō, Ferro de Cavallo, C. Rurpodius. Sic Itali uocant
herbam, cuius semen seu siliqua soleam equi ferream præ se fert. Medici speciem es-
se putant aliqui.

Ferula C. A. K. Semen ex Italia adfertur, ubi sponte nasci puto in montibus, præ-

M. m. iiij

ferſim Apulizæ. Herba ſimilis eſt Libanotidi à quibuſdam eruditis exiſtimata, ſolus ſimiliter multiſidis, &c. ſed minor, & ſapore ſoliorum differt: nec non odore radicis, quo Libanotis planè thus reſert, ut Argentinz mihi affirmavit Maſſarius. Plurimis annis in hortis durat. G Argentinz quidem in horto quodam ultra annũ quartumdecimum nunc uiuit huius generis herba: quæ ſerulæ ne ſit, an Libanotis, aut eius ſpecies, inquirendum diligentius. Ego Libanotidem potius quam Ferulam eſſe puto, quæ Argentinz & noſtro in horto naſcitur. Libanotidis quidem ſerulacæ ſpecies duæ à Dioſcoride traduntur: nec dubito quin etiam plures ſint.

Ferulago ab Italis quibuſdam dicta, ex ſemine nuper ap parere mihi cœpit.

Fi.

Ficus, G ad quadraginta, Vu. Pereunt apud nos hyeme non raro, præſertim minores adhuc, nec quatuor aut quinque cubitis proceriores. has in fine autumnii in ſerobe iuxta radicem facta, obrui terra tutius eſt: ſic enim & contra frigus munientur, & plures maioresque fructus ferent. Verno tempore rursus attolluntur, initio Aprilis maxime in noſtro cœlo. Sic curata ficus mea, quanquam loco umbroſo, multos tamen grandes & ſucci plenos fructus partum Auguſto, partim Septembri protulit: deinde tranſplantata, ceterius iam habet. Initio cum nõ obruiſſem terra, ſuperficiem perdidit. Argentinz in quibuſdam hortis paulò poſt ſoliſtitium fructificare incipiunt, perguntque uſque ad autumnum. audio & biferas ibidem eſſe interdũ, ita ut & media æſtate, & rursus autumnò maturent fructus: interdum alterius duntaxat temporis fructũ perficere. Groſſi uel primi fructus apud nos decidere ſolent: ſequentes uerò matureſcere. Ficus è ſemine nunquam aut uix oriri uidetur, Scaligero teſte.

Ficus Indiæ, quam aliqui ridiculè Opuntiam nominant, G K. Rurpodius. Mihi quidem è foliis tribus uno ad mediam, uel amplius, partem terræ inſerto in uafe, mox foliis auſta eſt, Vuoiſſelo Vratiſlaviæ è ſemine prodiit, anno ſecundo denũ ut audio: alius è ſemine facile naſci mihi narrauit. Folia tria ex Italia mihi attulerat Anſo Korſtam uir bonus et ſimplicium medicamentorum peritiſſimus ex his intra menſem ſerè, alia plura enata ſunt, Maio menſe, hæc poſtea uafe in cellamrepidam (hypocauſtum non caleſciti ſolium, ſed calido contiguum) reposito, ſub finem hyemis æruginofis quibuſdam maculis notari, & putreſcere (uel potius contabeſcere, & in aquam ceu hydropica, nullo ut putrida ſolent cœteris) cœperunt: ſorè quia ſemel aciterum aqua aſperſa fuerant. Partibus autem tabidis à me reſciſis, reliquæ remanſerunt: & noua pullularunt. At hyeme altera, cum ſeptendecim foliis conſtaret, deciderunt omnia, inſimo tantũ reſecto: cuius itidè pars tabeſcere incipiebat: quare ſecta, Maio menſe demũ nuper quatuor alia folia eruperunt: quæ unã cum inſimo, iam inſirmato, ne proxima hyeme mihi pereant, metuo. Non ſolũ quidem folia, ſed etiam partes eorum terrę mandatas comprehendere atque creſcere, dimidio uno (cuius partem mediam putreſcentem reſecueram) plantato, didici. In Italia & calidioribus Galliz locis ſilicius creſcit, & hyeme etiam in hortis ſub dio relinquitur: ſed undique ſtupis inuolutam induunt, et rigatione abſtinent. In Gallia Ciſalpina nõ fructificat, ut audio, ne Patauĩ quidem aut Ferrariæ. Calidioribus uerò locis, Romæ, alibiſque, & in Græcia, fructum perficit: quem aiunt longum eſſe digitos ſerè octo, graui quodam odore, Mandragoræ ſerè: non edi, & ſi edatur, urinam cruentam ducere. dulcem eſſe puto, & inde Ficus nomen impoſitum. Folio diſſecto multus & tenaciſſimus humor emanat, inſtar albi liquoris oui: quem ulceribus antiquis uſititer adhiberi aiunt. Ineptè aliquid Carduum Indicum uocant, propter ſpinularum in foliis ceu penicillos. Hyeme ſuperiori cum diuerſis in locis Germaniæ hanc plantam ſeruare aliqui conarentur, in cellis uinariis nimirum, omnibus (ut audio) peruit Arboreſcit tandem: in Italia ad quinque cubitos altam ſe uidiſſe aliqui mihi retulerunt. & ſolum inſimum temoris ſerè craſſitudine. Tota enim planta foliis conſtat. ita ut è ſingulis ſingula binaue naſcantur: idque è margine duntaxat, ſiue ſumo, ſiue ad latus. Retulit mihi quidam uifam ſibi Monſpelii hanc plantam tres cubitos

cubitos altam, cum fructu maturo, quæ de foliis promat ex aliquo penicillorum meatus. Septimo aut octavo anno fructum profert, qui maturêscit autumno do drantalis ferè, uerrucosus ut Cucumis uel Pomum mirabile; cui etiam colore ferè similis est in maturitate, ut scribit Carolus Clusius: qui coniicit hoc esse Euphorbium quod Io. Leo in descriptione Africæ describit: id quod cõsiderandum est diligentius. Cardanus De uarietate lib. 13. cap. 67. Ficum Indicam (inquit) Mexicani, apud quos trequens est, uocant Nuchili, arborem nopal. Indi autem insulæ Hispanæ arborem uocant & fructum Tunas. aliqui etiam Pithaiam huic generi (ceu speciem alteram) adnumerant, Granorum quæ fructibus illis continentur, ad sericum tingendum usus est. Refrigerant hi fructus: succo quoq; foliorum pro aqua utuntur. &c.

Filipendula, Oenanthæ. G. O. Pratis humidis gaudet. In hortis ad biennium durare puto singulas plantas, sed sparsis seminibus restaurare se nisi in riguis non facile potest. *Philadelphus* etiam à Nic. Myrepsõ scribitur. Specie aliam, folus ferè Apul hortensis, circa Monspelium in nemore uidi.

Filix femina G. quæ multis à radice statim foliis (errant enim qui hanc maiorem faciunt) passim in syluis abundat. Marem plantare nondum conatus sum: quæ similiter ubiq; syluis, & neglectis innascitur agris.

Filicis genus rarius, latiore folio, & floribus insigni, ab Hier. Trago depictum; Argentina in Sebaldi Hauuenreuteri medici eximii orto uidi.

Filicis genus minus & aquaticum, quod circa latum Felium (qui ab urbe nostra duarum ferè horarum itinere distat) palustribus pratis luxuriatur, G. Diu uiuit in siccis etiam hortis.

FL.

Flamma uel Flammula louis, seu Lychnis coronaria, ut quidam uolunt, nos florem louis potius uocamus ex Theophrasto. AE. O. K. Himmelsblume. Flammula (Phlox uel Phlogion Theophrasti nimirum) Scaligero est flos ab odore Caryophyllus dictus.

Flammulae nomen aliis aliis plantis urentibus attribuunt. pleriq; Clematidi, de qua dictum est supra.

Flos uel Caryophyllus Indicus uulgò dictus, herba Tanacetum refert: floris uerò species Caryophyllum florem utilem uulgò dictum, *Indianisch blumen/ Indische nâgellin*. Hunc florem primum ad nos allatū ex Africa, cum Carolus V. Tunetum traiecisset, Remb. Dodonæus author est: unde *Thunienbloemen* apud inferiores Germanos uocatur. Punica lingua Pedua uocatur, si bene memini. Species duæ sunt apud nos, una minor, uix cubitalis, & in solstitio aut prius florescens altera ad iij. aut iijj. cubitos assurgit, fruticosa admodū. Augusto florere incipit, ad hyemis initium, quod cum primum senserit, aut pruina aliquam, interit: semine non maturato, nisi & primo uere seratur, & æstas calida sit. Vtriusq; speciei flos tum simplex, tum multiplex reperitur: sed minor multiplex, apud nos rarus est. Maior aliquando ad pugni magnitudinem crescit & in globum colligitur. Ex eiusdem plantæ semine, flores tum simplices tum multiplices oriri puto: hos, si nihil impediatur, & semina uegetiora sint, & fortè de mediis præcipue floribus, nō iis qui ad latera sunt collecti, & solum pingue, illos, si quid impediatur. Sic ex una Cucurbita, multū referre aiunt, è collo an parte inferiore semen detrahatur. Herba utraq; tenera est, caloribus flaccescit, rigatione gaudet: ita ut ubi syluestres proueniunt, humidis riguisq; locis tūm nasci existimē. Flores & in ipsis plantis diutissimè durant, & decepti cū pctio-
lis suis in uase aqua pleno, subinde renouāda. uidi ita ad tres aut quatuor mētes durare integros. Medio autumno uasa, in quibus sati fuerint, loco tepidiorè sub tecto reponantur, aut in cellā uinariā, ita ad brumā ferè (id est breuissimū diem) durabunt. Sunt qui odorē huius fruticis damnet, ceu insalubrē admodū: quod mihi sapissimè circa eū uersato, nondū est compertū. Memini etiā sepe folia sine noxame mandendo triuisse, nō deglutisse tamē. Rēbertus Dodonæus uim uenenosā e cicuta similē ei tribuit: quod in puero qui gustarat, labia & os inflata uiderit, & felē cui flores benè tritos cū caseo recenti dederat, mox ualdè inflatam esse, & paulo post mortuam.

Violæ Indicæ, aliæ purpureæ, alię aureæ, Vu. de his fortè floribus intelligens: quorum maiores aurei seu lutei sunt minores, foris quidem eodem colore, intus uerò croceo, siue è luteo rubente. Cognomen ab India non probò, cùm ex Africæ ora ad mediterraneum mare allati sint: quare *Caltham Africanam* potius appellauero. *Amatus Lusitanus* tradit hos flores inueniri croceos, & melleos & albos.

Fœ.

Fœniculum commune nullis ferè hortis deest, & annis aliquot durat: eadē prorsus species (ni fallor) circa *Monspeliū* syluestribus nascitur.

Fœniculum dulce, uel *Florentinum*, G. hoc æstiuum est, & nusquam puto suæ spontis, sed artis & cultus.

Fœniculum marinum, *Myuros* *Ætīi* aliquibus dictum, K. *Myurus* quidem *Ætīi* *Alinti* folia habet, ac ueluti corymbos in summo oblongos, per terram sternitur: *hydropicis* urinas educit.

Fœnogræcum facilè in cœlo nostro prouenit & maturat semina. *Argentinae* agros plenos conseri puto. Syluestre nunquam uidi. nam *Ruta capraria* *Italorum*, quam aliqui *Fœnogræcum* syluestre uocant, toto genere differre mihi uidetur.

Forbelina *Bononiæ* uulgò dicta, *Conyza* palustris quidam, G. *Morauis* & *Silesii* *Struppars*. Sponte nobis abundat locis aquosis.

Fr.

Fraxini circa urbem nostram frequentes sunt, in syluis & montibus frequentiores. non omnes nec ubiq; fructificant. Magna & fructifera est in horto Vu. In montibus nostris iuxta *Vuallestadium* plurimę sunt fructifere. Semina earum auis linguas medicī quidam uocant.

Frutex coronarius quidam, C.

Fragaria fructu, quem *fragum* uocant, rubenæ: & alia albo. G. Vberime in collibus & montibus nostris proueniunt fraga: eò odoratiora plerunq; quò altius nascuntur. Species earum minor, partim rubra partim candida sunt, herba hispidiore, unde *Naarbeer* appellant aliqui, ut scribit *Tragus*. Species alia sterilis. Alia audio circa *Badam* syluestria nasci in *Legerio* monte & alibi.

Frumenti Turcici uulgò dicti genera (quædam,) R. Discrimen forte in colore tantum fuerit. intelligo autē barbatum illud foliis magnis, arundineis, flore in summo caule inutili, cum fructus è culmo enascatur. Nos etiā in horto aliquando & flauum & rufum habuimus. Panicum opinor rectius, quā frumentum uocabitur, cognomen peregrinum. *Cordus Triticum* *Bactrianum* nominat. Facile crescit, et maturefcit maturè. *Triticum* *Turcicum* uel *Indicum*, rubrum & album, Vu.

Fructus quidam ex *Guinea*, *Guanabanus* forsā *Scaligeri*, C. Arborem hoc nomine *Pini* stipite, procera, fructu *Melonis* magnitudine, &c. describit *Scaliger* De subtilitate, exercitatione 181. partic. 6.

Fumaria, *Capnium*, *Capnus*, passim in aruis & locis cultis reperitur: De *Capno* *Plinii* uide supra in C. Est et *Fumaria* quædam montana, (quam ab *Illyriis* *Splet* uel *Split* appellari audio; quod nomen funem significat, ab intorta similiter radice oblonga,) magnis & admirandis facultatibus nobilis herba, nondum satis mihi cognita: *Italīs*, ut audio, notissima, eius species una flores luteos fert, quæ in monte *Baldi* ad *Veronam* reperitur, cuius loci incolæ eam nominant *Chelidoniā*, altera candidos flores habet, ac reperitur in mōte *S. Iuliani* in *Hetruria* prope *Lucam* urbem; nec aliter inter se differunt, quæ tamen in *Sclauonia* nascitur, foliis constat aliquantulum pinguioribus, quā quæ in *Italia* habetur, ut *Aloisius Anguillara* nos docuit. Videtur autem *Capnus* uel *Chelidonia* *Phragmites* *Ætīi* esse, & cognata *Aristolochiæ* rotundæ uulgò hætenus ab imperitis in *Germania* medicis existimatæ. Forma quidem foliorū & sapor à *fumaria* uulgari, ut audio, parum differt. Iconem eius inter *Ioan. Kentmanni*, picturas reperi. Alium *Capnon* *Plinii* uel *Phragmiten* *Dodonæus* pingit, herbam mihi incognitam, capreolis nitentem: quā in *Germania* inferiore in marginibus agrorum, & circa ueteres muros nasci scribit, pharmacopolis incognitam.

Ga.

Galega. Vide Ruta capraria.

Gallæ, O. in Quercu aliqua nimirum.

Genista, R. K.

Genista humilis, C. Flos tinctorius Tragi. nascitur nobis syluestris in collibus siccis & apricis, circa Badam & alibi, **Pfingstblümen**.

Genista iuncea seritur apud nos à quibusdam in hortis : sicut & in Italia aliquot locis, spectandi tantum gratia, Val. Cordus. Hæc mihi etiam hoc anno è semine prouenit, estq; nobis peregrina. Vide Spartus.

Genista uel Genistella spinosa, C. Hæc etiam colles quidam aprici apud nos abundant, ut & alia quadam minima in Genistarum genere, caulibus angulosis & peculiari quodam modo foliatis, Chamæspartium dixeris. Hæc duæ species, & tertia quam Genistam humilem nominauimus, simul crescunt in colle iuxta Limagum fl; infra Vettingam monasterium proximè.

Gentiana, C. O. Species eius quatuor, magnitudine & florum colore præcipue differentes, G. sed uidentur pleræq; aspernari cultum, præsertim quæ altius nascuntur in montibus, neq; enim caulescentes in hortis unquam uidi, neque florem aut semen emittere: ut neq; Elleborum album, Rhaponticum uulgò dictum, & alias quasdam, in nostris quidem regionibus. Facile tamen in hortis crescit & florer genus unum mediæ magnitudinis, foliis ferè Hirundinariæ. Flore ex cœruleo purpurascens de qua paulò pòst. Norimbergæ in hortis Elleborum album & Gentianam bene prouenire, floresq; & semina proferre audio. Ego hortuli mei solum umbrosius, ardius, & non satis pingue esse puto ad plantas quasdam perficiendas.

Gentiana cruciata, cuius radix crucis ferè instar dissecta est, **Modelgchz/ Ae.** Ea passim apud nos in collibus siccis apricisq; & asperis crescit: radice plerumq; inter lapides sub terra latentes descendente, alba, peramara. In hortis uix apprehendit effosaradix, & aspernatur cultu; semine puto in solo sibi conueniente melius nasceretur.

Gentiana foliis Hirundinariæ seu Asclepiadis quorundam, **Giffwurz/ Schelmenstraut/ C.** Piperinus, G. Copiosa ubiq; apud nos locis montanis, circa semitas alibiq; apparet. Effossa radix, & in hortis translata, apprehendit, durat, & caulè, flores ac semina profert una in hoc genere facillimè. Causam esse puto, quoniam radix non singularis est, ut in plerisq; aliis, sed multiplex, Flores multos, confectos & eleganter cœruleos extrema æstate fert.

Gentianæ species pulchra, Picris dicta, K. Picridis nomen forte recentior aliquis ei confinxit: nam ueteres Græci, ut Theophrastus, Cichorium syluestre Picridem uocabant. Intelligit autem forte, K. Gentianæ speciem paruum in pratis humidioribus autumno floribus cœruleo colore saturato insignem: quæ Plinii Calathiana, aut eius species uidetur. Hæc aliquoties in hortulo mihi plantata, paulò pòst interit: quanuis enim radix ei non simplex sit, locum tamen desiderat palustrem. Sic & Gentianidem seu Gentianulam alpinam, nunquam retinere diu potui, iugis montium, aëri gelidissimo, & uentis niuosis assuetam. Sed neq; Violam Hippionà Cordo cognominatam, quæ & ipsa ueluti Gentiana perexigua uideri potest, in humidis pratis, præsertim montanis apud nos, proueniens: sed cum amaritudine careat, diuersi generis fuerit. Gentianidem alpinam autumno superiore cum cespite plantauis: quæ nunc etiam æstate pulchrè uiret: florem quidem producendum uix spero.

Geranii species quædam, G. una uulgaris circa urbem nostram, locis planis et arenosis præcipue emicans, folio Maluæ. Altera maior, montana, radicibus rubris, asstringentibus, **Blütwurz** appellant, hoc est, Ischaemon à facultate: (nam alia Plinii Ischaemos est) uiuacissima in hortis: & flore perpulchro, è purpura subcœruleo. Tertia fere similis montanæ, maioribus & latioribus foliis: quibus Aconitum luteum repræsentat. nascitur in humidioribus pratis, in quibus ferè Bistorta etiam uulgò dicta, flore rubente: hæc iam secunda æstate in horto mihi durat.

Geranium illud cui subrotundam radicem Dioscorides tribuit, in Illyria nasci

Nn

tur, superficie iam dicto simile: ab Aloysio Anguillara primum ex Illyria allatum superiore anno.

Geum Plinii, ut uidetur, herba quam uulgò Caryophyllatam à radice odore uocant, aliqui Benedictam. Huius genera tria in horto mihi uidentur. Primum, quod urbanum dixerim, radice odoratiore cæteris: hoc circa urbem nostram iuxta sepes alibiq; in umbrosis abundat. Secundum, riuale: nascitur enim iuxta riuos; & in hortis quoq; aliquandiu perdurat. Tertium, alpinum: pila lanuginosa postquam defloruit, maiore. Proximo autumnò, primum à me in hortulum translata, nescio quā uiuax futura. Quòd si Geum fortè alicui potius uideatur species laceæ, non cõtendam. Scaliger Getiam appellat, quasi ad Geum alludens. Getia nigra (inquit) uulgaris est, & ad scoparum usum quaesita; sed radice spirante Cinnamomum, aut uerius Nardum, &c.

Gith. Quære Melanthium.

Gl.

Gladiolus uerus, G. è montibus Curiaë Rhætorum ad me missus & plantatus, primis duobus annis folia quidem habuit, sed sine caule & flore: tertio & quarto floruit, & semen perfecit. Eundem in suis hortis alunt, Ae. Vu. C. A. Fert in uno caule modò duodenas flores, modò quinq; aut circiter. Aliqui Victorialem rotundam appellant: ut Allium alpinum, herbam toto genere diuersam, Victorialem longam: propter similem radice formam, multis ueluti loricis armata.

Glaucium Papaueri corniculato simillimum, radice succo luteo prægnanti: floribus ex nigro, luteo rubroq; permixtis, (aliàs, floribus purpureis,) Patauii in horto Priulano, è Syria. [Vide Memiba & Papauer Cornic.] Nunc etiam Basileæ nasci audio in horto Theodori Zuuinggeri medici, angustioribus & pilosioribus foliis quàm corniculatum Papauer: cuius fortè species est.

Glaux uel Onobrychis Dodonæo (Tomo 2. Iconum, pag. 32.) existimata herba apud inferiores Germanos in hortis tantum colitur. Eadem, uel cognata ei, circa Curiam in pratis abundat, fructu echinato seu aspero, subrotundo, pecoris pabulo lactiq; augendo celebrata. Caules cubitales, fungosi, multi ab una radice surgunt: foliola Lenius ferè sunt, & in acumen exeunt, subtus hirsuta albicant: bina plerunque, octona uel nouena utrinq; in summo terna: satis coniuncta, sed recentius nata multum distant: insipida, &c. G.

Glycyrrhiza. Lege Dulcis radix.

Gn.

Gnaphalium. Vide Impia.

Gnaphalium marinum, (uel potius maritimum,) Vu.

Gr.

Graleg. Vide Ruta capraria.

Graminis species Capriola uulgò Italica, Sanguinaria Auicennæ, O. G. In areis hortorum, alibiq; sua sponte exilit: ut & Dioscoridis gramen passim locis arenosis, geniculatis suis radiculis reptat: Cannaria Plinii ut uidetur. Nusquam non nascitur, abundant eo cœmeteria. At Theophrasti Cynops, quam Gaza Canariam uertit, Psyllium est.

Gramen album seu hirsutum, fibris radicum candidis, passim areis innascitur, inuisum mulierculis, quòd alimentum alijs herbis subtrahat. Hoc etiam aliqui Dentem canis Gallicè nominant: cum id nomen graminis Dioscoridis potius debeatur. De hoc Matthiolum sentire puto, cum scribit: Ex illo graminis genere, quo pueri ludentes sanguinem è naribus eliciunt, Sclaui Carniolæ incolæ, item Goritienfes, semen colligunt, deglubuntq; in pilis, & Milii uel Panici modo in carnium iure decoquant, granulis oblongiusculis, Panico minoribus, gustui nõ ingratiss, adeò ut Germani Himmeldaw uocent, hoc est, cœlestem mannam. Hanc herba in Sclauis Cornicis pedem uocant: Leoniceus Coronopum Dioscoridis putauit.

Gramen alpinum quoddam, Rabinum cognominant lactariis, præcipuum, foliis breuibus

breuibus, carnosis, (non apparentibus nervis,) circa radicem radiatis in orbem pluribus, G. florem nondum uidi, pecori eius pabulo lactis copiam plurimum augeri aiunt.

Gramen Parnassi C. intelligit autem illam quam Poloni Enneadynamin uocant, Germani quidam florem Hepaticum, *Leberblümle*; in palustribus pratis nascentem herbam, & in hortis non facile durantem. Sed uerum Parnassi gramen a nemine adhuc demonstratum puto, nostro seculo.

Gramen à Fuchlio exhibitum, pulchris flosculis, candidis, & non indignum hortis, circa Tubingam passim iuxta uias & sepes Aprili mense florere uidi: apud nos non prouenit.

Gramen alpinum quoddam, breuibus, solidis & mucronatis foliis, quod uulgò in Bernensium aut Vallesiorum montibus Rabinum uocant, ceu principale puto: quod præcipuum hoc uaccis ad copiam lactis augendam pabulum sit: hoc nuper in hortulum transuli.

Gratia Dei C. intelligit autem uulnerariam illam herbam quam Tragus ficto nomine *Heiden hyssop* appellat: quæ circa syluas & in collibus siccis, apricisq; sub fruticibus, passim apud nos obuia est, cultum non facile ferens, ea, si libet, uulneraria hyssopoides appelletur. Nostri aliam Gratiam Dei uocant, illam Sideritidis speciem, quam alii herbam Roperti. Galli quoq; aliam, quam Elaphoboscon aliqui putarunt: Tragus uulnerariæ herbæ nomine descripsit lib. 1. cap. 143.

Gu.

Guaiacum C. Puto autem ipsum sentire de arbore illa, quæ Patavii etiam hoc nomine in horto medicorum ostenditur: quam audio nasci in montibus circa Veronam; & è ramis eius aqua maceratis, rusticos uiscum parare: atq; ideo Viscaginè ab eruditis quibusdam ficto nomine uocari: quoniam Guaiacum non est: fructus eius immaturos, altringere: maturos uerò ita dulces esse, ut ferè nauseam moueant.

Guanabanus. Vide Fructus.

Ha:

Halicaccabus, R. G. in Sabaudia alicubi uidi in campis nascentem, locis humilibus & humidis. Solanum uescarium. *Judenkriese*.

Halicaccabus peregrinus à Fuchlio dictus, Caput monachi uulgò Gallis quibusdam, G. Non reperitur in Europa quòd sciam, præterquam in hortis. Toto genere à Solano halicaccabo differt.

Harmel, Harmala, K. C. foliis oblongis, flore albo: Ruta syluestris quædã, Vu. Vide in Ruta syluestri.

Hastula regia alia Asphodelus est, de quo diximus: alia in genere Maluarum, de qua leges infra.

He.

Hedera arborea, R. ea nimirum, quæ baccis nigris insignis passim arbores aut muros scandere & exedere uidetur. Eiusdem species luteis baccis est in horto K. Syluestre genus illud quod semper humi reptat, ubiq; obuium est.

Hedysarum. Lege Pelecinus.

Helenium. Vide Inula.

Helenium alterum Dioscoridis, Theophrasto simpliciter Helenium, hodie non satis cognitum; olim in hortis cultum apparet, sicut Serpyllum quoq; & Silymbrium. Lege Theophrastum Historiæ lib. 6. cap. 7.

Heliochrysus uerus, Italicus: planta rara, pulchra & odorata, K.

Heliotropium maius, AE. Vu. C. G. aliqui herbam Cancri uocant. Nascitur in aruis, flosculis candidis, scapo eorum inflexo instar caudæ Scorpionis, unde Scorpioides album dici poterit.

Eiusdem species altera, locis humidis gaudens, flosculis cœruleis: quam Scorpioides cœruleum dixeris:

Heliotropium minus, quod & tricoctum cognominant, siccū aliquoties uidit et

Nn ij

rae uerò haerens, nunquam, dignum certè quod in hortos recipiatur & specie sua, & uiribus medicis, quas commendari audiui, præsertim aduersus febres. Circa Monspelium sponte nasci audio, solo humili, arenoso & aquatico. Patauii feritur in hortis, seminibus è Creta missis.

Helxine quæ uulgò Parietaria dicitur, nusquam deest, omnibus ubiq; medicis & pharmacopolis notissima: humidis & umbrosis circa parietes locis uiret.

Eiusdem species altera Cissampelus cognomine, in Conuoluulo dicta est.

Hemerocallis, C. Dodonæi nimirum, qui Liliū syluestre purpureum à Fuchsiō cognominatū pro Hemerocallide pingit. Hemerocallis uera, O. K. & alia quædam eius species K. Matthioli pro Hemerocallide Liliū syluestre pingit, quod in Italia passim inter segetes, in aruis, in pratis, montibus & uallibus reperiri scribit, flore aurei coloris: & alteram eius speciem, quam Fuchsius Liliū rubens uel crocèū nominauit. Quòd ad uires, parū interest: utriq; enim Liliū (candidi) uires esse puto: quas & Hemerocallidi tribuit Galenus. Itaq; non errauerit (opinor) qui Hemerocallides, omnes istas appellauerit, adiecta aliqua differentia: ut sunt, alpina, aruensis, purpurea. Alii Hemerocallidem aliam esse putarunt, Bulbū scilicet litoralem Theophrasti, quod Monspelii Pancratium interpretantur, & pharmacopolæ uulgò pro Squilla minore habent. Hos fortè decepit Liliū marini nomenclatura, quæ apud Dioscoridem Hemerocallidi tribuitur. Cæterum aliud est Hemerocallis Theophrasti, toto genere diuersum.

Hemionitis Germaniæ peregrina est: in hortis quidem nostris translaturum cespitem faciliè duraturum sperarem: quandoquidem Phyllitidi nostræ tam faciliè diuq; duranti cognata uidetur.

Hepatica aurea, (herba trinitatis Italis, à folio nimirum tripartito: Germani aliam hoc nomine uocitant,) O. Nascitur in syluis, locis humidis & umbrosis: unde in hortos translata, diutissimè uiuit: & ueris initio, aut potius ante uer, Februario mense pulcherrimis cœruleis floribus tempus uernum nobis prænunciat, Rarior est flore albo. Vtraq; hortulum meum ornat.

Heptaphyllum, O. nimirum Tormentilla uulgò dicta: quæ nusquam non apud nos collibus humidis emicat, in hortis non diu durat, uel Quinquefolium palustre: quod aliquos Heptaphyllum uocare uideo. Nascitur id circa Lacum Felium apud nos dictum, floribus purpureis.

Herba scala, O. nescio quæ.

Herba ferrata, C. nescio quæ.

Herba trinitatis alia uocatur Italis, nempe Hepatica aurea ut iam diximus: alia Germanis, de qua inter Violas dicemus.

Herba uenti Monspelii dicta, Vu. *Ανέμοφιλος* in compositione Marciati unguenti magni nominatur apud N. Mirepsū: ubi Fuchsius: Herbam uenti (inquit) sunt qui Umbilicem Veneris esse dicant: alii Helxinem seu Parietariam: nonnulli Consolidam minorem uocatam.

Hermodactylus Mesuæ, folio maculoso, K. Circa Bononiam, ubi sponte abundat, Dentem canis uocant: aliqui non rectè pro Satyrio Erythraico ostendunt hanc aut similem quandam.

Herniaria à Gallis dicta, à nonnullis (nifallor) Millegrania. in agro Monspelienti ubique in aruis crescit. Tragus Empetron uocat, Germanice *Harntraut*. In ripis Rheni infra Brisacum etiam uidi, G. æstiuā est herbula: & seipsam profeminat.

Hi.

Hieracium maius Creticum, satium, Patauio nobis missum, G. A. Ac.

Hieraciū minus, agrestis herba, Hedypnois aliter dicta Plinio herba passim obuia, circa urbes præsertim & in hortis, maximo (ut puto) post Tragopogonem paporum globo, *Χόλιντραυτ*. Matthioli cum Intybis & Cichoriis hanc herbam pingit, Dentem leonis, aliisq; nominibus, recentioribus tantū nuncupans. Pro Hieracio

racio autem minori, herbam aliam minorē, Sonchis puto cognatam, exhibet. quod ad vires, parū interesse arbitror.

Hippion Cordi. Vide Calathiana uerna.

Hippoglossus, (melius Hypoglossus) seu Vuularia uulgò dicta, *Zeppsintraut/* K. Itali Bonifaciam uocant. Patauini quidam in hortis colunt. In Germania non puto nasci sponte. Adfertur ex Vngaria: ubi reperiri audio in ripis fluuiorum, solem occidentem uersus plerūq; locis non humidis. In hortis satum prouenit quidem, ut audio, sed pumilum manet, nec fructificat. Radix quidem satis crassa, carnosa, & geniculata cum sit, herbam uiuacem ostendit.

Hippomanes. Videnus Methel.

Hippomarathrum, K.

Hipposelinum. Lege Olusatrum.

Hirundinaria. Vide Asclepias.

Ho.

Hordeo obseruntur agri. Nascitur & quod Nudum uocant, in Italia.

Horminum, O. Sclarea nimirum uulgò dicta: cuius species una hortenſis est; floribus ex albo subcœruleis: altera syluestris, nusquam non in pratis obuia, flore cœruleo ut plurimum, rarior albo: utraq; in hortulo nostro duos aut tres annos durauit. Hormini pulchra species, K. Aliqui Orminum sine aspiratione scribunt, Galenus Phormium.

Hy.

Hyacinthus, O. R. Vide Bulbine, & Bulbus syluestris. Hyacinthorum multæ species, Vu. Primus & secundus Fuchsii, Ae. Hyacinthi tres species, C. qui & Pancratium à quibusdam existimatum pro Hyacintho accipit. Hyac. orientalis, K. Varrii, Leucthnerus. Autumnalis, C.

Hyoscyamus uulgaris, circa urbē nostram nascitur, loco plano & ruderato: Matthioli unus duntaxat Hyoscyami genus sibi cognitum scribit: flore aureo, & semine subflauo potius quàm nigro: atque hic est uulgaris noster *Bilsensamen/* qui ab ipso & Fuchsio pingitur. Dodonæus officinis familiarem esse scribit, & nigrum nominat, tanquam à floris colore potius quàm seminis: sicut album quoq; & luteum à se uocatos. Hier. Tragus & Dodonæus Hyoscyamum album quoq; pingunt atque describunt, qui in hortis Germaniæ inferioris seratur.

Hyoscyamus albus & luteus, æstiuæ herbæ, C. Fatetur autem se dubitare an uerè Hyoscyami sint. luteus quidem peregrina illa herba est, quam aliqui è Syria allatam aiunt, sapore acris floribus Hyoscyami, luteis. Monspelii quidam Priapeiam uocant à forma fructus. Hyoscyamum nec sapore, ut dictum est, nec odore refert: nec aliter puto quàm flore, calyce ac semine. Satus apud nos probe crescit, & facile maturat semen, Hyoscyami tertia species Patauii in hortis feritur: semine, quod nuper mihi amicus ad me, exili, subruffo è fusco, allato è Creta.

Hypecoum, K. C. & alterum spurium, (à Matthiolo nimirum pro Hypeceo pictum, quod Malua & Alcæ species est,) C.

Hypoglossus. Lege Hippoglossus.

Hyssopus uulgaris, nulli fere horto deest. Ramulus auulsus facile radicaſur. Syluestrem nasci puto in Narbonensi Gallia: sed & apud Vallesios nostros sponte oriari audio.

Hyssopus Crispa, C.

Hyssopus de Moschata, Rurpodius, C. G. Peregrina hæc seu Cilissa Hyssopus à Dodonæo describitur: & cum iconibus Stirpium primi Tomi Fuchsii Antuerpiæ excusis cum nominibus & descriptionibus Hispanicis, sub libri finem depingitur: facile crescit sata.

Ia.

Iacæ syluestres herbæ, flores habent uiolacei coloris, unde & nomen forsan illis impositum est. Ia enim Græcis Violæ sunt, quanquam Iacæ nomen uetus non est. Scaliger alicubi Getiam pro Iacæ scribit, tanquam à Geo facto nomine: nimirum

Nn iij

quod nigra cognominata in hoc genere, radices ut Geum Plinianum, odoratissimas habeat: ut ipse scribit, ego haecenus odorem illum non inueni, cum tres aut quatuor species norim, omnes Centaurio maiori cognatas: quaedam in pratis, aliae parietibus, aliae collibus siccis nascuntur. Hortis quidem dignissima fuerit species illa, si inueniatur, quæ Scaligero Cinnamomum aut Nardum olet, ueluti Baccharis quædam. Vide supra in Geo. Iaceam quoque aliqui uocant herbam prædictis longè diuersam, Violæ nigrae cognatam: de qua inter Violas,

lasme, uel (ut alii scribunt) lasminum, Ieseminum, Gelsiminum, floribus albis, suauissimio doris, G. facile nascitur, etiam ramulis & taleolis: & propagatione breui multiplicatur: semine non item, ut puto. Iuxta parietes plantari debet, & opere topiario digeri, bene fert hyemes, ut mirer apud nos tam nobilem fruticem neglectum haecenus fuisse. Copiosum & procerum Lindauia uidi in cauedio domus Matthiae Curtii. Idem alunt partim candido, partim etiam luteo flore C.K. Rurpodius. Arabum uernacula lingua (inquit Matthiolus) Zambach siue Sambach uocatur. nec diu est, quod in Italiam allatum est, quamuis nunc ubique horti opere topiario tum albis, tum luteis, tum etiam caeruleis Gelsiminis ornentur.

Iberis (sic enim scribendum sine aspiratione) à Matthiolo picta, G. semen ex Italia habui. facillimè prouenit, nasturtio syluestri cognata herba, fruticosa, multis, longis lentisque ramulis: anno altero in caulem effunditur, & semina profert, quorum restibili fecunditate durat. hyemes contemnit, nec folia amittit quæ iuxta radicem sunt. Dodonæus aliam quoque Iberidè nominare uoluit, nasturtium pratense quoddam, frequentissimum in pratis nostris, foliis ferè rotundis. *Gauchblüm.*

Ieseminum. Vide lasme.

Illex aquifolia. Lege Aquifolium:

Im.

Imperatoria, Quære Astrantia.

Impia Plinii, ut Matthiolus interpretatur: Gnaphalium quibusdam (ut Fuchsio) existimatum, *Rurtraut*/G. Collibus terrenis & apricis passim abundat.

In.

Intybum (Endiuium uulgò) Italicum O. Verum, & alterum uulgare, R. Angusti folium, quod Scariolum aliqui uocant: & latifolium, quod ad acetaria hyemis terra obruitur, (ut dictum est supra in Cichorio,) G. Agreste sua sponte passim circa uias abundat. Vide Seres.

Inula, uulgò Enula, R. O. G. Hæc alibi puto in campis & pratis, sponte nascitur: unde campanam medicis cognominant, hortensi nimirum præferentes. at quæ apud nos reperitur in hortis, & pratis circa domos urbi uicinas, omnis puto plantata est. Vide Helenium.

Iouis flos Theophrasti, nostris uulgò Cœli flos, *Himmel rôfle*/Lychnis aliquibus, ut Matthiolo: qui genus etiam syluestre eius apud Ananienenses inueniri tradit.

Ir.

Iris communis, G. hæc semina non fert: quod si hæc ipsa alibi syluestris reperitur, ut puto, Iris syluestris maior fuerit. Non solum autem in uno flore unius speciei colores diuersi reperiuntur, sed etiam in diuersis diuersarum specierum floribus totidem ferè iidemque, ni fallor, qui in arcu cœlesti. Iris albo flore, F. Ea, Matthiolo teste, è genere hortensium est, cuius radix odoris fragrantia & uirium robore Illyricam ferè equat. Ex epistola amici ad me: Lacuna uult omnes Iridis (siue arcus cœl.) colores in uno flore spectari, ex Dioscoridis sententia. Cornarius autem diuersos flores diuersis coloribus tinctos, ex sua uersione, (qua Græca Dioscoridis uerba prorsus sequitur,) sensisse uideri potest. Vidimus quidem nos Iridis flores totos albos, & totos caeruleos: alius fortè rubros: noui ego qui & melinos uiderit.

Iris Florentina, Rurpodius huius radices uegetiores sunt, & solidiores, siccatæque non corrugantur ut postræ, gustu minus feruidæ, foeminam dixeris. Puto autem hortensem esse.

Iris

Iris Illyrica, Ae. K. O. *Iris sylvestris*, Hermolao Barbaro *Illyrica dicta*, K. crescit sponte locis mediterraneis *Illyriae*.

Iris tenuifolia, Ae. Hæc puto est, quæ in pratis humidis quibusdam apud nos crescit copiose: & semina quoque profert, *Illyrica* similis, ut audio: communis urbana undiqueque minor. Eadem in hortulo meo iam aliquot annos durat. Ab hac differre puto duas *sylvestres* à Matthiolo exhibitas, in montibus & collibus saxosis nascentes.

Iris Arabica (si recte legi, & non potius *Illyrica* legendum est, ut conicio:) & altera cœlestis, (nimirum communis,) R.

Iris Matthiolo alia est fatiua: eaque uel cœruleis, uel niueis floribus: Alia *sylvestris*, foliis reliquisque partibus, fatiuae similis, paulo minoribus tamen. Ex hac fatiua originem duxisse uidetur cultu uegetior grandiorque effecta. Sic ille. Sed cum & fatiua & *sylvestris* in hortis reperiantur, neque hæc opinor in illam cultu degeneret, specie eas differre existimandum est. Est & altera *sylvestris*, inquit, foliis Gladioli, longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrusa, inodoraque: caule breui, flore cæteris longè minori, odore Armeniaci mali, &c. Sunt qui hanc legitimam *Illyricam* putent, *Illyricam* ab *Italica* differre existimantes, ego uerò *Illyricam* non uel genere uel specie à nostrate differre dico. sed quòd cœli solèque illius conuenientia præstantioribus polleat facultatibus. At cum fateatur *Illyricam* esse *sylvestrem*, *Italica* autem *sylvestris* species duas ipse proponat, existimandum est *Illyricam* uel alterutram ex illis esse, uel tertium genus *sylvestre* ab ea constitui. itaque indistincte loquitur qui simpliciter ab *Italica* nihil eam differre dixerit. Errant qui *Iridem domesticam* nullam esse, aut saltem à ueteribus non memoratam putant, quoniam Theophrastus dixerit *Iridi* nullum cultum accommodari. At Theophrastus de *Illyrica* tantum locutus est. neque de cultu hortensi dixit: sed Græce ἡ ἱρις αἰνὰ καὶ τοῦ οὐλοῦ καὶ τοῦ πλῆθους τοῦ καλλίστου καὶ ἀναγκαῖου. quæ uerba si Græcè legisset aut intellexisset Matthi-olus, commodius illorum opinionem retudisset. non aliud enim sentit Theophrastus, quam *Iridis* illius radicem, ut suauiter odorata uæneat, non aliter præparari, quam ut circumquaque purgata acrafa, siccetur. Hæc prolixius, sed ab hortorum cultu non aliena.

II.

Istis fatiua, *Glastrum*, Weid/O. G. facillimè nascitur: altero anno, si bene memin-erim, caulem, flores & semina perficit. Alicubi agri hac herba conferuntur in usum tinctorum. *Sylvestre* genus eius apud Vuallesios nostros extat, & alibi.

Ispopyron, C. id nimirum quod Dodonæus exhibet, quod Germani superiores *Biber Elee* uocant, inferiores *Bocyboonen*, id est, Fabam hircinam. Ternis enim foliis, fabaceis ferè, locis palustribus reperitur: radice longa, geniculata, &c. Hoc ille *Ispopyron* putauit, quoniam alio nomine *Phasiolus* à Dioscoride dicitur. *Phasiolum* autem interpretatur Fabam communem, cui planta hæc similia habet folia. At *Ispopyron* Dioscoridis *Aniso* simili folio constat, cuius extremitas in capreolum torquetur *Phasioli* instar, &c. hoc die, quod sciam, ignotum.

Iu.

Iuam aliqui *Chamæpityon* uocant, de qua dictum est supra. *Iua arthritica* & moschata, F. *Moschatam* puto alii aliam cognominant. Rhæti *Insubriae* finitimi, sic uocant herbulam montanam, *Tanaceto* cognatam, &c. aromatico odore insignem: quam autumnio superiore in hortulo plantaui: & nunc etiam in fine Iunii pulchrè mihi uiret: florem nondum ostendit, siue quòd nondum tempestiuum sit: siue quòd loco umbroso plantata est, & ætas huius anni 1560. humidior frigidiorque solito.

Iuiuba. Vide *Ziziphus*.

Iuniperus, R. Ea colles & montes nostri abundant, tum humili, quæ baccas maiores fert: tum arborecente, quæ minores. Minima est quæ in Alpibus nascitur: quæ aliquando plantata mihi, non apprehendit.

Keiri uel Cheiri. Vide Leucoia.

La.

Laburnum Plinii, K. Ae. C. Quare Anagryis.

Lachryma Christi uel Iobi, O. K. Hanc aliqui Lithospermi speciem faciunt: pro-
bè quidem si seminis substantiam respicias: modò Dioscoridis Lithospermum gene-
re toto differre intelligamus. hæc enim Arundineæ naturæ est, quæ in hortulo no-
stro aliquando fata, antè florem interiit. Monspelii in hortis frequentem uidi. Arun-
do Lithospermos forte nominari poterit, quanuis radix ei nõ est ut Arundini geni-
culata, sed in multas statim ab uno principio fibras diuisa. Itali uulgò Lachrymam
Iob uocant, nullo eius, usi nisi quòd mulierculæ seminibus istis filo traiectis suas pre-
ces numerant.

Lactoris. Vide in Erino.

Lactuca alba, nigra, crispa, G. Est autem crispa, ni fallor, eadem quæ sessilis & ca-
pitata: excaulis, Pythagoricis Eunuchion, mulieribus astytis, (sic enim legendum,) Cili-
cia aliquibus & Latifolia, crispa, latiorq; Cappadocia, admodum probata. Ca-
pitatæ quidem genus minus, in hortis nostris est: maius Basileæ, præsertim apud
Cælium Secundum.

Lactucæ syluestres quædam, elegantes herbæ, in syluis alibiq; apud nos inueni-
untur: una purpureo flore, aliæ luteo: in hortos transferri dignæ. flos omnium pap-
pescit. Ex his quæ in syluis humidis crescit ad quatuor aut quinque cubitos, Sonchus
arborescens Dioscoridis est forte. Species una ex illis, folio oblongo, subdulci &
grato gustu, anguloso: floribus luteis, &c. in horto multis mihi annis durauit.

Ladanum. Vide Ledon.

Lamium. Vide in Vrticis.

Lantana, uulgò Italis dictus frutex, quòd Viminum instar lenti eius ramuli sint:
pictus à Trago lib. 3. cap. 28. *Eleiner Walbaum*: in plerisque scipibus nostris arbusculi
instar excreuit. Aliqui Viburnum hoc putant.

Lanaria, O. Saponariam uulgò dictam intelligens, ni fallor.

Lancea Christi. Vide Ophioglossum. Aliqui Sideritim primam Matthioli in a-
quaticis nascentem sic uocant.

Lanceolam montanam, uocare libet herbam quandam in Albio nostro nascen-
tem, locis argillosis, rarissimam: foliis Plantaginis minoris, oblongioribus: radice ob-
longa, simplici, foris nigra: & si uratur, odorata. Hæc in hortulo meo plantata, pau-
lò post interiit. Alibi uidere non memini.

Lapathum hortense in Sabaudia tantum uidi, circa Laufannam, & alibi, ubi Lam-
pe uocatur uulgò. Huic simile est Lapathum syluestre, quod & Oxylapathum
uocant, à foliorum figura acutiore (quàm nonnullis, non quidem omnibus) Lapa-
this, nusquam non obuim. Hoc circa Friburgum Heluetiorum ut audio, foliis ferè
rotundis inuenitur. Maximum est, quod aliqui apud nos in hortis ferunt, Rhabar-
barum monachorum dictum: quod idem aut omninò proximum Hippolapathum
(in palustribus locis, aut montanis nascenti) uidetur. Minima est coxalis, ab acido sa-
pore dicta: una maior, pratensis, longioribus foliis: altera minor, quæ circa Glaro-
nam nostram locis siccis & lapidosis ad pedes montium circa ripam Limagi nostri
nascitur: eademq; aut cognata, rotundioribus foliis, quàm Galli & Sabaudi in hor-
tis ferunt, propter succum eius acidum, embammatis præcipue utilem. Acetosam
Gallicam aliqui uocant. Est & aliud Lapathi genus syluestre, quod circa lacus no-
stri ripas nascitur, in ipsa etiam aqua. deniq; Persicaria uulgò dicta, in humidis na-
scens, maculis nigris, Lapathum quoddam uidetur. Postremò Rhabarbaricum, La-
pathis omninò affine est.

Lapathis etiam, (Oxylapathum præsertim,) adnumeranda est herba illa, quam San-
guinem draconis uocant, propter colorem in foliis & caule rubicundum, semine
simili, foliis minoribus, gustu aspergenti, Ae. G.

Lapfana.

Lapsana. Vide Rapistrum.

Larix alpina arbor in altissimis Rhætorum & Valesiorum montibus nascitur. Scäliger Græciæ ignotam esse prodidit. In colle urbis nostræ Tiliis consito Larices duæ spectantur; & Bernæ iuxta templum. Plantaueram & ego paruulas in prædio meo Larices: quæ non prouenerunt, diutius opinor in uia retentæ.

Laserpitium Gallicum. Vide Angelica & Asfrantia.

Lathyrus in plerisque hortis apud nos, suis ipsa seminibus sparisis se profemina.

Lauandula uulgò dicta, Stichadi ueterum cognata, sicuti & Nardus uulgaris: in Liguria (unde & in Africam uchitur) suæ spontis; &, nisi fallor, circa Monspelium quoque in plerisque apud nos hortis colitur.

Lauræola seu Daphnoides, F. Sponte quidem circa lacum Lemantum nascitur, foliis ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis, &c. Vide Piper mont.

Lauri aliquot, K. Ac. G. iam quatuor fortè annorum quædam & cubitales è bacis prognatæ. Ante hyemem in uasa transfero, sub tecto reponendas. Vere rursus in hortum, scrobibus in area excitatis. Iacobus Funcius, prætor urbis nostræ, annis iam quindecim ferè, Lauros iam quatuor cubitos altas habet: quæ tamen hæcenus nondum eifloruerunt, (alteri cuidam ciui nostro, proxima estate floruit sua, nescio quot iam annorum Laurus.) Curam eandem adhibet, quam supra Citris ab eo adhiberi diximus.

Laurus syluestris. Vide Tinus.

Laurum Græcum Plinii interpretantur aliqui arborem uulgò ab Italis dictam Sycomorum: de qua diximus in Azadaracht. Seritur Laurus etiam ramo, teste Plinio, de quo ueteres dubitauerant. Laurus uulgaris, quæ Baccalia tempore Plinii dicebatur, à baccarum fertilitate. Idem meminit Spadoniæ, mira opacitatis & umbræ patientia insignis, ea forte facilius in Germania, quam alia Lauri genera duraret.

Laurus Alexandrina, C. Interpretatur autem Hippoglossum, de qua superius dictum est.

Le.

Lens maior, G.

Ledon, alterum Cisti genus (frutex è quo Ladanum fit) mas et foemina, A.

Lentiscus, Rurpodius.

Leontopetal, quod Matthiolum pictum exhibuit, radicem recentem uir quidam eruditus, superiori æstate ad me misit: pugni crassitudine: quæ nescio quomodo mihi euauit. Semina eius in Italia non reperiri audio.

Lepidum Aeginetæ, Lauri folio, maiore, G. In plerisque ciuium nostrorum hortis commune, à Sinapis sapore *Sensifraut* dictum. Sponte nascitur Romæ intra & extra urbem, Crapinella uulgò dicta.

Leucacantha, id est, Alba spina, C. Intelligens puto Carlinam uulgò dictam, (de qua supra,) ex Dodonæi sententia.

Leucoium proprie Violam albam significat, (ut Melanium nigrum, Theophrasto,) sed eodem nomine cuiuscunque coloris eiusdem generis flores appellantur. Sunt enim Dioscoridi Leucoii flores cœrulei, albi, purpurei, aut lutei. Mihi ceteri inter se omnino cognati uidentur, ut in solo colore differētia sit. (*Strassburger nägele*, nostris.) Lutei uerò nobis cogniti, qui Keiri Arabice uocantur, sui sunt generis: odore, sapore, specie tota, & duratione differentes: propter similitudinem tamen ad eiusdem nominis communionem asciti sunt. *Gäle nägele*. Leucoia proprie dicta, alba dico, purpurea & cœrulea (uel potius uiolacea, cœruleo purpureoque colore mixtis,) in hortis tantum apud nos uisuntur, & hyemem non ferunt, nisi sub tecto loco tepido reponantur. Reperitur huius generis syluestre in litore maris circa Monspelium. Lutea uerò hyemem facile ferunt: & syluestria in muris ac mœniis oppidorum, multis in locis, Galliæ præsertim habentur. Hæc

ante alia florent, initio ueris si loco aprico sint. Eorundem genus syluestre minus, Argentinae circa uias & sepes in suburbiiis lulii, principio florens reperi. Viola alba, et species maior, flores multos singulis caulibus sustinens, C. Leucoii (inquit Dodonaeus) duo genera sunt, unum quod à satione anno altero, & deinde aliquot sequentibus, primo uere floret: alterum priori simile, minus tantum & ternerius: quod uere satum, mense Augusto ut plurimum flores profert. Vtriusque flores aut sunt rubei, aut ex purpureo in puniceum inclinantes, aut albi, aut cineri candidiori colore proximi.

Leucoia hortensis, quae praediximus, in plerisque omnibus mediocriter instructis hortis reperiuntur apud nos, & alibi.

Leucoium marinum purpureum, Vu.

Leucoium bulbosum Theophrasti, Ac. G. *Wysf Hompunge blumen*. In syluis quibusdam apud nos circa Glattum fluvium nascitur.

Li.

Libanotis prima ex Asia, Ae.

Libanotis prima Dioscoridis, quam Ferulaceam cognominarim: ab eruditis quibusdam in Italia creditur, quae à nonnullis uulgò Ferula existimatur ut audio: suae spontis in montibus Italiae quibusdam. Vide in Ferula.

Libanotis (ferulacea) nigra Dodonaei, *Schwarz Hirzwurz*: & alba eiusdem, *Weyß Hirzwurz*: Fuchsius hanc Sefeli Aethiopicum facit, (ut & Matthiolus:) illam Peloponnesiacum. In hortos non facillè transferuntur radicibus: è seminibus puto felicius exorturæ. In collibus terrenis apud nos reperiuntur alba quidem apertis, illa potius umbrosis in Albio monte.

Libanotis coronaria. Vide Rosmarinus.

Libanotis Theophrasti, C.

Ligusticum, uel Leuisticum, uulgò dictum, *Lybstickel*, R. G. de ueteri eius nomine nondum constat. Matthiolus Hippofelinon esse putat. In Africa audio plantam Silphii huic persimilem esse.

Ligusticum, seu Lybisticum uerum siue ueterum, C. Ae. Sic autem uocat Ae. Siler montanum uulgò dictum plerisque pharmacopolis: quod quidem si Sil, uel Sefeli aliquid non est, Petroselinum forte fuerit: utpote acrimonia, & amaritudine insigne, &c. Matthioli Ligusticum uidetur herba quaedam ferulacea, aut foeniculacea, quae in pratis riguis apud nos crescit, radice nigra: (quam Cordus fortè Pastinacæ nigrae syluestris nomine descripsit:) quod si non est eadem, species certe proxima fuerit, sola fors magnitudine differens. Idem quod Matthiolus, pinxit etiam Dodonaeus.

Ligustrum, *Kern gerten*, circa urbem nostram copiose nascitur: frutex aptus se pimentis, propter lenta & flexibilia uimina.

Lilium album in plerisque hortis cernitur: syluestre ubi nascatur, nescio. Plinius se minimum eius meminit: quae in nostro nulla sunt.

Lilia rubra diuersa sunt: omnia, ni fallor, syluestria: praeter illa quae artificio hunc colorem contrahunt, ut meminit Plinius lib. 21, cap. 5.

Lilium purpureum à Fuchsio & Trago dictum, Italis Martagon, in syluis et montibus nostris abundat: uulgò *Goldwurz* à flato radicis colore uocant. Species eius duas notauimus, sexu (ut uidetur) distinctas: foeminae folia uiridiora: mari, qui rarius occurrit, nigriora. Hemerocallidem purpuream hanc dixerim, Translatum in hortos diu durat.

Lilium rubens uel croceum montanum: nascitur in faxis montium nostrorum, terra contextis: caule oblongis augustisque foliis comato, bulbis radicum albis, supra infraque fibratis. Flore Lilii candidi, sed paulò minore. Rarius superiore. Pingitur à Matthiolo pro Hemerocallide altera. In hortis hoc etiam diu uiuit. Bulborum particulae separatae etiam germinant: sed aliquot annis florem uel non producant,

produciunt, uel exiguum quoddam floris rudimentum candidum: donec augeatur & multiplicetur bulbus. *Rotberggilgen.* Hoc an Cynorrhodum Plinii sit, quærendum: aut aliud ex illis quæ hic memoramus Liliis rubris. De hoc puto sensit, K. cum in catalogo suo mihi nominauit Lilia rubra, humili cauliculo, siue semine.

Lilium rubens uel Croceum alterum, Hemerocallis Matthiolo, quod Italicum cognomino. *Rot wild Welsch gilgen.* Hoc in Italia ubique provenire scribit Matthiolus, inter segetes, in montibus, & uallibus, aureo colore. Describitur & à Marcello Vergilio. Florum eius extrema non reflectuntur, ut in Liliis plerisque aliis. Hæc Lilia esse conicio, quorum in catalogo horti, K. mentio fit, his uerbis: Lilia pulcherrima floribus rubris, qui tanquam in corymbo confercti complicantur, duo decim ferè, uel octodecim, uel plures. His circa singula folia, singula semina collocata proueniunt: quibus in terram sparsis, intra annum recètes bulbi germinant. Item in catalogo horti Ac. Lilium rubens seminiferum, deniq; R. Lilia crocea, quæ semina in caule habent.

Lilii rubentis genus, uidetur etiam Tulipa Turcarum, cuius picturam cum ad usum quendam doctissimum misissem, is Cynorrhodum Plinii (uel ut ipse legere mauult, Crinorrhodum) esse putauit. Sed ita dictum à Plinio Lilium in Italia quouenascitur: Tulipa uerò ista (nam & alia quædam hoc nomine uocatur herba, luteo flore, &c.) Italiæ (ni fallor) prorsus peregrina est, nisi in horio fortè aliquo conspiciatur. Mihi Augustæ in horto magnifici uiri Ioannis Heinrichi Heruuarti florentem uidere, contigit unicam plantam, Byzantio (utaiebant) allatam: Eam exhibui & descripsi in hoc uolumine in fine Quatuor librorum Cordi de Stirpium descriptionibus. Cynorrhodi quidem Lilii Hyacintho similis, Hesychius etiam meminit.

Lilium rubens arundinaceum Turcarum hortis frequens esse, meminit Bello-nius: foliis Cannæ seu arundinis Elogiæ, radice graminis illius quod Dentem canis appellant Galli, sed multò crassiore. Hoc si quis à radicis forma Cynorrhodum uocare uoluerit: aut à foliis Cannorrhodum, non absurdè fecerit.

Lilia montana cœrulea, quæ & candida reperiuntur, Chr. Piperinus: de Iridisne an Lilii propriè dicti specie aliqua sentiens, nescio.

Lilium conuallium uulgò dictum, *Wienryß.* Viuacissimum in hortis: propagat & multiplicat seipsum radiculis geniculatis reptantibus. Semine puto non crederet: quod ei corneum & amarissimum est in acinis rubentibus. In collibus, uallibus, & syluis proximis abundat nobis hic flos, locis umbrosis, quod mireris, omnium odoratissimus: & pulchro nomine dignissimus, quod à ueteribus impositum dum quærimus, interim, si libet Callionymum appellemus, iustiori ratione quàm Anonymum olim quidam ignoto sibi nomine plantam uocitarunt: uel Chamæcytinum. Est enim Cytinus flos satiuæ Puniceæ, ut Balaustium syluestris, habet autem hæc herba florem Matthiolo teste, Balaustii uel Arbuti effigie.

Limonium, hoc est, Bistorta, diu in hortis durat, G. In pratis quibusdam humidis, à quibus & nomen tulit, copiosè nascitur, montanis præsertim. Eius species duæ uidentur esse, magnitudine differentes.

Limonium Monspelienfium Didymus Obrecht Argentinæ: foliis ferè Polemonii, flosculis luteis, conferctis, exilibus, oblongis, &c. Mihi quidem cum Limonio nihil commune habere uidetur: & suspicor propter uocum uiciniam Limonium aliquid pro Polemonio protulisse, &c. Pingitur à Dodonæo tanquam altera Polemonii species. Crescit (inquit Dodonæus) ut & primum Polemonium, locis asperis, lapidosis, montanis. Apud nos (in Germania inferiore) plantatur in hortis.

Linaria uulgò dicta, (Osyris quibusdam: mihi non uidetur:) & in hortis aliæ quandiu durat, & sponte passim nascitur locis siccis & apricis: floribus luteis. Est et species quædam eius alpina, minor, flosculis cœruleis perelegans, G.

Lithospermum commune, uulgò ineptè Milium solis, Mauritanii Milium Soler appellant: quoniam in montibus Soler frequens nascatur, G. O. Prouenit apud nos

sponte passim, prope Silum torrentem iuxta oppidum nostrum, solo fere arenoso. Hortense cultum non amat. Lachrymam lobi sunt qui Lithospermum maius appellant. Vide in Lachryma.

Lithospermum fruticosum, & alterum uirgatum, Ac. uirgati nomine forsitan commutae intelligens, fruticosi uero Lachrymam lobi.

Lithospermum minus, Vu. Id nimirum quod à Matthiolo pingitur, & in aruis sponte exilit: quod nunc etiam in meo hortulo in fine Iunii fere defloruit: caule uno, uirgato aut ramofo ualde, sesquicubitali.

Lo:

Locusta à quibusdam dicta, *Tisleraut*, G. estur in acetariis per hyemem: reperitur enim in aruis hyeme tota uiuens lætissimè, foliis fere Oleæ, seu Oliuella quædam: Oliui etiam sapore quodammodo, insipida alioqui. Quod si cū Dracone hortensi misceretur, ipsa olei, ut ille aceti salisq, saporem afferret.

Lonchitis altera, K. Ac. Ea montanis assueta locis, non facile in hortis nostris apprehendit, nec durat. In Germania tamen inferiore, crescit etiam humilibus locis, in syluis & marginibus fossarū. *Spicant* aliqui Germani uocant, fortè quod radices Indicam Spicam aliquo modo referant. Huius duo genera in horto alit, R.

Lotus satius, G. Ea feritur uulgò apud nostros lactarios præsertim, qui recoctam (ut uocant) herbis coniungunt, ex quibus hæc præcipua est: unde & nomen ei imposuere, *Zigerkraut*/ *Stundkraut*/ *Sibengezeyt*. Hanc olim Lotum syluestrem esse putabam: quòd ad facultates quidem nihil interest: in forma tantum aliquid discriminis est. Oxyn Plinii nunquam ad Lotos pertinere existimaui, ut nuper quidam, memoria nimirum lapsus putauit, &c. Lotum enim utraq, Fœnogræci uires habere semper agnoui, Oxyn uerò contrariis esse præditam.

Lotus syluestris, G. Ea in Italia feri solet, sed etiam sponte (ni fallor) nata ibidem reperitur. Trifolium odoratum uocant. Viribus (ut dixi) à superiore non differt, quas cum Fœnogræco utraq, communes habet: ut neq, odore & sapore: sed flores habet luteos & in siliculis semina: illa in glumis breuibus.

Lotum pentaphyllum dixerim herbam, qua imperiti quidam pro Meliloto hæcenus abuti sunt, in odora prorsus. Nascitur ubiq, in pratis & collibus siccis: floribus luteis, subnatis siliculis. *Gåle Tubentröpfle*. Folia ei quina, quorum tria prominent, bina, cauli uel ramulis hærent. Species eius duæ sunt: una minor, læuis, supinata: altera, maior, modice hirsuta, & erecta magis, astringenti gustu, &c. Matthiolus Lotum urbanam nominauit: non probo.

Lotus palustris, Vu. sentit autem forte de illa, quam ternis foliis in palustribus locis nasci diximus, supra in Isopyro.

Lotus arbor, G. Iam plus quàm bicubitalis. Alebat illam in horto Forerus noster Vitro durenfis medicus pereruditus, quatuor cubitoi um iam proceritate: sed superioris hyemis iniuria ei interijt. Eiusdem plantæ aliquot uiuunt in horto, Vu. & K. Hanc arborem Itali uulgò nominant Fago, non tanquam Fagum Latinorum, sed à Lotophagis forte per apocopen. Folia ei fere Vrucæ.

Lu.

Luciola. Vide Ophioglossum & Cyperellam.

Lunaria, R. Sentiens puto de illa, quam Græcam cognominant.

Lunaria Græca, G. C. Rotunda et longa, O. roridam intelligo, cuius silique sint rotundæ: longæ uerò siliquis longis. Nascitur in montibus quibusdam, cū alibi, tum Heluictorū, circa Glaronam & Curiam. species duæ sunt: una floribus in odoris: altera odoratis: & hæc quidem, ni fallor, editioribus tantum locis: nullo alio discrimine. Facile semine prodit, duratq, in hortis nostris: & folia (Viola nigræ fere similia, maiora). per hyemem retinet. Anno secundo caulem fundit, (& circunquaq, fruticans, lætiore solo ad tres cubitos assurgit,) cum floribus & siliquis latis compressis, læuibus, argentei nitoris cū maturuerint. In ealæuitate Lunæ faciem noctu repræsentari aiunt, sicut in lapide etiam Lunari seu Aphroseleno, quem

&

& specularum uocant: inde nomen utriusque. Sed lapidi uetus, herbarum nouum. Quoniam ueteres nomine plantam hanc dixerint, nondum constat. Dodonæus Violam latifoliam nuncupat. Herbarii quidam (inquit) uocant Bolbonac, Brabant *Pens nind bloemen*, uel *Paeschy bloemen*. Alii scribunt Bulbonach, nescio qua dialecto aut significatione. Helli *Glitteren* uocant. Græca unde cognominata sit nescio, nisi aut nomen aut res est Græcia in Italiam fortè primùm illata sit. Semen latum, compressum, rufum, & cum aliqua amaritudine acerrimum est: unde ego Thlaspi generibus hanc plantam adnumerarim, & Thlaspi montanum appellauerim: ad indicandum simul formam. siliquæ præsertim ac seminis: facultates, & natales poterit & Lunare cognominari. Accedit sententiæ nostræ Dodonæus, & Thlaspi præsertim Crateuz, hoc esse putat.

Lunariæ Græcæ similes producens siliquas herba, laticæ scilicet & compressas, sed minores: nec ea læuitate, sed asperas & squarosas: nec eodem colore. Flosculis luteolis, foliis simplicibus, oblongis, asperis, albicantibus, G.K. Semen ex Italia habui: benè prouenit: æstiuu herba, si maturius & aprico loco seratur: tardius uel umbroso loco sata, per hyemem durat, & altero anno fructificat. Alyssum cognatum suspicor. Semen ex Italia allatum est: ubi in montibus sponte nasci arbitror. Dodonæus Alysson Dioscoridis hanc facit: & ab aliquibus Lunariam maiorem uocari tradit.

Lunaria Arthritica, *Gläblümle*. Vide in Arthritica.

Lunaria minor, Aë. ea nimirum quæ à Fuchsio eodem nomine depingitur, quæ sponte nascitur in faxis montium. In hortis quidem diu durare posse uix puto. Lunaria burisla, Aë. sic autè herbarii quidam Scorpioides Marth. nominant, si benè memini. Herbulæ est flosculis luteolis: siliquis gracilibus, longis, articulatis, inflexis.

Lupini communes, G.R.

Lupini Hispanici flore luteo & cœruleo, K.R.

Lupinus syluestris, O.G. Species eius duræ, floribus cœruleis, C.

Lupus salictarius, uulgo Lupulus, *Hopsen*. In sepibus nostris passim abundat. Vitis inftar colitur à Germanis Septentrionalibus pro condienda eorum ceruisia.

Lutea uel Luteum Vitruuii ab eruditis quibusdā existimatur esse herba, quam Tragus lib. .cap. 113. non recte Antirrhini nomine pingit ac describit. *Orant oder Sterckfrant*. foliis simplicibus, angustis, rugosis, oblongis, multis circa radicem: caule duorum aut trium cubitorum, flosculis referto, pallidis, longo deinceps ordine ut Verbascum, &c. Nascitur areis incultis, limilibus agrorum, & secus itinera. Huius planta una ante triennium in hortulo mihi est semine nata, sparsis ab ea cum maturuisset seminibus, hortum repleuit. Caulem & semina edit secundo anno. Alii qui hanc temerè Struthium appellant. Aliqui Resedam Plinii: sed aliam Resedam doctissimus Aldronandus Bononiensis nobis ostendit, quæ Arimini etiamnum nomen seruat: quam Lucas Ghinus Sesamoides maius uocabat: cui cognatum uidetur quod Monspelii Phyteuma nominant, et si foliis multum diuersis.

Ly.

Lychnidis nomine antiquo herbas alii alias ostendunt: plerique illam, quam nos Florem Iouis appellauimus: (Vide supra) Lychnidem satiuam uel coronariam faciunt. Dodonæus Ocimoides nostrum, Lychnidem syluestrem uocat, alii herbam quandam in aruis & circa agros Tritico consitos nascentem, quam nonnulli Perfoliatam rubeam uocitant: alii Lychnidem monachorā, *Karthüßer blümle*. Æstiuu est herba. Dodonæus Vaccariam nominat, & Ocimoides esse suspicatur. Lychnides quædam: & species una agrestis, K. Lychnidis species floribus elegantissimis, C.

Lythymachium luteum, quod luteos flores fert, G. in hortis diu durat, & radiculis suis se propagat. Nascitur iuxta riuos & humidis locis sponte: sicut etiam purpureum cognominatum cui flores rubent: non colore solum, sed specie tota diuersum.

Id minus diu in hortis uiuit. Dodonæus Lysimachiis adnumerare uoluit tertium etiam genus, foliis oblongis, serratis, flosculis cœruleis, &c. quam ego Anagallidis aquaticæ uulgò dictæ speciem esse potius dixerim. Nascitur apud nos in foliis quibusdam, aquam ab expatiente lacu recipientibus.

Ma.

Maizum. Vide Sorgum.

Maiorana. Vide Sampuchum.

Malacocissum Democritus Aquilex mollibus Hedere foliis depingit caule tene ro, sese cuiuscunq; quod fuerit nactus inuolucnte. Subesse aquam ubi reperitur, affirmat. Videtur autem lasiones siue Asines, seu Conuoluuli species maior, aut Vitis nigra quā Ruellius Cyclaminū alteram existimat, aut non longè dissimilem. Vtraq; & sponte apud nos crescit: & in hortis à ei herbariæ studiosis colitur.

Malua agrestis maior, locis cultis ferè apud nos sponte prouenit: minor incultis, circa uias passim. Sunt & Alcea & Ibisus Maluæ agrestis genera.

Maluæ quatuor genera, R.

Malua Romana quibusdam dicta, Hastula regia Apuleii, (nam alioquin Hastula regia Asphodelus est,) *Ernrosen*. Differentia ei à floris colore candido, & rubro: & quòd flos uel simplex uel multiplex est. In nostro orbe satiuia tantum habetur, G.

Malua crispa, quam aliqui (non superiorem) Romanam cognominant, foliorum margine crispo & fimbriato eleganter, O. G. K. Hæc etiam in hortis tantum colitur: ad octo pedes excrescit, flores uerò in Maluarum genere minimos profert, albican- tes, modicè roseos: in fine æstatis & autumno floret.

Malua arborescens Dendromalache, O. G. Hanc primùm Argentinæ in horto Herlini uidere mihi contigit, sex aut septem cubitos altam, ramis brachiata, trunco lignoso. Perit hyeme primis frigoribus si sub dio relinquatur, radicitus. Florere hæcenus aut fructificare non uidi.

Malua (uel potius Althæa) Theophrasti. Vide Albutilon.

Malua Veneta Vide Alcea peregrina.

Malum insanum, C. G. Malsarius Melongena uel Melentzana uulgò Græcè: quo nomine etiam Strychnū appellant. Aliud est Manzinzanion Aëtio, nempe a dix Aegyptiæ fabæ. Fructus unius speciei puniceus est, alterius albus. Solanum po- miserum dixerim. Agrestis enim Græci Agriomelentzana uocant, Zacharia Caliergo teste. Insaniam quidem fructus hic minime facit: sed aliorū quorundam Strychnorum, quibus hæc herba aliquo modo similis est, uidentur autem Græcè recen- tiores multa uocabula à Latinis mutuati. Fructum apud nos non perficit, nisi matu- re admodum feratur. Melensana (inquit, Ruellius qui fruticem hunc describit. li. 2. ca. 24.) Galli Amorū poma nomināt, fortè quia propter elegantiam et pulchritudi- nē dignum sit amari. Fructus est pomi magnitudine, in orbem circinatus, in quibus cartilago granis intercepta cucumeraceis cōtinetur: quæ edendo sit. Estur uulgò ex- oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum, &c. Eodem gaudet cultu quo Cucume- res & Melones. Est & aliud Pomum amoris ab aliis dictum. Vide infra in P.

Malorum genera quamplurima optimaq; in hortis & prædiis nostræ regionis proueniunt: præcocia, media, serotina. Horum aliqua durant tribus, quatuor, aut pluribus mensibus, quædam usq; in sequentem annum, donec alia maturescant, com- modè reposita. Malorum genera quædam (non qualibet tamen) ramis & brachiis suis in latitudinem deduci ab elegantia studiosis solent: ut brachia undiquaq; in su- perficiem ferè planam extensa, recti cuiusdam speciei, pedamentis in orbem dige- stis sustentata, præ se ferant. Eiusmodi non pauca apud nos priuatis publicisq; lo- cis uisuntur.

Mala Apiola dicta Italici, dulcia illa quidem, tam iucundè fragrant, ut uniuersas Indias sua superent suauitate, Scaliger.

Mali humiles diuorū generum: una, cuius fructus poma Adami uocant. Vtraq; frutex potius quàm arbor.

Malus

Malus hana, (Zwerg Äpfel,) Matthias Curtius Lindauæ. Poma fert Paradiseis vulgò dictis non dissimilia, albicania; quæ sub finem Iulii maturescunt. Arbustum non supra quatuor cubitos assurgit, fruticans à radice.

Malus quædam ex Italia: cuius poma magna & rugosa in præcio sunt, Pampin appellant. Idem Curtius.

Mala Cydonia siue Cotonea, nullis ferè instructioribus hortis desunt. Cotonea magna, Vu. Pira Cotonea (Struthia Galeni, ut uidetur) pulcherrima & maxima, Vu. Cotonea Piris similia, Matthias Curtius etiam Lindauæ alit. Persica arbor in malum Cydoniam inserta, Cydonium malum enasci uidemus, Nic. Monardus Hispanensis medicus.

Mala citrea. Vide supra in Citro.

Malum Armeniacum, uel præcoquum (duracinum) commune, G. Amarellen/Barillelt.

Mala Armeniaca ex Vngaria, magna & optima, Vu.

Mala Armeniaca candicantia, gustu suauissima, nucleo oblongo, dulci, ut Amygdala uideantur, Vu.

Mala Armeniaca alia, longè maxima, quæ ille existimat esse uera ueterum Armeniaca, Vu.

Malum aureum. Lege Pomum aureum.

Malus Persica. Vide in P.

Malus Punica, C. G. In hortulo quidem meo uix cubitalis nunc est, sed admodum fruticosa, nam ante biennium contra hyemem non munita, superficiem amiserat: sed denuò germinauit à radice. Bicubitalem uidi Argentinae in horto Massarii; Mali Punice ad triginta, Vu.

Mandragoras, R. A. K. Ae. F. G. Vu. Cum fructu quidem adhuc in Germania non uidi. Latet aliquando, ut dixi in Achanto. In Italia alicubi sponte nasci puto. In horto amici quarto postquam satus est anno nuper floruit: fructus autem nullus subsequitur.

Mandragoræ generibus aliqui adnumerant Solani genus, quod Itali Bella donna uocant. Vide inter Solana.

Manna Polonis dicta, alia satiuæ est, alia syluestris, cæp. melior. Vide in Gramine supra.

Maron, O. Vide Clinopodium Dodonæi. Mari uerè rarissime herbæ semen peregrinum in Italiam fertur, nec nisi maxima cura prouenit.

Marrubium album, G. In plerisque hortis alitur. Agreste nasci cum alibi, tum circa Argentinam uidi. Nigrum, quod Balloten uocant, nusquam non agreste abundat, Me.

Medica uera, genus Trifolii procerum, plurimis ab una radice caulibus, siliquis intortis cochlearum instar, floribus subcœruleis, Ae. G. R. Aliquot iam annis in hortulo nostro uiuit: flores & semina fert quotannis: alta hoc tempore cubitos quatuor: colligatis ad perticam caulibus, ne supina iaceat. Circa Lutetiam sponte nasci audio. Circa urbem nostram in marginibus agrorum reperitur Trifolii genus, Medicæ per omnia simile, sed floribus luteis, & siliquis non ita intortis.

Medica minor, K. G. Trifolium tortuosum puto à quibusdam dictū intelligens.

Medicæ species plures, C. Sex numero, Vu. Inter cæteras unam Itali Ferri equini nomine appellant. Vide supra in Ferro.

Medion, Ae. Bononiæ olim Lucas Ghinus in horto mihi demonstrabat. Rapi syluestris genus maximum, quod Medium appellabat. Dodonæus Viola Marianæ nomine pinxit. Reperitur in syluis & montibus Italiae, foliis oblongis, floribus purpureis: et altera species albis. Ego olim an Lonchitis esset hec herba, dubitabam.

Melanthium. Vide in Nigella.

Melilotus uera nascitur apud nos in aruis, alibi que, locis arenosis præcipue,

floreluteo:& altera species, albo. Vulgus Trifolium aureum appellat. Melilotus Italica quibusdam dicta, uel Trifolium odoratum, quod in hortis feritur, Loti non Meliloti species est, ut supra indicauimus. Loto pentaphyllo à nobis dicto imperiti aliqui pro Meliloto abutuntur.

Melissophyllon ueterum, uulgo Melissam esse dictam non dubito. Nam & Citrago appellatur ab odore quo Citrum refert: mihi quidem iucundo, etsi quibusdam ingratu, & ueluti cimum odor is uideatur. Ea nullis ferè hortis deest, & multis annis perdurat. Huius etiam syluestre genus inueniri scribit Marthiolus.

Melissa uera, Rurpodius. De alia fortè quàm uulgari sentiens, Fuchsius nimirum. Melissa, uel Cedronella, id est, Citrago Turcica à quibusdam cognominata, nuper in hortis alicepit, Byzantio, (ut audio) allato semine, O. Ae. Vu. G. Odore multò grauiore & magis ad cimices accedente est, quàm uulgaris: angustioribus & oblongioribus foliis, herba æstiuæ, floribus purpureis.

Melissophyllon quod pro uero exhibuit Fuchsius, G copiose in syluis nostris nascitur: & in hortos translatum aliquot annis manet. Lamium syluaticum dixeris, quanquam à cæteris Lamiis non nihil differt: à Melissa quidem uulgo dicta, toto genere distat. Tertium Melissa genus copiose in Bauaria iuxta Ingolstadtium prouenit, odore suo planè Citrum referens, præsertim quum aridum est. Hoc Sclopsia Ingolstadianæ pro Melissa utuntur, Fuchsius lib. 1. De compositione medicamentorum: de hac ipsa (opinor) sentiens, quam pictam de dit.

Melo pepones uel Melones, R. Pulcherrimi & uarii generis, K. Melo spinosus, O Fructus maximi sunt Anguria. quam Melo peponem ob id Galenus uocat, quòd non distincta sit canalibus ut Pepon, sed rotunda ut malum. Odorem quidem & saporem Melonis refert, manditurque cum interiore parte, quod in Peponibus non fit. Sapor eis insipidus, substantia frigidissima, &c. Cardanus.

Memitha, C. Papaueris cornuti speciem puto intelligens, floris colore differentem. Talem enim herbam pro Glaucio (quod Arabum Memithe est) in Italia ostendit.

Mentha hortenensis trium generum, G. Prima communis & maior omnibus ferè hortis. Altera nobilior, rotundioribus, & rugosis seu crispis foliis. Tertia minima, rubicunda, suauis admodum odore, ad Sisymbrium & Ocimum accedens: hyeme etiam uiuet: & surculo inflexo propagatur. Hanc Tragus, Sisymbrium hortense uocat: Marthiolus uerò alteram, nempe crispam. Mentha feritur surculo, non semine, ut Theophrastus scribit. Solet quidem radiculis reptantibus se propagare, Mentha syluestris, quam Mentastrum uocant, ubiq; in aquaticis prouenit.

Mentha Græca uel Romana, uel Saracenica à nonnullis dicta, toto genere à Menthis propriè dictis differt. Vide supra in Costo hortenfi.

Mercurialis mas & scemina, locis ferè cultis omnibus circa Vites & in arceis horum copiose nascuntur plerisque regionibus. Tiguri decrat: sed è Bada oppido proximo planta una atq; altera in hortulum meum ante annos aliquot translata, ab eo tempore abundat: & similiter in hortis amicorum. Agrestis quidem in rudibus circa urbem nostram maioribus foliis, mas duntaxat, (ni fallor) ubiq; occurrit. In syluis etiam nostris abundat species alia, quam pro Cynocrambe quidam accipiunt: quæ in hortis etiam annis aliquot durare solet, & radiculis suis transuersis se se propagare. Itali Castagnariam, uel Castrangulam uocant, quòd folia quodammodo castanæ habeat. Superiores æstiuæ sunt, G. Hæc in cibo oleris modo sumptam gratior quàm communis uidetur, & aluum benefoluit.

Mespili arbores satis uulgares hic & alibi in Germania sunt. Aronia uerò Mespilus siue Tricoccus, cui folia Oxyacanthæ sunt: in Germaniâ nondum peruenit, quod sciam.

Meum uel Meon, O. G. Ae. Nostri **Wärwurg** dictam pro Meo non temere usurpant. Ea facile nascitur in hortis etiam de folis capitibus radicis resecta, plantata, & multis durat annis. Fuchsius hanc herbam Sefeli Creticum uel Tordylum appel-

appellat: pro Meo tamen usurpari posse concedit. Vide mox in Muttelina.

Milium uulgare in agris feritur. Indicum uerò uel Saracenicum à Fuchſio dictum, uulgò Sorgi, à nostris etiam in hortis, propter raritatem: & culmorum comæ-
tue usum ad scopas, &c.

Millefoliū uulgò dictū, *Garbe*, passim in agris & collibus obuiū est, frequētius albo flore, rariū rubro. In hortis etiā satis diu durat: & radicibus suis se propagat.

Millefolium Strathiotēs, herbula teneris foliis, minutissimis, semine etiam minimo, odore suauissimo, Vu. Non aliud uidetur Millefoliū nobile ab Hie. Trago dictum, lib. 1. cap. 160. Quod cum alibi reperitur, rarum tamen: tum Basileæ prope urbem, qua Birsia fluuiolus ingreditur: & forsan idem quoque quod peregrinum uel odoratum in horto suo uocat, D.

Millefoliū luteis floribus, D. Pingitur hoc à Dodon. qui rarū inuētu esse scribit, Mo.

Morsus diaboli uulgo dictus à radice ueluti præmorsa, unde Succisæ nomen Fuchsius finxit, nota ubique in pratis humidis herba, G. in hortis parum durat.

Moly Plinii secundum Dodonæum, C. Phalangium nostrū, ut ex pictura & descriptione coniicio. Pseudomoly Dodonæi, C. Graminis species, in litoribus maris proueniens.

Morus arbor fructu nigro, in Heluetia passim habetur, præsertim in hortis, G. In Italia & Sabaudia (ut circa Lemanium lacum) uicinis regionibus alba etiam Morus colitur. Quo modo ex trunci aut ramorum maiorum, serra dissectis partibus, Moriferantur, ut multæ citòque proueniant, Rei rusticæ authores tradunt.

Mu.

Muris auricula. Vide Pulmonaria Plinii:

Muttelina uulgò in alpibus dicta, à nostris *Muttri*, caros alpinus quidam uidetur: radicibus Mei ferè figura & sapore, sed infirmioribus. Autumno superiore aliquot eius radices in horto plantavi: quæ nunc etiam in fine Iunii pulchrè germinant: sed nondum florent. Eius pabulo in montibus uacæ plurimū & optimum lac reddunt: sicut & Mei pabulo in Apulia: unde caseum caballinum dictum cōfici audio.

My.

Myrica, uulgò Tamariscus, G. Rurpodius. Hanc aliquoties frustra plantare conatus sum in hortulo meo siccano. Hoc anno demum in prædio ad riuulum mihi plantata benè prouenit, & floruit Iulio mense: translata è Sili torrentis iuxta urbem ripis: ubi copiose prouenit, cum alibi, tum paulò superius quam misceatur Limago. Alterius generis esse puto quam circa Monspelium uidi, trunco satis crasso, etc. nam nostræ truncus pollicis magnitudinem parum excedit.

Myrrhis, O. G. C. Ae. Rurpodius. Aliqui Italicam cognominant, alii Cerisolum Hispanicum, *Spanisch Kurbel*. Planta una ante triennium ex semine eius prælongo mihi prouenit, foliis dulcibus, necdum in caulem assurgit.

Myrtus, Rurpodius. Myrti plantæ decem, Vu.

Myxus alba quorundam, Sycomorus uulgò Italis, Quære in S.

Na.

Napellus. Vide in Aconito. Scaphusiae in horto quodam & apud nos quoque flore albo inuenitur.

Napinatura inter Napum & Brassicam esse uidentur. In agris, non hortis seruntur. Rari apud nos: commendantur ex agro Vlmensi.

Narcissi uarii, Leuschnerus Misenæ. Tres species, C.

Narcissus Italicus, flore candido, odoratissimo, K. Hunc puto esse qui à nostris *Lilium D. uirginis* nominatur: qui flos in montibus supra Curiam syluestris, ut audio reperitur, G.

Narcissus alius, candido flore, pulchro, odorato, K. R. O.

Narcissus luteus, odoratus, qui initio Martii floret, K. R. C. O. Ae. alius luteus, K.

Narcissus purpureus & luteus, Vu.

Nardus Celtica uel Gallica, K. Nos etiam ex altis Vallesterum montibus à Caspare Collino nostro missos, aliquot eius cespites proximo autumnno plantauimus: & rudimenta floris iam uidimus, ipsi sua lingua *Selliga*, quasi Saliuncam uocant. Et profecto non alia est Saliunca, quam Celtica Nardus: eademque Phu herbe, id est Valeriana, prorsus cognata. Viret etiamnum in hortulo meo, sed male, ut alpinum coelum desiderare uideatur.

Nardus Indica, (nisi Gallica scribendum sit potius,) Ae. R.

Nardus uulgo dicta, in hortis nostris plerisque culta, in agro circa Monspelium sponte abundat. Cum Nardis quidem proprie dictis ab antiquis nihil commune habet, ut neque Lauandula, quae in hoc genere ceu foemina est: à Fuchsio Pseudonardi appellantur, haec foemina, illa mas cognomine. Mihi ad Stichadis naturam, specie, odore (caphurato ferè) saporeque accedere uidentur, propius quidem quam ullius alterius ex illis quas nouimus plantis. Surculo foelicus quam semine provenit. Vide etiam in Spica.

Nasturtium maius, album: & minus nigrum, G. Sylvestre persimile hortenfi, puto me in altis quibusdam montibus olim reperisse. Genus illud sylvestre quod *Welsamen* uocant, à Fuchsio & Trago depictum, sponte apud nos non reperitur. In Sabaudia circa muros & rudera frequens uidi, ut in regione duces Vuirtenbergensis quoque Dodonaeus Thalictrum facit. Inferiores Germani quidam Sophiam nominant. Apud nos pratenfe quoddam sylvestre est, *Gauchblumen*: & aliud riuale, circa saxa riuorum, *Strenkresich*: aliud denique palustre, floribus luteis: Sinapi forte adnumerandum. Haec omnia ab hortenfi genere aut potius specie differunt. Nascitur & in uineis quod *Abtressich* appellant, foliosum, acre, Februario flores, &c.

Nerium. Vide Rhododaphne.

Ni.

Nigella (alias Melanthium, Gith) Damascena, semine nigro: sicut & alia uulgaris, G. Vulgaris nostrae species altera semen subflauum habet, & odoratius. Sylvestris etiam in aruis nascitur, ut circa Liechtstalam Basiliensium oppidum uidi. Hanc aliqui (ut Cordus quoque) non recte pro Cumino sylvestri accipiunt. Damascenae hoc peculiare, quod capitulorum eius calices inferius pulchre coronantur foliis.

Nil Arabum. Vide Conuoluulus caeruleus.

Noli me tangere, G. Tragus hanc herbam Esulis seu Tithymalis adnumerat: non recte: nam neque lacteum liquorem habet, nec uiribus nec specie cum illis conuenit. Silique eius maturae, tactu diluunt. Vide supra in Balamine. In horto meo circa sepe abundat, aestiua herba, & e semine suo quotannis resurgens. Vidi saepe in montibus, locis asperis, lapidosis & humidis. Flos colore & forma aconitum luteum refert. Veneno forte non caret. Gustata fauces rodit. *Judenbuelin* quidam Germanice uocant, Non desunt qui Scorpioides existimarint.

Nu.

Numularia à Fuchsio dicta, G. Nascitur passim circa sepes et alibi, locis humidis: eius species alia est, quam syluaticam à natalibus aut marem dixerim, minorem, acutioribus foliis, & erectam ferè. Superiorem foeminam aut supinam nominemus. Aliqui Centimorbiam & Delphaticam uocant.

Nuces iuglandes in agro Tigrino abundant, hortis inutiles: primum quia non solum uasta magnitudine sua nimium inumbrant caetera: sed homini etiam noxia umbrarum existimatur: deinde quia cum profundissime earum radices sint, quantae fere superficies (ut uulgo creditur) exhauriunt & emaciant solum, succo pinguiore omni ad se attracto.

Nuces iuglandes, tum saporis praestantissimi, tum corticis adeo tenuis, ut leuissimo digitorum compressu frangantur.

Nux Auellana, Corylus. Vide in Auellanis.

Nux Methel Auicennae, Stramonia Fuchsio. Aliis Pomum spinosum, Turcis Ta toul, Graecis hodie Paracoccalon, uel Barycoccalon, quasi nux grauans, torporè et somnum

somnum inducens: quibusdam Corona regia, Melospinus Venetiis, Gallis Pomme de Perou, G. K. C. Vu. Nux quidem improprie dicitur, cum durum toris nihil habeat, pomum uerius quam nux. Flos ei tanquam Conuoluuli in sepibus, sed multo maior, odore graui quidem, sed aromatico fere, nec sine gratia, ut mihi uidetur. Foliorum uero odor grauis simul & foetidus, ut plerorumque frigidorum uenenorum. Mandragoris annumeranda uideri possit haec planta, aut sui generis esse, potius quam Solani cum poma ferat: sed nos quoque Solana Pomifera quaedam congnominabimus. Bellonius Solanum somniferum nominans (aliud certe Dioscoridis hoc nomine est) in planicie circa Hiericho sponte nasci scribit, Aloisio Anguillare audio hanc plantam uideri Hippomanes, a Scholiaste Theocriti dictum: & conuenire ei descriptionem, uocabulo uno transposito, ut spinosum scilicet de fructu, non de folio dicatur. Ego ut huic opinioni non contradixerim, ita non aliud Lycopersum Galenexistimo, &c. Forlan & idem Dioscoridis Phariacum fuerit. Monspelii Solanum Romanum uocant, ex Hispania ad se allatum dicentes.

Oc.

Ochrus Galeni, O. Leguminis genus Ciceri cognatum.

Ocimastrum uerrucarium libet appellare herbam quandam aestiuam apud nos, Ocimi foliis, flosculis candidis, pulchris, uasculis seminum exiguis, rotundis, hisutis, quae paruas ceu uerrucas referunt. Nascitur circa sepes, nullius uel nominis, uel usus apud nos.

Ocimoides (Lychnidis syluestris nomine depingit Dodonaeus) album, purpureum uel roseum, rubrum, alpinum, G. Aliqui Been album & rubrum uocant, inepti: ut illi etiam qui Polemonium pro Been albo accipiunt. Marem in hoc genere diximus, cui apices e medio flore prominent: foemineam, cui nulli: idque in utroque colore: nam & mas albus purpureusque reperitur, & foemina similiter. Haec odoratio est, praesertim uesperis, quo tempore rursus aperiri flores et odorem recipere uelutique resurgere solent, tanquam Heiperis Theophrasti: nam sole meridiano ita flaccescunt ut mortui uideantur. Anno secundo floret. Durat tres aut quatuor annos, ni fallor. Passim apud nos sponte nascitur locis siccis, circa macerias, sepes & alibi. Genus illud cui flos magis ruber, in albis: minus odoratum caeteris, uel potius inodorum prorsus. Dodonaeus Ocimoides nostrum Lychnidem syluestrem uocat. Plantatur (inquit) in hortis alba & purpurea, & longo cultu aliquando florum folia multiplicat: Saponaria inferioris Germaniae pharmacopolis.

Ocimoides peregrinum dixerim, flores quos ab Hierosolymis denominant, croceo colore splendente longe pulcherrimos. Eiusdem species minor reperitur, quae primo anno floret, G. Flores Hierosolymorum appellant uulgo: quanquam non e Syria, sed Dacia allatos audio. Aldrouandus Creticum cognominat. Diu durant in hortis nostris, radice uiuaci. Semina tempestiue maurant, & facile ex illis oriuntur. Flos odore caret, & sole nihil afficitur. Aliqui ante fenestras in pensilibus hortis a sunt, tanta gratia est florum. Species minor cubitalis est, aut paulo excelsior, rarioribus floribus: maior bicubitalis. Florent anno secundo, durant pluribus.

Ocimum, quod uulgo Basilicum nominant, id est, regium, ab odoris praestantia, diuerforum est generum: quae apud nos in uasis tantum & altibus hortis conferuntur. Herbae aestiuae, pruinae impatientes: ideoque non prius serenda quam cum nulla amplius pruina expectatur, ne in prima herba intereant, aut perurantur. Ex eis paruum genus, ut crispum & globosum appareat, forfice puto circundetur. Idem dum floret cum radice euulsum & in uas uitreum angustis colli aqua plenum impositum, diutissime uiuet, radice in aqua crescente: adeo *φλυδρην* est. Maioris aliud Caryophyllatum ab odore dicitur, aliud Citratum, quod maximum est, & Melissophyllum seu Citrum olet, rarius nostris: mihi quidem satum in uasis pulchre prouenit.

Od.

Odontitis Plinii, K. Hanc Plinius in pratis nasci scribit inter Foeni genera, cauliculis densis ab eadem radice, geniculatis, triangulis, nigris: flore purpureo, pu-

fillo: hordei semine in alis: foliis paruis, Polygono longioribus.
Oenanthe, Lege Filipendula.

Ol.

Olea aliquot, Vu. Olea procera, quæ superioribus aliquot annis floruit: hoc uerò anno 1558. demum æstate fructum, non prorsus tamen maturum produxit. K. Vidi et ego Oleam cubitalem Augustæ in horto magnifici D. Ant. Fuggeri. Arbo rem equidem in nostro cælo prouenire miror, quum hyems, frigus & uenti plurimum ei noceant, Theophrasto teste: florenti etiam imber. Adde quòd tardè admodum crescit: & afflatum maris desiderare uideatur: quare olim (Plinio teste) non putabatur nasci nisi intra ccc. stadia à mari. Plurimæ quidem circa Benacum nascuntur: multæ etiam circa Roboretum apud confederatos nobis Rhætos, prope sed ultra alpes, Insubriâ uersus. Inde autumnino superiore allatas mihi arbusculas duas plantauim in uase, propter instantem hyemem.

Oleastris species, ut quidam putant: ut alii, Ziziphus alba, A. Lausannæ alibiç in Sabaudia quidam in hortis alunt.

Olus atrum, quod Itali uulgo Alexandri uocant, pharmacopolæ Petroselinum Macedonicum, O. G. Durauit mihi tribus aut quatuor annis in hortulo, loco nimis umbroso constitum: quo tempore semel tantum flores & semina protulit: interdum latuit. Heyme germinat ac floret, teste Cardano. Bernæ in horto Aretii nuper floruit. Græcè Hipposelinum uocant plerique. Sed Matthiolus pro Hipposelino Ligusticum uulgare pingit Hipposelinum uerum, K. Rurpodius, Matthioliue an alterum intelligentes, nescio.

On.

Onobrychis. Vide infra in Ruta capraria Italorum, & supra in Glauce.

Ononis non debet plantari in hortis, ne fiat anonis, hoc est, inutilis & noxia aliis herbis. Oblongis enim & ualidissimis radicibus longè lateç reptat, & sese propagat. Sponte in aruis alibiç crescit, inuisa agricolis quorum sæpe aratra sistit aut moratur. Læuis est uere & prima æstatis parte, deinde aculei superueniunt. Reperitur, ni fallor, etiam perpetuò læuis. Flores purpurei in uulgaribus montanæ, quam uidi in Gemma monte Vallesiorum, lutei.

Onopordum, Basileæ in horto Zuuinggeri.

Op.

Ophioglossus à Fuchsio dicta, Aë. in pratis quibusdam (humidum & pingue solum amare aiunt) apud nos copiose nascitur. Maio mense reperitur, postea euanescit. Folio singulari semper, unde Henophyllum uel Monophyllum dixeris. Enam quæ Germanicè sic uocatur, *Einblat*, caule edito, altero folio augeatur. Tota etiam nostra non semper unifolia est. In hortis parum durat: & fortè etiam ruri, ubi sparsis feminibus eam multiplicari puto. *Waterziingie*. Itali (ni fallor, Bononiæ præsertim) Serpentinam uocant: aliqui Lanceam Christi, uel Luciolam. De ueteri eius nomine non constat.

Opulus, Aceris species minima: alio nomine Rumpotinus, montibus & collibus apud nos frequens est. Circa Verbanum lacum maritatur Vitibus.

Or.

Orchis. Quare in Testiculo.

Origanum uerum montanum, Leuschnerus.

Origanum Creticum, O. Origani Heracleotici uel Hispanici species, K. G.

Origanum onitis, rara planta. K. Rurpodius.

Orig. syluestre uulgare, G. Tragoriganum, Rurpodius. Idem aliquot annis ex cultum in horto, K. tandem perijt. Tragoriganum alterum, C. Illud nimirum quod Dodonæus pingit Serpyllo persimile. Tragorigana (inquit) in hortis tantum coluntur à diligentioribus: eius speciem alteram aliqui Prasium uocant, alii pro Thymo ducunt.

Origanum Haracleoticum (uel Hispanicum à nonnullis dictum.) Antuerpiæ quod ex Hispania aduchatur, C. Pingit hoc quoq; Dodonæus: odoratius candidusç esse scribens.

Origano

Origano cognata tridetur, quæ uulgò Maiorana maior dicitur.

Orminum. Quære Horminum.

Ornithogalum, K. Nascitur in Brabantia passim in agris & aruis, ut et circa Monspelium.

Ornithopodium Dodonæi, G. Sic autem ei nomen finxit Græcum, quoniam Brabantii similiter nominant *Voghelvoet*, id est, Avis pedem, propter siliquas articulas extremitate recurua, quinas aut senas, ad exemplum pedis auium. Nascitur passim apud nos in collibus & pratis siccis apricisq̃, foliis è regione binis, multis deinceps, lenticulae, minoribus. Flosculis in corymbo luteolis, Loti pentaphylli nostri similibus, odore exili, suauis, lactis quodammodo uel lasmini florum. Vetus nomen ignorare se ait, nisi fortè Polygala sit. Ferro equino Italorum (de quo diximus) cognata uidetur.

Ornus, A. G. Semina à Bellonio accepimus: cuius diligentia Lutetiae etiam Orniam non pauca proueniunt, seminibus ex Italia aduectis.

Orobanche uera in agris uel syluis nascitur. Orobanche uerò Ruellii, Galls Tenia dicta, alia uidetur, quæ cirris suis ceu brachiis legumina obuoluit & strangulat. Helxine Gussampelo, ut consilio, similis herba: sed flore minuto: quæ passim in nostris etiam hortis & agris inuisa nascitur. Volubilem nigram uocant: gustu glutinoso, subacido: semine triquetro, nigro: radice una, candida, dodrantali: à qua cauliculi plures prodeunt, oblongi, distorti, ramosi, lenti, &c.

Orobus à Græcis dictus, hoc est, Eruum quod ad Theriacæ compositionem requiritur. Legumen est nullis capreolis, siliquis secundum semina interceptis, ita ut in furnis coniuncti panes. Semen foris album est, intus rufescit, O. Vu. G. Facile prouenit. Circa Lugdunum (unde semina accersui) agros eo conferi audio, Inuenitur & syluestris: sed non in Germania quod sciam.

Orobus albus, O. Superiorem rubeum uulgò cognominant.

Ou.

Quariam, uernacula lingua (*Quiertrant*) uocari audio herbam mihi incognitam in Saxoniae hortis & Francofordiæ: quæ dillecta aspergatur ouis frixis, propter saporis acrimoniam.

Ox.

Oxyacantha Dioscoridis, Spina alba uulgò dicta arbuscula uidetur, quæ in sepibus nostris abundat. Est enim sepimentis aptissima, propter multas, ualidas acutascq̃ spinas. Hæc mihi Plinii Spina appendix uidetur: & alibi simpliciter Spina.

Oxyacantha Theophrasti, Ae. Theophrastus Oxyacantham suam perpetuò uirere tradit, incunte uere germinare: semen reddere post occasum Vergiliarum.

Oxys Plinii passim circa sepes, locis umbrosis & muscosis emicat. Itali quidam in hortos transferunt.

Oxytriphylllum, K. nimirum Trifolium Asphaltites: de quo infra.

Pa.

Pæonia foemina, K. G. In plerisque apud nos hortis colitur: in quibus uiuacissima est, ita ut si effossa radice exiguum aliquid relinquatur, inde repululet. Syluestrem nasci audio in summis supra Glaronam nostram montibus, è quibus Serua fluuius oritur. Reperitur etiam multiplici flore, quod rarissimum est.

Pæonia mas, folio nucis, K. G. Curtius Lindauiae. Rara fuit hætenus in hortis, Syluestrem in Germania nasci non puto. Vtranq̃ reperiri audio in Generoso dicto monte prope Luganum, quod oppidum est Heluetiorum non procul Lario lacu. Non eius à nemine hætenus exhibita est, ne à Dodonæo quidem, qui tamen in hortum eam habere fertur. Tragus, quem & Dodonæus secutus est, Dictamnium uulgarè, id est, Fraxinellam Italorum, Pæoniam marem esse putabat: sed non conuenit descriptio. Huius radix quidem tragon, id est, hircum olet, non tamen idcirco Tragium est, ut quidam putant: nam Tragium primum, Lentisco ferè per omnia simile est, sed minus. Alterum Scolopendrii foliis insignè.

Pæonia ultra prædictas tertia species, minor, *C.* Quæ mihi etiam nuper ab eo transmissa unâ cum aliis quibusdam, tam longo itinere, in hortulo uiret. In Catalogo, *O. Pæonia* species quatuor reperio: ex quibus una nimirum fuerit *Fraxinella*, de qua diximus.

Paliurus nobis incognitus est; nec senserim cum *Amato Lusitano*, qui *Illicem Aquifoliam* nostram (ipse *Agritolium* nominat, & ab *Aquifolio* nō rectē distinguit) *Paliurum* facit.

Paliurus *Africana*. Apud nos (inquit *Ruellius Gallus*) paucis antea annis frutex inuenitur, qui etiam arborescere possit, folia per ambitum laciniatim sinuato, rotundo, molli, ramis *Spini*, quem *Album* cognominant, modo aculeatis. baccis rotundis, rubris, myrteis, longè maioribus, gustu iucundo: qui & unum suauitate sua commendet. Condiuntur & grato ori cibo. Cœpit mea memoria propagari insita, quantum reor, albo *Spino*. Qui colunt in hortis, uelut alienigenam & aduenam arborem *Myrobalanum* appellant. Hanc esse putauerim nullis ferè notis reclamantibus *Paliurum Africanam*, eam præsertim quæ non siliquetur. Hæc *Ruellius*. Eadem puto est *Connarus Athenæi*.

Palma in Europa an usquam fructificet, nescio: de arbore proprio sic dicta loquor. Nam species quædam minores, ut *Chamariphes*, & quæ *Musas* appellatas fructus ferunt, in Italia etiam Hispaniaq; fructus perficiunt: & in Gallia *Narbonen* si quoque, ni fallor, uel utraq; uel *Chamariphes Margaridæ* sue saltem. *Palma* arbores circa *Monspelium* habentur, sed steriles. Audio *Monachii* (quod oppidum est *Bauariæ*) in horto principis *Palmam* exiguam haberi. Ego *Indicæ Palmæ* folium pedes ferè denos longum, & totidem latum ab altera parte, aridum seruo: misit ad me dono à *Ioanne Baptista Hoffstettero pharmacopœo, Augustæ Vindelicorum* celebri. Eam arborem in Hispania etiam (aut *Lusitania*) iam prouenire nuper quidam nobis asseruit.

Palmæ species pumila, quæ *Musas* uocatos fructus fert, &c. Lege quæ proximè retrò scripsimus. In *Aegypto* circa *Memphim* plurima nascitur. Propaginè feritur. Seritur iam & *Neapoli* in Italia, inquit *Alexander Benedictus*: in annum durat. Folia hyeme decidua, uere renascuntur, &c.

Panaces *Heracleum*, pulcherrima planta, *O.K.C.* Ex eo colligitur liquor *Opopanax* dictus *Pharmacopolis*. Vidi aliquando in hortis Italiae, aliqua cum *Sphondylion* nostro similitudine, maius.

Panaces *Asclepium* *Patauii* quidam in hortis ferunt, nescio quo prouentu.

Panaces *Chironium* forte fuerit *Virga aurea* uulgò dicta *Italis* uel *Doria* (si bene memini) in *Provincia* uulgò nominata, (alia quàm *Virga aurea*,) quam in horto *D.* uidisse me puto.

Panacratium uerum, *Vu. Soilla minor*. *Dodonæus* *Panacratium* interpretatur herbam quam *Fuchsius* pro *Hyacinthi* genere exhibuit: quod audio *Monspessuli* *Ophioscorodon* existimari à doctis, et uulgò ibidem *Allium caninum* nominari: ra dice rubenti & bene acri. Circa *Laufannam* in aruis reperi. Idem *Dodonæus* *Panacratium* alterum nominat *Bulbinem* nostram.

Panicum legumen uulgare apud nos, agrum non hortum decet.

Panicum *Indicum*. Vide *Sorgo*.

Papauer minus, nigro semine, nigrum uel commune, in hortis nostris abundat: alicubi agrieo obseruntur ad exprimendum oleum. est ubi syluestre nascitur.

Papauer album, satium, flore & semine candidis, feritur à *pharmacopolis* nostris. Huius & altera species reperitur, *Dodonæo* teste, cuius florum folia sunt creata & dissecta.

Papauer rubrum etiam aliquando seui in hortulo. Huius capita inquit *Dodonæus*, rotundiora sunt, non longa. Semen subnigrum. Huius quoq; ut superioris, species reperitur foliis florum crenatis & dissectis.

Papauer erraticum, quod *Græci* *Rhœadem* uocant, rubro flore in aruis apud nos

nos ubiq; emicat, altera demum estate florens. Huic similem herbam, sed æstiuā, flore luteo, si benè memini, aiunt apud Vallesios alicubi in agris secali consitis reperi, et *San* appellari ab incolis.

Papaueris rara quædam species, O.

Papauer cornutum uel corniculatum, luteo flore, G. R. K. O. Vu. Facillimè nascitur, & semina in tempore maturat in hortis nostris: & seminibus sparsis sese reparat. Vide sequentia.

Papauer cornutum rubro uel purpureo flore, rarius, in aliquibus hortis, ut Augustæ, alitur, O. K. Vu. Vide Memitha & Glaucium. Papauer corniculatum nascitur in maritimis, floremq; fert croceum. Nos in Hispaniis, præsertim regnis Aragoniæ & Castellæ, longè à mari per multa miliaria, circa uias & arua duas alias species inuenimus: unam flore ualde rubeo, cætera similem, sapore tamen non ita salso: et alteram minorem per omnia, flore uiolaceo. Semina omnibus nigra: Monachi in in Mesuen, Posterior hæc species à Dodonæo exhibetur Iconum Tomo 2.

Papauer spumeum uidetur genus quoddam Esulæ paruū, quod Tragus pro Pello pingit inter Tithymalos Esulam exiguā nominans, radice inutili, locis cultis ali quibus sponte nascens: foliis paruis, angustis, longiusculis. Nihil ei cū Papaueribus cōmune præter liquorem lacteū, etc. Plinio Pellos aliās Syce, uel Mecon aphrodes dicitur: semine minore quàm candidi Papaueris. Inter Vites serè colligitur, &c. Foliis Rūtæ paulò latioribus. Dioscorides tres herbas diuersas facit: nam Chamæsyce aliter Syce uocat, genere quidem conuenire uidentur. Et Galenus quoque Pelum aliās Papauer spumeum uocari tradit.

Parthenium, hoc est, Matricaria uulgò dicta: circa muros hortorum & rudera sponte nascitur. Alii Cotulam foetidam interpretantur, quæ circa uias & limites agrorum ubiq; abundat: item in hortis, locis siccis & lapidosis.

Pastinaca uulgò Carota dicta, O. Tria eius genera apud nos reperiuntur, radicibus luteis, purpureis, albis. *Rubli*. Inter syluestres herbas Dauci Pastinacis cognati uidentur: & aliæ quædam forsan propius. Carton (accedit uocabulum ad uulgare Cariota) Pastinaca est magna & bene aucta, meliore succo, &c. Athenæus. Hæc forte est quæ iam sequitur Pastinaca.

Pastinaca uulgò dicta, *Pasteneien*, minus frequens est apud nos: frequentissimū Basilæ & Argentinæ. Hoc Dodonæus pro Elaphobosco pingit. Reperitur etiam syluestre in pratis obuuium. *Pe*.

Pecten Veneris, siue Scandix, nisi inter segetes nostras abundaret, locum in hortis meretur.

Pelecinus, Securidaca, G. K. R. C. Semen ei in filiis oblongis rufum, securis effigie, unde nomen Pelecini: amarissimum, unde & Hedyсарum fortè per antiphrasin dicta est. Apud nos inculta non provenit, alibi in aruis sponte, nusquam tamen in Germania quod sciam. E seminibus suis restibili fecunditate reparatur, ethyme etiam uiuet.

Pelecinus falsus, C. Pingitur à Dodonæo Tomo 2. Sponte apud nos nascitur locis siccis & apricis quibusdam.

Pentaphyllum, Quinquefolium, ut nusquam non obuuium, pinguiori & humidiori solo gaudet, ita in hortis etiam durat, flagellis suis ubi terram attingit per interualla articulata apprehendens, (Fragariæ modo cui cognata uidetur,) seipsum propagans.

Pentaphylli etiam aliæ quædam species sunt, minus communes apud nos, minores, magisq; syluestres quodammodo: à Trago descriptæ: ex quibus unam etiam depinxit, floribus albis: foliis serè Lupini, quod etiam in hortulo, Ac. alit. Est & aliud Pentaphyllum album quod Petreum cognominauerim, pulcherrima herba: Id primùm reperi copiosum in mœnibus Vuallstadii oppidum, sed muris nunc reparatis nullum est. Deinde in faxis montis supra Sanamcassam oppidulum, iuxta introitum in fodinam ferri, quæ maxima antiquissimæque illic est. Hanc

speciem superiore autumno in hortulum transtuli. Pentaphyllis densq̃ etiam Tormentillam uulgò dictam adnumerâim; quæ in pratis aliisq̃ locis passim apud nos abundat: in horris parum durat.

Pepones, R. Dodonæus pingit Peponem latum, & alium rotundum: & tertium magnum, quem & Cucumerem Turcicum uocat.

Perfoliatæ uulgò dicuntur herbæ quædam, Diaphylla Græcè dixeris: quarum caulis transigit & penetrat folia: unde & Germanicum nomen *Durchwas*, hoc est, Diaphyes. Sed una præcipuè, quæ à Fuchsio & Trago pingitur, hoc nomen sibi uen dicauit. Ea quam uis multis in locis sponte nascatur, solet tamen apud nos etiã in hortis feri partim propter eius raritatem hîc, partim quòd ad sanandos ramices ac prominentias umbilici, singularis eius uis existimetur. Maiorem hanc cognominat Tragus. Aestiuæ est herba.

Perfoliatæ minor, O. Ea nimirum quam Tragus descripsit, similis prædictæ, foliis tamen acutioribus, & crassioribus: & filiquis oblongis quales ferè Brassicæ sunt, cum superior nuda ferat semina.

Perfoliatam Achilleam appello herbam, quæ in collibus nostris, non frequens tamen reperitur, floribus luteis, *Lyfimachii* ferè, quorum singuli foliis constant octonis. De hac sensisse Plinius uidetur, his uerbis: Aliqui ueram esse Achilleam tradunt, scapo cœruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter uestitam. Cœruleum quidem colorem non obseruauit: reliqua conueniunt. Aestiuæ est.

Periclymenum (Caprifolium Latine quibusdam. Syluaticus Pyxacantham Caprifolium nominat) in syluis Sabaudia & circa Argentinam sponte nascitur. Nostris in hortis plantant, ut pergulas uel attegias eo innectant: circumuoluit enim se sua sponte: aut iuxta muros pangunt: facile enim in altum scandit, ad secundum etiam coenaculum domus: ut & uiriditate ornet fenestras: & specie odoreq̃ florum suauissimo oblectet, id quod multo tempore facit. Floret enim paulatim. Viuit in hortis annos quam plurimos. Huic cognatus est syluestris quidam frutex, qui locis saxosis nascitur apud nos passim in sepibus, muris, syluis, acinis rubicundis, gemellis, nō circumuoluitur, etc. *Beinhülzen* uocant nostri, hoc est, *Xylosteon*, à duritie ligni tanquam ossea. Pingitur & à Dodonæo ceu *Periclymeni* species. *Periclymeni* speciem unam reperiri tradit Dodonæus, cuius folia non ut in superiore bina & distincta, sed in medio unita sint, transeunte per medium caule. Hæc nimirum est quam Matthiolus pinxit.

Persica mala non unius generis, abundant in nostra regione. Maiora & odoratiora nostris circa lacum Verbanum uidi. Persica Vngarica trium generum: quædam magnitudine pugni: alia intus & foris colore aureo: alia intus sanguineo succo, Vu. Postrema apud nos etiam rara non sunt, duracina, & serotina. Persica malo in Cydoniam inserta, Cydonium enascitur: ut supra scripsi in Malo Cydonia.

Persicorum generis sunt etiam præcocia seu Armeniaca mala. Lege supra in Malis.

Petasites circa montium radices in pratis humidis apud nos luxuriatur. In hortos translata locis umbrosis uel humidis diu durat. Floret ante folia primo uere. Semen ei nullum. Trago teste.

Petroselinum uulgò dictum, ueteribus simpliciter Apium est. De Petroselino ueterum leges in Sesele.

Peucedanum, K. F. C. Massarius Argentinæ: ubi etiam sponte nascitur prope urbem, in pratis, iuxta Carthusiam, radice ad duos aut tres (ut audio) cubitos longa, succi seu potius liquoris plena, sulfur olente: foliis oblongis, ternis ferè, &c. Hier. Tragus etiam Peucedanum in suis hortis copiose prouenire scribit. Uulgò *Wils den fenchel* uocant, hoc est, Foeniculum agreste: nō rectè. Aliqui *Schwebelwurcz*, à sulfureo radice odore. Crescit (teste Trago) in altis, umbrosis, & opacis syluis, ut Hercynia, & Spessarto, & Idaro dictis uulgò: item in Vualgoia & Monte tonitruæ.

Phalan-

Ph.

Phalangitis seu Phalangium herba, G. K. Nascitur sponte in collibus siccis & locis montanis apud nos, floribus Lili, sed parvis: maiores duplo quam nostri sint, in montanis Sabaudia pratis uidi. Herba, ut quibuscum uidetur, Asphodelo cognata est: quanquam dissimili radice *Graßgilgele*. In hortis probe crescit: annos (ni fallor) tres aut plures durans. Hanc Dodonæus, si bene coniicio, ex pictura & descriptione, pro Moly Plinii exhibuit.

Phalaris, O. G. Semen ab Ollingero accepi. Facillimè crescit. Pingitur à Dodonæo: qui apud inferiores Germanos semen Hispanicum uel Canariense uocari ait, quod inde allatum sit. Audio speciem unam syluestrem esse, alteram satiuam.

Phasioli, O. Legumen nimirum quod & Phaselum uocant, idem forte Smilacæ hortensi. Mathioli quidem pro Phasiolo in Dioscor. lib. 2. cap. 101. & rursus cap. 140. pro Smilacæ hortensi, herbam eandem pingere uidetur: nisi quod pictura una inflexa, altera recta est. Alius est Phasiolus, qui & Isopyron, de quo supra.

Phaselus Turcicus aliquanto maior est nostro: sed admirabili naturæ arte humanam effigiem refert, fronte, oculis, naribus, (si tamen pediculi partem illi annexam relinquant:) ore, quod quasi duobus testibus munitum est, ac mento. Nihil certe humanæ faciei natura similis fecit, Cardanus.

Phaselus syluestris uel niger à Dodon. dictus, aut Faba syluestris, (nā Fabā uulgò dictam, ueterum Phaselum esse putat: ac in duas species, maiorem, & minorem quæ & rotundior sit, diuidit:) similis est satiuæ, nisi quod capreolos habet, quibus satiuæ caret: semen globosum, nigrum, non maius Piso, & inter mandendū ingrato sapore, odoreq; foetido. In Germania inferiore sponte nata nō reperitur, sed in hortis quorundam. Hæc forte est, inquit, Cyamus, aut Faba ueterum. Ego neq; syluestrem esse toto genere, neq; sapore ingrato, & odore foetido, de ueterum Faba dici posse arbitror. An uerò Phaselus eorum sit, perpendendum est accuratius. Nos diuersi generis Pisa nigra interdum in hortis serimus propter raritatem, sapore odoreq; à communibus Pisib; nihil distantia.

Phillyrea siue Ligustrum, G. Eadem sepes nostræ abundant, *Kerngerten*. Aliam Phillyream nominat Bellonius, sua primū cura in hortis Luteciæ conflatam: quæ etiam Veneriis in horto Maphei de Mapheis medici cernitur, è locis saxosis et montanis Italia, ubi sponte nascitur, translata.

Phu maius & minus, O. Vulgò Valerianam uocant. Nos & hortense genus unum habemus, & syluestria tria: maius commune, minus, & saxatile seu petraeum montanum. Omnia facile in hortis proueniunt, durantq;: saxatile quidem diutissime. Vna enim iam planta decimo aut amplius anno mihi uiuit in horto. Cognata his herbis omnino etiam Nardus Celtica est: (& ni fallor) Indica quoq;.

Phu peregrinū, seu, ut à quibusdam hodie uocatur, Valeriana Græca, herba pulchro flore, cœruleo, sed in odoratæ radicis K. A. Ae. C. Rurpodiis. Excrescit interdum ad duos cubitos, (inquit Aretius in epistola ad me:) in summo caule cœrulei multi flores sunt. Viridem nondum uidi: & foliorum specie tantum puto, non uiribus & natura Phu proprie dictam referre.

Phyllitis, quæ uulgò lingua ceruina dicitur, G. In multis apud nos hortis bene diuq; uiuit. Syluestris nascitur cum alibi locis collium saxosis & umbrosis, tum prope Limagum infra Badam nostram: & Glaronæ.

Phyllum, C. Dodonæi nimirum, quod is lib.: Iconum pinxit & descripsit, his uerbis: Phyllum, herba semine quidem Mercuriali similis, sed reliquis dissimilis. Tenui enim candida & lanugine tota incanescit, ac leniter hirsuta est: folia Oleæ foliis similia, sed latiora paulò. Errare eos hinc manifestum est, qui Phyllon cum Mercuriali confundunt.

Pi.

Picea si est, quam nostri Abietem rubram (à corticis colore) appellant. Abundant ea syluæ & montes nostri: & in hortos etiam translata arbuscula, breui adolefcit, G. Piceastrum quidem in altissimis montium nostrorum syluis nasci aiunt, materia

Qq

longè puriore & politiore. Ego nondum satis consideravi.

Piceastrum esse puto, cui maxima (ni fallor) rigidissimaq; in Coniferarum genere folia sunt, nostris montibus & collibus, etiam proximis urbi nostræ, frequentia. *Forst. Rhen.* Aliqui ipsam Piceam in altis montium sylvis nascentem pro Piceastro accipiunt; *Forst.* uerò Tædam interpretantur.

Pimpinella minor sylvestris, crescit in collibus siccis, hirsuta modicè. Habetur & satia lævis, G. Non aliter opinor quàm cultu à sylvestri differens, tenerior, & acetariis expetita: in quem usum sylvestris adhuc tenera substitui potest. Semina habui à Gallia. Cucumerem olent. *Pimpinella* à Nic. Myrepsò scribitur: de ueteri nomine nō dum constat. Pimpinella à Germanis uulgò dicta, aliis populis Saxifraga nominatur, Italis cognomento hircina.

Pimpinella maior, in pratis humidis suæ spontis, G. Durat aliquandiu & floret in hortis.

Pinguicula uel Liparis uocari potest; propter pinguiā & tenera folia, semper humida: in humidis quibusdam pratis, præsertim circa sylvas et montes nascentis herbulæ, foliis Oleæ ferè: caule nullo. Floribus Violæ nigræ, specie & colore. Viret aliquantisper in hortis, sed perennare (ni fallor) non potest.

Pinus arbor in Germania fortè nulla est, nisi rarissima, ut in hortis, K. R. V. u. apud Italos in hortis colitur propter nucleos Pineos, ein *zamer Zirnen bañ/an wolchem zame Zirbelnussen oder Ziernussen wachsend.* Audio & Genevæ spectari Pinum in loco quodam publico.

Pinaster, Pinus sylvestris in altis montibus Rhætorum & Valesiorum. Nec ulla arborū (opinor) alius nascitur. ein *wilde Zierbaum*, G. In horto ante annū è nucleis aliquot mihi exorta sunt, quæ partim uirent adhuc, partim perierunt. Nuclei quidam eius ut minores, ita gratiores sunt quàm Pini.

Piper uerum, ut quidam existimant, lac. Oppenheimer pharmacopola Francfordiæ ad Mœnum; qui iconem etiam ad me dedit.

Piper uerum ex India, hætenus non uisum, R. Pseudamomum, quod apud nos spontaneum est, aliqui antehac pro Pipere demonstrabant in Gallia. Idem aut per simile fuerit cuius Matthiolus meminit his uerbis: Piper foliis fruticis Ribes uulgò dicti, sapore & odore Piperi usitato simile, in racemis nascent. Sed aliud se uidisse tradit Neapoli, simile Vitalbæ, Italis uulgò dictæ, id est, Viti sylvestri causticæ nostræ. Huius plantas aliquas iam etiā in nonnullis Germaniæ hortis apparere audio, ut Schornдорff ad arce. Piperis, ut uocabant, arborē, uidi Ferrariæ in hortulo Ant. Mariæ Nigrosoli, altitudine bicubitali, foliis ferè Mali punice, sed pallidioribus.

Piper Indicum uulgò dictum, quod aliqui Capsicum uel Cardamomum Arabicum interpretantur, longum, O. G. Rotundum, O. quod Fuchsius latum cognominat: qui etiam tertium genus exhibet, rubeum & nigrum uocans. Tria eius genera, C. Aestiuata est herba, & nisi primo uere apud nos feratur, siliquas suas pulcherrimè rubentes non perficit. Siliquæ aliæ longæ sunt, exq; uel crassæ uel graciles: aliæ breues & latæ, in diuersis speciebus. Zingiber caninum Auicennæ secundum aliquos: aliis Piper Indicum, Hispanicum, Calecuticum, Bresilicum.

Piper montanum in Italia multi uocant, quod nostri Zyländ, Fuchsius Daphnoides uulgarè, Dodonæus Chamelæam falsam. Nascitur copiose in syluis ac locis montanis nostris. In hortos quoq; translatum, satis diu perdurat, G. C. Eiusdem species alpina minor, superiore autumnò hortulo meo commissa, uiret etiamnum: sed flores & fructus non productura uidetur. Vis utriq; caustica, omnibus partibus, os & palatum non aliter quàm Euphorbium accendens. Aliqui non rectè Laureolas uocant. Facile nascuntur: crassius enim radice & tenax est cortex. Maior nunc bicubitalis mihi uiret.

Pirolam uulgò dictam, (*Wintergrün* nostris, quod hyeme etiā uireat: et *Wald mangolt*, quasi Betam syluaticam,) à Piri arboris folio, sæpe frustra in hortulo plantare conatus sum, quamuis cum terra sua erutam. Desiderat enim in sylvis suis, solo duro,

duro, sicco, muscoso, umbroso, & uentis perflato uiuere: ubi radiculis suis geniculatis instar graminis se propagat.

Pirorum differentiae uariae apud nos reperiuntur: magnitudine, figura, odore, sapore, colore & tempore quo maturescunt, diuersae: quas in praesentia persequi prolixum foret.

Pirorum genera diuersa, Matthias Curtius Lindauia: ē quibus praecipue commendantur Moschatula cognomine (*Muscatbyrle*) ab odore, perparua, dulcia. Maturescunt in fine Iulii, (Superba, Chia, Myrapidia, praecocia) Et alia quaedam parua, quae Virginea cognominant, (*Juncstfrawenbyrle*), grato & dulci sapore: quae siccata etiam placent. Et maiora quaedam, quae Regia uel Regulana uocitant (*Ängelsbyren*) ē Curia Rhætorum aduecta. Hæc quidem apud nos etiam rara sunt, maxima post Libralia.

Pira omnium nobis (in Gallia, inquit Car. Stephanus) gratissima sunt, quae uulgo Bonchrestiana cognominantur: non ob hoc solum quod in eximia suauitate libere pondus equeat: sed quia tantę sunt teneritudinis, ut gustata statim eliqueant, & perennent, gestatumque tolerant. Primum quidem Neapolim usque delata Carolo octauo ibi res gerente, a felici illa Campania. Hæcille. Sunt & apud nos Libralia quaedam, quamquam rara, pondere ad uncias quindecim & amplius quandoque: inaequalia, tuberosa, succi plena: sed hæc diu seruari non possunt.

Pirus Bergamotte, Ae. De Pirorum generibus qui uoluerit plura, leget apud Cordum nostrum, ac Tragum: item Ruellium, Car. Stephanum, & Herm. Barbarum.

Pisforum genera uaria, K. Ea quidem in agris non hortis seminari decet.

Pisa nigra, G. *Woozenerbs*. Vide in Phaeolo syluestri.

Pisa rubra, Vu. Nescio an de illis sentiens, quae floridissimo colore rubro, una macula nigra excepta, ex nouo Orbe nuper allata sunt: quae uidi quidem, an uero in Orbe nostro sata etiam proueniant, nescio.

Pistacium, C. K. Arbusculæ eius aliquot, Vu. Hanc arborem (inquit Car. Stephanus) uidisse memini Venetiis, permultis in locis: item etiam Parisiis in æde diuæ Mariæ: atque adeo in horto Renati Bellai Cenomaneus episcopi, &c.

Pityusa uidetur non alia quam Esula uulgo dicta: quae rura nostra ubique abundant. Sed peritissimus omnium rei herbariæ Anguillara horto Patauino praefectus, Pityusa cuiusdam ē Creta, non uisæ antehac in Italia.

Pl.

Plantago trium generum passim apud nos reperitur, maior, minor, et media. Alia est aquatica, sed improprie Plantago dicta. Est & maritima, a Dodonæo exhibita.

Platanus in Græcia & alibi forte suae spontis est: in Italia ē semine tantum. Ego non semel frustra terræ mandauī. Lutetia, ni fallor, a Bellonio sata prouenit. Cardanus alicubi scribit Platanos in Scotia multas esse & bene prouenire: quod equidem miror. Scio deceptos aliquos Aceris genus latifolium pro Platano accepisse.

Po.

Polemonium, quod pharmacopolæ aliqui Been album non recte nominant, cui pro calyce est folliculus seu utriculus quidam calathi specie, cauus, inanis: flos albus, radix cubitalis, &c. G. Non diu uidetur in hortis durare: sed passim sua sponte nascitur in pratis siccioribus. Vide Been album. Polemonium Monspelii uocant plerique herbam, de qua in Ruta capraria dicemus.

Polemonium alterum, C. Videtur autem Been rubrum a pharmacopolis uulgo dictum intelligere. Nam Dodonæus etiam Polemonii speciem id facit: sed nihil ad Polemonium ueterum. Vide etiam supra in Limono Fontanoni.

Polium primum siue montanum Dioscoridis, K. Vu. C. O. Aliqui recentiores hoc Polium maius cognominant. Hoc non semel in uasis uerno tempore mihi satum prouenit, uix ad trium digitorum altitudinem: sed ante autumnum, medio fere Septembri interit. Argentina in horto, O. probe crescit & floret. Sponte nascitur locis siccis & apricis in Italia. & circa Monspelium, grati & aromatici odoris.

Polium alterum, uel minus, fruticosius & infirmius, A. G. In collium & montium locis, præsertim saxosis, sponte apud nos prouenit. Rhæti nobis uicini Herbam auream uocant (*Gulbintraut*) à præstantia nimirum ad remedia quædam. In hortis plantas erutas cū terra sua aliquoties plantaui, quæ intra annum aut citius perierunt. Siccum, saxosum & apricum locū requirit. E semine felicius prouenturū sperarem.

Polium (*Pulegium* fortè) Ceruinum *Mônspellii* dictum, Vu.

Polycnemum. Vide *Clinopodium*.

Polygonatum, uulgò *Sigillum Salomonis*, *Wyswurts*. In syluis solo pingui & opaco passim emicat: & in hortos translata annis permultis durat, relictis in radice ueterum caulium uestigiis ceu cicatricibus: ut & aliæ quædam, quarum ætatem inde computaueris:

Polygonaton erectum, quod à *Fuchsis* pingitur, G. caules nō obliquos ut prius, sed rectos fert: & quanquam aliquid similitudinis cum præcedenti habeat, genere tamen toto differt. Prouenit apud nos locis montanis, umbrosis, saxosis, ut circa thermas *Fabarias*: in hortis quoq; uiuacissimum.

Polygala. Vide *Ornithopodium*.

Polygonus mas, in hortis sponte & passim circa semitas nascitur: fœmina in palustribus.

Polypodium, R. G. Arboribus & saxis innascitur per syluas & montes. In hortis non benè nec diu uiuit, licet iuxta murum aut saxa cum suo cespite plantetur.

Pomum aureum uel amoris dictum, uel de altero mundo, in frutice peregrino, æstiuo, qui *Solanis* cognatus uidetur, (*Solanum pomiferum* dixeris, sed alterum, ad *Mali* infani differentiam) grauis & fœtidi odoris: fructus ferè inodorus est, nec insuauis, nec noxius in cibo, magnitudine *mali orbiculati* seu parui alicuius; rotundus: sæpe uerò maior, inæqualis & tuberosus: colore aureo: & in altera specie rubro: in tertia, albo, O. G. Vu. C. K. Facile apud nos prouenit, & fructum maturè perficit. *Rigari* gaudet, & solo pingui, in areis aut uasis. *Malum infanum* etiam aliqui *Pomum amoris* uocant, ut suprà dictum est.

Porrum etiam nostræ mulierculæ alunt, sed minus ac in aliis regionibus copiosum. Et si magnopere laborant hortorum cultores (inquit *Matthiolus*) ut eorū Porri longi, crassi, candidi ac teneri euadant: nesciunt tamen eos capitatos efficere ceparum instar: quamuis ita apud ueteres in frequentissimo usu fuerint, quod longis qui propriè sectiui appellantur, sapidiore, gustuiq; gratiores habentur. De his tanquam præstantioribus scripsit *Dioscor.* non quod à sectiui genere differrent: è quibus *mangonio* capitati fiunt, tegula in transplantatione supposita, incisus prius ante medullam foliis, ne adolendi facultas in sublime fetatur, nec ad radices, sed in ipso capite considerat: uel sarculo conuelluntur radices, ut delumbatæ alant, neq; distrahant, ut scriptum reliquit *Plinius* lib. 19. cap. 6. Hæc *Matthiolus*.

Porrum sectiuum, quod sic uulgò Germani uocant, (*Schnittlauch*) à superiori et ueteri sectiuo differens, à *Dodongo* *Schœnoprasum* uocatur, ficto nomine: nam et inferiores Germani *Biesbloock*, (alii *Bislauch*), à luncō & Porro composito nomine uocant; pro foliis enim lunci inanes ei sunt. Nos *Gethyllidem* appellabimus: quam *Nicandri* Scholiastes *Ceparum* genus esse dicit: formā autem diminutiuā uidetur à *Gethyo*: ita ut *Gethyū* sit species in hoc genere maior: quæ & ipsa apud nos reperitur in hortis, sed rarior: & mitior ad condimenta existimatur. *Gethyllidem* quidem syluestrem in uno tantum loco uidi, ad *Lauffeburgum* oppidū iuxta *Rhenicatarra* hactā inter saxa. Scio grammaticos Græcos in *Gethyi* & *Gethyllidis* interpretatione uariare: sed inter alia hæce uerisimilio ra delegimus. *Ampeloprasum*, syluestre genus Porri est, à natalibus inter uineas dictum: ut & *Scoro doprasum*, odore *Allii*, folio Porri: quod in pratis quibusdam reperitur. Et Porrum petræum, quod in faxis circa *Badam* nostram nascitur. Nisi id *Allio* potius cognatum sit. *Carolus Stephanus* *Ruellium* secutus *Gethyum* *Theophrasti*, interpretatur *Porretam* uulgò à *Gallis* dictam & *Ciuetam*, quali *Porraginem* et *Capulam*; hoc est Porrum

rum sectium à Germanis uulgò dictum: idè in agro, id est, inter agrestes herbas. Idem in horto: Bulbi genus (inquit) quod in hortis coma copiosiore uiuet, nucleis gracilioribus, uulgo nostrum uocat des Porrettes, uel Oignonnettes, à Porri uel Vnionis tum sapore tum forma. Eadem quoq; grandioris formæ bulbos (de Cæpa Ascalonia quibusdam existimata fortè sentiens) donarunt appellatione. Theophrasto Gethyum olus hortense est, capitata seu bulbosa radice: caulis magna pars sub terra est. Semen ei infirmum non multo tempore durat: à satù tardè, nempe decimo aut duo decimo die germinat. Seritur Ianuario: scmentis eius per æstatem est. Imbres diligit, uel simpliciter, uel à principio saltem.

Portulaca maior, horten sis, O, G. Apud nos minor, quæ & syluestris alibi est, frequentior habetur.

Pr.

Priapea. Vide Hyoscyamus è Syria.

Primulam ueris, alii Arthriticam, alii Bellidem nominant: de utraq; prædictū est.

Prunus quæ fructus magnos, purpureos & acido sapore fert, Lindauia Hengst uocat, nostri Bockshoden uel Pflaumen, G. His similia etiam cerei coloris, minus frequentia, apud nos reperiuntur.

Pruna parua, serotina, cereola, quæ nostri nescio unde Zipparten appellant, G. Pruna præcocciora, parua, uersicoloria, à tempore quo Auena metitur apud nos dicta, Haberfrüchert, passim nobis abundant.

Pruna Neapolitana oblonga, (dulcia, ni fallor,) quorum species una alba est, altera punicea, Matthias Curtius Lindauia.

Pruna Vngarica, quæ uulgò Tuuesca uocant, (Zwerschgen) duorum generum: maiora & oblongiora: & alia minora, rotundiora, dulciora, Curtius Lindauie. Prioris generis arborem nos quoq; habemus, è nucleo ad quatuor iam cubitos enatam. Cuius quidam noster adultam habet, sed quæ non bene fructificat, Basileæ in horto Io. Iacobi Lofs. probè perficit fructum.

Pruna Vngarica præstantissima, Damascena fortè, Vu. Eiusmodi Venetiis mituntur aliquando Augustam, magno precio, crassa & carnosa, subacida. Hæc (uel oblonga Neapolitana) aliqui Imperatoria siue Augusta cognominant, quod iis Imperator Augustus oblectetur. Vnà aut altera arbor Augustæ est.

Pruna alia Vngarica aurei uel cerei coloris, magnitudine ouis gallinacæ, aut etiam anatinæ, carnosa, gratissimi saporis, Vu. K.

Pruni diuersis arboribus inferuntur, ut, Nuci, Malo, Amygdalo.

Prunus syluestris, Spinus in plerisque sepibus uiuis nascitur.

Pf.

Pseudamomum. Vide Amomum.

Psyllium, R. A. Vu. Aliquando mihi in horto satum pulchre quidem excreuit, sed hyeme præueniente seminis maturitatem non est cōsecutum. Psyllii duo genera, K. tria, O. Semel in horto satum, seipsum proleminare & restaurare scribit Deodæus.

Parmica. Vide Pyretto cognata.

Parmica alia Monspelii dicta, uera (ut existimant) hac ætate floruit, A.

Pu.

Pulegium in plerisque apud nos hortis uiuet. Sponte circa Argentinam, & alibi, in pratis humidis luxuriatur. Patauii Calaminthæ genus uidimus, Pulegio specie, odore saporeq; tam simile, nisi quod rectum nascitur, ut prorsus ei cognatum iudicem. Aquaticum Pulegium, uulgò regale dicitur: montanum uerò, multis Polium, foliis multò antedicto minoribus, flore cæruleo: caule recto, dodrantali, &c. Carolus Stephanus. puto autem Pulegium illud montanum cuius meminit, Monspelii Ceruinum cognominari. Id quidem hoc uere Lugduno ad me missum, pulchre in hortulo meo crescit, coliculis pedalibus, candidis, erectis, ab una radice pluribus: foliis longioribus & angustioribus, Hyslopifere: odore & sapore omnino Pulegii uulgaris.

Pulegium petreum uocari potest, Germanici nominis (*Steinpooley*) imitatione, herba aliquibus Clinopodium existimata, quæ sponte apud nos in muris, et locis siccis saxosisq; & collibus apricis crescit. Hanc puto Calaminthæ montanæ nomine non rectè exhiberi à Trago lib. 1. cap. 10. Eadem fortè est, de qua Car. Stephanus sic scribit: Aquatico Pulegio similis quædam planta in montibus et siccis locis crescere solet, quæ Gallis Pouliot sauuage, quibusdam Polium montanum appellatur; folio Serpylli, sed paulò latiore, flore cœruleo; apud eū collem Lutetiæ uicinum frequens qui Eritius dicitur.

Pulmonaria Plinii, Italis hodieq; uulgò sic dicta, sine maculis apud nos, reperitur in Albio monte, G. gaudetq; locis humidis & umbrosis. Illa uerò cuius Plinius meminit foliis maculosis, in Italia tum hortis tum sponte frequentior est, nobis rarior. Audio tamen in montibus quibusdam Bernensium reperiri, O. K. Est autem omni nò Symphyto alteri seu Consolidæ maiori dictæ cognata herba, sed undiquaq; minor. Syluium audio hanc Myosota, id est, Muris auriculā Dioscoridis existimasse. Plantatur in Germania inferiore plerisq; hortis, non alium ferè in usum, quàm ut misceatur ferculis, præsertim placentis ex ouis. Dodonæo teste.

Pulmonaria eadè quæ Vegetii, Consiligo est: quæ Pulmonariæ nomine hodieq; apud Anglos uenit. Vide in C.

Pulmonaria Gallica, Gallis hodie uulgò dicta, siccis & lapidosis locis, & in muris circa urbem nostram multa est: nec non in syluis, præsertim Fagorum, *Büschspide*: olus quoddam syluestre, Lactucarum generi cognatum. Commendatur ad pulmonis uitia, paronychiam & uulnera. Hæc fortè est Scopa illa regia (nam & aliæ eodem nomine sunt) quæ apud Plinium demonstratur, ramis oblongis, foliis ex inter uallo lactucinis, sed rigentibus & lanuginosis, flore luteo; radice promissa, tenui. Et forsàn eadem fuerit Sideritis etiàm illa Plinii (nam aliæ sunt Dioscor. Sideritides) quæ sit latissimo folio, Scopa regia appellata, uulneribus præcipua: quanquā Ruelius Carpentariā à Gallis dictam, (i. S. Barbaræ herbam) pro Sideritide ista accipit.

Pulmonariam aliqui (Sabaudi aut eis uicini Bernenses) uocant herbam illam, quam nos Saxifragam montanam. Vide infra. Et in ser Mursci genera, arboribus ad hærens, quam Pulmonariam recentiores medici nominant. Vulgus nostrum uernacula lingua Marrubio id nomen tribuit. Alicubi Gentianam quandam pumilam in pratis humidis prouenientem, *Lungenblümle*, id est, Pulmonis flosculos uocitant.

Pulsatilla Italis uulgò dicta, Cauda uulpina Amato Lusitano, sed alia est Alopecurus ueterū. Vide supra Anemone quædam. Alia est Polonorum Pulsatilla, nempe *Astrantia nigra* nostra.

Py.

Pyrethrum, O. R. C. Rurpodius. Huius etiàm Argentinæ plantas duas in horto Malsartii medici primū uidi: foliis ferè Millefolii latius se spargentibus. Mihi etiàm hoc anno è seminibus Pyrethricò plures plantæ enatæ sunt, radicibus albis etc. Vide Tarchon. Pyrethrum alpinum quoddam paruū in summis alpibus, (id est, Gothardi monte) reperi.

Pyrethro cognata quædam herba, oblongis serratisq; foliis. Locis aquosis nascitur: circa Luteciam in pratis: & prope Basileam iuxta fluuiolum qui in oppidum minus intrat. Tarchon aquaticum dixerim. Falluntur qui Ptarmicam putarunt. Hoc in hortulo etiàm mihi uiret, sed minus lætum humiliusq; propter siccitatem; repit radicebus suis.

Que.

Quercus in syluis nostris crescunt, duorum generum opinor, *Wich* & *Hageich*, Quantum profit cura arboribus (inquit Cardanus de Varietate rerum lib. 6. ca. 23.) præcipue ostendit Quercus Basileæ in diui Petri nemore (area publica Tiliis consista,) Truncum terni uiri diductis manibus uix ambiunt. Altitudo (trunci) minor quàm hominis, Exerit in uertice sex aut septem stolones (imò ramos magnos & la-

ros, quos tabulata dixerim) sensim ascendentes, ut imaginem pateræ referant. Inde crebrioribus ramis, tum & ramusculis ita densatur, ut olim referant Casarem Maxi-
milianum cenasse in ea, discubuisseq. Siquidem ambitum pedes centum continere haud dubium est, cum numerando illū circumiuerim. Ergo hac diligentia quamuis sterili (nō est sterile) solo frigidoq. coelo, Basilica Quercus cū Lycia Platano iure de-
certabit. Et quamuis gloriatur Licinius Mutianus, eius prouinciæ legatus, cenasse sæpius sub Platano cum octodecim sociis: multò tamē plures Quercus Germanica suprà excipiet, quā Platanus illa adumbrauerit. Sed differim et quod Mutiani
Platanus 77. pedum altitudinem habuit. Quercus hæc, ut dixi, humillima est.

Quinquefolium, Quære Pentaphyllum,

Ra.

Ranunculi, siue Batrachii multa sunt genera: propriè autem ita dici uidentur quæ locis aquosis, & ubi ranæ frequentant, nascuntur. Horum unum pinguibus ac
splendidis foliis est: (quod apium risus, uel apium Hemorroidum uocant) id primo loco Matthiolus pinxit. Alterum simplicia, oblonga & angusta folia habet, Oleæ fe-
rè: quod à Dodonæo oues occidere fertur, qui foliorum marginibus eminentia quæ-
dam appingit, quod ætatis aut potius speciei alterius proximæ signū est. Nunc ali-
quot mensibus in horto meo uret. Tertium, minima & multifida habet folia. florē
partim album, partim luteū: humi sternitur. Tria hæc genera, foliorum quidem spe-
cie prorsus differunt: cæteris fere omnibus conueniunt. Omnia caustica sunt, & na-
scuntur palustribus locis apud nos: præsertim ubi lacus expatiatur. Hæc in hortis ni-
si aqua subsit, non durant. Alia Ranunculi genera nascuntur in pratis, & collibus,
alibiq. magnitudine & foliorum hirsutie distincta. Genus illud cui hirsutiora sunt
folia, caulibus longior, & pluribus incisuris folia, Sardoum Ranunculum dicemus, u-
rentem & ipsum. Genus id quod per terram magis repit in pratis, & acrimonia ca-
ret (unde & inter olera uulgus recipit,) aliqui Cronopodem uocāt, de quo diximus
in litera C. (Huic cognatus est syluaticus quidam à Trago & Dodonæo descrip-
tus.) Colitur hoc etiam in hortis nostris (sicut & præcedens) flore multiplici, tum
luteo splendente (unde & nomen factū à nostris, *Glyssblümle*) tum albo. Diu du-
rant, flagellis suis, ut Pentaphyllum se propagantes. Siccis locis & in collibus nasci-
tur genus quoddam humilius, quod aliqui Flammulam uocant, à præcipua urendi
ui, præsertim in radice, quā globosam habet: unde Apuleius Verticillum nominal-
se uidetur. Nostrī uulgō *Gehörsle* *glyssblümle* à calyce florum in uerso. In hortu-
lo aliquoties mihi plantatus non durauit. Est & aruenlis quidam æstiuusq. Ranun-
culus à Fuchso depictus, frequens apud nos, conceptaculis seminum aculeatis, G.
Montanos etiam Ranunculos in Helueticorum montibus nascentes, albis floribus,
tres noui. Vnus ex his minimus est, caule uix ultra quatuor digitos alto: acerrimus.
Ex eo destillata aqua in Valleis quidam propinant Gallico morbo affectis, & mi-
rè purgare aiunt. In hortis aliquandiu durat, per duos fortè aut tres annos, *Jägerz-
Erant*, G. In saxis ferè altorum montium terra interiectis & musco nascitur. Alius est
magnus, magnis & latis foliis, qui flore etiam multiplici in hortis colitur: genere
ab aliis differens, quod & forma & sapor præ se ferunt. Crescit in montium locis hu-
midis & aquosis. In hortis facillè ubiuis & diu uiuit, G. Tertius qui *Sidertsche*
appellatur in Bernensium montibus: unde, A. noster in hortum transtulit: à quo
etiam descriptionem, picturam & semina eius accepi, & nuper ipsam plantam recen-
tem. Floret (inquit) hæc planta in horto nostro: quæ sponte in montium locis um-
brosis accitæ Larices crescit: radice alba, rotunda, multis fibris, qualis Ellebori al-
biferè est. Caules ab ea multi erumpunt. Florere incipit primo uere floribus
ut Ranunculorum, minoribus, candidis. Folia habet magna, Platani fermè mo-
do incisa. Hæc ille. Chamæplatanum, si libet, uocemus: Vix enim (Ricci
no excepto) folia Platano similia uidi, tum figura, tum magnitudine fer-
mè pari. Sapor eis subacris & nitrosus: qualis & secundo generi ex albis mon-
tanis,

Ranunculum phragmiten appellauerim, quem Fuchsius tertiam Ranunculi apud Dioscoridem speciem facit, ut similem ei alteram flore lacteo, speciem quartam eiusdem: quoniam passim apud nos in sepibus nascitur, etc. *Wergensblümen*. Vide supra in Anemonis.

Ranunculi Dioscoridis secundam speciem, herbae Sardoae nomine, Dodonaeus Pulsatillam Italorum facit; de qua leges inter Anemonas.

Ranunculum quartum Matthioli flore albo, (quem depingit, non autem describit, ne uerbo quidem,) foliis Napelli ferè, ut pictura prae se ferat, nondum uidi. Inter Ranunculos & Aconita ambigere uidetur herba illa montana, cuius inter Aconita mentio facta est.

Raphani tria genera enumerat Plinius, crispum, leue & campestre: quae Germania etiam hodie agnoscit, inquit Bern. Dessenius. Sed quod à Plinio Algidense dicitur, longum, succosum ac translucidum, hortis inferioris Germaniae tam frequens, ut nullum ferè aliud norint: hoc apud Batauophrysios nostros in eam magnitudinem crescit, uti uiderim quod triginta libras penderet. Quamobrem minimè mirandum, in Germania infantium puerorum magnitudinem aequare, Plinium scripsisse. Vulgaris est Raphanus, qui uirilis brachii amplitudinem non excedit. Sunt autem hi translucidi: & adeo fragiles, ut in taleolas absque ferro confringi queant. Multum ab acedine illa ac saporis uehementia, qua secundum genus pollet, recedunt: & falgugine imbuti, linguam usque adeo non uellicant. Theophrastus quinto de causis plantarum capite quinto, hyeme cum maximè uigent, terra radices Raphani obrutas, ut nullum imbrem admittant, ac directis quibusdam foliis, mirae crassitudine distendi docuit. Alterum genus Rapi figura, Syriacum appellatum, in superiori solum Germania prouenit: uehementissimum & tenerissimum, nec multa humiditate redundans: quapropter parcius editur. Nam qui affatim ingerunt, praeter frequentes ructus, rolionis quendam sensum in stomacho experiuntur. Tertium, quod fronde copiosius quam radice, & plurimum agreste, à Latinis Armaria, à nostris uoce parum corrupta Raphanus marinus uocatur. Hoc saepe in paucis Tubantum circa lacus & stagna crescit, atque in pinguius Phrysiæ paludibus copiosissimè uidetur. Rheni superioris accolae in hortis transplantant, meliori quodam cultu & natura. Extremae planè acedinis est, unde quibusdam radix Piperis appellatur: uulgò *Pfefferwurzeln*, & *Wyrhettrich*. Sicille. Laudatur hodie Argentina cum aliâ fertilitate soli, & nascentibus in eo uariis naturæ (imò Dei per naturam) donis: quæ à maximo illic hortulanorum & olitorum numero seruntur & coluntur: & inter alia Raphanis eximiis. Tragus uulgarem Raphanum & rotundiorum, quem à ueteribus Corinthium & Syriacum dictum putat, Argentoratensi & Spirensi agris familiarem esse tradit: præ longum uerò, dulciorem ac mitiorem Metensi ac Lotheringico. Hunc Algidensem Plinii, Theophrasti Cleonæum facit. Habetur apud nos praeter commune genus alterum (ex Italia puto) cuius cortex nigricat: & tertium cuius radices pars magna supra terram excrecere solet, utrumque communi præstantius, sed rarum. Raphanum maiorem, uel marinum uulgò dictum, nostri in hortis tantum plantant: diu & probe durat, capitibus radicum resectis plantatur, non semine, quod non fert, Trago teste. In Sabaudia memini aliquando reperisse in pratis, infra Laufannam oppidum: satum forè potius purto quam sponte natum. Facile enim ubiuis nascitur. Tragus quidem in humidioribus pratis sua sponte nasci scribit, & Theophrasti radicem Thraciam uel Liothalasium esse putat.

Rapistrum passim in aruis nascitur: idem quod Lapsana uel cognatum, agreste olus.

Rapis arua conferuntur non horti.

Rapa rubra, Vu. Betæ speciem intelligo, de qua dictum est supra.

Rapi genus minus, exprimendi è seminibus olei causa in agro Metensi seritur. Radix non editur. Id ad Sinapis naturam accedit, Trago teste.

Rapi

Rapifylueſtris multa ſunt genera quod Dioſcorides ſimpliciter ſic uocat, uideſtur id eſſe quod noſtri uulgò Rapunculum. Eo minus eſt de quo ſuprà diximus Campanulæ cœruleæ nomine. Et aliud maius, foliis ſerè Vrticæ. Maximum, quod aliqui Medion uocant. Dodonæus Violam Marianam. Sunt & Vuulariæ quibuſdam dictæ in pratis non alterius generis. Et in ſyluis ac montibus, quarum flores ceu in ſpica ſunt, alii cœrulei, alii pallidi, ſuperiorū floribus, qui calathiſformes ſunt, diſſimiles. Ex his quædam in hortis elegantioribus ſeruntur, ut Medion, Campanula cœrulea, &c.

Reſeda. Vide Lutea.

Rh.

Rha barbaricum uerum naſcitur Romæ in horto Scipionis ad S. Apoſtolum, ubi etiam à ſe depiçti doctiſſimus Io. Kentmannus cum aliis plurimis iconibus participem me fecit. Is, inquit, (Scipio ciuis Romanus) quatuor radices habebat, et planè affirmabat, in Turcia ſemen ſeiſpum collegiſſe, & ex eo ſemine has radices ſibi progeneratas. Interdicebatur autem à Paulo III. qui rerum naturalium, & herbarum amator erat, ne uenderetur alicubi propter raritatem. Sic ille. Omnino quidem Lappathorum generis uidetur hæc herba.

Rhabarbarum monachorum uulgò dicta herba, ubiq; in cultioribus hortis ſatà reperitur, R. G. Eſt autem Hippolapathum, aut eius ſpecies.

Rhamnus, Leuſchnerus, Rurpodius,

Rhamni ſecunda ſpecies, K. C.

Rhamni tertia ſpecies, Matthioli, Vu. C.

Rhaponticum uulgò dictum. Vide in Centaurio maiore, Acantho, & Gentianâ.

Rhodia uulgò dicta radix, Roſin wury; è Pannonia (puto, ubi ſponte creſcit,) primū allata, Ac. R. K. C. Huius radicem proximo autumno Leonhardus Fuchſius ad me miſit: & uiret mihi etiamnum pulchrè, ſed florem nondum protulit.

Rhododaphnè ſiue Nerion uidi anno ſuperiore Baſileę in hortis doctiſſimi uiri Cælii Curionis & aliorum: item Argentinæ Maſſarii & D. E ſemine, aiunt, facile provenit, Auulſi eius etiam ſtolones creſcunt. Hyeme ſub tecto includi debet. Mihi aliquoties ſaturn non provenit. Nunc ſtirpem duorum ſerè dodrantum à Cęl. Curione donatam pulchrè creſcentem habeo.

Rhus Plinii exiſtimatus Monſpeli ſuſſrutex, C. Verum Clymenum Dioſcoridis. Nunc in meo etiam horto Antuerpiam à C. tranſmiſſus naſcitur, ſed nondum perfectè propter recentē plantationem. Videtur autem facile naſci, ſicut & reliquæ herbæ aſtringentes ſerè.

Ri.

Ribes. Vide in Ceanotho.

Ricinus. Lege Cici.

Ro.

Rosę hortenſes albę, multiplici, folio paſſim apud nos in hortis abundāt. Earum frutices proceriores ſunt, quàm quæ rubras ſerunt.

Rosæ rubræ urbanæ, ſimplices, uulgares nobis. Item alię ex purpura albicantes, folio multiplici. His diebus in horto amici Roſam uidi dimidia parte candidiſſimam, altera purpuream.

Rosæ Alexandrinæ, uel Perſicæ, uel Damascenæ, uulgò Incarnatæ dictæ, ante annos aliquot raræ nobis, nunc ſatis frequentes. *Lyſſarbo roſen.* Harum roſaria (inquit Nicol. Monardus Hiſpalenſis medicus) noſtris maiora & uiridiora ſunt: foliis amplioribus: aculeis plurimis & acutioribus. Florum numeroſam copiam ſunt: quæ foliis quinis aut ſenis conſtant, medio inter album & rubrum colore. Ruderatum amāt locum. Seruntur, inciduntur, cremantur, transferuntur ſicuti noſtra. Harum Roſarum apud Italos, Gallos, Germanos, diuerſasq; gentes nunc eſt frequens uſus, quas Damascenas uocant: quoniam ex Damasco nobiliſſima Syrię urbe creduntur aduectæ. Apud nos uerò triginta ſerè ſunt anni, ex quo earū notiā

attigimus. Apud magnates & nobiles fuit in primis in magna æstimatione, ex illis rosis medicamentum, (syrupus ex multiplici earum infusione,) uel mel rosaceum, foliatum, &c. nunc uero ubiq; habetur, ita ut non sine seplasiariorum iactura perierit usus pharmacorum. Hæc ille. Sed uideo Damascenas uel Alexandrinas rosas diuersas esse, ut differentie causa has, Persicas tantum nominare præfiet.

Rosæ citrinæ seu luteæ, C. Rurpodius.

Rosæ moschum fragrantæ, luteæ, K. Augustæ luteas alunt in hortis lautiores quidam, quas inodoras esse audio, (& uulpinas cognominari;) frutice tamen odorato, quem uidi illic uir entem iuxta parietes hortorum, odore ferè syluestris Rosæ foliorum, quam à uino nostri denominant. Florem siccum tantum & inodorum uidi. Nunc plantas duas in horto alo: sed non feliciter germinantes, quod diutius (opinor) in itinere detentæ sint: & iam circa solstitium odorem etiam am. sisse uidentur.

Rosa muscata, (alia à præcedente,) simplex & multiplex, C. Rosæ muscatæ uel Damascenæ, parua, simplices, albæ, Curtius Lindauiæ. Flos est quatuor foliorum tantum, (ut audio) foret in Italia toto ferè anno, Augustæ uix ante autumnum. Aliæ nobiles, densifolio flore, paruo, purpurei coloris diluti, Idem. Harum fruticem Augustæ etiam uidi, in uase, tanquam à frigore ei metuerent ut recondi sub tectum posset. Earum speciem priorem esse puto, de qua Amatus Lusitanus: Sunt præterea (inquit) aliæ Rosæ albæ ad citrinum tendentes, parua, pauca (tria quatuorue) folia habentes, ut & syluestres quibus similes sunt: quæ ferè per totum annum in arbore uidentur, quas moscatas ab odore, uel Alexandrinas uulgo appellat; aliqui Damascenas. Hæ uerò odore caput tentant: & potentissimè alium subducunt, non minus ac Scammonium: ita ut si sex uel octo folia acetario miscueris, totum purgatorium reddas, qua de causa ab illis tanquam pernicioso medicamento naturæ uim inferenti, abstinendum suadeo. In Hispania rarò uidentur: & ab aliquibus cum incarnatis confunduntur. Hæc ille. Audio easdem marinas à nonnullis uocari, aliæque iam in hortis monachorum præsertim & ditiorum hominum, circa Verbanum lacum quoque. Sed fortè genus diuersum est. Præstantissimæ rosarum quæ puniceo colore rubent: proxima laus iis quæ in rufum (rubrum) candicant, incarnatæ uulgo dictæ; uilissimæ albicantes. In quarum tamen genere eæ odoratissimæ excipiuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, & aliis Moschettæ uulgo dicuntur. Siquidem non modo cæteras excellunt, quòd colore admodum suauiter fragrant, sed quòd etiam magis alium subducant, Matthiæolus. Monachi interpretes Mefuei Nesrin uel Neslin Arabicè hunc fruticem uocant, aliàs Rosam Seni: & è syluestrium genere esse putant, sicut & incarnatam uel trentaphyllam uulgo dictam à foliis triginta: & albam, quæ & centifolia dicatur.

Rosæ Indicæ magnæ, coloris aurei, Vu:

Rosæ syluestres, Cynosbati uel Cynorrhodi nomine ueteribus dictæ, passim fepes uiuas apud nos replent.

Rosa syluestris alia, humilior, in collibus siccis & apricis, toto frutice suauissimè odorato nascitur: unde à uino nostri Wintòsle denominant. Hunc cum aliquando in hortuli mei loco umbroso plantassem, probè quidem excreuit, sed odorem amisit. Cuius quidam noster partim in ipso muro hortuli sui, partim iuxta, loco aprico, ualde procerum & suauissimi odoris, quem nectæreum dixerim, hunc fruticem habet: quem annis quàm plurimis illic uixisse apparet: à quo ego etiam accipi.

Rosa syluestris, à Maio mense denominata uulgo nostris, Weientòsle, colitur quidem in hortis etiam ab aliquibus apud nos: crescit uerò sponte ad radicem Albii montis, horæ itinere ab urbe: minor, odorator & præciosior est Cynorrhodo, in hortis facillime durat. Hæc eadem fuerit Rosa campestris Tragi, quam Germanice uocat *Danrosen* / *Haberrosen* / *Selderosen*. Hæc inquit magnitudine tum florum, tum foliorum excedit illam cuius folia fragrant: spinis

spinis non perinde minacibus. Flores seu Rosæ huius fruticis, coloremagis rubro & elegantiore tinguntur, odoris (meo quidem iudicio) inter omnia genera suauissimi, tactu pinguiorēs. Luxuriat hic frutex plerumque in humectis ac minime fertilibus auenaceis agris, aliisque nonnullis dumetis, raro supra tres cubitos assurgens. Serpentibus in terra radicibus se propagat, facileque & nullo negotio plantari potest. Huius species altera (inquit) Rosas prorsus candidas profert: odoris minus iucundi; in siccaneis agrorumque limitibus, & iuxta itinera, lunio ac Iulio mensibus florens.

Rosa alpina dicta ab Heluetiis montium incolis, *Alprosen/Hünnerlaub*, &c. Folia Oleæ uel Rhododaphnes habet, ruffa parte supina: florem rosei (rubri uel è rubro albicantis) coloris. Frutex duos pedes altus, totus odoratus est & pinguis. Species eius altera foliis minimis, Acinariae palustris nostræ (*Woesbeere* uocant) foliis persimilia, nascitur in Adula monte Rhætorum: inde autumnoproximo mihi allata, & in hortulo plantata: ubi nunc media hyeme egregie uiret, nec perdit folia: duraturam tamen uix spero, altissimis, siccis, uentosis & apricis frigidisque locis assuetam. Species hæc rarissima est. Prior in plerisque altis montibus reperitur: quam qui Nerion montanum appellant non laudo; nam neque uenenosus est, neque siliquatus frutex.

Rosmarinus seu Libanotis coronaria, duplex: unus nobilior, angustiore folio: Cordus tenuifolium seu minorem appellat. Alter ignobilior, Cordus sylvestrem uel maiorem nominat. Vterque iam apud nos in hortis colitur. Nobilior siue urbanus noster, flores ex albo cœruleos habet. Audio inueniri speciem, cuius flores omnino albi sint. Sylvestris è Sabaudia hortis sæpe ad nos adfertur: idem in provincia Narbonensi, ut circa Monspelii sponte provenit; & hyeme pauperum etiam focis uritur. Prouenit tum ex semine, tum ramulis auulsis commodius. Topiaria arte digeri facile potest, in varias figuras. Sic pulchre digestum Basileæ uidimus in horro Ioan. Jacobi Lofs: & in cœnobarum Gallia Italiaeque aliquot hortis: Biturigibus scenam siue attegiam Rosmarino procero inflexoque supra opertam, ut triclitanium caperet.

Rosmarinus ita ut in Gallia, arborecens ferè, Vu.

Ru.

Rubia sativa, à radice colore dicta, qua ad eundem colorem utuntur tinctorēs. *Note*, Ae. O. R. G. Nos cognitionis tantum gratia, & ad remedia, in hortis plantamus. Alibi ea conferuntur agri in usum tinctorium. In horro meo alta nunc est cubitos fere septem.

Rubia sylvestris tam ubique obuia est, ut in hortum transferre nemo dignetur.

Rubia syluatica aspera, *Waldmeister* à nostris dicta, G. Frequens occurrit in syluis, pedali aut cubitali cauliculo: locis umbrosis, pinguibus, opacis & sylvestribus gaudens, margine foliorum aspero, caule quadrato: flosculis albis, odoratis. Altera foliis est lauibis, caule terete, bicubitali ferè: flosculis albis, inodoris, G. Vtriusque meminit Tragus: priorem depinxit. Huius speciem aliam longioribus & angustioribus foliis in colle iuxta Scaphusiam inuentam sibi nuper quidam ostendit. Sunt & alia sylvestres huius generis species multo minores: quas circa Bononiam Squinanchicas, aut Herbas uite appellant.

Rubus uulgaris passim circa sepes & alibi, mora sua obuiis sponte præbet. Alia eiusdem species, humidioribus præsertim locis, humi reptat, nec unquam assurgit: ita Chamæbatus inter Rubos, ut Chamæcissus inter Hederas.

Rubus alpinus humilis est, sine spinis: quare Idæum dixeris: moris rubris, acidis, quæ paucioribus granis constant. Hunc primum obseruaui in monte Pilati ultra Lucernam, super saxis terra interfectis.

Rubus Idæus à plerisque doctis existimatus, moris rubentibus, suauiter odoratis: circa sylvas apud nos reperitur. Spinis raris & paruis. Hunc Argentina in horro uidi, procriorem quam sponte nascatur, spinis nullis, si bene memini, *Hinderbeer*.

R r ii

Ruscus, R. O. K. Suffrutex in hortis uigacissimus. Plantam unā ante octodecim annos ē Sabaudia horto mecum attuli, nescio cuius tum ætatis. A quo tempore hætenus in hortulo meo pulchrè uirer per totum annum, (quamuis bis aut ter in hortos translata diuersos:) uere germinat, & ueteribus arecentibus coliculus nouos promittit; floret etiam aliquando, & florum rudimenta uel hyeme in medijs folijs ostendit. Fructum quidem toto hoc tempore nullum ne inchoauit quidem. Radix uidetur talis esse, qualis ferè Hypoglossi & Polygonati: ideoq; tam diuturna. Pedis altitudinem non excedit: non minuitur nec multiplicatur, nisi ut dixi. Refracti fortè à radice coliculi seorsim germinarent.

Ruta hortensis in plerisq; omnibus hortis. Hæc cura & ætate uidetur propemodum arborefcere posse. Semine uel surculo seritur. Rutæ hortensis (inquit Tragus) duæ species sunt, sed adeo inuicem confimiles, ut nisi singulari diligentia nemo facile discernat. Quæ nobilitate præstat, ea tenerior, nigrior & longe exilior uulgaris existit. Eius folia ex multis alijs rotundis, lenticulamq; imitantibus foliolis constant. Hæc rarò florem profert; ferroq; incisa, facile inarescit. Vulgaris autem Ruta per omnia maior, folijs uestita latioribus, frequentibus, casti colore. Vtraq; florem gerit luteum, &c. Seritur Ruta & semine, & surculo: idq; multò felicius.

Ruta syluestris per omnia similis hortensi, sed undiquaq; minor. Nascitur circa Monspelium. Hæc è semine aliquando mihi prouenit. Hyeme perit, nisi sub tectis seruetur in cella tepida aut uinaria. Flos ei luteus, Vu. A. Puto autem duplicem esse, unā minoribus folijs, de qua iam diximus: alteram maioribus, hortensi similiorē. Rutæ syluestris iconem depictam clarissimus hoc tempore Torgæ medicus Ioan. Kentmannus ad me misit. Folijs, ut icon præ se fert, longioribus & angustioribus quam hortensis, floribus partim albis, partim purpurascensibus. Caulibus ab una radice ternis. Hanc plantā (inquit) accepi à Pet. Bellonio Cenomano, redeunte ex Aegypto, qui dixit uerū Hamel esse: tertium Rutæ genus apud Diosc. aliàs reperitur in Macedonia & Toleti. Florem habet album, folia non dissimilia folijs Rutæ: capitella (uascula seminum rotunda) maiora quàm Ruta hortensis: pluribus ab una radice cauliculis, Hanc in hortis alunt, Ae. Vu. folijs oblongis, flore albo, etc. Vide Hamel supra.

Ruta pratensis Lutetia uocatur in pratis proximis nascens herba: cuius flores albi uel purpurascens, nullis folijs, solis apicibus aut cincinnis longiusculis cōstant. Reperitur & apud nos locis saxosis & umbrosis, circa sepes sylvarum alicubi. Folia Aquilinæ uel Aquilegiæ uulgò dictæ, fere similia habet, A. G. Plurimis annis plantam una in horto iam mihi durauit, loco umbroso. Aliqui circa Sabaudiam hanc non recte Rutam caprariam uocant. Cognata huic uidetur Saxifraga lutea, de qua infra. Simile est etiam ei Thalictrum à nonnullis dictum, &c.

Ruta capraria Italorum, alio nomine Galega (quasi Gallica: nam & Regallicum, & Galeni herba quibusdam dicitur) uel Gralega, Ae. K. C. Rurpodius. in Germania sponte nasci non putot: in Italia abundat, præsertim iuxta aquas, uel ubi sublit aqua, Cardano teste. Alijs etiam nominibus diuersis in diuersis Italiae locis appellatur: ut sunt, Casti cane, Lauanese, Lauannan, Fœnogræcum syluestre, Thorina uel Taurina, Martanica, Saracena, Capragina, & herba Nesa, Fœnogræco fatiua toto perissimilima est. Non seritur in Italia: sed locis pinguius humectisq; copiose prouenit, Monachi in Mesuen. Eruditi quidam Onobrychia à ueteribus dictam iudicant. Matthiolus contradicit, ut iis etiam qui Glaucem faciunt. Pingitur Ruta hæc à Dodonæo. Videtur (inquit) nonnullis Polygala esse, & nomen Galega à Græco corruptum. Item à Matthiolo in Glauce. Vulgaris est adeo in Italia ut semina nemo colligat: quare sæpe frustra petii.

Ruta capraria Gallorum, Monspelii uulgò sic dicta: folijs Rutæ, sed uiridioribus, ex atro tamen, flore luteo, copioso, Vu. Frutex uel suffrutex eselignosus, (folijs fere ternis, floribus ut lasine, sicut in planta arida apparet) acinis nigricantibus, qui semina aliquot continent, calidæ nature, &c. E semine superiori anno mihi prou-

diuit,

diuit, & in uase per hyemem durauit sub tecto: nuper Sphondylorum iniuria perijt. Enata est etiam Bernæ, A. cui nuper floruit luteo flore: & O. Massartocq; medicis Argentinae. Viret nunc etiam hyeme, nec folia amisit in uase, dum hæc scriberem. Eruditi quidam Polemonium Dioscoridis hoc esse multis persuaferunt. Ego aliud demonstraui supra in P.

Ruta muraria uulgò à Germanis dicta, in muris hortorum & mœnium nobis abundat. Herba Adianto magis cognata quàm Paronychia, tantum abest ut ipsa sit Paronychia, quod quidam putat.

Sa.

Sabina, R. G. Reperitur apud nos in hortis tantum, in quibus floret quidem: sed fructum rarissimè profert. Semel tantum memini me fructum eius reperire in arbuscula huius generis quatuor cubitorum aut amplius, in horto loco sublimi posito, itinere duarum horarum (si probe memini) è Suitia pago. Putatione adhibita in arbusculam, sed tardissimo incremento, euadit, Gaudet Sabina humo (inquit Tragus) cui è parietibus lateres tili admixti fuerint. Seritur sirculo auulso terræq; immisso, & facillè radicatur: processu temporis in uiridem & elegantem arborem, quæ tamen sese magis in latitudinem effundat, quàm in altum erigatur, euadens. Cum in arborem grandiuseculam excreuerit, quotannis rotundas & nigras Iuniperiq; simillimas baccas producit. Hæc ille. Ego sæpe auulsos Sabinæ ramulos frustra terræ mandauit. Felicius forte cresceret à matre sua deflexus in terram ramulus, donec apprehenderet, uel per uasculum terra plenum dependens traiectus: quod in Cornis arboribus aliqui faciunt. Idem Tragus lib. 1. cap. 169, Sauinæ syluestris nomine pingit & describit herbulam dodrantalem, Sabine similem, sed inodoram, luteis in cacumine iulis: fructu nullo quam in arenosis altissimorum nemorum locis nasci scribit; eam etiam nondum uidisse memini, à Sabina tamen toto genere differre dixerim.

Saccharum (sue Sacchari canna, hoc est, Arundo) non in insulis Oceani occidentalis nascitur, sed in Hispania etiam (ni fallor) colitur. Celebris Francofordiæ ad Mœnum pharmacopœus Iacobus Oppenheimer, iconem huius Cannæ qualis in horto suo nascitur ad me dedit: & plantam insuper uiuam (& alia quædam) mihi pollicitus est.

Sagapenum existimatum ferulacea herba, A. F. Rurpodius. Vidi & Augustum in horto præclari medici Adolphi Oconis.

Salicaria, O. Lysimachium puto intelligens. Id enim à Salicis foliorum similitudine Germani Weyderich nominant.

Saliunca. Quære in Nardo Celtica.

Salices in hortorum marginibus & circa fossas aut riuos pangendæ sunt. Multarum genera habemus, satiuæ & syluestriæ. Syluestrium quæ minima est, Siler appellatur. Alia lato folio, Salwyden nostris: quæ etsi passim sponte nascatur, hortum tamen ornare potest, uere primo præsertim, cum floribus & iulis odoratis uisendam se præbet, &c. Salicem etiam è semine nasci, nec uere frugiperdam esse, ut Homerus putabat, obseruatum est ab Hier. Tragæ.

Saluia in nullis non hortis toto anno uiret, quanquam rugosis foliis. Frequentior est Latifolia: infrequentior, cui folia angustiora, & candidiora: nobilem cognominant nostri, uel auritam. Rarissima, inter illas media ferè, non aurita: odore cæteris minus grato, G. Saluiis nostræ mulierculæ accumulare solent ramenta de corticibus Piceæ coriariis usitata. Surculo seruntur. Viuacissimæ sunt in hortis: & quidem eò magis, quò minus florere permittuntur, sicut & alia pleræq;.

Saluia syluestris Monspeliū dicta, à folii similitudine. Lege in Verbasco. Nostri Horminum, Saluiam syluestrem nominant. Saluiam montanam aliqui uocant Scordium alterum nostrum.

Sambach, uel Zambac. Vide lasme.

Sambucus gaudet locis humidis & pinguibus. In hortis si colatur, diu uiuit: & in arborem satis crassam proceramq; euadit.

Rr iii

Sambucus montana acinis rubris tanquam in racemo digestis, G. In montibus & sylvis quibusdam suæ spontis.

Sambucus palustris uel aquatica Germanice dicta (*Wasserholder / Schwelcken*) in sepibus, & alibi locis aquosis apud nos non rara: acinos rubros latiusculos in umbella profert. Sylvestri flos simplex est. Hortensi multiplex, magnus, albus, in globum coactus, pulcher aspectu, adeo ut fructus nullus sequatur. Aliqui *Schönballen* id est, Globos formosos nuncupant. Audio etiam purpurei coloris *Basilææ* in hortis reperiri. Frutex est: & si curetur, arbuscula fit. *Chamæplatanum* appellantes hanc arbusculam non laudo. Abundat mihi sylvestre genus, nec deest *hortensianum* floribus globosis.

Sampsuchum. Vide in *Amaraco*.

Sanguinea uirga Plinio dicta, *Italica* hodieque *Sanguis* uel *Sanguaro*, passim in sepibus nostris crescit. *Xor Keringeerten*. Cornus foemina secundum aliquos.

Sanguis draconis uulgo dicta herba, inter *Lapatha* est.

Sanguisorba. Vide *Pimpinella*.

Saniculæ nomen uulgare apud recentiores chirurgos, Germanos præcipue: a sanandis uulneribus factum, herbis uariis attribuitur. Vna tamen præcipue & simpliciter sic appellatur, passim in sylvis umbrosis & humidis obuia, folio quinis aut pluribus incisuris diuiso: quæ *Saniculæ maris* nomine *Fuchsius* depinxit. Nos eo in genere foeminam aut differentiam ullam, nondum obseruauimus. Ea quidem quam *Fuchsius* *Saniculam* foeminam cognominauit, genere toto differt. Vide *Astrantia nigra*. *Sanicula simpliciter* dicta in hortulo meo iam aliquot annos durat, & hyeme tota uret.

Sanicula alba, à radice alba, nam flos etiam superiori albus est, dicta: aliis *Hessica*, quod apud *Hessios* forte sua sponte oriatur: quamquam medicus quidam *Hessius* à me interrogatus per literas respondit, in *Hessia* se non reperire. *Italica*, ni fallor, *Dentaria*, quod in radice quidam ceu dentes appareant. *Cordus* hanc *Coralloides* uocasse uidetur à radici figura. Huius enim hoc nomine iconem, floribus tamē luteis, *Hier. Heroldus* ad me misit: alias uero duas *Ioan. Kentmannus* communicauit, ab illa differentes. *Allatam* (inquit idem) hanc herbam ex *Apulia* accepit à *Io. Brunstero* *Norimbergensi* medico. Secundam etiam speciem passim in *Pannoniis* & *Marcomanis* uidi, radice alba, *Alabastris* modo splendet: unde aliqui *Aconitum pardalianches* nominare uoluerunt. Has qui in horto plantari nondum inueni, dignas ceret *hortensi* cura: & apparet ex crassis nodosisque radicibus uiuaces in hortis futuras. *Germanis* uulgaris est herba, quam *Saniculam* appellant, foliis *Pentaphylli* maioribus: radice candida, miro naturæ ipsius artificio nodulis ac laciniis quibusdam elaborata, &c. *Matthiolus* in capite de *Symphyto*.

Sanicula alpina à quibusdam dicitur *Arthritice* genus alpinum, de quo leges in *A.*

Sanicula alpina alia, foliis rotundis, hirsutis, *Saxifragæ* albæ simillimis: floribus lacteis, quorum folia punctis sanguineis asperguntur: crescit in sylvis uel locis umbrosis editorum duntaxat montium. In hortum meum translata multis iam annis durauit: digna ceret *hortensi* cura. Semina ei longe minima, & (ni fallor) inutilia: Ex his enim sponte in horto meo aliquoties sparsis nihil unquam prouenit.

Sanicula lata, *R. Nescio* quamnam herba.

Saponaria uulgo dicta, quæ locis arenosis & apricis prope flumina aut torrentes sponte crescit, roseo flore, odorato, Galbo, *Ae. Rurpodius*. Hanc *Dodonæus* *Alisma* interpretatur. Diu durat in hortis. Serpit enim suis radicibus.

Saponaria Italica, *Ae.*

Satureia, uulgo à medicis dicta, *hortensis*, condimentaria & æstiuæ herba, inter olera nascitur: & feminibus quibus abundat sparsis, restibili quotannis fecunditate sese multiplicat. Hanc aliqui *Thymbra* *hortensem* uocant. Alia est *Thymbra agrestis*, quæ nascitur in prouincia & aliis regionibus calidis sua sponte: quam *Dodonæus* depingit: & à quibusdam in *Germania inferiori* satam in hortis *Tenderick* uocari

uocari scribit: usum eius ad condimenta & remedia eundem esse qui Thymi uel Satureiae uulgò dictæ. Vide Thymbra.

Satyrrium uerum tria folia profert, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra. Colligitur in tractibus sabulosis & arboribus conditis: ex quibus nos olim frequenter eruiamus, ac maxime circiter Herlem, eximium Hollandiæ oppidum. Radix una est, bulbosa, mali magnitudine seu forma, fulua, intus ceu ouum candida, gustanti dulcis, & ori non ingrata, Bern. Deffenius. Videtur autem sentire de Bulbo syluestri illo, quem Fuchsius Hyacinthum minorem foeminam uocauit, cuius una species cœruleo, altera candido flore reperitur. Hunc enim Dodonæus quoque in Annot. Tomi Iconum, Satyrrium Triphyllum facit: Erythronium uerò Satyrrium, eiusdem generis herbam binis foliis, &c. Crescit utraq; species in syluis umbrosis, inquit Dodonæus, ab herbarum uerò studiosis colitur in hortis.

Satyrrium Erythraicum, fortè est Tulipa à Turcis dicta, flore rubro, Liliū instar, foliis etiam Liliū, radice bulbosa, &c. quam uidi Augustæ in horto magnifici uirilo. Henrichi Heruuarti: quamquam semen ferre negant. Eam descripsi pluribus, primo loco inter quinque illas plantas, quarum icones et descriptiones Val. Cordilibris De plantis subieci.

Satyrri species an Orchis herbæ sit, quæ reperitur apud nos bulbo singulari ferri per, similis alioqui ceteris, sed minor, foliis binis, cōsiderandū. Monorchin dixeris.

Satyrrium balilicum alpinum, flore ex purpura nigro, tanquam adusto, (unde Brendii nomen impositum: odore omnium suauissimo, ceu styracis: quem etiam aridus, & in pollinem tritus, diutissimè retinet, Chr. Piperinus. Nos etiam aliquando plantauimus Lauffannæ: sed uix ultra annum puto in hortis durare, & semen inutile esse: sicut reliqua Orchis genera.

Saxifraga alba, C. G. Alba cognominatur à colore florum. Semen ei nullum, aut potius inutile. Radix ex pluribus granis ruffis conglobatur, quorum singula seminum loco sunt: ab iis quidem granatâ cognominare licebit. In hortis non diu durat. Nascitur in pratis quibusdam siccis, asperis, macris, circa Scaphusiam, Brugam, Basilæam, & alibi: Maio præsertim quærenda. Cæteris enim mensibus æstiuis non appareret. Hyeme uiret, si bene memini: etsi quidam usque ad annum sequentè latere scribit.

Saxifraga aurea, foliis superiori simili fere, unde & nomen ei factum: à similitudine foliorum dico, non à uiribus iisdem. De his enim nondum constat, sui omnino generis, flosculis luteis, C. Rarissima apud nos est: & cū allatam aliquando plantassem, paulò post perit. Sponte in humidis & aquaticis locis crescit.

Saxifraga hircina, uel simpliciter Saxifraga, maior & minor, floribus albis in umbellis, G. Radix ferè hircum olet, acris admodum. Minor siccis, asperis & saxosis locis, in collibus & circa muros apud nos abundat. Maior uerò locis humidioribus & pinguibus. Huius (maioris dico) etiam in alpinis species una flore rubente inuenitur. Vide in Pimpinella.

Saxifraga lutea, à colore florum uel radicis, G. Thalictrum Dioscoridis aliqui faciunt. Galli circa Monspelium Saxifragam simpliciter nominant: nostra enim hircina uix reperitur illis. Inferiores Germani Pigamum (quasi Rutam Græco nomine: est enim Rutæ pratensis similis tum foliis ferè, tum floribus, qui similiter è multis tantum apicibus constant, sed colore sunt luteo: ut cognata uideatur.) Alii R. nabarbarum spurium, quod siue foliis siue radicibus quoquo modo sumptis uentrè soluat. Alii Barbam capræ minorem: (quæ à maiore, de qua supra diximus, toto genere differt: quòd multis conferctisq; floribus, quæ apicibus tantum ceu, pilis constant, spectabilis sit. Dodonæus huic Barbæ capræ suæ minoris aliam, hircinam similem in Hypocoum esse coniicit: mihi non uidetur. Saxifraga lutea illa, quam Heilblat Germani præsertim Saxones uocant, nascitur apud nos in ripis, sicuti prope lacu. Memini in maceria ripæ inuenisse, & in montibus inter lacus, sicuti. In horto plantata durauit aliquandiu, sed malignè floruit, & radices luteas non in altum extendit, sed Sisa-

ri instar contraxit, substantia fungosa, pluribus simul cōplicitis. Huius species duæ, maior & minor, sunt in hortis, A. & Ae.

Saxifraga montana, filiquas gerit, radice alba, nodosa, quibusdam ceu squamis extantibus, G. Crescit in Albio monte, non procul urbe nostra, solo pingui species una quinis per singulos pediculos foliis. Folia singula ceu Fraxini sunt. Flores purpurei, tanquam Leucii, maiores, foliis quaternis conditi. Reperi & aliam speciem circa sylvas non procul Saphusia, septenis in uno pediculo foliis, floribus candidis. Herbae sunt acres: Raphani ferè acrimonia. Vtraq; in hortulo meo per biennium fortè durauit, nō sata, sed translata è montibus: ubi una radix diuturnior mihi uidetur, & ipsa sese propagare. Circa Sabaudiam Pulmonaria uocatur: ab Italis quibusdam puto Dentaria, à squamis denticulatis in radice: sicut & Sanicula alba superius dicta.

Sc.

Scabiosa uulgò dicta trium generum: duæ minores, una scabra hirsutaq; altera laeuis, in pratis siccioribus & collibus apud nos copiose proueniunt. Tertia maior, quam ab ouibus aliqui denominant, (ut Dodonæus, qui hanc magnitudine mediam facit: hirsutam uerò iam dictam, in hoc genere maximam: sed in nostra regione secus se habet, cuius folia non diuiduntur, locis editioribus, pinguibus, & humidis gaudet. Omnes in hortis bene ac diu durant, lacea nigra diuersi omnino generis est, contra quam aliqui putarunt.

Scammoniae frutex, O nobilissimus & eruditus ciuis Patauinus (ut audio) Prius nomine, Scammoniam è Syria allatam in horto habuit, herbā Conuoluulo cœruleo (quem granum Nil appellant) persimilem: floribus albicantibus, (illis etiam, ni fallor, campanæ seu calathi effigie,) qui priusquam aperiantur, rubicundi apparent: semine etiam simili. Perit ei, nescio an secundo tertioque anno, siue quòd natura non diutius duret forte, siue aliam ob causam. Primæ quidem hyemis iniurias fortiter pertulit: semina etiam an protulerit ignoro. Monspelii aliam quandam Scammoniam ostendunt, floribus exiguis, &c.

Scandix est in Pectine Veneris.

Scilla uel Squilla, A. R. Rurpodio Francofordiæ, etiam florem protulit. Radix mihi olim in horto plantata, folia quidem produxit: sed non apprehendit, nec ultra tres menses durauit. Scilla uera, C. Veræ quidem epitheton ab eo additum puto, propter Pancratium, quod aliqui pro Scilla substituunt.

Sylla Epimenidea cognomine, crescit (ni fallor) in horto Patauino, seminibus è Cera accersitis.

Scolymus. Vide Carduus hortensis.

Scopa regia. Quære Pulmonaria Gallica.

Scoparia uulgò dicta, Italis Beluidere uulgò (quod nomen etiam aliis herbis attribui uideo.) Vide supra Belle uidere.

Scordium uerum. O. R. G. K. A. Ae. Verum dicimus, quoniam superiore seculo cum hoc ignorarent medici & pharmacopolæ, Allium quoddam syluestre substituebant. Sponte in pratis humidis & palustribus nascitur circa Lemanium lacum non procul Lausanna, circa Norimbergam, & alibi, non multis tamen locis. Hyemem in hortis facit fert: & coliculis per terram reptantibus propagatur, tum sponte, tum si quis inflexos terra obruat, eminente tantum extremitate: sed quoniam non profunde hæret, resoluta terra quæ gelu ascripta erat, facile eleuatur & perit, nisi terra operias.

Scordium maius Plinii, uel Scordotis, quod Saluia syluestris nomine pinxit Tragus lib. 1. cap. 4. de Nepeta inscripto. Dodonæus Sphacelon appellat: aliqui Ambrosianam: Ruellius Polemonium facit. Nascitur locis montosis, macris, asperis & apricis: ut in monte Albio nostro, & in colle imminenti oppido Eglisouiae. Translatum in hortos non diu durat. Scordio planè cognata est herba, sapore, uiribus, & odore fere: meo quidem iudicio ad remedia Scordio præferenda, quòd odo

re gravior sit, nec ita limum palustrem oleat, ut illud, præsertim contritum dum bibitur. *Wirdelweiff* quidam Germani uocitant, A.C.G.

Scorodoprasum Dioscoridi (alius enim quod sciam nemo meminit, præter Gaslenum & Aeginetam qui ex Dioscoride repetisse uidentur) nascitur quasi grande Porrum: Allii simul & Porri uiribus præditum, sed remissionibus. Hoc pro syluestri olere Car. Stephanus accipit, quod frequens in pratis crescat, Allium porrinum officinis dictum. Porri (inquit) folio, sed odore & sapore Allii. Adnata non habet, neque spicas: aut si quidem habet, rarissimæ sunt. Sponte sua nascitur (inquit Matthiolus) in compluribus Italiæ locis: è quibus translatum in hortis & uiridariis depositum, uire scit: foliis Porraceis: quæ digitis attrita, ita Allium & Porrum simul resipiunt, ut illo rum effectus præbent. Hæc ille. Nec aliud Scorodoprasum Matthiolus, li. 2. ca. 68. depingere uidetur: cuius historiam subiungens cap. 70. Mediomatrices mulierculæ (inquit) in hortis Allii genus quoddam plantare cõsueuerunt, quod radice, foliis, & caule per omnia uulgare Allii æmulatur: nisi quod radix huius nequaquã ut illius multiplici nucleo coagmentatur. Latiora folia & caules grandiores fundit, nigro quotannis semine prægnans in cacumine fistulosi caulis non aliter arque Cepas: ad quam odore etiam accedit, sapore minus feruenti & acri quàm Allium: quamuis lachrymas eliciat. Germani *Aberthobland* dicunt, Possent & *Grosland*/ i. Porrum grande dici. Idè Allii genus existimo, quod ueteres Vpicum, Gallicum & Aphroscorodum uocant, &c. Hoc etiam in Sabaudia hortis uidisse me memini.

Scorpioides Matthioli, A.D.G.C. filiquis instar scorpii caudæ articulatis & in summo reflexis. Vide Lunaria Burisfa.

Scorpioides aquaticum, flosculis cœruleis, uelut in spica, reflexa in summo, G. *Vergiß mein nit*. Sapor ei Borraginis. Passim locis palustribus provenit. Huius generis marem & fœminam Dodonæus lib. 1. iconum pinxit. Ab herbariis (inquit) passim Scorpioides appellatur. Sed alia est Scorpioides Dioscor. In Gallicis quidem eius stirpium Commentariis Car. Clusio interprete, aliud Scorpioides mihi in cognitum exhibetur: quod illic etiam (in Germania inferiore) in hortis tantum feritradit. His scriptis reperi ex seminibus peregrinis enatam mihi herbulam, Scorpiu roist: Dodonæi planè congenerem; & hoc fortè solo differentem, quod nullum penè caulem edat: & caudas scorpionum singulas à singulis petiolis (duos digitos longis) postquam flosculi lutei, ipsi etiam singuli defluerunt. Caudæ illæ instar uermis aut crucæ cuiusdam sunt, lanugine ruffa, superius hirtæ, in se reflexæ, inq̃ mucronem perexilem curuum terminantur. Folia sunt Oleæ: flosculi Melifoti ferè figura, magnitudine & colore. In Italia quidam Scorpioides uocant herbam illam, quam alii qui uulgò Noli me tangere: de qua diximus in N. litera.

Scorpiurus, K. Videtur autè Scorpioides intelligere. Veteres Heliotropiũ etiã Scorpiurũ uocabant. Tragus Dioscor. Theoph. et Plinio etiã Scorpius: pusillus frutex, aculeatus, in maritimis nascens; sine foliis, &c. uiris doctis in Italia non est incognitus. Eius semen ab amico expecto, qui id ab Aloisio Anguillara (doctissimo diligentissimoq̃ nouarum stirpium indagatore & nomenclatore) accepit, ac simul alia quædam.

Scrofularia maior, quæ circa sepes, fossas & rudera crescit, folio ferè Vrticæ, odore graui: & altera eius species in humidis nascens, caule quadrangulo, nullis radicum scrofulis, in hortis etiam durant, sed prior diutius.

Se.

Sebesten. Vide Myxus.

Secacul, R. O. Polygonatum puto intelligentes.

Securidaca est in Pelecino.

Sedum seu Semperuiũ uulgare maius (quod eruditi quidam Cotyledonis potius quàm Sedi speciei esse docent) quanquam super tectis ædium & muris antiquis nasci gaudeat, crescit tamen in horto etiam facile. Semperuium radice nulla uiuit, & semen fert, & sibi ipsum radix est, Scaliger: non quidem radicem ei deesse sentiens,

Ss

ut conficio: sed quòd ea sit uiuacitate, ut quanquam non nitatur radice nec apprehenderit, foliis tamen & caulē crescat, uel racens super solo aut tegulis. Dioscorides Stratioten in aquis Semperuium similem, sine radice uiuere tradit.

Sedum maius uerum, ē Græcia nuper allatum, audio iam aliquos in Italia habere: hyeme si rigetur, perire. Huius iconem à lo. Kentmanno accepi: qui eam sibi usque scribit Venetiis Murrhani in horto clarissimi Veneti Hier. Corneli: qui ex Alexandria hanc plantam, ut & multas alias raras ex Candia & Cypro, cuius insulæ præfectus fuerat, afferendas curauit.

Sedum minus Dioscoridis, foliis in mucronem exeuntibus, in Germania non me mini uidere: ut neq; Dodonæus, in hortis tantum apud inferiores Germanos uideri tradens, R. In Sabaudia & Gallia uidete memini. Nascitur Dioscoridi in petris, parietinis, maceris & scrobibus opacis.

Sedum minus alterum (Crassula minor quorundam) uulgare nobis, passim ueteres muros & mœnia implet, foliis obtusis, floribus albis.

Sedum tertium D. oscoridi, pusillis & crassioribus foliis flosculis luteis, succo acri & erodente. Lilecebra priuatim dictum, prouenit copiose in faxis, muris & locis arenosis apud nos.

Sedum minimum, foliis breuissimis, latiusculis, acinosis, obtusis, subacidis: binis, alternante positu: flosculis candidis intus, foris roseis. Huius species una maior & candidior est, altera minor & rubicundior, seu mas & fœmina, G.

Sedorum in faxis montium (aliqui Phylla nominant) uarię sunt species, magnitudine, figura, coloribus, floribus, &c. inter se differentes. Sunt quædam minimæ, & flosculis tum figura tum colore pulcherrimis egregiæ: quæ in hortis parum durant, nisi fallor. Aliæ maiusculæ, ad Sedum maius uulgare nostrum accedunt, et in hortis diutius durant, quamuis in solum aræ defixæ. Horum species una foliis est minoribus, albicantibus & ferratis. Alia similibus quidem foliis, sed margine piloso, non ferrato Floribus quidem multum differunt. Minoris & gustu dilutioris flores pauci sunt, candidi, punctis sanguineis, minimis, aspersis, nullo penè caule, ut nunc mihi nascuntur: aliæ enim in caule mediocri mihinas puto. Maioris & acidioris caulis pedalis, flosculis partim candidis, partim purpureis refertus, & unum in latus struthionis pennæ instar inclinans. Vtrumq; hoc anno mihi floruit. Folia marginibus & aspersis branchias piscium referunt. Non laudo qui Phylla nominant.

Semperuium. Vide Sedum.

Sena, C. Senę folliculi (inquit Matthioli) ē ramusculis prominent, tenui pediculo appensi: quo fit, ut maturescences, paruo uentorū flatu facili decutiantur. Planta est frigoris impatiens: ob idq; feri uult Maio, nec ultra autumnū perdurat. Siquidē (ut pluries expertus sum) prius sata, facili frigore deperditur: serius uerò hyemē similiter non tolerat. Sic ille. Conficio autem eū de Sena communi et uiliore sentire: qua minor & efficacior est Alexandria, Europe hortis nescio an hactenus cognita.

Senecio, Erigeron, nusquam nō obuius est, circa oppida præsertim & loca culta.

Senecio foetidus appellari potest ab odore herba, maior, pinguioribus foliis, luteo & similiter pappefcente flore, &c. D.

Septem fratres, O. Nescio quæ herba.

Seris, idem quòd Intybum supra dictum. Verrucaria Seridis species, C. Aliqui Verrucariam uulgò dictam, interpretantur Seridis speciem: alii rectius Heliotropium minus.

Serpillum passim locis siccis, asperis & apricis luxuriat: & pro diuersitate locorum ac cœli odorem mutat, ita ut alicubi, Theophrasto teste, Thymum planè redoleat. Serebatur olim in hortis, idq; surculo non semine, ut idem scribit. Inuenimus et quod citrum oleret.

Sesamoides, uel Elleborine, (alia à Consilagine,) K. Vide Elleborine.

Sesamoides alterutrum quidam esse suspicantur herbam Ellebori nigri radicibus uiribusq; foliis Abrotoni ferē, Vide in Elleboro nigro.

Sesamum

Sesamum uerum, an ullo adhuc in horto Germaniæ aut uicinarum regionum ex-
titerit nondum reperiui. Nam qui Schwaden uulgo dictam herbam pro Sesamo ac-
cipiunt, decipiuntur: ut illi etiam qui Myagrum Dioscoridis non agnitum, arbitran-
tur esse Sesamū. Semen eius recens nuper ex Italia missum seminaui, sed nullo pro-
uentu.

Seseli quod uulgo Siler montanum cognominatur, &c. Plantatum mihi aliquan-
do radice, paucis mensibus in horto durauit, nec apprehendit. Aliàs ē semine pro-
gnatæ plantæ tres, Sphondylorū iniuria in canicularibus interierunt, radicibus ero-
lis. Si cura adhibeatur, non dubito quin duraturum sit, quamuis in montibus non
nisi in faxis & inter saxa eorumq; rimis nascatur. Alunt id in hortis, O.K. Rurpo-
dius, Piperinus. Abundat sponte proxime Vuesam oppidum ad lacum Riuarium,
alibiq; in Helueticis montibus saxosis, meridiem uersus præcipue, acrimonia & a-
maritudine insignis herba: quam uel ipsum Petroselinum ueterum, uel optimū eius
antiballomenum esse dixerim: cum nullo quidem Seselis apud Dioscoridem gene-
re conuenit. Non desunt qui pro Ligustico accipiant. Vide supra in L.

Seseli Aethiopicum Fuchsi & Matthioli, *Wys Hirzwurz*: in montibus no-
stris nascitur. Id ē semine in horto etiam nuper mihi exortum est, nescio quā diu du-
raturum. Vide supra in Libanotide ferulacea Dodonæi. Sed aliud hoc nomine Gal-
li Monspelienses ostendunt, quod à Dodonæo pingitur Tomo 2. iconum: cuius se-
mina hoc uere frustra seui.

Seseli Creticū, aliter Tordylium, à Fuchsi iudicatur herba illa quam docti plu-
rimi Meum nominant, nostri *Berwurz*. Vide supra. Dodonæus Caucalidem Bel-
lonii pro Seseli Cretico exhibet, quod non probo.

Seseli Massiliense, Rurpodius, Matthiolus hoc nomine herbam quandā depin-
git, quam in omnibus ferè Tridentinis montibus legi scribit. Dodonæus aliam ico-
nem exhibet. Nuper ab amico Seselis Massiliensis semina accepi, communicata illi
ab Anguillara: qui ē Creta se habuisse dicit, Fœniculi ferè magnitudine & figura, ē
fusco subbruffa, myrrham ferè (ni fallor) subolentia leuiter. Hæc Basileæ sata hoc ue-
re Zuvinggero prouenerunt.

Seseli Peloponnesiacum, quod Matthiolus pingit, in Italia (ut inquit) sibi reper-
tum: idem mihi uidetur quod in Rhætorum uersus Italiam montibus (circa Puccla
uium, ni fallor, præcipue) crescit. Rhætorum aliqui uulgo herba Pidrie uocant, uel
Pantegia, quod pecori anheloso medeatur, appellant. Radicem eius maximam, ali-
quando in horto plantaui, sed non apprehendit, quanquam germinauit ad duos for-
te menses. Aliud est Seseli Peloponnesiacū Fuchsi, *Schwarz Hirzwurz*, spon-
te in collibus apricis apud nos proueniens ferulacea herba, Apio montano (de quo
diximus in Alitera) similis. Vide supra in Libanotide ferulacea Dodonæi.

Seseli utrumq; C. Intelligēs opinor Massiliense & Creticū à Dodonæo exhibita,
Seseleos species quædam, plurimis à radice foliis, tenuibus & multifidis, longis:
coliculis teneris, gustu calfaciente, non grato, ex Insubriæ montibus autumno supe-
riore mihi allata, pulchre adhuc uiret: sed nondum caulescit.

Si.

Siciliana (Italis uulgo dicta) siue Clymenum Plinii, K. Quære Clymenum.
Sideritis prima Dioscoridis secundū Fuchsi, Tetrabit uel herba Iudaica qui-
busdam, A.c. Nascitur asperis, petrosis & incultis locis, circa Badam nostram, & ali-
bi. Alia secundū Matthiolum, Marrubium aquaticum Trago dicta, li. 1. cap. 7. G.
Frequens nobis in palustribus locis: cum Dioscorides Sideritim primam suam in
petrosis nasci dicat.

Sideritis tertia Dioscoridis, Gratia Dei nostris uulgo dicta: aliis Herba Ropera-
ti; nascitur passim in muris & maceris hortorum, loca amat umbrosa. Matthiolus a-
liam quandam pingit, cuius in commentariis ne uerbo quidem meminit.

Sideritis Plinii latissimo folio. Vide Pulmonaria Gallica. Fuchsius quidem her-
bam s. Barbaræ uulgo dictam pro Sideritide hac accipit, Dodonæus negat.

Ss ii

Sigillum Salomonis, Polygonaton ueterum.

Siliqua arbor, Græcis *Ceratonia*, Arabicis scriptoribus *Carube*, C. *Rurpodius*. Videtur apud ciuem quendam nostrum, esse semine ortam dodiantalem hanc plantam: quæ per hyemem ei interit. Germani s. Iohannis panem uocant, Alia est quam Belonius *Siliquam* nominat: de qua lege supra in *Azadaracht*.

Siliqua Inda. Vide *Cassia*.

Silybus. Lege *Cardopatium*.

Sinapi in agris potius quam hortis ferendum est. Tria *Sinapis* genera, inquit Car. Stephanus: syluestris, ubique sponte nascens; exilius, quod uulgus (*Gallicum*) a minori proceritate *Sanelam* uocat: alia numerosioribus altioribusque ramulis brachiantur, *Rapo* similia: sed folio minore & asperiore. Verum semen euariat: in uno rufescit: in altero candicat.

Sison, C. *Dodonæi* nimirum: quod is ab Herbariis scribit paruū *Amni* uocari. *Sifer* uel *Sifarum*, *Citræle*.

Sisymbrium agreste aquaticum, passim in aquaticis exilit. In hortulum meum, qui siccior est, aliquoties translatus, non diu durauit.

Sisymbrium hortense prædicto simile. Seritur furculo potius quam semine, ut Theophrastus tradit. Vide in *Mentha*.

Sisymbrium alterum *Dioscoridis*, *Nasturium* aquaticum aliquibus, uulgo *Bummentresich*: in fontibus & riuus abundat, & per hyemem pro acetariis legitur: sicut & alterum *Nasturtii* aquatici genus, siccius duriusque & acrius: quod *Secintresich* uocamus.

Sium etiam, herba odorata, in aquis nascitur, hortis non idoneum. Iuxta *Basileam* hoc reperire memini in proximo. A nostra urbe longius nascitur, inter *Dibedorpham* & *Vuangam* pagos, *Sium* non odoratum recentiores quidam uocant *Anagallidem* uel *Portulacam* aquaticam ab aliis dictam, *Bachbungelen*, cui nihil cum *Sio* commune. Nascitur in aquis & palustribus ubique.

Sm.

Smilax hortensis, O. G. Alia species, O. *Smilaces*, K. *Welschbonen*. Vide supra in *Phasiolo*.

Smilax æuis *Fuchsis* & *Matth.* *Conuoluulus* *Plinii* est: de quo supra diximus.

Smilax aspera in Germania non reperitur, nisi lata in hortis quorundam diligentiorum, ut *Dodonæus* scribit. Nascitur autem tantum in calidioribus regionibus, ut puto: asperis & petrosis locis: circa *Monspelim* & alibi. *Plinius* quidem tradit nasci in aquaticis, incultis, humilibus & umbrosis.

Smyrniū uerum, K. & *Basileæ* in horto *Zuvingeri* medici. Veri semina ego quoque uidi, nigra (si bene memini) rotunda, & planè odore *Myrrhæ*. Satum appareo puto in horto *Patauino*. *Matthiolum* quidem *Smyrniū* uocat, *Olus atrum* aliis dictum: *Tragus* *Astrantiam* nostram.

So.

Solanorum (indocti *Solatra* uocant) permulta sunt genera, quamuis à *Dioscoride* quatuor tantum memorata. Omnibus acini sunt, utque seminibus albis pleni. Pluraque aliquam in foliis & floribus similitudinem habent: odore graui, ui refrigerante & humectante prædita.

Solanum hortense quoddam olim erat, quod nunc etiam circa hortos ferè nascitur, circa rudera acuias locis humilibus: sed coli desit, acinis nigris. *Nachtschat*.

Solanum rubrum, A. e. *Luteum*, *Rurpodius*. Eadem cum uulgari, cui acinos nigros esse diximus, nisi colore differrent.

Solanum uescarium in *Halicaccabo* est. *Halicaccabus* peregrinus à quibusdam dictus, cum acinis careat, &c. è *Solanorum* genere non est.

Solanum furiosum, R. *Solanum* manicum *Bern.* *Dessenius* scribit se uidisse *Grueningæ* in horto *Cornelii Bebingii*.

Solanum somniferum duplex, A. e.

Solanum

Solanum fruticescens, C. Fruticosum, baccis (acinis) rubris, foliis amygdali, K. Idem hoc puto, quod Itali quidam pro Amomo Plinii accipiunt, & Indicum cognominant; mihi etiam est semine ex Italia misso ortum, iam altera æstate duos dodrantes æquans nondum ostendit florem, hyeme sub recto seruatum. Amicus quidam in Italia sesquicubitale uisum sibi ait. Quidam Strychnodendri nomen sinxerunt. Vide in Amomo.

Solanum peregrinum, & aliud ex Prouincia, Rurpodiis: qui peregrini nomine Solanum fruticosum, aut Halicaccabum peregrinum uidetur intelligere.

Solani genus syluaticum, quod nostri *Schlassbeere* & *Dollwurz* uocant, G. baccas aut potius poma Cerasorū instar, coloris est cœruleo nigricantis fert. Italis Bella donna dictū: sponte apud nos circa syluas alibiq; locis incultis abundat. Aliqui Morion esse suspicantur, uel potius Mandragorā Theoph. Radice est crassa, uix proculdubio in hortis futura; sed ne pueri fructus sua specie inuitantes deuorēt, uite periculo, ut in aliis Solanis, ita hoc præcipue, cauendū. Quidā mortale cognomināt.

Solanum somniferum, O. Non alius opinor à syluatico iam dicto, Matthiolum tres somniferi icones proponit: primam legitimi Dioscor. somniferi, ut apparet: tertiam somniferi nostri, Belle donne nomine Venetis usitato: Vulgò (inquit) Herbarii Solatrum maius uocāt: secundam, nostro quidem similis, sed longioribus foliis, etc. Cuius in commentariis ne uerbo quidem meminit: iconi Solatrum somniferum inscribit: neque de prima aliud, nisi quod Pisis à Luca Ghino missam accepit. Dioscorides in faxis nasci tradit non procul à mari. Nostrum quidem legitimi, sicut & Mandragoræ, omnibus sui partibus succedaneum esse posse mihi uidetur.

Solanum quoddam fruticosum, plurimum apud nos nascitur locis dilutis, & aquam plerumq; subesse indicat, sæpibus aut fruticibus aliis intitens, floribus Solani cōmunis, cœruleis, luteo per medium apice: acinis rubris, &c. G. R. Aquas amat: & ramulus in aquam impositus, breuī radículas emittit, instar Salicis. In terra eitam putārim furculum defixum facile crescere. Inuenitur & albo flore, sed rarer. Attegiis & topiario operi conueniret, nisi grauior esset fruticis odor. Florum quidem & acinorum species non uulgaris est. Solatrum mortale quidam appellant, mihi inter Solani genera minime noxiū uidetur. Alii rectius perpetuum, quoniam caules in eo perēnant: nam folia amittit hyeme. Aliqui Amaro dulcem: quod si quis ramulū aut corticem mandat, primo ingratus uideatur gustu, sed quō diutius manditur eō insignior eius dulcedo se prodit: unde nomen ei factū à nostris *Jelenger jelibeer*.

Solanū tetraphyllum, G. Sic nomino genus illud Solani quod foliis ut plurimū quaternis, rarissime quinis aut pluribus, in syluis nostris frequens est. Quidam non recte pro Aconito primo accipiunt, Refrigerat certe insigniter. Aconitis uerō omni bus uis est septica, erodens, feruida.

Solanum pomiferum, Malum insanum uulgò dictum. Vide suprà in M.

Solani pomiferi genus aliud. Vide Pomum aureum.

Solani pomiferi genus tertium, si libet, appelletur, quod uulgò Pomum spinosum uocant, &c. Lege in Nuce Methel.

Soldanella. Quære in Brassica marina.

Sonchus asper & læuis, uisitur in hortis, (sua sponte nimirum) campis et uineis, Matthiolo teste. Cicerbita Italis, nostris *Nasentöl* / *Gans distel*. Lactucæ syluestris quædam species.

Sonchis cognatū uidetur etiam olus syluestre illud, quod nostri à lacte *Wilderh* uocant: Dodonæus Lapsanam facit.

Sonchus arborescens Dioscoridis. Vide in Lactucis syluestribus: harum quædam procerissima in syluis humidis nascitur, puniceo flore: & alia luteo, circa moenia, humidis locis, &c.

Sorbus, Ae. Reperitur apud nos in montibus. Sorba, alia rotunda sunt ut mala, quæ odore & suauitate præcellunt: alia turbinata ut Pira: alia ouata, ut mala quædam, obnoxia Acori, Germanis *Speierling*. Generosissima quibus circa pediculus

culos tenera folia, Sorbos & Cornos in mitiores arbores sui generis inferi posse qui dam crediderunt. Item in Pyro, Pomo, & Cotonea: sed id nunquam uerum esse aut posse iure fieri potui comprehendere. Rectius crediderim inferi posse aut debere in Oxyacantha, quemadmodum & Mespila.

Sorbus torminalis, K. Apud nos syluestris abundat, locis montanis: folio fere Platani, minore. *Aressel* Trago, *Cordo* Crataegus Theoph.

Sorbus alpina, uel pilosa Italica dicta, Gallis *Tralier*: nostris *Elgbirle*/ *Thelsbirle*/ *Unser frauen birle*: (aliquibus *Mälbaum*/ quod nomen etiam alii arbori attribuitur.) Ficui Idææ cognata, ut coniicio.

Sorbi tres species, C. Sorbis etiam cognata uidetur, si fructum respicias (nam foliis superiores etiam plurimum differunt) Diospyros in D littera.

Sorbus torminalis Plinii, Gallis *Alisier*, G.

Sorgum uulgo dictum, O. Scrictur a quibusdam in hortis, apud nos quoque cum propter raritatem, tum quod coma scoparum usum præbeat. Sunt qui *Midium Indicum* aut *Saracenicum* uocent: alii *Panico* potius cognatum putant. *Maizum* alii qui uocant, ut *Cardanus*, *Indico* uocabulo.

Sp.

Spartus uel Spartiū, O. A. C. *Rurpodius*. Spartus mihi prognatus (inquit A. in epistola ad me) uerus esse uidetur: habet enim omnino caulem sine foliis. Vide *Genista*.

Spartus Hispanicus, Ae. Hunc Theophrasto incognitū fuisse aiunt: carere eum foliis, flore, semine: contexi ex eo sportulas Ficuum.

Spatula foetida, O. K. A. *Rurpodius*, Vu. Ae. C. Huius semē sæpe frustra hortu lo nostro commissimus. Aretius Bernæ prouenisse sibi scribit: sed nondum perfectum semen. Eruditi *Xyrin* appellant. Spatula foetida, Spatula media, Spatula minima, *Schorndorffii* in hortu lo. *Schmidlappii* mercatoris.

Sphondylium seu Spondylium nascitur in pratis, pinguius præsertim uel mediocriter humidis, abunde apud nos: maius quidem in montibus, *Panacis Heraclii* emulum: quidam non recte pro *Brancha* uersina accipiunt.

Spica Italica odorata, K. Nescio an *Nardum Celticam*, (quæ tamen alibi in hortu eius catalogo nominatur,) intelligens.

Spina ceruina uulgo dicta Italica, *Krügbere*, G. Sponte apud nos in sepibus abundat. *Tragus* & *Dodonæus* inter *Rhamni* species ponunt. Aliqui solutiuam cognominant.

Spina citrina uel lutea, a floris colore, Vu. D. Sponte nascitur, ni fallor, circa *Monspelim*, & aduersus morbum regium commendatur, acanacei generis herba æstiuæ.

Spina solstitialis circa *Monspelim* ubi sponte nascitur, D. Herba est bicubitilis, æstiuæ, albicans, lanuginosa: foliis angustis, oblongis, amaris. Caules rigidiusculi sunt, alba medulla referti. Floret solstitio: flos flauus in pappos abit. supra calycem quæ multis, longis, exilibus, pallidisque aculeis riger: nec alibi aculeos habet: cognata fortè *Stellariæ* a quibusdam dictæ, (quam *Cardui stellati* nomine *Dodonæus* exhibuit,) flore etiam simili præterquam colore. Cum eodem in amaritudine cōuenit, & ni fallor, remedio quoque. Mirè enim commendatur ad mouendas urinas & calculos educendos succus huius herbæ, aut aqua destillata, aut contrita pollen: ut ex clarissimo medico *Argentinenſi Didymo Obrecht*o primū cognoui: qui cum in hortu suo longè instructissimo hanc herbam alat. *Carduus* uerò stellatus ubique circa urbem *Argentinam* abundet, sitne aliqua inter has stirpes, tanquam duarum unius generis specierum cognatio, melius iudicabit. Intuba & solstitialis spinas, è pratis uerè euelli præcipit *Columella* lib. 2. cap. 15.

Spinaceum olus uulgo dictum, *Binetsch*, in omnibus hortis apud nos feritur, cum alio tempore, tum sub hyemem ante Septembris medium, & per hyemem demetitur. *Spinachia* manifestum habet sexum, *Scaliger*. Coniicio autem marem ab eo intelligi illum, cuius semē spinosum est: feminam, sine spinis. Aliqui *Spanaciam* nomi-

nominant, tanquā ex recentioribus Græcis sumpto nomine, ut et Seutlomalachum, quasi dicas maluaceam Beram, inquit Ruellius, nimirum quod figura & denticulato seminis habitu Betam, & mollitia Maluam mentiretur. Arabes Hispanicum oculus appellauere. Sic ille. Sed forte Seutlomalachum potius, hoc est, mediæ inter Betam ac Rumicem naturæ, quam Seutlomalachum, appellari meretur.

Spondylium. Lege Spondylium.

Squilla. Vide Scylla.

St.

Stachys duplex, Ac. Stachys Cordi, O.K.

Staphisagria, K.O.G. Vu.C. In Germania nullibi sponte (quod sciam) nascitur, nisi sara: amat umbrosa loca.

Staphylo dendron Plinii, G.K.C. **Pimpernūfle**. Arbor trans alpes, inquit Plinius, simillima Aceri, alba in materia. Fert siliquas, & in iis nucleos sapore nucis Auellanae. Itali quidam, ut Romæ, uocant Sambucū ualidam. Crescit apud nos sponte in sepibus, quamuis rara: & uidetur locum humidum amare. Frequentior, ut audio, circa Arouiam.

Stella herba à quibusdā Italis uocatur, quæ à nostris **Sinnaw** à quibusdam Pes Leonis uel Achismilla: Matthiolo Stellaria. (Is enim t Sellam herbam uulgò alicubi Coronopodem uocari ait.) Crescit nobis affatim in syluis, et montium pratis: in hortos translata, ad duos fortè annos durat.

Stoebe Dioscoridis, O. De Scabiosa fortè sentiens. Alia est Theophrasti.

Stoechas uel Stychas (simpliciter, uel Arabica cognomine,) O.C.G. Vu. Rurpudius: sed in hortulo nostro ad maturitatem non peruenit. Circa Monspelium in siccis & apricis sponte nascitur.

Stoechas citrina uulgò dicta, Vu. Circa Monspelium in muris & petrosis, si bene memini, abundat. Ageraton aliqui interpretantur. Sabulosa, aspera aridaq; terra, pratisq; ac campis soli maxime expositis, præsertim uerò ad tractum Rheni (hinc **Rhein blümen** appellant) inter Spiram & Vuormaciam, nec non circa Hagenoriam, Nouiburgum, & in Vuasgoia affatim luxuriat, Tragus.

Stramonia Lege Nux Methel.

Stratiotes est in Millefolio. Fluuiatilis Stratiotes, quoniam & in fluuiis & radice nulla crescit, nihil ad hortum.

Struthium quibusdam dictum, Vide in Lutea.

Strychnodendrum. Vide Solanum fruticescens:

Styracem arborem, ad quatuor cubitos enatam, si bene memini, idq; è semine, nō fallor, anno superiore uidi Augustæ in horto doctissimi medici Adolphi Occonis, A.F. qui nuper etiam de ea ad me scripsit, his uerbis: Styracem meam quodammodo bifurcatam in duas partes radicibus diuisi, & ex una arbuscula duas feci, satis insignes. Supererat mihi ex dissectione radix, quam uidendam ad te mitto, ut (si uideatur) terræ committas, quamuis ut pullulet, difficile fore arbitror. Atq; utinam ex ea prouenire possit arbor meæ non dissimilis, quæ me præ cæteris mirifice delectat, tū quod sciam nullam eius generis reperiri in Germania nostra, præsertim finitimis huic nostræ ciuitati regionibus: tum quia foliorum & florum etiam pulchritudo speciosa uidetur. De fructu tamen in hisce partibus despero propemodum, cum talis apud nos æris clementia non sit, quæ fructus eiusmodi ad maturitatem perducere possit. Sic ille. Agitur autem nunc tertius mensis ex quo radicem illam, cum exigua stipitis resecti parte plantaui: quæ nondum quidem pullulauit, cortice tamen adhuc uiuet & spem aliquam facit. Venetis olim in horto monasterii cuiusdam, memini me iustæ magnitudinis hanc arborem uidisse.

Sy.

Sycomorus ueterum, Ficus Pharaonis uulgò in Syria, in Europa (opinor) nō apparet. Morus Aegyptia Theophrasto, aliis Ficus Aegyptia: quod nomen etiam Ceroniæ arbori attribuitur, sed improprie, cum in Aegypto nō proueniat. Morus A-

gyptiā peregrinari omnino nequit, Theophrastus hist. 4. 2. Recentiores Sycomori nomen arboribus diuersis tribuunt, alii alius. Galli sic uocant Arborem ludæ, de qua dixi supra in A. Itali, præsertim monachi, Azadaracht Auicennæ, de qua itidem supra dictum est, Pet. Crescentiensis arbusculam paruulam, similem sanguineæ uirgæ, &c. Ruellius Sycomorum appellauit Acer montanum, quod Allobroges uocant Plane, ut uir quidam eruditus ad me scripsit.

Ta.

Tanacetum, G. & in plerisque hortis. Nascitur & sponte, non quidem apud nos: sed circa Argentinam copiose, & alibi, præsertim in aquarum ripis & uinearum aggregibus.

Tanus. Vide Vitis nigra.

Tarchon Auicennæ & Symeonis Sethi; uulgo eruditi Draconem uocant, hortensis uel acetarii cognomine: foliis Hysopi, sapore Pyrethri, &c. Hoc alunt Curtius, (qui & mihi communicauit,) & K. Aliqui Drabam faciunt: quod non laudo. Sub hyemem fimo equino alioue tegi debet: sic & contra hyemem muniatur, & uerecitus copiosiusque erumpet: tum quidem precipue placet in acetariis, siue per se, siue aliis potius condimenti gratia additum: nam & salis & aceti ferè saporem repræsentat. Coliculi cum digitales fuerint uere, propagentur per terram, cacumine tantum eminentes: sic breui multiplicantur. Radix una, discerpi & per diuersas partes plantari potest. Floret hoc quidem, sed semen nullum aut inutile profert. Linum satum in Cepe secto, eam ex se progignere plantam, quam uulgo Draconem uocat, Thuscis olitoribus persuasum est. Cuspis ei figura folium, serratum ut Betonica, sed molliter & obscure. Sirculi uiminacei, floccellus candidus. Saporis acrimonia commendationem attulit ad usum acetariorum. Radix penè nulla, eorum arguit temeritatem, qui Pyrethrum fecere nomen. At mihi non semel Lini semen cum ita, uti iusserant, seuissem, Draco nullus exiitit, Scaliger in li. 4. Aristotelis De plantis. Ego quoque me semel atque iterum frustra expertum memini. Sed Tarcho nostro hortensi folium minime serratum est: syluestri modo dicè.

Tarchon aquaticum Monspelii Serpentina, fruticosa, uel potius ramosa herba, G. Vide Pyrethro cognata.

Taxus arbor crescit in montibus nostris, specie quadam Abietis, latioribus foliis, multò humilior: acinis rubris, paruis, umbilicatis, glutinoso humore plenis, &c. O. Facile crescit arbuscula parua transplantata, sicut etiam Abies & Picea. Durare ultra seculum putarim: nam & materia huius arboris in terra maxime omnium durat. Arbores duæ in horto uicini mei eadem proceritate uigēt, qua me puero erant, iam ferè per quadraginta annos. Fructificant raro, non singulis annis, nescio an similiter in syluis.

Te.

Telephium Anacamperos nostra. Vide supra in A. Sedit etiam genus minimum et acre, Telephium olim uocabant. Eruditi quidam hodie pro Telephio Dioscoridis accipiunt herbam, quam alii Cerinthen existimant. Vide supra in Cynoglossò montana & Cochlearia.

Terebinthus in aliquibus Italiæ hortis reperitur, ut Venetiis in Franciscano cenobio. In Germania nusquam uel sponte nascitur: uel in ullo (quod sciam) horto reperitur. Circa Monspelium abundat: & in montibus prope Veronam, & Tridenti ad eum montem in quo arx Episcopi est, & alibi in Italia.

Testiculus uel Orchis herba, species quam plurimas complectitur: quas enumerandi locus hic non est. Nascitur in pratis, collibus, syluis, montibus, umbrosis, apertis, siccis, humidis, aliæ atque aliæ species. Radices omnium è gemino quasi bulbo constant: qui in aliquibus palmatus seu manus instar & digitatus est. Vide supra in ter Satyria. Reperitur apud nos species una, minor, bulbo singulari. In hortos translata uix ultra annum mihi durarunt, aut duos ad summum.

Teucrium uerum, R. R. Ae. C. Id nimirum quod Fuchsius, Matthioli, & Dodonæus

donæus pingunt. Sponte sua in Germania nusquam prouenit, quod sciam, inquit Fuchsius: satum tamen copiose nascitur. Matthiolus pluribus in locis reperiri ait, Triflagini tã simile, ut sepe ex tempore uisa oculos decipiat, &c. Nascitur hic frutex Basileæ etiam Zuuinggero, seminibus ex Italia allatis: & mihi quocq; etiam nuper exorta est una eius planta. Tragus pro Teucrio pingit Veronicam, uulgò dictam *Verenbyss*: quæ herba frequens circa syluas nostras (duorum generum) in nostro etiam hortulo uiuet.

Thalictrum quorundam. Vide in Saxifraga lutea. Thalictrum Dodonæi est inter Nasturtia syluestria superius.

Thanus. Vide in Egano.

Thapsia, Rurpodius. Vera nascitur in Gargano Apuliæ monte: semine ni fallor, inter ferulaceo latissimo. Eius radice aliqui abutuntur pro Turbit: & a quibusdam uocatur Turbit montis Gargani. Hæc mihi etiam olim è semine prouenit, sed hyeme prima (si bene memini) periit.

Thlaspi uerum, O. G. C. Bursæ pastoris ferè similis est herba, æstiuæ, acris. Bursæ pastoris Thlaspi fatuum dixeris. Hæc nobis passim abundat sponte: illud in Germania non nisi satum, quod sciam.

Thlaspi alterum Dioscoridis fuerit fortè Raphanus maior uel marinus cognominatus, de quo prædiximus.

Thlaspi Creticum, ut quidam uocant, Dodonæus Drabam facit, C. G. Floribus subcœruleis. Diu floret, ad flores propensa herba, æstiuæ. Cum in summo semina maturat, ab imo sæpe floret iam sub hyemem: & partibus summis detractis, ab imo regerminat floretq;. Semina è Creta primum nostra memoria aduecta puto. Acrimonia simul & amaritudine excellit.

Thlaspi montanum uel Lunare. Vide Lunaria Græca.

Thymbra uera, R. K. C. Rurpodius. Vide in Satureia.

Thymelæa uera, K. R. quæ coccum Gnidium fert.

Thymus uulgaris, R. O. G. K. Non benè durat apud nos. Hyeme seruandus in uasis domi, Basileæ & alibi melius. Semen eius (teste Plinio) deprehendi non potest. Flore satum nascitur. Translatum ex Attica Thymum, & uix flore satum prouenit alibi, eodem teste: sed non durauit, assilatum maris requirens: quæ antiqua opinio erat de omni Thymo, ideoq; non nasci in Arcadia. Thymis quidem nunc etiam lapideos campos in Prouincia Narbonensi refertos scimus. Mihi è seminibus nuper plantæ aliquot natæ sunt. Ramuli inflexi radices agunt & propagantur.

Ti.

Tilia minor seu mas, G. Steinlinden.

Tilia in urbe nostra magnæ procere quæ collem Palatinum, quem uulgò Aulam (den Hof) nominant, quàm plurimæ decorant, pulcherrimo Tiliæto: & extra urbem passim in fossis circa moenia, egregiæ spectantur huius generis arbores: ut passim sub eis sedilia in umbra non desint senibus & aliis animi gratia obambulantibus. Harum maxima truncum habet inferius ea crassitie, ut si uiri duo mediocres amplectantur, dodrantes quinque adhuc supersint. Sed præcipue spectabiles sunt duæ ille huius generis arbores, quæ infra urbem statim ad Limagum uisuntur, media inter eas domo, cui planca utrinque iunguntur, in qua conueniunt qui sclopetis exercentur: ita digestæ, ut mensis aliquot in utraq; collocatis maximus conuiuium numerus, tanquam in coenaculis et tricliniis capiatur, infra, supra et circumquaq; brachiis & frondibus Tiliarum ambientibus, &c. Similes aut etiam elegantiores Scaphisæ ad Rhenum demonstrantur. Omnes quidem sic fermandæ arbores, ne trunco cubitos quatuor excedant curandum est, ut quicquid ab ea altitudine superest, totum in tabulata, siue brachia & ramos effundatur, sicut & de Quercu Basiliensi supra dictum est, impietatis illo genere à quo & Impiam herbam denominauit antiquitas. Tilia utraque quod in hortis Lutetiæ nunc spectatur, industria Bello-ni fecit. Sexu distinguitur apud Theophrastum: ita ut mas sit sterilis, ramiosior,

Ti.

densior, materia flaua, & arida, &c. Fœmina fructum habeat, materia alba, &c. In syluis ac montibus nostris genera duo crescunt, *Linden* & *Steinlinden*: cadenti, ni fallor quorum Theophrastus meminit. Abundat hæc arbor humore nativo glutinoso: qui facit ut & longæua sit, (quanquam hoc etiam fructui debet, paruo scilicet & sicciori, ita ut minimè exhauriatur:) & in prima ætate flecti digeritq; facilius queat.

Tinctoria ex Antuerpia, R. Aliam puto quàm *Rubiam* intelligens: quoniam *Rubia* seorsim in catalogo eius mentio fit.

Tini, semen ex Italia Bellonius delatum mihi communicarat: sed non prouenit mihi. Hanc (inquit Plinius) syluestrem aliqui *Laurum* intelligunt: nonnulli sui generis arborem. Differt colore, est enim ei cœrulea bacca. *Tini* (inquit Bellonius in epistola ad me) permultæ mihi in hortis uirent, & semine enat, hyemem minimè reformidantes: sed diu humi (sub terra) durant, antequam conurgant.

Tithymalus characias cognomine, O.K.C.Ae.G. Quia *Fuchsio* & *Matthiolo* pingitur. Nascitur circa *Scaphusiam*, *Basileam*, & *Badam* nostram, asperis apricisque locis. E semine aliquando mihi nata hæc, post biennium, si bene memini, periiit. *Cyparissias Matthioli*, *Pityusa* aliorum est. *Dendroides*, *Rurpodius*. Hanc esse puto, quæ in sylua parum distante *Argentina* iuxta *Carthusiam* copiose nascitur. Memini & supra *Basileam* in colle saxoso reperisse, *Matthioli* quoq; *Dendroides* inter saxa nascitur. *Heliocopius*, C.G. Passim in hortis & uinetis emicat æstiuæ herba. *Myrsinites* uel *Myrtites*, C.Ae.O.K.G.R. *Rurpodius*. Pingitur à *Matthio* solo cum nuce, à *Dodonæo* sine nuce. *Paralius*, C.G. *Rurpodius*, quia *Matthiolo* & *Dodonæo* pingitur. (quærendum an hic *Cyparissias* sit: *Matthioli* autem *Cyparissias*, potius *Pityusa*.) Nascitur frequens in *Selandia*, solo maritimo & arenoso. *Pentadonus* à *Cordo* cognominatus, Ae. Is passim (ni fallor) sponte nascitur. *Characias Tithymalus Matthioli*, quem (ueluti rarum) à *Luca Ghino* se accepisse scribit, à *Dodonæo* etiam eodem nomine exhibitus: idemne sit, quem *Dodonæus* pro *Pityusa* maiore pingit & *Fuchsius*, pro *Tithymallo platyphillo*, considerandum.

To.

Tordylium, O. Non aliud puto quàm *Sefeli Creticum* intelligens, de quo supra. *Tordylium*, C. Sentit autem de *Tordyllo Dodonæi*, quod *Caucalis Bellonii* est. Vide in *Caucalide*.

Tr.

Tragacanthæ plantula unica, C.

Tragium, C. intelligit autem *Dictamnū* uulgò *dictam*, id est, *Fraxinellam*, cuius radicem hircum olere aiunt. Sed aliud uidetur *Tragium Dioscoridis*.

Tragopogon in pratis nostris abunde crescit, duorum generum: uterq; luteo flore. *Habermarck*.

Tragopogon puniceus, O.G. In aliis regionibus, *Italiæ præsertim*, luteus deest, hic abundat. Facile nascitur, uiuereq; per hyemem. Aestate secunda flores & semina profert, ac perit.

Tragopogon peregrinus uel *Hispanicus* dici posse uidetur illa herba, quæ *Hispanice Escorsonera*, hoc est *Serpentaria* dicitur, quod contra serpentium uenena profit: depicta in fine Iconum *Stirpium Fuchsi* cum breuissimis descriptionibus *Hispanica lingua* editarum nuper *Antuerpiæ*. *Tragopogonis* autem genus esse monuit me *Petrus Coudenbergius pharmacopœus Antuerpianus percelebris*: qui hortietiam sui catalogum misit. In *Tarraconensi Hispania* (nunc uocant *Cataloniam*) herba *Mauri* cuiusdam industria cognita est, quam uocant *Escorzone ram*, aduersus uenena præstans: quæ etiam strenue morbis oculorū auxiliatur. Vulgare est in *prouincia Carthagera*, iuxta *Darienem*. Existimant eandem esse quam olim *Ptolemæus* liberatus sit, &c. *Cardanus lib. 6. de rerum uarietate*. His scriptis radices eius aliquot à clarissimo *Lugduni medico* *Jac. Dalechampio* accepi aridas ex *Hispania* ei allatas puto, tam breui quidè tempore, ut, electa ex eis recentior una, in horto

horto creuerit. Radix est dodrantalis, singularis & simplex, cortice tenui arboris li-
brum referente obducta; quò facile detracto aridae, interior superficies fusca est,
pars uerò intima albicat, aut etiam subruffa & in medio subflaua est, insipida, sub-
dulcis.

Tragoriganum. Lege in Origano.

Tragus uel Tragium, maritima herba, O.K. & A. cui semina adhuc non protu-
lit. Vide Scorpius.

Tribulus terrestris Dioscoridis, O.G. Facile crescit, & semina maturè perficit, æ-
stiuu herbula. In Germania uix usquam sponte nasci puto. Tribulum terrestrem fo-
liis Portulacæ Matthiolus ait se uidisse Venetiis in maris litore, prope diui Nicolai
facellum, ab eo diuersum, quem exhibeo. Lucas Ghinus Pisis ad me misit. Quidam
Carduum stellatum uulgò dictum, Tribulum terrestrem non rectè uocant. Aquati-
cus crescit in aquis profundis, cum alibi tum in lacu nostro superius circa Tungam,
ut audio.

Trichomanes, G. Nasctur passim in syluis, locis saxosis & umbrosis: & in ueteri-
bus muris fossarum urbis nostræ.

Trifolium simpliciter, quod & Asphaltites, id est, bituminosum ab odore cogno-
minatur, O.K. G. Vu. C. Circa Monspelium sponte natum reperi. In Germania non
nisi satum prouenit. In Area seminatum aliquando eadem æstate mihi floruit matu-
rè, sed semina ne ostendit quidem, nescio quo uitio: suspicor autem non debuisse
tam citò florere: nam aliàs in uasis secunda demum æstate floruit, & semina perfecit;
durauiq; ni fallor, tribus annis: cum illud primò interierit. Folia ei minora rotun-
dioraq; sunt ante caulem; quo adulto folia angusta oblongaq; in mucronè exeunt;
ut Oxytriphylum tum dici mereatur: quanuis hoc aliqui ueterum (ut Plinius) spe-
cie distinguunt à duabus aliis unius generis speciebus.

Trifolium odoratum (Italorum,) R. Hoc Lotus syluestris uidetur, de qua di-
ctum est supra.

Trifolium caballinum, *Stundkraut*, Lotus satiuu esse mihi uidetur.

Trifolium pratense seu uulgarè, capitulis florum purpureis, in omnibus ferè pra-
tis luxuriatur, albis per folia maculis. Circa Lugdunum speciem aliam uidere memi-
ni, quod Hemorrhoidum cognominant aliqui, nigris maculis. Est & altera species
maior, in collibus & aruis apud nos frequens, acris gustu, ut abscessu tertio calida ui-
deri possit.

Trifolium uulgarè albo flore in pratis & collibus nostris obuium durioribus &
longioribus foliis albicantibus.

Trifolium pulchrum flore candido, K:

Trifolium marinum (maritimum) quoddam, Ac.

Trinitatis herba. Vide Hepatica aurea.

Triticum ubiq; in agris feritur.

Triticum Turcicum, Indicum, uel Bactrianum, Lege in Frumento.

Tu.

Tussilago, Vngula caballina uulgò, quanquam arenosa loca amat quibus aqua
subest: nasci tamen in hortis etiam, et aliquot annis durare potest, locis umbrosis, G.
Floret primo uere,

Va.

Vacaria Dodonæi. Vide in Lychnide.

Valeriana. Vide Phu.

Ve.

Verbena omnibus nota ubiq; nascitur & calcatur.

Verbenaca supina uidetur, quæ Consolida aurea à nostris dicitur, aliis Britanni-
ca. Planta incognita Romæ passim proueniens, æris, florem cœruleum mense Se-
ptembri producens: foliis, floribus & caule ferè Verbenacam repræsentans, K.

Verbasci species diuersæ passim apud nos obuie sunt. Ex his Fuchsius pingit

Tt ii

candidum, quod in marem ac foeminam dirimit: & nigrum: & quartum quod syluestre uocat, foliis Saluiae, &c. quam aliqui Blattariam uocant. Blattaria flore purpureo & citrino, C. Rurpodius. Verbasci nigri species uidetur Blattaria Plinio dicta, **Goldknöpsle/Schabentrant**, Dodonaeus. Saluia syluestris dicta Monspeliensibus, eruditis quibusdam species Verbasci syluestris, diuersa ab illa Matthioli, licet non multum, Vu. G. Folia ei tanquam Saluiae hortenstis sunt, colore, figura & magnitudine: flores lutei. Hoc anno fata mihi quoque prouenit, & in uase nunc etiam hyeme uiuet domi: sed iniuria quadam postea ante florē mihi periit. Aliud uidetur Verbasci syluestre à Dodonaeo exhibitū, cuius folia Saluiae foliis similia facit, maiora, molliora, &c. In Germania inferiore nusquā nisi in horto quodā instructiore si biuifum ait: floribus luteis, quibus coliculi summi per interualla, ut in Marrubio, coronantur. Idem habet, C. Verbasci maius, minus, albi, O. flore purpureo, K. montanū, idem, ex Apulia allatum, idem, Syluestre ex Italia, Zuuinggerus Basileae.

Verbascula quorundam nos Arthriticas uocauimus.

Veronica uulgò dicta quibusdam, **Erenb: yss.** Vide in Teucrio. Quae proprie sic dicitur, mas uocatur à Fuchio: foemina uero ab eo dicta, toto genere differre uidetur, Elatine quorundam, ni fallor.

Verrucaria, O. Seridis aut Heliotropii species, Quare in Seride.

Veronica uel Beronica (Graeci ferè per t geminatum scribunt.) Alia est supradicta, in B syluestris. Alia toto genere diuersa, altitilis, coronaria: quam recentiores Tunici flores (Ocellum, Barbaricam) et Caryophyllos ab odore simili, uocant. **Nägeleblümen.** Species eius multae sunt, magnitudine, colore, & foliorū numero differentes: aut enim maiores, aut minores proferunt flores: eosq; aut candidos, aut rubentes, aut uiolaceo ferè admixto purpureos, aut Rosae syluestris colore, aut uarios & guttatos, item flore uel simplici, uel multiplici foliorum numero. Sunt in quibus flores bini iungantur, ita ut unus ex alio medio excrescere uideatur. Basileae apud doctissimum uirum Con. Lycosthenem uidi in una planta flores triū generum. Audio & plurium reperiri. Plantantur furculo auulso in uasis: & hyeme in cellas reponuntur. Seminibus feri non solent: ita enim putantur ad agrestem naturam redire: & si multiplici flore cōstent, ad simplicem. Si florere prohibeantur initio, ita foliorum in floribus numerum multiplicari aiunt, praesertim si stercorentur & rigentur diligenter. Viuacissima est & plurimis annis edurans planta. Turnerus Cantabricā appellare uoluit: eamq; in urbanam & syluestrem diuidere. Syluestriū illa species quam uulgò nostri **Grasinnägele** & **Frieseneugle** uocant, ad Altiles proximus accedit, per omnia minor. Plantatur haec in horticulis etiam muris, nec metuit hyemem, uiuacissima & diu durans. Alia in petrosis collibus, & asperis, sabulosis apricisq; locis nascitur: folio latiore, breuiore: Saponariae simili, floribus permultis simul congestis. **Streinnägele.** Hanc Lindauiae in Curtii horto alibiq; uidi: & è semine natam nunc alo. Floret anno secūdo, pulcherrimis floribus: qui medio ceu orbe perexiguus punctis candidis ornantur. Syluestrem quoq; reperi, si probè memini, ad ripas Gryphii lacus nostri. Aliqui puto Scarlatam uocant, tanquam à coccino floris colore. Tertia in pratis humidis emicat folio multipliciter dissecto: unde à Germanis **Wistwillen** uocatur. Huic etiam similis species in hortis alitur à Dodonaeo depicta. In Flammula, quam ab odore Caryophyllum uocant, frequens est apud Italos, ut ex maiore flore prodeat minor flosculus: duplices nominant, Scaliger, Mihi Flamma seu Flammula Theophrasti, genere differre uidetur.

Vesicaria. Vide in Halicaccabo.

Viburnum, Lege Lantana. Sic enim dictum Italīs fruticem, aliqui Viburnum interpretantur: alii Vitem syluestrem causticam nostram.

Vicia inter segetes ubiq; copiose prouenit: minori (angustiori & oblongiori) quam Aphaca folio, tenuiori caule, flore in purpuram rubescēte, siliquis longioribus, gracilioribus: semine non rotundo, sed latiusculo similiter lentis: quae etiam Aphacae seminum figura est, Galeno teste. Haec Matthiolus qui utranq; pingit. Aphacen

phacem eius Dodonæus (in posteriori editione) Viciam facit: Viciam uero ipsius Arachum nominat. Aphaca ubiq; sponte in Italia nascitur, & à multis etiam seritur ad columbarum saginam, Matthioli.

Victorialis apud recentiores, alia rotunda dicitur, de qua leges in Gladiolo; alia longa, de qua dixi in Allio alpino.

Vinea peruinca. Vide Clematis.

Viola simpliciter dicta, uel nigra cognomine, Martio mense apud nos erumpit circa urbem copiosa, iuxta sepes præcipue. Theophrastus libro 6. tradit posse eam toto anno florere, sicut & Oenanthem, si certa ratione curetur: qua etiam Dasypodium cognominatum, (Dasiphyllum mallem) hoc est, multiplici flore hoc genus euadit, frequētius apud Gallos & Sabaudos, nobis rarius. Ego à Sabaudis primùm huc attuli, nunc multis in hortis habetur: est enim uiuacissima herba, & radicibus sese propagat. Flores diuersis anni partibus edit, semina nunquam. Syluestrior species flore ferè nullius odoris est, minoribus & acutioribus foliis, flore maiusculo & dilutiore, radicibus magnis repēs & circunquaq; se propagans. Rarior est albo flore, quanquam satis frequens nobis. Rarissima luteolo & minore, in syluis & montibus interdum apparens.

Violæ nigre per similis flos, quem aliqui trinitatis cognominant. A colorum numero, nostri septenos ei colores, uulgari nomenclatura Heptachrum appellantes, attribunt; inodorus, sola colorum elegantia & uarietate placet. Aliqui non rectè Antoram, Dodonæus Violam flammeam; aliqui laceam, fortè quòd humi iacere uideatur. Crescit in aruis inter Triticum & alibi, ut in montibus quoq;. Aruensis minor, minusq; pulchris coloribus est: hortensis elegantior, siue cultus ratione, siue quòd species diuersa sit: ex mōtibus fortè translata: montani enim hi flores maiores sunt, & albi quoq; luteiq; maiori ex parte, syluestres inueniuntur.

Viola alba, Leucoium Græcis dicta. Vide in L.

Viola equina Sueuis dicta. Vide Calathiana uerna.

Violam flammeam Dodonæus, ut dixi, florem trinitatis uel Heptachrum à nobis dictum facit. Aliqui Indicum florem appellatum: neutram sententiam approbo: ut neq; Scaligeri, florem Caryophyllum uulgò dictum interpretantis.

Viola è Flandria, K. Leuciorum forte genus aliquod intelligens: Fuchsi Matronales.

Violam fruticosam à se primùm inuentam (in montibus ni fallor) Franc. Calceolarius pharmacopœus Veronæ ad Campanam auream percelebris, nigra communis per omnia similem, nescio an etiam odore, in horto educat.

Viola Mariana, Vide Medion.

Viola matronalis Fuchsi, (apud Dioscoridem nomen hoc inter Leucoii nomē claturas est,) ficto ab eo nomine. Aliqui Violam hyemalem uocant, interpretantes Germanicum nomen Winter violen. Brabant. Mast bloemen. nostri Psinsnâgele, quòd circa Pentecosten floreat. Solerius Gallus Hispanicam Violam. Aliqui Hesperidem ueterum interpretantur. Flores fert anno secundo albos, interdum rosos aut subruberyes quod rarius est. In plerisq; hortis apud nos inuenitur. Inueni & syluestrem si probè memini, olim supra Liechtstalam oppidū Basiliensiu.

Virga aurea uulgò ab Italis dicta, Solidago Sarracenica Fuchsio. Neidisch Wundkraut Germanis, (forte Panaces Chironium cui Lapathi folium tribuitur, &c. nisi id potius Donia circa Monspelium dicta est.) Nascitur passim apud nos locis siccis & apricis circa syluas, & alibi. In hortum quoq; translata, aliquandiu durat. Aliam eius speciem uidi in mōte supra Sanam casam (uulgò Salganam) oppidū, in quo fodina ferri est, longioribus & angustioribus foliis: quā Argentinæ etiā in horto Massarius medicus alit. Sunt qui Lyfimachiū luteū Virgam auream nominent.

Virga sanguinea. Vide Sanguinea.

Viscum nec natura prouenire puto, nec ab homine feri posse. Serunt id duo imprudentes turdi, ipsi malum sibi.

Vitex est in Agno.

Vitium differentiarum non pauca sunt apud nos: sed plures in calidioribus regionibus, ubi uuae melius percoqui possunt, maiore hominum cura ut diuersa & generosa uina nascantur. Nostra fere omnia acerbata sunt, idcirco magis quo propius ciuitatem nascuntur: paulo remotius enim nascentia, (ubi montes non impediunt & ut prorsus non nascantur in causa sunt,) plerumque mitiora sunt. Quoniam ciuitas nostra non solum frigidis Aquilonibus ut finitimi tractus, exposita est: sed Austros etiam natura tepentes, frigidis experitur: quod eis accidit (Austris inquam, ut refrigerentur) dum alpes perpetuis rigentes niuib. perspirant. Apud Vuallesios nostros multa & generosa uinorum genera nascuntur. Ciui cuiusdam nostro e uinaceis natae uites aliquot, post annos aliquot bonas uuas protulerunt. Mihi etiam e uinaceis uuarum passarum maiorum quas Cibibas uocant: ac minorum (in quo genere rari sunt acini qui uinacea habeant) prognatae uites quinto iam anno durant, necdum fructificarunt. Uuae bonae uarii generis, praecipue tamen albae, magnae, quas Cibebas uocant, Vu. Muscatellinae ex Vngaria, Vu. Alię ex Vngaria, acinis longis admodum appellat ab ea figura *Geißdorten*, Vu.

Vitis syluestris quae Labrusca dicitur, non aliud a sativa differt, quam quod cultu destituta est, ut Marcellus Vergilius sentit: sed cum propter omphacium (quod uulgo agrestem uocant,) a Gallis & Italis colatur, nec tam e agrestem suam naturam deponat, specie etiam differre uideri potest. Huius species una fructum non perficit, sed florem duntaxat quem oenanthen uocant. Altera fructum fert acinis exiguis, nigris, astringentibus. Labruscae flores (inquit Marcellus Vergilius) nunc etiam condiendis & odorandis uinis diligenter leguntur. Audio in Alfatia Labruscam ra cemileram sponte nasci: sicut & circa Brugam oppidum ad Arulam flumen, tum albis tum nigris acinis. Apud nos quidem nec sua sponte nascitur, nec colitur a quoquam, quod uel ex satiuis Vitibus uuae nostrae satis acerbae sint, & quanquam annis tepidioribus uina mediocria, interdum etiam optima nascantur: acerbata tamen et quae omphacii instar sint, nunquam desunt a superioribus annis seruata.

Vitis syluestris caustica, (flore enim, semine, cortice & radice uim urendi habet,) passim sepes nostras inuoluit, & in syluis arbores scandit: Clematidi plane cognata: quare a nonnullis recentioribus similiter Flammula nominatur. Sunt qui ueterum Viburnum faciant. Matthiolus, ni fallor, non distinguit.

Vitis alba syluestris Bryonia, R. K. G. Suae spontis passim inter sepes reptitat, circa Basileam, Brugam, alibi quae in agro Tigurino, quod sciam, nulla. Semine alundem misso, iam aliquot in hortis luxuriatur. Radix ei praegrandis & uuuacillima.

Vitis nigra syluestris, O. G. si modo est eadem quae Tanus Plinii, quam Matthiolus pingit, quamuis radicem non probe, fructum uero omittit: & capreolos addit, forsitan descriptionem Dioscoridis in hoc non naturam secutus. Ego cum capreolis nunquam uidi, sed uiticulis tantum suis flagellisque se circumuoluentem. Aut igitur Dioscorides lapsus fuerit *idcirco* in hac planta nominando: aut non propria significatione usus: aut Vitis nigra Dioscoridis haec non erit. Accedit quod fructum eius primo uiridem, in maturitate nigrum facit: cum Tani acini post uiriditatem semper ru-beant. Item quod Dioscorides minus efficacem huius uitis radicem facit, quam albae: cum Tani radix exulceret, quod meo periculo didici, Vitis albae non item, aut non adeo. Interim hanc Vitem nigram esse non nego, aut proximam ei speciem: quoniam non inuenio aliam quae propius ad descriptionem accedat. Sponte nobis abundat in syluis & montibus proximis, *Schmarwurz* nomine uulgo nota, quod alibi Viti albae attribunt. Vbi nascitur, aquam subesse significat ut plurimum, ni fallor: quam obrem Ruellius Malacocissum Democriti hunc esse coniicit, alibi uero Cyclaminum alteram Dioscoridis. Tanus, alias Tamus dicitur (Italis hodie uulgo Tamaro) unde & Taminia uua, quanquam ea Celso Staphisagriam herbam significat.

Vitis Idaea *Heidelbeere* uulgo, ut primus ego obseruaui, & uiros aliquot eruditos consentientes inueni. Aduersatur quidam de re herbaria bene meritus: & Vi-tem

tem Idæam interpretatur illam quæ Passulas Corinthiæcas uulgò dictas ferat. Ego nobilissimum illud uux passæ genus non in Ida, nec aliis præ altis niuosisq; montibus nasci putarim: sed uel in planicie uel collibus apricis, magna hominum cura. Vitis Idæa, (inquit Theophrastus Hist. 3. 17.) est fruticosa; uirgis paruulis & ramulis cubitalibus penè exporrigitur: quibus acini laterales nigri adhærent, magnitudine Fabæ, dulces, uinaceorum instar aliquid (*γλαυκώδεις*) intus continentes, folium rotundum, indiuiduum paruumq;. Transtulit hunc locum Plinius lib. 14. cap. 3. sed parum feliciter, & pro Idæa Alexandrinam posuit, &c. Non mirum est autem suffruticem montanum Vitis nomine appellatum: quando & Ficus & Laurus et aliarum arborum nomina suffruticibus propter aliquam similitudinem tribuuntur, &c. Genera huius suffruticis duo reperiuntur, magnitudine tantum diuersa. Conatus sum aliquoties frustra, tum semine fato, tum frutice translato è syluis, in hortulo meo alere. Anno quidem superiore in hortu Petri Figuli Lithotomi amici mei plantatus uideret etiamnum, nescio an duraturus, nō dum flore aut fructu edito. Durum, macrum, editum & uentis expositum solum amat.

Vitis Idææ species altera acinis rubris, foliis similibus, in altis montibus Heluetiorum nascitur: & in hortu, C. Ipse in catalogo Vaccinæ rubra uocauit. Pinguntur à Dodonæo bis, altera icone meliore.

VI.

Vimiperpauca apud nos sunt, exq; parua, ex montibus proximis puto translata. Videre memini paulò infra Albii nostri cacumen,

Vr.

Vrtica syluestris maior & minor, ubiq; notissima est. Mascula uel Romana, R. O. G. Sponite apud nos non crescit, semina maiora habet, & ueluti cōglobata. Sunt & Vrticæ mortuæ uulgò dictæ, non urentes, nec unius generis, passim obuicæ.

Vu.

Vua crispæ. Vide Ceanothus:

Vulneraria appelletur à nobis herba, (uel Consolidida aut Sideritis,) cognomine rustica, passim in pratibus siccis & collibus crescens, foliis circa radicem Lapathi pratensis fere figura, minoribus, multis, crassis seu carnosis, trientalibus, subacidis: caule uno & altero, pedali, in cuius medio folia minora, seu multifida sunt, in summo corymbi futeorum flosculorum, qui in quibusdam ceu folliculis mollibus, albicantibus, hirsutis pluribusq; conferctis, continentur. Radix subest singularis, alba, capillata. Hanc herbam literis hætenus quod sciam nullis celebratam, multis uerò experimentis apud rusticos nostros nobilem, Vulnerariam (ut ab aliis Consolidis uulgò dictis distinguatur) rusticam nominemus. Quidam Germanicè simpliciter Wundkraut uel Klein Wundkraut, in Bernensium agro Gachheil (ut alii Anagallidem) nominant.

Vuularia. Vide in Rapo syluestri.

X.

Xanthium passim circa oppida & in rudibus reperitur, G:

Xylum, C. hoc & Gossipium uocant, è cuius fructu lana uulgò arborea dicta capitur. Bononiæ in Luca Ghini hortulo uidisse olim memini. Herba est, foliis Vitis, &c.

Xyris. Vide Spatula.

Z.

Zambach. Vide Isme:

Ziziphus, uulgò luyba (Z in I mutato,) C.

Ziziphus alba in Oleastro est.

AD LECTOREM.

His ferè perscriptis accepi catalogum Stirpium instructissimi hortu
Ioannis Schmidlappii egregii mercatoris & ciuis Schörndorffii in regio-
ne ducis Wuirtembergensis, quem hic subnectere libuit, non omnibus,
sed rationibus tantum in eo nascentibus commemoratis.

Abinthium Rom.	Delphinium purpureum et album.	Melilotus Italica.	Solanum Indicum.
Acetabulum uerus.	Dictamnus falso dicta, id est. Melissa maior.	Melones zuccarini.	Spatula fetida: alia media: alia minima, omnes semi- nifere.
Acetosa rotunda.	Fraxinella.	Melopepones.	Stachys.
Acetopis.	Digitalis Fuchsij maior & minor.	Melium nigrum.	Stiches Arab.
Alcea hortenſis.	Doronicum.	Narcissus uerus: alius cernuus.	Struthium, nescio quale.
Alkali herba.	Elleborus albus.	leus.	Thlaspi Creticum.
Alyſſus Dioſcoridis.	Elleborus niger uulgaris.	Nigella Damascena: alia lutea.	Thymus.
Amaranthus Plin. magnus:	Eringium: aliud marinum: aliud montanum, diuerso ab alpino nostro.	Pegonia mas: item femina rubra & punicea.	Tithymalus myrtilles.
alius ceu pinnatus, mit- langen fedem: alius ceus griffatus, puleherri- mus, mit panna femi- nen.	Eupatorium Mesue.	Papauer spumum salsum.	Trifolium aureum uulgo di- ctum.
Ammi.	Prumentum cum spica gran- de, succulofum.	Papauer spumum salsum.	Trifolium bituminosum.
Amomum falsum. Plinij pu- to iuxta aliquos.	Gentiana.	Petroselinum Macedonicum.	Vetonice, uel herbe Tunice syluestris species, ut puto, Steinnageles: a- lia Geseche winter na- gele.
Anagris minor.	Gladiolus albis floribus.	Phalangium.	Viola Martia multiplici flo- re.
Antirrhinum floribus ru- bris, albis, roseis, luteis.	Gratiola.	Phalaris.	Viola matronalis Fuchsij ad ba & rosea: Winter veyel.
Aristolochia rotunda, uera nimirum.	Heliotropium minus, uer- rucaria.	Piper Indicum uulgo di- ctum.	
Aphodelus uerus, aliis ma- rinus.	Hordeum nudum.	Pisa capitata.	
Atrachylis: alia Antwerp.	Horminum uerum.	Polium montanum.	
Balsamina.	Hyacinthus Fuchsij cernuus leus & albus.	Poma amoris lutea, rubra, & tertium genus croci rubore.	
Barba hircina purpurea.	nunge blumen mit sternlinen blaw vñ weyß.	Pomum S. Iohannis forte a- bor Ceratia.	
Brassica mar. i. Soldanella.	Hyoſcyamus albus.	Priapeia.	
Bupththalmus.	Hyssopus moschi odore.	Psyllium uernale.	
Calendula multiplici flore.	Isaminum albis floribus.	Pyrethrum: aliud odoratu.	
Chameleo niger.	Vetonice altilis species ni fallor.	Rhodia radix.	
Caryophylli Turci rubri,	Indicus flos communis: eius dem species maior flore multiplici: & minor si- militer.	Rose Lugdunenses: alia multiplies: alia lutea.	
Centaurium maius.	Iris syluestica parua, flore ceruleo, semisera.	Sanguis draconis Lapathi species.	
Cerintha Plinij.	Lachryma Iodoci uel Iobi.	Satureia alba.	
Chamaemalum nobile.	Lapathum Sabaudicum.	Searlete flores. Est autem species Vetonice uel her- be Tunice syluestris.	
Charancia uulgo dicta.	Leucoia alba, punicea, ro- sea. Welsche som- mer veyel.	Scolymus spinosus: alius leu- uis.	
Cistus semina.	Linum hyemale.	Scoparia Scudenten fraut.	
Citrullus.	Lupini syluestres.	Scordium:	
Coryza uera odorata, alia maritima.	Malua crispa.	Sesamoides.	
Coriandrum Venetum.	Marum.	Siciliana.	
Coronopus.	Medica Parisinorum, alia lutea: alia minor.	Stilax (uel potius Conuolu- nulus) ceruleus.	
Cucumis erraticus.	Medium.		
Cucurbita species rara, muschel Furbis oder Schwumf fürbgle.			
Cyclaminus minor.			
Cyperus.			

CATALOGVS PLANTARVM

HORTI CLARISSIMI VIRI PETRI MICHAELIS
ciuis Veneti, in uico S. Gerualdi: quem Ita-
licè scriptum ab amico ante annos
quatuor seicè accepi.

CELEBRATVR ET

Ducis Florentini hortus:
in quo præter alia pui-
ebra aut rara hæc es-
tiam uisuntur,
ut audio.

Acanthus radice glandi- fæ.	Eupatorium Mesue è Syria.	Osyris flore cæruleo aut uio- lacco.
Argemone Plinij.	Faba Aegyptia.	Panaces Chironium Theo- phrast.
Alaternus Plinij.	Fascolus purpureus Indicus.	Ficus Aegyptia.
Alimus Crateus.	Fænogracum recentiorum.	Polycnemum.
Alliaria alpina.	Folium, Dioscoridis nimi- rum.	Pyramidalis quædam plan- ta.
Aristolochia radice crasse.	Galei, si rectè lego, nescio quid.	Quadrifolium.
Aster Plinij.	Gingidium Plinij, si rectè lego.	Radix idea.
Aspalatus uerus.	Hyacinthus, Tulipa Turca- rum, uel Lallæ.	Rhaponticum.
Asphodeli species aliquæ.	Hyoscyamus Aegyptius.	Rose moschate, sine spinis.
Baiarus Myrsefica.	Hyssopus quædam, uel Ser- pyllum rectum.	Sanicula formica.
Batrachium, Ranunculi spe- cies.	Lichen Plinij.	Sebastus ex Oriente.
Bellio Plinij.	Lilium Alexandrinum.	Sedum maius Dioscoridis.
Canelle, seu Cinnamomi uul- go dicti, folia.	Lonchitis prima et secunda.	Sedi plures species.
Carduus nobilis.	Lunaria Borissæ species Cen- taurij minoris.	Sementina ex Oriente.
Carus.	Lycium secundum Indicum.	Sion Plinij.
Caryophyllorum ex Oriën- te folia.	Mandragoras mas.	Sisari plures species.
Cedronella, species Nigellæ.	Melongena uel Mala insa- na spinosa.	Smilax lenis ex Creta.
Cepæa.	Musa.	Spina ceruina.
Cerberium (sortè Corsium, quod est radix Loti Aegy- ptiæ) Theophrasti.	Narcissus flore multiplici, è Constantinopoli.	Staphylodendron puto: nã Italicè scribitur Albero de l' uua
Chondrilla Plinij.	Narcissus luteus, species Tu- lipæ Turcicæ. Alius lu- teus autumnalis, species Colchici.	Tomentaria è Creta.
Chrysogonum.	Nardus montana uera.	Trastr uel Dulcibini.
Corniola, Lutea Plinij.		Verbascum uiscosum è Cre- ta.
Colocynthis duo genera.		Et aliæ quædam incognita, uariae.
Daucus Creticus.		
Dictamnus marinus.		
Elatine secunda.		
Epimedium.		

Myrtus laura.
Laurocassus.
Laburnum.
Solanium somniferum uerū.
Geniste species trifolia, quã
aliqui non rectè pro Cy-
tiso accipiunt.
Thapsia.
Ferula.
Smilax laeuis uera, quam et
in monte Atho sibi ui-
sam Bellonius ait.
Caprifoliū Memphiticū, ut
Bellon. uocat, quodeir-
ta Smilaxem Aegypti
in Scipihem prouenit, apo-
cyno simile, liquore ea-
tiam albo mmanas, ut il-
lud croco: sed amplexi
caule & in altum ascen-
dens: species Smilacis læ-
uis aut apocyni.
Herba baccifera, folio Silie
quasstri Fuchsi, &c.

FINIS.

FINIS.

CONRADI GESNERI APPENDIX

LIBRI SVI DE HORTIS GERMANIAE, AD FRAN-
ciscum Calceolarium, pharmacopolam Veronen-
sem ad insigne Campanæ aureæ.

POSTQVAM Dominicus Monthisaurus, (uir non solum felici artis medicæ usu summus, sed etiam phi-
losophus præclarus, & Græcis Latinisq; literis instructissimus,) mutæ nobis amicitie, humanissime Calceo-
lari, auctor fuit, multa ab eo tempore beneficia tua copiose & liberaliter in me collata percepi. Quæcunque
enim in genere Stupium & antiuersa materia medica abs te petij, ea iam aliquoties cumulatisimè, & magno semper
petitionis meæ senore ad me misisti: uti cum aliàs, tum proximo uere proprio ad te nuncio tam longinquo itinere
misso, qui Stirpes aliquas rariiores tute cutoq; abs te mihi adferret, benignissimè sum expertus. Et quamquam ego
perparum uicissim mitto, (quoniam regio nostra parcissima fert, & ego negocijs alijs occupatissimus operam rei
hortens, ut uellem, dare non possum: ac uix unus aut alter præter me apud nos huic cultui deditus est,) non tamen id-
circo desists, & noua subinde donas, quæcumq; occurrunt. quod quidem bonitatis tuæ, & sincere amicitie, non
uulgariis illius, quæ utilitatem magis quàm uirtutem ac honestatem spectat, argumentum illustrè est. Exigua certè
V u

sunt quæ Germani præstare possunt hac in parte, nisi ab externis adiuentur. Plurima eorum quæ ueteres descripserunt Germaniam non fert, ut in Stirpium, ita animantium quoque præsertim aquatilibus, genere. Scripserunt enim illi fructu de maritimis, aut non ita procul à mari, mediterraneo maxime, nascentibus plantis, cælo calidioris et fecioris: si autem etiam de piscibus mediterranei præcipue maris. Germania uero nostra in frigido humidoque tractu, procul à mari abest: et maritimæ aliæque peregrinæ stirpes in ea neque sponte nascuntur, neque ex seminibus scilicet, etiam quæ ducunt: maritimæ autem eius ad Oceanum oræ, quæ à nobis alpium accolis longissimè distant, per pauca (ut audio) profecerunt, partim ob cæli frigiditatem, partim (ut conicio) quod perpetuis ubique Euripis litora obruantur. Quare tantilla hæc, etiam imperfecta, boni consulenda sunt: præsertim inter hæc nascentis nuper harum rerum cognitionis principia. Principij enim ubique, uis et authoritas summa est, etsi re ipsa per exiguum aliquod sit hæc finitima. Propter ingenuam quidem animi iurgæ me liberalitatem, cum his diebus Appendicem libelli mei De hortis Germaniæ meditarer, illam utcumque, exilem et extemporaneam, tibi potissimum, tanquam et amico summo, et optimè merito, et in re hortensij diligentissimè uersato, dedicandam existimaui. Nam qui tantilla hæc, quæ antea ad te misij, grato animo acceperis, hunc etiam utcumque, breuem et leuissimè operæ libellum, non aspernatum te mihi promittebam. Non tam autem ut publice beneficij tuis obligatum me profiterer, dedicatiuncule huius, quæ longè infra merita tua est, consilium cepti: quam ut hac occasione te incitarem ad maius subinde Stirpium reique hortensij studium: quod ego certè præclarum, et magnanimitati coniunctum esse statuo: quippe quod ad honestam oblectationem, et gloriam, magis quam ad lucrum aut commodum priuatum referatur: et non solum præsentis cuius homines, sed ipsam quoque posteritatem iuuat: id quod magnanimi uiri proprium est, isque in hoc ipso liberalis, qui præsentis tantum spectare uidetur, laudes excellit. Etsi enim herbarum generis pleræque anno uno aut paucis durent, nec ad posteritatem numero, specie tamen feminibus confuata, transmittuntur. Arbores autem plantatæ uel insite semel, plurimum annis edurant, et ad posteros transeunt. Præter uoluptatem uero, quam ijs quæ terra eduntur aspecandis, capimus, magna à plerisque uel utilitas uel necessitas ad uitam ualitudinemque hominis conseruandam aut restaurandam manat. Proprius quidem studiosiorum naturæ ex eis fructus hic est, quod cognitihis hac occasione plantis, ueterum de eis scripta legendo non sine magna uoluptate intelligunt. Nam quæ igitur legere quod oblectet? Scire autem uel per se pulchrum et expetendum est. Sed hæc de re uerba facere non institueram. Præsentis institui hoc est, tibi optimo summoque Hortorum conditori et cultori, dedicandam de re hortensij argumentum conuenire. Tu enim pulcherrima hac Stirpium cognitione non modo plerisque, seculi nostri pharmacopæos, sed ipsos etiam medicos quam plurimos longo post te intervallo relinquis. Tu non proprium modo hortum Veronæ uarijs et raris plantis conseruis, et prædium iuxta excelsum montem Baldum diligentissimè colis: sed etiam in nobilissimi cuiusdam urbis uestris patricij palatio hortum multis pulcherrimisque Stirpium generibus mirifice exornasti, ut ait ciuium simul et peregrinorum admirationem spectantium mereatur. Hoc superius à me dictum oportebat, Appendicem hanc à me scriptam esse, cum liber meus De hortis Germaniæ ad finem operum Val. Cordi Argentinæ imprimendus, ad manum non esset: nec reuocari, typographo ad operis finem festinanti, ut suis quæque locis alphabetice seriei insererentur, posset. Itaque seorsim potius consignare uolui, quæ ab eo tempore quo librum misij imprimendum uel in meo plantauit hortum, uel in aliorum catalogis obseruauit, quam omnino omittere. Nec pudet me operis imperfecti, quod primus ego uidebo aut neminem in eo fecutus: in hoc præsertim argumento, quod nulla forte etas perficiet. Nullus enim nouas plantas inueniendi finis est: nondum omnes nostri orbis nouimus, aut ad hortos traduximus, nedum alieni. Sed cimi rati finitus homini hic labor sit, modus aliquis statuendus est: ut tandem postquam multas uariisque Stirpes colere tentatum fuerit, pulchriores utilioresque, tantum, et quæ cultum facilius admittant, durentque, melius, recipiantur in hortos: ceteris suæ naturæ relictis. Tu quidem, charissime Calceolari, non solum terræ hærentes Stirpes plerisque omnes et nobis, (ut suprà dixi,) et suis designare tum antiquis tum recentioribus aut uernaculis nominibus potes, et rarissimas quasque in hortis alere soles: sed etiam in instructissima officina tua Veronæ, optimas lectissimasque plurimas, ut et reliquam materiam medicam selectiorem, recondis, nec ulli ad hanc rem sumptui parcis. Quod facili animaduertit nuper, cum ex multis simpli medicis quibus recenter ad THERIACAE antidoti compositionem usus es, speciem singulorum liberaliter mihi communicasti: qualia sunt, Folium uerum, (sicuti uocas, ante hac mihi non usum, Nardo aut Celtica cognatum ut conicio.) Scordium Creticum, Thymus capitatus, Dictamnus Cretica suis cum floribus, Marum aut Amarae siue Sampsuchi genus à Creta. Proueniunt autem hæc, et aliæ quædam calide odoratæque herba in illa insula, multo, quam quæ alibi ferè nascuntur odoratiores, acriores, et magis albicantes aut lanuginosæ. Quam obrem Galenus à Creta potissimum ad Theriace mixturam accersi uolebat, quauis multo meliores nostris quæ in Germania nascuntur, huiusmodi herbas passim circa Romam nascentes et aliunde habere potuisset: cum unusquisque generis optima quæque ad præstantissimam hanc antidotum deligenda rectè censeret. Tu quidem exemplo uitam etiam nostri pharmacopole moti, ad hanc antidotum parandam, et alias quoque maioris precij compositiones, cum predictas herbas à Creta, tum aliunde quoque optima quæque selecta haberent: qualia sunt ex ceteris que ad me misisti Ammoniacum, Thuris masculi glebarum emulum, sincerum ac purum, cum frangitur splendens, et si mandas, lacte à albedine insignis, subamarum Myrrha odoratissima, bene amara, pinguis ac tenax, superficie liquida et ueluti rubiginosa, minutis glebis, quæque confracta intrinsecus unguum ferè modo albicantes uenas ostendat. Sagaræ nam rissimæ, perlucidæ, acerrumum, Porri ferè odoris. Liquor panacis purus, et plerisque à Dioscoridis attributis optimo notis, conspicuus. Ac similiter Galbanum, idque adeo pingue, ut digitis statim lentefcat. Bitumen Iudaicum uerum, nitro splendore, odore in hoc genere grauissimo. Terra Lemnia, (seu sigillata uera) à Byzantio, difficilis acquisitu.

in pashilis tenuitatem, & bicurulis, capre effigie insignibus. Bolus Armenia uera, subflau coloris, (quales etiam lineas in charta ducit, si afficitur) substantia equabili, simplici, & minime arenosa, solida uero & duruscula ut margaritae dumq; ne margo aliqua species salis substituat. Deniq; passilli, quos tu ipse seuissimè parasti. Hedyctroti Scellitici, & è Viperis. Haec & alia omnia, quae ad perfectam ferè (propter paucissimam enim quibus destitumur medicamentis, & quibus alia ipsdem uiribus prædita substituantur, non absolutè perfectam dixerim) Theriacæ apparatus requiruntur, omnes totius inclitæ ciuitatis Veronæ excellentissimi medici, circiter uiginti numero, in officina tua diligentissimè singulatim inspexerunt, examinerunt & approbarunt, idq; magna cum solennitate: & ipsam tandem antidotum permixtum suo in uase ad tempus conueniens fermentandam sigillarunt. Itaq; publico ciuitatis instrumento, fidei diligentiq; circa hanc antidotum summæ testimonium illustre tibi exhibitum accepisti. Quo nomine equidem tum tibi, tum seculo nostro gratulor, et ad tuum exemplum ac similis gloriæ emulationem, pharmacopolas omnes adhortor. Tibi quidem in uniuersa simplicium medicamentorum notitia excellere facilius est, quod & in urbe tecum multos clarissimos medicos, tibi conuinculos habeas: & locupletes magnificosq; homines tui amantes, harum etiam rerum studiosos: & phoenicem illum rei herbariæ Angullaram illustri Patauino horto præfixum, compatrem tuum, magna tibi beneuolentia propensorum tacam defunctum illum nuper iulium Moderatum Armini pharmacopolam percelebrem, in omni plantarum genere exercitatissimum & horto instructissimum nobilem, tibi quam amicissimum fuisse, & alios quam plures. Accedat regio uicina uariarum Stirpium genere abundans. Interim uero etiam alij pharmacopole, cum hodie tot occasiones discendi cognoscendiq; omnem materiam medicam, ex libris simul & præceptoribus extant, quos nulla unquam retro ætate, nihil suæ insculptæ prætexere debent aut possunt. Sed finem faciam huius epistolæ prolixioris quam proposueram, quanquam Appendicis tantillæ conueniat, si prius teroquero, ut si cui ego Stirpium in Germania horti nascentium Enumerationem qualemcunq; confecer: ita tu quoq; idem in hortis Italicis conseris, aut si tantum à tuis occupationibus ocij non da'ur, amicorum aliquem ad id horteris. Erit enim & iucundus & utilis posteritatis labor, præsertim si quæ ad culturæ quoq; rationem faciunt tum communia tum peculiararia præcepta adiungantur. In Gallia certè idem facit consultissimus ille totius ferè naturæ Bellonius, qui Gallicum de hortis & propagandis sua opera plantis, imò syluis, librum non ita pridem edidit. Et nostris excitati exemplo in Hispania quoq; alijsq; regionibus forsitan idem tentabunt eruditi aliqui hominès: unde paulatim non hortensium modò Stirpium, sed etiam syluestrium quæ in hortos transferuntur, cognitionis, copiosa fiet accessio. VALE, ornatissime Calceolari, & clariss. uro Dom. Mon. hislauro me commenda, cuius in me beneuolentiæ ac beneficiorum perpetua apud me uiget memoria. Tiguri Heluetiorum Cal. lunij. Anno M. D. LXL.

OBSERVANDA QVAEDAM

in uniuersum ad idem hortensem.

PROPRIVM bulbi est, ut non omnia semina eodem anno germinent: sed quædam primo, alia secundo anno: sicuti & de Aucua aiunt, & Loto (herbanimirum): quod quidem si uerum est, aliis etiam nonnullis commune fuerit. Theophrastus Decausis, Piura autem leges huius argumenti, lib. 7. cap. 1. Historiæ.

Semina multa genera principio hyemis superioris, circa D. Martini diem, terræ mandauit, experiundi gratia quænam ita melius prouenire & fructum sequenti ætate maturare possent, quam uere sata. Nolui autem citius ferere, ne ante hyemem germinarent, & tenellæ plantæ enatæ mox frigore perirent, Sed non successit, suble quata enim hyemis tæ aspera longaq; fuit, ut semina frigoris uel in terra perisise arbitrer. Vites certè apud nos alibiq; non paucis locis, ut in Italia quoq; sicut audio, ubi & Ficus & Olea, plurimæ hyemis iniuria perierunt: & ex peregrinis plantis quas sub hyemem in cellaria reponimus apud nos pleræq; Libanotides coronariæ imprimis: quas etiam in Sabaudia, unde ad nos adferri solebant, in hortis sub dio relictæ, prorsus interierunt: & multæ peregrinæ in magnificis hortis Augustæ Vinelicorum, quamuis parietibus undiq; muniti quidam essent, ita ut nullus externi aëri aditus daretur, & fornacibus accensis subinde tepesierent.

An flores ut denfescant in hortis, duobus aut tribus annis non sunt permittendi florere: idq; primis statim annis, & teneris adhuc plantis incipiendum est, non iam a cultis & confirmatis: sciam & animalium corpora ut prima ætate castrationem melius ferunt, ita carnosiora euadunt: prouecta non item.

Rustici quidam laudant è loco macro & arido nouellas plantas sodi, in lætiore solo plantandas. sicut enim facilius apprehendere eas & proficere putant.

Vu ii

Hortorum libros xxx. nuperrimè Lugduni edidit Benedictus Chritius Simphorianus eques in Ecclesia Lugdunenſi, quos Ioannes Tornæſius typographus Regius excudit in folio, ſatis magno uolumine: in quibus arborum duntaxat hiſtoria continetur, partim ex probatiſſimis quibuſq; authoribus, (philologia etiam non omiſſa,) partim ex ipſius autoris obſeruatione collecta, ut titulus pollicetur.

IOANNES VOLMARIUS pharmacopola eruditione & diligentia eximius, reiſq; herbariæ peritiſſimis quibuſq; conferendus, Eſſlingæ (quæ ciuitas Imperialis eſt, Vuirtembergeni ducatu finitima) hortū pulcherrimū & inſtructiſſimum habet, in quo plurimis iam annis uarias & externas ſtirpes magno ſtudio educat: quarum pleraq; nomina, & ſi quid præterea ab eo circa ſingulas obſeruatum eſt, ut ab ipſo accepi, huic Appèdici inſerui, nomine eius modò integris literis ſcripto, modò V. tantum initiali notato. G. uerò noſtri nominis nota, noſtros hortulos indicat.

Prædicatur etiam nobilis uirī CHRISTOPHORI PRAVNI rationibus ſaſis à Cæſarea maiestate præfecti Halæ in Valle Oeni, &c. hortus ampliſſimus, & uario herbarum, fruticum arborumq; genere locupletiſſimus: in quo uel Prunorum genera ſpectantur uiginti, &c.

STIRPIVM APPENDICIS

Enumeratio alphabetica.

A.

ABROTONVM fœmina Fuchſii, Abſinthio Pontico eiufdē haud diſſimile, V. Aliud fœmina, mari perſimile, ſed maius, latioribus & albijoribus foliis, ignauius, G. Creſcit Abrotonum quouis loco, ſed melius efficaciusq; aprico ac ſecco, ut odorata & fruticoſa lignoſa (q; *opuravoddy* uocant Græci) omnia: Hyſſopus, Thymus, Sampſuchum, Abſinthium, & huiuſmodi. Abrotonum utrunque topiarium dixeris, non quidem propriè ut ea quæ duci ſectiſq; ad diuerſas figuras facile poſſunt: fragiles enim eiſ ramuli ſunt. ſed quia putari & tonderi ad diuerſas figuras facile ſuſtinet. & rami reſciſci aut taleæ, uel leuiter impacti, ad quamuis figuram, ſacilliſimè creſcunt.

Abſinthium maritimū ad ſex annos habui: nunc ad occaſum uergere uidetur, V.

Abſinthium Ponticum Fuchſii, non multi amaroris, (Vulgare quidem noſtrum duplò amarius eſt,) ſponte proueniens Tubingæ, aſtrictionis cuiuſdam particeps, V. G. Album è Vallefia, uix ultra biennium in horto durans, G. Vide in Abrotono. Santonicum, Oſſingerus. Alpinum humile, non diu in horto mihi durauit.

Acanthus mihi flores nunquam produxit, Volmarius ſuperiore anno produ-cendos ſibi ſperabat.

Aceris ſpecies tres, G. Harum unam uoco montanam, noſtri uulgò **Lynbaum**: cuius truncum femoris ſerè craſſitudine, quatuor (& ampliùs) cubitos longū, ſuper-na parte abſciſſum, proximo uere plantaui, prato mediocriter humido: qui nunc æſtate pulchrè germinat, ita ut per facile eam creſcere & durare appareat.

Achillea, V.

Aconitum primum Dioſcoridis, id eſt, Tera Valdenſium, multis annis in hortis durare poteſt, ut in meo experior. In alio enim haſtenuſ nullo uidi.

Aconitum cœruleum montanum minus, foliis hiſſutis, ſubrotundis, minoribus, minusq; inciſis quàm cætera Aconita. Bergritter ſpòſile in montibus Bernenſis ditionis ruſtici uocant, à ſimilitudine ſlorum colore & figura ſerè cum Conſolida regali dicta. Eſt autem Napelli ſpecies. Napelli uerò nomen meretur non omne Aconitum (etiã ſi Itali hodie uulgò non diſtinguant,) ſed cuius radices ceu parui Napi ſunt, G.

Aconitum pallido flore, Lupariæ, ſeu Lycopſoni nomine uulgò dictum, benè

in hortis durat, contra quam olim putabam: & multis, ni fallor, annis, G. Eiusdem species alia floribus albis, foliis minoribus, radice simili, nempe latiuscula, dissecta, G.

Aethiopsis, G. Aethiopidem habeo (inquit Volmarius) eandem cum illa quam Matthiolus pinxit: & pulchrè quidem conueniret cum descriptione Dioscoridis, si feminum uascula, bina tantum semina caperent. Adhæc radicem uiscidam à Dioscoride ei attributam, non habet. Neque etiam exiccata cornu durities: aut saltem talis, qualis in Scolymi radice sentitur. Sic ille. Secundo anno, ut puto, flores & semina profert. Quarendum an Verbasci potius species sit, Thryallis scilicet uel Lychnitis.

Alcea Bononiensis, V. Sentit autem de illa, ni fallor, quam Alceastrum aliqui uocant: Tragus Alceam peregrinam seu Venetam.

Aloës herbam (inquit Val. Cordus lib. 4. De plantis cap. 110.) ex Hispania alla tam plantari, omnibus, quibus à Dioscoride describitur notis respondentem. Hyeme tamen ob gelu eruenta est, & in tepido aliquo loco suspendenda. Nam in aëre quoque suspensa uiuit ac incrementum capit, cuius rei causa etiam amphibion appellatur. Non enim in Arabia Indiaque tantummodo prouenit, uerum etiam maritimis Apuliæ & Hispaniæ partibus, sed faciendo succo inutilis. Hæc ille. Ego Aloës plantam parua proxima hyeme tota habui, partim in calido hypocausto, partim in alio ei proximo frigido aut tepido ferè: demum Aprilis die uigesimo cum uespere tepido pluuiam expectarem (erat enim siccior planta) exposui sub dio. sed pluuia subsecuta non est, & planta periit, foliis ceu coctis, & uirore omni amisso, etli nox satis tepida fuerat. Nunc aliam habeo, tuum munus Calceolari charissimo: quam solam nimii frigoris proxime hyemis iniuria tibi relicta, mittere ad me dignatus es. Eam aliquandiu suspensam domi reliqui. sed hodie primum (Calendis Iunii) cum radicem eius plantæ siccam animaduertirem, terræ immisi in uasculo, experiundi gratia: & forsan arenæ per se, aut cum terra permixtæ, immisisse præstitisset. Audio alios quos multis annis domi suspensam seruare, arena tantum, quæ interuallis irrigetur, linteo alligato circumposita.

Amomum officinis falsò dictum, V. Hoc (inquit) quibusdam Petroselinum Macedonicum uidetur, aliis Sison.

Anagyris, G. cubitalis ferè. Cacumen uere refecui, quod per brumam aruerat: quam causam esse puto, ut malignius germinet. Anagyrida sæpius, sed non ueram, habui. Faba erat unicolor, cœrulea, cum uarii coloris, ut Ricini esse deberet, V.

Anemone montana, (si ita uocare placet,) uel Pulsatilla Italorum (Ruchschell Germanis,) bis in horto mihi plantata, durauit paucis mensibus, postea euauuit.

Antoniana, uel S. Antonii herba foliis hirsutis, sponte circa riuos & fossas nascens, rarior inuentu laeuius, G.

Apiicrispinomine herba ex Italia missa ab amico, syluestris, ut apparet, nec Apii seu Petroselini uulgaris odore æmulum, G. Veteres Apiicrispinomine herbam satiuam intellexisse uidentur. Plinius libro uigesimo capite undecimo Apium fœminam mare nigrius, acrius & crispus facit, tanquam generis unius duæ sint species proximæ. Theophrastus non aliter quam cultu differre ostendit, hist. lib. 7. cap. 5. Apium, inquit, si satum conculcetur, cylindroque spulsetur coæqueturque, crispum aiunt prouenire.

Arisarum, G. quod tu nuper misisti mi Calceolari, foliis oblongis ut Matthiolum pingit, &c. Et forsan ad idem genus pertinent, bulbuli illi Auellanis paulò minores, summæ acrimoniæ abste missi: quorum superficiem & herbam uidere opto. Commisi quidem aliquot eorum terræ, succo enim pleni erant, sed an prouenturi sunt dubito. Intrinsicus pulpa candicans, cortice foris fusco, in nonnullis etiam articulo, & Trasi dicti radiculis per similes figura ac magnitudine. Hanc adolescentes lasciuiores per lusum inter se gustandam præbent. Cogit enim nimio feruore ore aperto aërem captare cum qui gustarit, cum astantium risu. Sumpto

autem aceto feruorem extingui aſunt. Sic & radicis illius, quamã te primũ ſiccã accepi, necdum herbam noui, qua in uino infuſa Fabæ magnitudine, eoq; ante cœnam per horam circiter, admixto ſimul alio uino, epoto, omnis cibi appetitus tollitur, irriſione quadam laſciuorum adoleſcentium, itidem antidotus eſt hauſtum acetum.

Aristolochiam rotundam & Piſtoloſchiam, V. ante triennium ſeuir: ſed nihil apparuit: ut ne mihi quidem, cũ illarum utranque & longam non ſemel ſeminari.

Asparagum Italicum audio nonnihil à noſtro diſſerre: & in nonnullis Germaniæ hortis creſcere. Sylueſtris Asparagi illius quem Corrudam appellant ſemina ex Bononia à Luca Ghino olim accepit, V. Sed ex illis ſatis nihil emicuit.

Asphodelus luteus, pulcherrima planta, Volmario fructum tulit præterito anno: ſed uafa (inquit) inane ſemen ferebant: eſtq; adhuc ſuperſtes. Habet & Asphodelum album. Luteus, (id eſt floribus ceu liliis luteis, & eiufdem coloris radice) caule procerò, & floribus ſuperiore parte referto, totoq; ſoliato, ſuperiori aſtate florebat Auguſtæ in horto generoſi uiri D. Vlrici Fuggeri. In hortulo meo trium generum naſcitur: Vnus maior, & propriè dictus Asphodelus Dioſcoridi deſcriptus. Is folia à radice nunc circiter tredecim habet, duos dodrantes longa: bulbos radice quàm plurimos: ſed caulem nondum oſtendit, eſſi ante tres aut quatuor annos, ſi rectè memini, è ſemine mihi ortus. Alius, mediæ magnitudinis, radice lutea, oblonga, non bulbosa, foliis ſerè totidem à radice, ſimiliter triangulis ut ſuperior, minoribus, ſex digitos longis, ſed malignius creſcere uidetur: ſapore acri ſatis. Tertius minor, foliis ſubteretibus, cepitiſ ſerme, non tamen cauiſ, dodrantalibus, cauliculis bipedaneis, ramofiſ, ab una radice pluribus: ita ut alii ſemina ferant, & nouus ſemper ſubnaſcatur, flores albos egregios ſuſtinens. Flos non maior Leucoio, ſeminiſ conſtat foliis, linea ſuſca medium quodq; ſolium diſtinguente, apicibus intus luteis: calyx nullus. Fructus in caulibus deinceps per interualla magnitudine Piſi breuib; pediculis aſſiguntur, tripartiti, luteo (ſi immaturos premas) liquore plenti, in quibus ſemina terna, ſuſca, uaria, triangula. Radix ſub eſt non longa nec bulbosa, ni fallor, fibris multis albis ſubmixta. Superioris anni uere hunc cũ ſeuſſem, autumno ſubſecuto floruit: ſed ſemen perficere non potuit. Inchoatum uerò, hyeme tota, in cellam uinariam reſoſitus, retinuit, & uere perfecit: & ſimul in eodem caule, qui iam aruiſſe uidebatur, flores ruriſ edidit: mox uerò nouos in nouis cauliculis floretq; etiam nunc initio Iunii: & florum aſtate tota futurorum ſpem facit, ut meritò Anthericum ueteres Græci Asphodeli caulem excellentia quadam à floribus denominarint. Hoc genus aliqui, ni fallor, maritimum cognominant.

Althæa diutiſſime durat, quamuis enim radix uetus quarto ſerè anno interit, enaſcuntur tamen nouæ è uetere.

B.

Balaſamina quæ & Momordica, Volmario Eſlingæ bis ad maturitatem peruenit, altera ſæpius.

Blattaria luteis & cœruleis floribus Norimbergæ in horto Ollingeri.

Borrago & Bugloſſus, albis utraq; floribus, ibidem.

Bugloſſius, G. albis floribus.

Bulapathum in horto, V. maius Hippolapatho, quod Rhabarbarum monachorum uocant.

Bulbocastaſtanum aliquot annis habui, nuper uerò amiſi: quoniam autumno ſuperiore tranſplantaueram, nec ſatis profunde, ita ut Bulbus frigore nimio proxime hyemis læſuſ ſit. Viret autem hyeme, aſtate euaneſcit.

C.

Carpeſium. Vide Phuſaxatile.

Calamintha odore Pulegii, cuius officiniſ Gallicis uſus eſt, pauciſſimis Germanorum officiniſ nota, V. G. Stirpes eius ſingulas non ultra biennium durare putro, ſicut & Calaminthæ montanæ noſtræ.

Cerinthæ

Cerinthe Plinii, V.

Chamelæa binæ plantæ aliquando proveniēre Volmario: quatum una deinde in cellario periiit, altera hyemis iniuriam perpessā sub dio (texerat enim stramine) eūm ad Februarium usq; incolumis peruenisset, à quodam nebulone euulsa est.

Chamæmalum nobile, ut uocant, G. Puto autem singulas plantas non ultra tertiam æstatem durare. prima quidem non florent. Dodonæus hanc Camomillam Romanā uulgò uocari ait à Germanis inferioribus: sicuti & luteā odoratā, quæ duplex est: una capitulo foliato, altera sine foliis. utranq; ex Hispania primū aduectā.

Chamæmalum rubris floribus, Ollingerus, Anemone quorundam fortē.

Chamæmalum nobile, (Parthenium nobile Trago,) frigoris, & hyemis quantumuis duræ, contemptrix herba, provenit in muris sepibusq;, & aliis quibusdam locis. Circa Metas urbem, Bipontiq; & alibi in hortis colitur. Per terram sparsa procumbit, ac facillimè ubicunq; humum attigerit, radicatur, haud aliter quā Serpyllum: quare è furculis decerptis sine negotio plantari potest, Tragus Chamæmalum quidem uulgare, annua herba est: bisq; anno floret, uere primū inter segetes: dein de autumno in agris rapitiis.

Cisthum oblongum, non rotundis, foliis bis orientem uidit Volmarius, & ad mediocre incrementum ei provenit: retinuitq; in longam usq; hyemem straminibus tectum: tandem amisit.

Citraria. Vide Melissophyllum.

Cnicus, G.

Colocynthis, (id est, Cucurbitula) amara & medicata, alium purgans, alia minor est, medicis in usu. Alia maior, figuris differens. est enim oblonga quædam & flaua: & alia rotunda, uaria. Alia sessilis ferā nigra, maculata, magna instar Cucurbitæ: & differens ab hac sessilis alia minor: quas omnes audio Basileæ in hortis medicorum quorundam inueniri: & ego Laufannæ olim ex illis quasdam alui.

Colutea ut quidā uocant, Senæ cōgener, ut Ruel. uult, V. G. Semina è matre prolapsa sponte crescūt. Cordus in alpinis sponte nasci asserit, à Brennero usq; in Italiā.

Conyza uera minor, ut ex odoris præstantia conficit, Volmario crescit quantum alior uno pede, quod culturæ dandum putat. Hæc serò admodum ad Arctum ortum, ut Plinius dicit, florem fert, aliquando tamen anticipat, V.

Costum amarum simul & dulcem Tubingæ in horto Fuchsi medici, & Stutgar diæ in illustrissimi principis horto provenire, aut certe provenisse nuper audio, illius radicem cum acrimonia amaram esse, huius acerrimam.

Cotula foetida uulgaris, crassioribus foliis, plerunq; inter segetes nascitur, annua (ni fallor) herba. Est & alia rion foetida, priori similis: item alia, tenuibus Fœniculi foliis (aut Mei) breuioribus, hyemem sustinens, amara admodum, G. Semen amicis quidam Lugduno missum communicauit. Floruit æstate superiore: et hac etiam florem eius proditum exspecto. Chamæmalum amarum dixeris.

Crithmus, uulgò Creta uel Salsa marina, Ollingerus. Amat solis reflexum ad parietem, & salsugine gaudet. Periiit Basileæ docto cuidam uiro, nimio frigore. Floret anno secundo, Volmario Eslingæ aliquoties factus, nunquam prodit.

Crocibulbi, domi forte neglecti autumno floribus emissis se produnt. Hos ego superiore autumno plantaui, qui deinde folia emisissent, quæ tota hyeme & uere habuerunt: nunc (Cal. Iunii) marcescunt.

Crocus montanus bene durat in hortis, sed rarò floret. Floruit mihi quidem bulbis annuus superiore Martio, cādidò flore, Croci omnino sed inodoro, sed nullo semine relicto, syluestres copiose & florent & semina relinquunt. Folia citius quā in satiuo euanescent.

Cyclaminum Italicum orbiculatum, non oblongum ut Rhæticus est, Volmarius bis florentem duobus annis habuit: sed superiori æstate ei periiit. Mihi loco umbroso plurimis iam annis durat.

Cucurbita quædam sessilis, rara, alba, lata, compressa ab altera parte: planta pau-

lò maior est Cucumere. Margines partis latioris crispis ueluti fimbriis eminent, Basilæ in horto Io. Bauhini medici.

Cynoglossus minor, ni fallor, appellanda herba, multis uirgis pedibus aut longioribus, foliis Scorpoidis palustris ferè, simplicibus, nulla à medio neruo fibra, asperis: floribus Pulmonariæ Plinii, cœruleis: radice longa, nigra, lignosa, G. Circa Scaphusiam sponte prouenit: & Badæ in colle ad dextram supra Limagum flumen.

Cytisus meus iam bicubitalis, rudimenta florum ostendit, Iunii die 9.

D.

Daphnoides è Sabaudia missum, ubi ad lacum Lemanium sponte prouenit, autumno superiore plantatum uiret mihi adhuc, sed non satis laetum, & tenuioribus foliis, quæ ad Daphnoides nostrum uulgare, (quod Piper montanum Itali uocant,) ferè accedunt.

Daucus Creticus è monte Baldo, (unde in hortum tuum translatus mihi communicasti optime Calceolari,) satis pulchrè uiret. Eundem puto (aut certè simillimum, eiusdemq; generis, & eisdem uiribus,) in altioribus apud nos montibus inueniri, ut quem circa Lucernam, Pilati uocant: & ab incolis male uocari *Wolfswurz*, nulla (quod sciam) ratione. Aconitis enim hoc nomen debetur. Radices aliquot longiusculæ, uergetæ & carnosæ subsunt, odore saporeq; Dauci syluestris communis. Foliola angusta: coliculi subhirsi albicantes.

Daucus palustris à me dictus, pluribus annis translatus in hortos durat.

Dauci syluestris genus, foliis ferè Cicute, nigrioribus, radicibus oblongis, nigricantibus foris, sapore Pastinacæ: caule sesquicubitali. Folia etiam digitis attrita, subdulcem Pastinacæ odorem spirant. Aliquot iam annis in horto mihi durat. Nasctur autem sponte in semitis uinearum graminosis. Meminit eius Cordus, ni fallor, alibi, nescio iam quo nomine.

Digitalem purpuream loca opaca amare audio, & sponte cum alibi tum supra Cyriam Rhetorum nasci.

Diospyrus dicta à quibusdam arbuscula, foliis ferè Rosæ, Pomo Cerasi magnitudine ferè, umbilicato, cœruleo, specie & figura omnino Vitis Idææ, adeo ut uel Lotus alpina dici mereatur. nam & suauis est fructus, & ita aptus stomacho: ut qui copiose etiam ingererit, non grauetur. Semina insunt quina, rufæ, latiuscula, tanquam Pyri: sapore etiam non dissimili. Succus pomi est lenis, dulcis, aquosus. Nasctur in Albio monte uicino urbi nostræ. Quidam *Slubirle* uocant: unde nos Pyrastrum Idæam uel petream uocare poterimus. In hortum translata anno superiore, uiuit quidem adhuc, sed malè.

Draconis uel Tarchi hortensis unius radices diuelli possunt, et plantari, ut ex una plures proueniunt. Fimo equino sub hyemem muniri debet. Syluestris & ferratus durat quidem in hortis, sed durior est quàm mitescat cultu.

Dracunculum minorem cuius folia albis uenis insignia sunt, perç hyemem durant, ad duos annos habui, dein sine pistillo & fructu periit, V.

Dulcem radicem ante aliquot annos plantatam, autumno proximo effodit: & radices magnas oblongasque, quæ rectè in terram descendebant, amputatas in usum seruauit. Capita uerò radieis unius in quinque partes distraxi: quæ rursus plantatæ crescunt, sed parum adhuc, primo scilicet anno. Ex iis quas mercatores afferunt uiridiores, quæq; germina aliqua ostendunt, deligi plantandæ possunt.

E.

Echium minus appellârim herbâ in horto meo nascentè, à nemine (quod sciam) depictam aut memoratam: quæ prima facie Lithospermis cognata uideri potest. Caulis est trium uel quatuor drantum, (herba tota aliquando trium cubitorum,) teres, solidus, asper: inq; uirgas multas & longas diuiditur, equales ferè, ut quænam ex eis potior sit, non facile dicas, & caulis primitiuus totus in illis consumitur. Lentæ & flexiles hæ uirgæ sunt, & in terram procumbunt, nisi fulciantur. Ab iis certè
ramosum

ramosum aut fruticosum genus hoc Echii cognominari meretur. Est quando etiam alter caulis, à radice statim exit, & forsan plures interdū. Radix recta deicendit, parua, brevis, alba, uel subrubra etiam, lignosa, singularis, minimis & perpauca fibris prædita. Folia sunt Oleæ ferè uel Scorpioïdis palustris cœrulei, similiter carnosa modicè, & neruo medio simplici nō fibrato, simplicia, hirsuta & aspera: albicantia et magis quidem supina parte: insipida, nisi quòd herbaceum quidam sapiunt, ea nullis petiolis adherent coliculis, singula, maioribus interuallis inferius Si mandas, aspersitate quadam inter dentes collisa crepant. E foliorū alis (circiter dodrantem aut amplius supra radicem) foliola quina stellæ instar radiata surgunt, per breui sed crasso pede, qui è cauliculo oritur, nixa, in quorū medio flosculi sunt albi, parui, caui, quinque partiti, uulsiiles ut Buglossi: & (ni fallor) singuli semper, intra barbula illas quinas seu radios quibus cōtinentur cōiunctis: nō enim se aperiūt aut radiantur donec perfectū sit semen. incipit autē florere ab imo. Flosculis succedūt semina singula, bina, ter na, uel ad summū quater na, Echii omnino seminū magnitudine & figura, uiperæ ca put quodammodo referēte: latitudo enim superior utrinque ceu in oculos leniter protuberat, & antrorsum attenuatur tanquam in rostrū: inferior pars utrinque depressa, in medio prominet instar carinæ inuicem. Hæc cum scriberem lunii mensis dies 2, erat: & flosculi in summis tantum coliculis uisebantur ad pollicis altitudinem, inferior pars omnis semina ostendebat. Herbam annuam esse puto & uiribus Echii præditam, ostendente in ipsa seminū facie natura, cui usui pròduxerit hanc herbam. Ignauiorem tamē Echii dixerim, quòd minor, tenuior, annua, & inutili radice herba sit. Echii quoque temperamentū ei attribuerim, primo gradu refrigerans, medium inter frigidum ac humidū, & abstergendi uim. Quòd si quis hanc herbam Lithospermopotius congenerem fecerit, non pugnabo. Val. Cordus certe Lithospermū maius quoque ad Echii et Anchusarum genus pertinere ait, idque ueteres nō animaduertisse.

Elleborastrum, G. Sic autē appello herbam Abrotoni penè foliis, radice forma & uiribus Elleboro nigro respondentem: unde & Tragus Elleborum nigrum alterum appellat: aliqui Consiliginē esse somniant: Cordus si bene recordor, Bupthalamum. Sed forsan ad Anemonas potius referenda fuerit. Flos in ea luteus, magnus, uernus, solem sequitur. Semen est nigrum, mali ferè seminis figura & magnitudine, id carnosa quadam laxa substantia, partim uiridi, partim alba ambitur. Hærent autem semina plurima connexa in pilula, maiore quam Auellana plerumque, subrotunda uel longiuscula. maturescunt ea & legi debent Cal. lunii ferè: idque maturè. decidunt enim seruatō uisore suo, antequam plenè matura putes.

Ellebori nigri, (præter Consiliginem nostram ueram, quæ & ipsa Ellebori nigri species omnino est, & iam dictum Elleborastrum,) species tres, G. Harum una Elleborus niger uulgaris est: altera persimilis uulgari, sed foliis maioribus, longioribus albioribusque, sceminam dixeris. allata mihi è uicinis lacui Lario locis. Tertia Italica floris purpurei: cuius radicem unam tu misisti suauissime Calceolari: quæ longo itinere humidior flaccidiorque facta, metuo ne nō apprehendat: superficiem quidem statim rescidi.

Eruum album & rufum ex Italia, Italici puto. Mocho in Hetruria dictum, G. quorum utrumque quoniam summa illa amaritiei, quam Orobo, id est, Eruo tribuit Galenus, caret: an uerus sit Orobus dubitari potest: eruditi quidam ut Fuchsius, ni fallor, pro Cicercula accipiunt.

Eryngii duas species à Luca Ghino missas accepit Volmarus: unam cœruleis, alteram subcœruleis floribus, mox ad albedinem tendentibus: posterius Eryngium maritimum esse puto, foliis rotundis. Vtrumque è semine non primo, sed altero demum anno oriri obseruauit idem V. Eryngium magnis latisque florum ac seminum capitulis (unde aliqui improprie Rosam Hierichuntidem uocant,) foliis angustis, ualde incisissimis, amplissimum, prouenit anno superiore in horto illustris uiri D. Virici Fuggeri Augustæ.

F.

Ficus Indica uulgò dicta, (cuius ante triennium folia terna coniuncta plantâ

Xx

ram,) sub finem hyemis anni huius 1561. Martii principio, folia habebat marcescenda tabidaque, non ut prius, hydropica, nec decidua, cum ne ui quidem reuellere potuerim: quod miror, cum ter aut quater illa hyemerigauerim: intus quidem puncta essent rubra.

Filicum species diuersæ, G. Fœmina: sic autem appello, quæ pluribus ab una radice foliis germinat nullo caule; multis iam annis horti mei incolæ: mollior uel tenerior aspera, de qua nunc dicemus: & durior molli, foliis modice incisus non cuspidatis, coliculis lanuginosis, fœminæ similis, foliis pedalis, angustioribus, non ita latis in medio. Foliorum partes subrotundæ, singulæ suis marginibus asperiusculæ sunt, & mucronem perexilem breuissimumque erigunt. Folia nouem aut decem ab una radice prodeunt. Nervus medius folii parte auersa hirsutus est, lanugine ruffa. Potest autem aspera cognominari: sicut mollis altera, cufus molliora & albiora sunt folia. Asperæ similis est hæc, sed folio breuiore aliquanto, & nulla nervi medii lanugine. Exit & ipsa (adultior forte tantum) in aculeos foliorum marginibus, sed molles. Videri poterat eadem asperæ, ætate tantum minor: sed omnino species est alia. nam aspera lanuginem habet in nervis, utcumque teneris adhuc & recentibus foliis, hæc non item. Est & alia similis molli, foliis dodrante paulo longioribus: quæ supina notantur punctis ad luteum uiridemque & album colores mixtos tendentibus. Lanuginis in nervo inferius aliquid subest, sed parum. Crescunt hæc Filices omnes in sylua, quæ horæ itinere ab urbe nostra abest, inter Septentrionem & Occidentem. Palustris uerò circa lacum Felium duarum ab urbe horarum itinere. Dryopteris uerò (ut aliqui uocitant) palustri similis, sed minor, &c. in collibus diuersis, præsertim Badæ infra Thermas statim iuxta fluuium ad læuam: ubi & Filix quædam minor, læuis candidiorque, foliis ualde incisus & mollioribus nascitur: quam & alibi in muris reperi. Mas ubique nascitur, procerior unius soliti pede, alius duriori folio, alius mollior, tanquam duæ unius proximi generis species sexu distinctæ. Præter has alia etiam Filicum genera à Baubino obseruata in propinquis Tiguro syluis, & in horto mihi recens plantata nunc non describam.

G.

Gentiana maior, foliis magnis, latis, subcæruleis, hoc tempore denis, & caule iam dodranti, nescio ante quot annos cum radice primum plantata: paulatim forte intra paucos annos ad iustam proceritatem mihi assurgit, ac flores producit.

Geranii maioris species tres: quorum unum foliis est magnis, figura fere & magnitudine Aconiti lutei, hirsutis, asperis: alterum ei simile, minoribus paulo foliis, asperioribus, nigrioribus, ueluti mas in eodem genere. G.

Giadiolus Indicus, quem tu nuper cum aliis plantis diuersis liberalissime Calceolari donasti, G. Typhæ fere similis, foliis inspidis: radicibus albis, & earum nodis Filipendulæ similibus.

Glaucium superiore anno Basilicæ in horto nascebatur excellentissimo medico Theodoro Zuinggero.

Glaux, G. E semine ex Italia misso, herbula foliis glaucis uel incanis, hirsutis, ternis ut in Loto herba, quibus succedunt alia bina ad caulem, gustu astringenti. Secunda iam æstate in horto mihi uirens nondum floruit.

H.

Hippomarathrum semine maiori quam uulgari, magisq; medicamentofo. Locum maxime apicem requirit, difficulter & sero admodum maturefcens.

Hyoscyamum albis floribus in horto habuit olim V. habetque etiamnum Ioannes Schmidlappius, egregius Schorndorffii mercator, rei q; hortensis studio nobilis.

Hyssopus moschata uel Cilissa, à Cilicia regione, G. odoratior nostra uulgari hæc est, moschi fere odore quodam: sed, ut audio, breui degenerat, locis præsertim umbris, & ad nostram accedit. In hac miratus sum, quod cum prima æstate floreat,

reat, perennet tamen, nescio quandiu durans. iam enim secunda tantum æstate, mihi uiret. Germinare citius uidetur quam nostra, & seminibus deciduis seipsam profermat. Vide etiam in Abrotono.

I.

Iris Illyrica, G. nuper à te missa, mi Calceolari, similis ferè nostræ Iridi sylvestri minori, quæ in pratis humidis aliquibus, etsi paucissimis inuenitur, nec diu durat in hortis.

L.

Lachryma Iodoci, (aliis Iobi,) Milii genus, inquit V. Ferè ad maturitatem mihi peruenisset, nì pramaturò frigore adustum fuisset.

Lactucam Romanam Basileæ quidam in hortis educunt, folio similem Seridi, & in cibo suauem, ut audio.

Lapathi genus minus acidiusq; Oxalis dicitur, cuius semè difficulter colligitur, nam subito decidit priusquam probè mature scat. Huius species una rotundioribus est foliis; altera oblongioribus, & pratensi similior, sed tenerior, &c. G.

Lapathum rotundum, G. Id hoc anno Io. Fabricius Ecclesiæ Curiensis apud Rhætios pastor, doctrina & pietate eximius ad me misit. Folia habet rotunda ferè, radicem transversam. Nascitur in montibus supra Curiam, & non procul Friburgo Helueticorum ut audio, aliqui Rhabarbari nomine appellant, propter similitudinem aliquam, nam uero quoq; Rhabarbarico in Perside nascenti folia rotunda tribuunt.

Lautus Alexandrina, Bonifacia uulgò, (nostris Zäpfletraut. Vuularia,) quam tu hoc uere cum cæteris plantis dono misisti, ornatissime Calceolari, pulchrè adhuc in hortulo meo uiret: & cum Rusco cognationis aliquid habere uidetur. unde similiter faciliè diutissimeq; duraturam mihi polliceor.

Leucoia quatuor generum, alba, rosea, seu purpurea, rubra & punicea. Voco autem hic punicea, quæ rubro colorì, cœrulei aut nigri ferè parū addiderūt, (bunrot Germanus diceret.) Vide distinctionem Dodongii. Diuersum ab his genus est Leucosium illud albū, quod recentiores aliqui Violam matronalem uocitant, Hispanicam (puto) Solerius alii Hesperidem. (Tragus Persicam uel Parthicam Herm. Barbari Violam, hanc esse putauit: cum Barbarus disertè, nō hanc, sed lasminum, uel leseminum uulgò dictum sic appellari posse censet, &c.) Germani quoniam benè ferat hyemem, Violam hyemalem uocant, nostri à Pentecoste uel Maio denominant, quo tempore floret, incipit autem secunda æstate demum.

Libanotis Volmario semen protulit, quod tamen ab eo satum nō prouenit, & tandem periit.

Lilia rubra duorum generum: quorum alterius semen simile est semini Martagii Italorum, V. Martagon illud, quod Lilium croceo colore fert, secunda aut tertia forsan æstate oritur, Idem.

Linaria uulgò dictæ species montana, parua, ut Sedum paruum ferè referat, floribus cœruleis, G. Nascitur circa Curiam Rhætorum, & alibi in montibus.

Lonchitis altera seu aspera, quam Matthiolus pingit, tuum donum Calceolari, belle mihi uiret ad parietem umbrosam plantata. Eandem, nì fallor, reperi superiore anno in colle inter Badam nostrū oppidum, & balnea ei subiecta, supra dexteram Limagifluuii ripam. Aliam montibus nostris familiarem Tragus Aspleni sylvestris nomine exhibet: quam Ghinus & Maranta Lonchitidis nomine digniorem existimasse uidentur.

Loti arboris (quam Ledonnie Monspeliensi uocant) ramulus refractus, & terræ mandatus superiore autumno, mihi crescit. Arbuscula è semine iam ferè quatuor cubitos æquat.

M.

Maluam arboream habuit V. brachii crassamento, quæ ei & flores & semina protulit: postea periit.

Malus quædam prope urbem nostram non floret & fructificat tamen.

Mandragoram V. uel ter prodeuntem uidit, sed nunquam alterum ueris tempus attigit.

Martagon. Vide in Liliis.

Medica, satis respondens descriptioni Dioscoridis, sed semini nulla in condimentis gratia, V.

Medion purpureum à quibusdam dictum, in horto alit V. sed minime (inquit) Medione est, planta nonnunquam binos cubitos æquans, cognata huic, ni fallor, quam Fuchsius Campanulam uocat: nam & hæc flores campanæ forma fert, sed triplò ferè me maiores quam (Campanula) nostras. Oritur autem è semine, non primo, sed secundo demum anno. Vide Viola Mariana.

Melissophyllum Fuchsi, uel (ut quidam appellant) Citraria, (nomine ficto nimirum, nulli uerò genti usitato,) V. Vulgaris quidem nostra Melissa (inquit) ut officinæ uocant, odore Citrum quam proxime relet; utcunq; quidam delicatuli ad eam tanquam cimicum foetore infamem nauseant, Citraria uerò illorum nullo citri odore (quanquam nomen id præ se ferat,) commendabilis est. folia etenim Vrticas potius odore imitantur. Florum odor quidem gratus, at nihil Citri in eo. Sic ille. Ego Citrariam illam, Lamium sylvaticum maius appellarim.

Mentastrum foliis orbiculatis ferè instar Menthæ, nobilioris crispæ, rarum apud nos & officinis ignotum habet V. Huius semen (inquit) non ortum est mihi primo anno, sed sequenti, aut forsitan tertia æstate.

Molyza Hippocratis, id est, Allii genus simplici capite, in hortis quidam alunt, & Hyacinthi speciei imperiti quidam esse putant. Eius pictura à nullo adhuc, quod sciam, exhibita est.

Myrrhis ab eruditis quibusdam existimata herba, à nemine adhuc picta, aut descripta quod sciam, G. Matthiolus Myrridem suam, quamuis raram & ab aliis non positam, pinxisse, contentus non describit, ut solet plerunq; id quod libenter dico, non quidem cū reprehendendi gratia (ut maleuoli accipiunt,) sed ad aliquam descriptionum diligentiam in rebus obscurioribus adhortandi. Nostra caules ab una radice producit plures, rotundos sesquicubitales ferè, hirsutos, & leuissima substantia alba infarctos, dulces & odoratos mansu. Folia habet magna, forma ferè Cicutæ, dulcia, & sapore ferè Chærefolii, mollia & hirsuta. Umbellas Cicutæ, floribus albis conditas. Floret anno secundo, initio Maii: Semina subnascuntur oblonga & magna, eminentibus angulis striata, digiti transuersi longitudine, gemina, & in geminū mucronem exeuntia: dulcia, sapore Aniso proxima, intus alba, sex aut nouè ferè ab uno principio. Hanc descriptionem ex tempore ad plantam unicam, quæ in horto erat, descripsi. Radicem nondum inspexi. Cognationis aliquid cum Chærefolio uulgari habere uideri posset, si uel minimum, ut illi, liquoris ei inesset: quo prorsus caret. Alia uidetur Myrrhis Anguillaræ, floribus luteis. Hæc nostra præ cæteris mihi ueterum Myrrhis esse uidetur: in hortis coli dignissima.

Myrti arbuscula, quam misisti recentem Calceolari, non crescit mihi, etsi diligentèr in uase plantata: ut neq; semina terræ hoc anno, & superioribus non semel, mandata. Vnde à nostro cœlo eam abhorreere conficio.

N.

Narcissus albus uel albis floribus, quem Dioscoridis esse retur, V. qui Narcissum album quoq; non primo, sed secundo anno è semine nasci monuit. Val. Cor. refert (inquit amicus quidam meus in epistola ad me) quempiam Tridenti & Venetiis coli, qui uere flores ferat, & nonnunquam etiam autumnò ante brumam, foliaq; illius etiam ante hyemem prorsus erumpere. quorum neutrum in meo uidetur. nam folia prodeunt Februario, flos uere: sed nunquam bis florentem uidi. Theophrasti etiam Narcissus, diuersus ab illo est. nam caulem cum flore porrigit, foliis exitu tardantibus usq; ad reslorescentiam: terq; ait florere anno, triaqt; sationum tempora ostendere. Hæc ille: cui respondeo: in Theophrasti lib. 7. cap. 12. Historiæ, ubi hæc de Narcisso

Narcisso traduntur, mendoſum eſſe locum, & pro Narciſſo, quoties eum cum Scilla nominat & conſert eo in capite, legendum eſſe Crocum, tum rei ipſius ueritate id indicante, tum Plinii teſtimonio libro uigeſimo primo, capite decimo ſeptimo, ubi locum hunc Theophraſti tranſtulit. Quod niſi pro Narciſſo Crocum legas, Theophraſtus ipſe ſibi aduerſabitur, ſemen manifeſtum Narciſſo negans, quod paulò ante ei attribuerat, eodem in capite ſcribens Lirium (ſolet autem Narciſſum alio nomine Lirium appellare, ut libro ſexto capite ſexto conſtat,) manifeſtè è ſemine prouenire. Libro ſexto certè capite ſexto, quanquam locus eſt mutilus, fructum Narciſſi decidere & ſponte germinare ſcribit: & qui legunt, inquit, deſigere eum ſolent. Eſt autem ſerotinus admodum cùm poſt arcturum & circa æquinoctium floreat. Mox uerò capite ſeptimo Narciſſum inter uernos flores, qui Violam nigram etiam præueniunt, ponit. Quorum utruq; uerum erit, ſi bis anno floreat, uere autumnoq;. Ter quidem anno eum florere nuſquam dixit Theophraſtus: nam ut concedam libri 6, capitis 12. Narciſſi nomen ubiq; rectè legi: non tamen ter eum florere ſcribit: ſed Scillam ſolùm ter florere ueluti obiter admonet: hoc uerò ex profeſſo & Scillæ & Narciſſo commune facit, quòd utraque florem aliquandiu ante folia emittit, &c. neque reſtoreſcentis Narciſſi mentio fit, ut malè uertit Gaza, una litera deceptus. legit enim *airwba*, id eſt, reſtoreſcit pro *airwba*, id eſt aruerit. Sic autem uerti debet, Fructum conſpicuum non parit (Crocus uidelicet, non Narciſſus:) ſed ipſe ſlos una cum caule marceſcit: & poſtquam aruit, tunc folia exeunt. Hæc ex meis obſeruatiõibus te celare nolui. Theophraſti certe codex Græcus, innumeris in locis perquàm uitiatus eſt: & Gazæ translatio mala: quibus uitiis qui mederi uellet, non utriuſque ſolùm linguæ peritum eſſe oporteret, & ipſos Theophraſti libros diligenter euoluere, ac inter ſe conferre, Hiſtoriæ præſertim cum illis qui ſunt De cauſis: & quæ ex eis tranſtulit Plinius: ſed in ſuperiudicio præditum eſſe acri, & Stirpium ipſarum quas memorat Theophraſtus non uulgarem habere cognitio-nem. Quæ omnia uix in unum hominem cadunt. Conabar ego iamdudum hac in re aliquid: ſed creſcente ætate, ualetudine infirmiore, & uariis negotiis impeditus, aliis hunc laborem relinquo. Præſtabit autem hæc omnia breui (ut ſpero) feliciter R. Conſtantinus, uir ſummæ in utraque lingua doctrinæ, & artis medicæ Stirpiumque hiſtoriæ ſcientiſſimus: ut & alii quiſcunq; editi ab eo haſtenus libri reſtantur: & edendus breui totius linguæ Græcæ incomparabilis Theſaurus ampliſſime declarabit. Ab hoc etiam, quoniam ſe totum Reipublicæ literariæ deuouit, Theophraſtum ſua lingua emendatum, una cum duabus translationibus latinis, altera Gazæ altera cuius ipſe autor eſt, Annotationibus quoq; & Iconibus Stirpium adiectis breui expectamus, & omnia interim ad perficiendum hunc conatum quàm feliciffima ei precamur.

Nardus Celtica ad ſeſquiannum mihi durauit in horto, diligentia quidem adhibita, diutius durare poſſe uidetur.

Naſturtium Hiſpanicum in quibuſdam Germaniæ hortis colitur, maius (niſi fallor) noſtro: & unum forte ex prædictis Naſturtii ſpeciebus.

Naſturtium alpinum hortenſi minori perſimile, minus iam altero anno mihi durauit, & ſemina protulit.

Naſturtium hortenſe aliud eſt foliis ſimplicibus, pollicem latis, tres longis: idque uel læue & albius, uel ſubhiſutum minusq; album. Aliud foliis ualde diuiſis, hoc etiam duplex niſi fallor: minus ſcilicet, ac maius, quòd ad Ranunculi pratensis folia tum forma tum magnitudine accedit.

Nigella agreſtis & ſponte inter frumenta proueniens, odore. Officinarum Nigellam reſerens, ſed tamen inferior, V.

O

Ocimoides croceum durat aliquot annis: licet primo anno floruerit. Mihi enim hoc anno pulcherrimum eſt in horto, quòd anno ſuperiore ſatum uere, æſtate prouecta flores, ſed paucos habuit.

Olusatrum, (Matthiolo Smyrniū, officinīs Petroselinum Macedonicum.) *scæpius* (inquit V.) mihi ortum, semper absq; fruge perit. Schmidlappio uerò (mercatori Schorndorfii) cui semen comunicāram, & flores & semina edidit.

Onobrychis, Galega uel Castracan Italarum, V. G. Inclinat quidem Cordus, & alii nonnulli, Onobrychin esse hanc plantam, sed meo iudicio (inquit V.) esse non potest: nam do drahtalem Dioscorides facit, cum Galega duos cubitos multoties æquet.

Origanum Creticum, V. Vulgarī (inquit) quod quidam Tragoriganum, alii syluestre Origanum esse uolunt, planè simile, nisi quòd flores albos habeat. Idem in meo hortulo pulchrè uiret, anno superiore seminatum, & hac æstate eius flores exspecto. Odoratius & acius nostro est: sed paulatim degenerare V. obseruauit.

Orminum uerum quorundam, coliculis summis pulchre cœruleis, ita ut flores uideri possint. Depinxit id Matthiolum, sed foliis latioribus: quæ longiuscula & longiora (ut Saluā minoris ferè) pingere debuerat. Semina in ore retenta non aliter quam Ormini nostri maioris, seu Sclæræ hortensis, glutinoso succo obducuntur. Odoris nihil aut parum habet: annua uel potius æstiuā herba. Quærendum autem an Sideritis prima sit potius quam Orminum.

Ornithogalum, G. quod nuper à te accepi, candidissime Calceolari, una cum caule pedali floribus onusto, radices bulbus albus, satis magnus & uegetus est, & tubercula quædam ostendit erumpentium radicularum: unde breui multiplicatum iri spero. Caulis ipse quidem nimium mollis & tener mox interiit.

P.

Pæonia mas & foemina, G. Foemina nobis uulgaris est, Maris plantam adultam misit clarissimus Lindauiæ mercator Matthias Curtius, quæ plantata superiore anno mox floruit, sed semen non perfecit: hoc anno iterum floruit, & semen iam fert. Habeo etiam nouellas aliquot plantas è semine mihi natas, non primo sed secundo anno. A satiationis quidem tempore uix ante nonum annum florere aiunt.

Paliuri frutex ortus, & incuriosius tractatus, in horto V. frigore perit.

Panaces Chironium, ut quidam putant, herba Doria uulgò Italis, Raphanus syluestris uulgò Monspeliū, ubi sponte (ut audio) iuxta aquas crescit, G. Lapathum similis est herba foliis & caule, qui bicubitalis ferè in hortulo nostro est. Folia inferiora circiter do drahtem longa sunt, (computata etiam petioli parte, qui & ipse foliatus utrinq; est,) aut palmo longiora si petiolum etiam totum computes: simplicia, nisi quòd utrinq; angulis exiguis qui in puncta candida exeunt, notantur. neruus medius albicat, succo multo abundat, mollia flaccidaq; sunt, paulò postquam decerpseris, ut Costus hortensis aut Lepidium ferè, satis carnosæ. Sapor cum acrimonia aliqua amarus. Multa sunt circa radicem: in caule singula per intervalla. Caulis unus et simplex est. Florum in summo corymbi lutei, ut in Costo hortensi, uel Virga aurea, foliolis raris & angustis, quinis ferè, singula capitula seminum seu apicum mediorum ambientibus. Semen accepi à clarissimo Argentinenſi medico Didymo Obrecht.

Panacis Herculei planta, quam tibi debeo mi Calceolari: sed metuo ne longo itinere infirmata radix intereat: superficies quidem amplius nō apparet. Semina eius hoc anno & alias frustra feui.

Pancratii semen Schmidlappius (mercator Schorndorfii) à me accepit, & ortum uidit, sed rursus perit: mihi ne ortum quidem est, V.

Papauer Memphiticum, magnis & pulchris floribus multifidis, album & purpureum, & medii coloris, G. Idem puto, quod aliqui recentiores Papauer opii uocant, semine coloris albi sed ad roseum uergentis, si bene memini. Dodonæus Papauer satium album duplex haberi prodit, unum integris, alterum minutim dissectis floribus, & similiter nigrum. Nigri dissecti flores albos, roseos, & rubros, superiore anno hortulus noster protulit.

Papauer flore multiplici. Tubingæ in horto Fuchſii nasci audio.

Parthe-

Parthenium nobile. Vide in Chamæmalo.

Perfici arboris species Italica, fructus maiores proferens, in horto patricii Tigurini Felicis Engelhardi, mediocris iam magnitudinis.

Perficus præcox uel Armeniaca, cum femoris crassitudine truncum haberet, & nouem forte cubitos altū, integra effossa autumnō ex horto quodam, & in prædium meum translata, pulchri è creuit: & uere quidem floruit, sed fructus non habet nunc, nec mirum primo transplantationis in tanta arbore anno.

Phu petraeum, G. Sic autem uoco Phu speciem in opacis montium saxis nascentem: quæ uel Carpesium, uel ei cognata esse herba uideri potest. Caules enim emittit multos, qui etiam si sicci exuicq, & ueluti καρχα quædam, id est festuæ aridæ uideantur, multis tamen annis durat, & quotannis germinat, in calidioribus nimirum regionibus, calidioris tenuiorisq naturæ.

Plantago maritima è semine nata, anni secundi mense Maio mihi floruit, foliis primū latiusculis & Plantagini similioribus, secunda uerò æstate perangustis, ceu coronopodis, sed simplicibus, duos palmos longis, trineruis. Coliculis pluribus, ad sex digitos longis.

Polemonii pratense nostrū duplex, aliud apicibus florū albis, aliud purpureis.

Polemonii genus è monte Pessulano, Fontanoni cognominant, G. Floret mihi nunc initio Iunii corymbis purpureis, Valerianæ quadam similitudine. Flos nudus est, (sine calyce, oblongo canaliculo) Centaurii minoris specie, superius in quinque folia diuisus, apicibus per medium binis, inferius ceu calcar adheret: suauis odoris, uesperis præsertim. Caules à radice plures prodeunt sesquicubitales, caui, albicantes, sicut & folia, læues. Folia bina sine petiolis ex caulibus & ramulis, simplicia, tres digitos longa, in acutum exeuntia, amariora quàm nostri Polemonii. Fruticosa omnino herba est.

Polium italicum & Germanicum, V.

Polygalium Rhætici plantæ dure, Curia à doctiss. uiro Io. Fabricio missæ, G. Polygalum autē uoco eam herbam, quoniam & in pascuis ad lac pecoris augendū præ cæteris prædicatur, (uulgò enim aiunt, es sei das best miltch sütter,) & ad Dioscoridē descriptionē, foliis Lenticulæ è regione positis per octo uel nouē deinceps ordines, quibus unum in summo accedit, solidis seu crassiusculis, simplicibus, insipidis, subacerbis, in exiguū mucronem desinentibus, & parte supina albicantibus, hirsutisq. Rhæticum autem cognomino, quoniam circa Curiam Rhætorum creuit, & abunde quidem in pratis infra Curiam usq ad Riuarium lacum, nec ultra. Audio tamen etiam non procul Basilea inueniri.

Pulegium ceruinum Monspelii dictum, sub hyemem ex area in uas transtuli, id nunc mihi in horto pulcherrime uiret, foliis simplicibus, angustis, oblongis, Hissopi ferè: coliculis albicantibus, pluribus ab una radice, rectis, pedalis, uno etiam cubitali.

Pyrethrum Germanicum V. G. Pyrethrum in Italia paludibus Pisanis prouenit cum umbella & caule Fœniculi, inquit V. in epistola ad me. Germanicum uerò acrius est Italico, si ambo exiccata fuerint. Verum autem & Pisanum si uiride fuerit (ut doctiss. medicus Henr. Munzingerus mihi retulit) multo acrius est Germanico. Crediderim in Germania quoq prouenire. Tragus enim tradit in montibus perenni niue obrutis, item in sylua Hercynia, duo genera Fœniculi prouenire: quorum alterum accerrima radice sit insigne ut Zinziber, alterum multo remissioris acridinis. Dioscorides uerò Pyrethri folia & caulem syluestri Dauco & Fœniculo comparat, umbellam Anetho. Dauco etiam Cretico folia Fœniculi tribuit. Syluestrem quidem Daucum non describit, sufficit autem Fœniculo quoq eum comparasse: Ex his genus illud quod acrius est, facile Pyrethrum esse crediderim. Hæc ille. Germanicum Pyrethrum superiore anno satum, nuper Aprili mense florere incepit, floribus Chamæmali ferè, sed maiore capitulo: quod ambiunt folia alba intus, foris rubentia, capituli proportionē parua, Herba ipsa Millefolium repræsentat, crassior tamen & hirsutior.

Q.

Quinquefolium luteis floribus rectum, non serpens, V. Tale sponte nascitur circa Zurzachum Heluetiorum.

Quinquefolium albis floribus, V. Eiusdem species quædam in faxis montium nascens, G.

R.

Radix Rhodia, ut quidam appellant, perpulchrè mihi crescit, coliculis ab una radice viginti quatuor, quorum longissimi pedales sunt, & absq; floribus: qui uerò recens è medio germinant, florum rudimenta, quinto iam lunii die, ostendunt.

Ranunculus albus maior, foliis Platani fere, altius incisus, duplex, G. Vnus syluestris, flore simplici, sponte proueniens iuxta riuos & locis riguis montium. Fiderit schi rara Bernensium uocant. Alter illi similis, sed flore minutiusculo multiplici, in hortis hiccoli solitus, G.

Rhus Plinii Monspeli dictus, ante annum Antuerpia mihi missus ab eruditissimo pharmacopola Goldenbergio, satis pulchrè adhuc uiret; nō crescit, tamen ut uellem, necdum flores ostendit.

Ribes syluaticus, frutici uulgò Ribes dicto plane cognatus, & fructu simili, sed maiori, in syluis Bernensium, (uulgò Neechbeere nominant,) sponte prouenit locis opacis: foliis parte prona hirsutis, supina læuibus, (cūm hortensis utrobique læuia habeat folia,) solidis & crassiusculis. Ante annum mihi plantatus, pulchrè adhuc uiret, & longæ durationis spem facit.

Rhododendrū hyemis superioris iniuria mihi periit, ut & alibi aliis. Volmarus Eslingæ ante annos aliquot è duabus sibi enatis plantis, unam sub dio reliquit per hyemem, alteram in cellarium reposuit, sed utraq; perierunt.

Rosa moschata, uel Damascena Alexandrinæ, Nefrin Serapionis, ut Anguillara docet: magno in hortis nobilium quorundam Germaniæ uiuorum, & quidem paucorum, studio colitur: Monspeli (ni fallor) syluestris exit. Ego nuper ex amplissimo horto generosi & illustri uiri domini Geor. Fuggeri horto plantas eius quatuor nactus, plantaui. Flores nondum uidi. Folia minuta & ordine quadruplici bina profert, quibus unum in summo accedit. Hyeme superiore pleriq; isti frutices frigore perierunt.

Rubia fatiua diu durans, & plurimū se propagans, G. Syluestrium una communis, ubiq; nascitur. Alia syluis familiaris est, eaq; duplex: una minor, & asperior: altera maior & læuior. Omnes in hortis diu durare possunt.

Ruscum ante complures annos plantaui: qui cū fructum non ferret, & multi ab una radice coliculi prodirent, distraxi in quinque plantas, & partim loco umbroso, partim magis aprico posui. Crescunt autem omnes & nullum uidentur solum aspernari.

Ruta procerissima superiori hyeme mihi interiit, tribus fere cubitis frigore perditis & uno supra radicem relicto, qui uere repullauit.

Ruta capraria Italorum, G. Galega uel Gralega uulgò: aliquibus herba Galeni, Gallica, Regallicum. E semine hoc anno mihi prodiit, foliis albicantibus, maiusculis, nullo insigni sapore, (gustauī autem herbam recens è semine progeneratam,) Pulchre à Dodonæo pingitur.

S.

Sabina non maior solum & pungens quæ Cupresso comparatur, Tiguri in hortis habetur, eaq; frequentior: sed etiam minor quæ pungit, & comparatur Myricæ, in horto Petri Figuli Lithotomi & Chirurgi optimi, amici & compatri mei charissimi.

Sampsuchum. Vide in Abrotano.

Satureia albis floribus, per hyemem quoque ut Hyssopus perseverans, V. Escarlata flos. Vide in Viola Mariana.

Scordium, V. G. In uase quidem magno pulchrius id mihi aliquando quàm in terra

terra provenit. Proxima hyeme tectum stramine ferè computruerat, nisi cauisssem. Loco humido & palustri (sed uentis exposito) nimirum lætius proveniret.

Sesamoides minus uel Elleborus luteis floribus, V.

Seseli Peloponnesiacum quod Matthioli pingit, è Rhætiae montibus allatum proximo uere doctrina & pietate excellens uir Io. Pontifella Curiae iudimoderator ad me misit: speroq; id melius duraturum, quam quod ante annos aliquot plantaram: nam per totam hyemem superiorem Curiae, in horto Io. Fabricii Ecclesiae pastoris eximii, cœlo humiliori assuescere cœpit.

Sferra cauallò Italis dicta herbula, Ornithopodio Dodonæi similis, siliquis incuruis, quarum singulae soleas ueluti equorum, per interualla aliquot referunt.

Siciliana ab Italis dicta, formosus frutex, V. Hæc doctissimo Fuchsi Androsæa mon ueterum (ut audio) uidetur, etsi neq; flos tritus, neq; etiam folia, manus sanguineo succo inficiant, cum id Hypericon uel Ascyron faciat, quibus ob hoc ipsum Androsæmi uocabulum adscitum est. multò magis autem id tacere debebat Androsæmum ipsum primario proprioq; nomine eam ob rem (ut Plinius exprimit) sic appellatum. Hæc amicus quidam noster, Anguillara non per S. sed per C. Cilianam scribit, & Clymenum Plinii interpretatur, aliud à Dioscoridis Clymeno. Ego Plinii Clymenum Hederae foliis, omninò pro Periclymeno accipio, sicut & Clymenum Theophrasti: Clymenum uerò quod Græcos Plantagini comparasse tradit Plinius, Clymenum Dioscoridis est.

Smilacis asperæ semen plus semel terræ mandauit, ortum illius ad triennium usque intactis areolis expectans, sed frustra, V.

Smyrnum, V. idq; uerum (inquit) Dioscoridis, ut mihi uidetur. semē etenim rotundum instar Brassicæ profert, nō oblongum ut Olusatrum uel Petroselinum, cum officinis dictum. Ortum est proximo uere, imminente autem Canis ortu, exaruit herbula illius: putabamq; planè de illa actum esse. sed accedente autumno rursus emerfit, atq; per totam hanc hyemis (anni 1559) clementiam, uiridis herbula uisa est, sicut & nunc insequito uere. Crediderim illi apricitatem loci noxiam esse, nam studio apricum locum selegeram, sperans me maturitatem promoturum. Semen à Luca Ghino medico Imoleni Bononia acceperam.

Solani species orta in horto V. cuius acini (inquit) Halicaccabi nostratis acinos æquabant: colore phœniceo baccarum Asparagi. ferebat etiam in uesiculis acinos, sed frigore præoccupata planta maturitatem non assequebatur.

Sonchi genus, Terra crispa uulgo Auinione, tenera & grata acetariis herba, G. Semina Lugduno accepi. Nascitur etiam in ruderibus & parietibus apud nos Sonchi genus, læue, foliis rubicundis uel omninò, uel aliqua ex parte duriusculis, lacte plenis, amaris, trifariam & profundè incisis: caule pedali, uel altiore paulò, flosculis luteis. Hoc puto (ut doctissimus iuuenis medicinae candidatus Io. Bauhinus noster nos monuit) Anguillare Lactuca syluestris illa fuerit, cuius meminisse ait Galenum lib. 2, uidelicet De alimentis, cap. De Lactuca, G.

Solanum sylvaticum, quaternis foliis, (raro quinis,) loco umbroso hortuli mei plantatum, diu durat, scq; suis radicibus repens propagat.

Sorbus torminalis G.

Spatula foetida uulgo dicta, V. G. provenit autem mihi ex semine altero anno. Cordus & alii quidam Xyridem hanc Diosc. faciunt. Sed Dioscorides (ut V. obseruauit) Xyridi caulem crassum cubitalemq; dedit, in Spatula autem illa neq; crassus neq; cubitalis est. Semine satis respondet, ut & radice: quam quidem primo non crassam, sed capillarem monstrat.

Spatula foetida alia: cuius semen primo anno non exit, V.

Stachys, floribus *, gravioris odoris quam Germanica, à Fuchsi et aliis data, V.

Styracem Augustae Vindelicorum in horto habet excellentissimus medicus Adolphus Occo: & refractum ab eo stolonem cum radice anno superiore mihi donauit:

qui terræ commixtus à me & toto anno relictus, permanfit quidem uiridis, sed non germinauit, nec apprehendit etiam, ut animaduerti cùm tandem euellerem. superior enim pars aruerat, sicut & infima radices, in medio adhuc uirebat. Vnde colligitur arborem hanc diu durare posse si semel apprehenderit. Venetiis in hortis quibusdam Styraçes satis magnæ uiſuntur: & calidioribus Italiæ tractibus etiam luæ spontis inuenitur, lachrymam tamen, ut in Syria, non fundit, Anguillara teste.

T.

Thlaspi Creticum, G. V. Acris hoc amariusq; est illo quod Fuchsius & alii exhibent: quanquam hoc propius ad Dioscoridis descriptionem accedat.

Tithymallus myrtites uel myrsinites, V. G. non tali fructu seu capite, ut Matthiolum pingit: sed sicut reliqui Tithymalli tum flore tum fructu: maiore tamen: & cùm maturuit testa dura, ut in nuce, semen maiusculum & subruſtum includit. Coliculi ab una radice quàm plurimi sparguntur: quorum nullus primo anno floret: secundo autem, aliqui eorum, ita ut plures ferè sine flore relinquantur. tertia æstate quid fiat, nondum animaduertere potui.

Tithymallus dendroides quidam, uel Turbit quorundam: missus à te, humanissime Calceolari, & reſecta superficie plantatus, nondum regerminat mihi. Idem autem, aut certè ſimillimus, circa Argentinam sponte creſcit.

Trifolium asphaltion, generosa certè planta, si illius & ſapor & odor apud nos non deficeret, V.

Trinitas appellata Italis, Germanis Hepatica aurea duplex: minor, quarum communior flores cœruleos proſert: rarior, albos, & maior: quam tuæ liberalitati acceptam reſero mi Calceolari, punctis albis per folia inſignis, G.

V

Verbeſina (ab aliqua puto foliorum cum Verbenæ ſimilitudine, aliàs Forbeſina,) Italis dicta, paſſim hîc in paluſtribus emicans, G. Videtur autem mihi ea planta floribus Indicis uulgò dictis cognata, flore quidem multò minore, ſemine ſimili, & odore ferè ſimiliter annua & aquoſis gaudens, &c.

Viola Mariana (uulgò Scarlata, Scharlach nâgelin,) V. Herba eſt ſimilis ſuis foliis Saponariæ uulgò dictæ, quâ Dodonæus Alisma facit, ſed flore prorſus Caryophylli ſeu Betonice altis, minore, &c. Sed alia eſt Viola Mariana Dodonæi, quâ alii Medion appellant: nomine recentî à diua uirgine (propter pulchritudinē floris opinor) conſcripto, nam & ſlos louis noſter, Lychnis Matthioli, pulcherrimo flore, unde etiam Cœli ſlos à noſtris dicitur, ut olim nimirum louis, ab aliis Marten roſile, id eſt, Roſa diuæ Mariæ uocatur. Alia etiam Viola marina Plinii, cuius meminit lib. 1. cap. 5. Tuſculanam Violam odoratiore & auguſtiore (niſi anguſtiore legendum ſit) aliquanto folio deſcribens, quàm marina Viola ſit. Ego Violam marinam aliam nondum noui, quàm Leucopium marinum.

Viola frutiçoſa, pulcherrima planta, Martiæ, ſeu nigræ Violæ foliis & floribus conſimilis, per te primùm inuenta, optime Calceolari, & mihi communicata: quæ ſi non creuerit, ut metuo, quoniam radix infirmior eſt, & longo itinere allata, ſemina ab humanitate tua expectabo.

Vitex uel Agnus Norimbergæ in horto Ollingeri. Hoc obiter moneo, nuperri-
mè mihi obſeruati, Theophraſti plantas quas Iſon uel Oſonice, uel αἰῶν quorū poſterius tantum probo) uocat, ab Agno nihil diſferre, ut Plinii & Euſtathii authoritate confirmari poteſt, nam quæ de Iſo Theophraſtus, eadē ferè Plinius de Vitice .i. Agno: & Euſtathius Homeri interpres αἰῶν interpretatur Agnoni: quamuis alibi Salicem aut ſpeciem Sparti. ſed Agnū Latini quoq; Salicem Amerinā nominant. Gaſa imperitè ex Theophraſto Iſon, Aequum, & alibi Oſon Iuncum interpretatur.

X.

Xiphium Dioscoridis nunquam, bis autem ſeu, mihi prouenit, loco ad quartum uſq; annum uacuo relictò: cùm Patauit inter frumenta naſcatur: & forſan apud nos etiam cum frumentis ſaturnem erigeret, V.

F I N I S.

E NVMERATIS Germania hororum Stirpibus, quotquot mihi hoc tempore, curiosius etiam inquirenti, in mentem venire potuerunt: quoniam huius enumerationis Appenatim tuo nomine (ornatissime Calceolari) dedicaui, uolui hic ad finem illarum etiam, quæ tuo in horto pariter, et illustris illius uiri palatio Verone, tua opera proueniunt, plantarum subicere nomina: ut hoc etiam incitamento ad hortos tuos uarijs Stirpibus augendos, remq; herbariam uniuersam illustrandam, et plurium Italia hororum catalogum (ut petebam) instituendum excitaretis. Sic enim simul nominis tui fama nobilitabitur, simulq; posteritas quantum his principijs, quorum nos sumus auctores, tu in Italia, ego in Germania, debeat, grato animo intelliget. Sunt in Anguillare sententis De plantis, Italice scriptis, quas nuper mihi dono donasti, quædam ad rem hortensem, et Italia imprimis hortos, pertinentia, quæ idcirco non excerpsi, ut tibi totum hoc negocium proprium relinquerem. Sed nunc Stirpium hororum tuorum nomina, ita ferè ut abs te accepi, ordinè literarum recensibo, idq; breuissimè simplicissimèq;

Aconitorum uariæ species, & inter alias una mirabilis, cuius radix plurimis per interualla nodis constat, quorum singuli singulos ueluti scorpiones referunt: sed hanc Doronici uulgò dicti speciem esse, flores & folia ostendunt, &c. in hortis non diu durat, Aegilops uerus, Agni seu Viticis plantæ multæ, Aloë, Alypum: Alyssum duplex, unum Dioscoridis, alterum Plinii, Amarantus, Ambrosiæ species: Amelulus Vergilii, Conyzis puto cognatus: Amorinum, ut doctissimo Anguillare uidetur, apud nos quidem is frutex sponte crescit in aquis: & ego Pseudamomum iam olim appellare solitus sum, Anagyris, Anchusæ diuersæ, Androsæmum, Anemoniæ species, Apios, Apocynos, Arabis seu Draba, Arbutus, Arisari species duæ, Aristolochia longa & tenuis, Asarum, Aster Atticus, Astragalus Dioscoridis, Atræylis.

Berberis: Bifolium, Ophrys Fuchsi puto: Botrys.

Cacalia, Cachrys, Caucalis, Centaurii maius, Chamelæa, Chamelæon albus seu Carlina, Chamæpitys, Cisthus, Clematis altera: Clymenum, uulgò Saponaria: Colocasia, Conuoluuli species cœrulea, uulgò Flos noctis: Coris: Crithmus spinosus, seu Pastinaca maritima, Cynocrambe,

Daucus Creticus, Dictamnus Cretica, Doronicum Auenennæ, Dorycnium, Dracunculus maior.

Echium, Elichrysus, Eringium maritimum.

Ficus Indicæ aliquot, quæ hyemis elapsæ iniuriâ omnes perierunt: Fœnograecum, Ferula ex Apulia.

Genistæ duæ species, Gentianæ duæ species, Gladiolus Indicus elegans, Glaux, Glycyrrhiza et Dioscoridis, ni fallor.

Heliotropium maius & minus, Hippofelinum, Holosteum, Hyacinthi, Hypericum.

Isopyrum.

Laserpitium, Laurus Alexandrina, uel Bonifacia uulgò, Lentiscus, Leontopetalum, Libanotis, Ligusticum uerum, Ligustrum, Lithospermum, Lonchitis arbor, Lycium uerum, Lycii species.

Mandragoras, Marum, Medium, Melilotus uerus, Mespilus prima, Momordica siue Balsamina, Myagrus, Myrtus.

Nardus Celtica & montana, quæ in hortis parum durat: Nux methel.

Onobrychis, Origanum onitis.

Paliurus: Panaces triplex, Chironium, Heracleum, & Pharnaceum, uidetur autem mihi Pharnaceum non aliud esse quam Centaurium maius, ex Plinio: aliqui herbam Doriam Italici uulgò dictam interpretantur. quæ cum Lapathi folium habeat, Chironium Panaces potius fuerit: etsi in huius historia pro Lapatho, alia lectio sit, Amaraco. Itaq; Hyssopum campestrem à Trago Germanicè dictum (Dei deithysop) à quadam foliorum similitudine, pro Chironio Panace quidam accipiunt. Herbulam quidem illam, uulnerariam esse constat. Pityusa, Platanus, Po-

lium, Polypodium, Poma amoris alba & rubra, Psyllium, Ptarmica Fuchsit & alia, Pulsatilla species duæ, Pyrethrum.

R Radix Rhodia, Rhamnus, Rhododendrum rubro & aliud roseo flore, Ruta sylvestris quæ & Harmala.

S Sambucus racemosus, Saxifragiæ species rara & miræ efficacæ: Sedum maius, quod proxima hyeme tibi perit, sponte in maritimis nascens: Sesamoides: Sefeli triplex, Aethiopicum uerum, Massiliense & Peloponnesticum: Sideritis: Solani species diuersæ, furiosum, halicaccabum, somniferum, peregrinum: Spina alba, cui flos in echino subcæruleus: Stachys, Staphisagria, Staphylodendrum uel Pistacium sylvestre, Stramonium, Symphytum petrarum.

T Terebinthus, Thlaspi species duæ, Thymelæa, Thymus Creticus, Tinus uel Larus sylvestris, Tithymalli omnes, Tora, Tragacantha, Tragoriganum, Tragus uerus, Tulipani pulcherrimis floribus, ceu liliis, Turbit.

V Verbasci genera tum alia, tum lychnites: Vmbilicus Veneris primus & secundus: Vnifolium. Et alia complura.

DE SCILLA ET EIVS SPECIEBUS CONR. GESNERI
iudicium ad Franciscum Calceolarium Pharmacopolam
Veronensem.

SCILLA nostra uulgaris, siue Pancratium sit, siue alia species Scillæ, rectè & utiliter in Theriacam additur: & uires omnes, quas ueteres Scillæ attribuunt, egregiè præstat, ut plurimis experimentis constat. Quamuis autem folium Liliæ eam habere aliqui obiciunt, non Aloës, quod Dioscorides requirit. non idcirco tamen à Scillarum genere excludi, & tanquam uenenosa reijci debet. Matthiolus eam damnat, quasi mitiorem iustè, & parum efficacem. Anguillara contrario nomine, quasi nimium uehementem & uenenosam. Ego tanquam bonam & conuenientem antidotis approbo. Debent enim ad antidotos quæ in eodem genere efficaciora sunt deligi, potius quam lenissima. Esto uehementior quam Scilla alba edulsi, (Scilla nomine adhuc in quibusdam Græciæ insulis nota, ubi Scillam nostram Cypulam caninam uocant, ut Anguillara docet,) at eo medicatior est. Esto uenenosa, si in cibis, præsertim sæpius & copiosius, sumatur; non tamen uenenosa erit, si præparatur quo debet modo, & aliis multis misceatur: sed iam uenenorum & morborum multorum alexipharmacum fiet. Alba uerò & edulis si sic præparata antidoto misceretur, omnem uim medicamenti exueret. Esto Pancratium, ut uult Anguillara: non idèo tamen uenenosa erit in antidoto, nec reijcienda: cum ueteres Græci medici, Pancratium adeò simile fecerint Scillæ, ut ab aliis simpliciter quoque Scillam, ab aliis Scillam minorem appellatum, & iisdem omnino uiribus pollere, mitioribus tamen, scripserint, quòd si uenenosius esset quam Scilla, mitius profectò dici non deberet. Et ut ueneno eam non carere concedamus, non tamen ab antidotis excludenda est. nam Plinius quoque uim ueneni Scillæ tribuere uidetur, cum scribit libro 20. cap. 9. oxymelitis scillitici tantum uim esse, ut animæ extinctæ speciem momento aliquo præbeat. id quod nos etiam à uino scillitico factum obseruauimus in muliere, quæ eo poto in uteri strangulationem; aut persimilem ei affectum ad breuissimum tempus incidit. Arabes etiam de Scilla uenenata, loci natalis præsertim ratione, loquuntur. Authores cum albam Scillam eligi iubent, præcipuè ad acetum scilliticum, hoc ipso ostendunt, aliquam etiam esse ruffam Scillam. quæ quoniam uehementior est, præparari debet, ut minore periculo sumatur, assando, torrendo uel elixando. alba uerò cum innocenter sit, præparari aliter non indiget, quam ut in taleolas secta siccetur in umbra pro aceto uinoque medicatis ex ea parandis. Ad theriacam

uero

uerò Scillam albam deligere nemo iubet. Iam quòd ad magnitudinem attinet, Scilla uulgaris nostra, duplex uidetur, maior & minor; quòd si aliter quàm ætate differt: minorem, Pancratium dixerim; maiorem uerò Schinum, quo nomine ueteres (Hippocrates, Aristophanes, Theophrastus) Scillæ speciem nominarunt: etsi Garza malè Lentiscum uerterit: ut & Cicero ex Arato: nisi forsan & ipse Aratus homonymia nominis deceptus, transcriptum ab aliis Schini nomen, pro Lentisco arbore acceperit, &c. Hispanica certè Scilla, quam cæteris acriorem esse aiunt, & maiorem, folio Aloës, simpliciter Scillam appellârim: eaq; si ad manum foret, præparata ad antidotos uteretur. Ego, ex homine docto & fide digno cognoui, toxicum etiam apud Hispanos ex Scilla parari, sicuti ex Elleboro: quod magnum ipsius uehementiæ argumentum est. At Scilla edulis alba, quam in Creta & Cephallenia adhuc essitari Anguillara tradit, non simpliciter Scilla, ut ipse putat, sed Epimenidea Theophrasti uocari debet. Diuidit autè Plinius quoq; Scillam in genus medicatũ & cibarium. Quòd si, ut dixi, Scilla nostra uulgaris minor, Pancratium est: & à maiori specie differt: uulgaris maior, (quæ tum ruffa, tũ albicans (ut audio) adfertur: quæ colorum discrimina haud scio an in minori quoq; reperiantur,) non temerè Schinus uocabitur. Galenus quidem dubitat an Schinus Hippocrati idem quod Scilla sit, uel aliqua eius species: sed ex Theophrasto à Scilla differre, eiq; cognatam esse, liqui do apparet. Plutarchus Periclem schinocephalum cognominatum tradit, ab oblonga & acuminata capitis figura: additq; Schinum pro Scilla accipi. Hæc de Scillæ generibus habui à me diligentius obseruata: ex quibus etiam constat (ornatissime Calceolari) paratam à te nuper theriacam antidotum, è uulgaribus Scillis trochiscos non temerè recepisse. Scilla Theophrasto ter floret anno, & tria arandi tempora significat: & Arato similiter, etsi is de messe loquatur. Sed Aratus primò Schinum ter fructum pro ducere ait: deinde etiam Scillam ter florere. Et quoniam is primùm ab Illicis simul & Schini fructibus, prognostica quædam tempestatum signa exponit, de duabus arboribus sentire uidetur, Illice & Lentisco: cum Schinum uerisimilius sit, illum quicunq; hoc ante eum scripsit, à quo ipse nimirum est mutuatus, pro Scillæ specie accepisse: sicut & Theophrastus alibi accipit, Lentiscus quidem an ter floreat alicubi, non constat mihi: non sit autem mihi uerisimile. Scillam ter florere minime dubito: non ubiq; tamen, sed in Græcia & notis Theophrasto locis. $\Sigma\chi\iota\nu$ igitur per iota in prima fœminino genere Græcis Lentiscum significat, & antiquioribus eorum aliquando speciem Scillæ $\Sigma\chi\iota\nu$ uerò per σ diphthongum, masculino genere Iuncum. Vale Tiguri Cal. Iunii. Anno M. D. LXI.

CONRAD. GESNERVS AD LECTOREM, DE
QVIBVSDAM VEL EMENDANDIS, VEL ADDENDIS IN
suo De hortis Germaniæ libro.

ad. adde. l. lege, quod tamen plerumq; subaudiatur.

NVMERVS prior paginam designat, cum a. adiecto facie priori, cum b. posterio-
ri. Posterior uersum, quod si unicus est numerus, is uersum solum pagine prius nomi-
nate indicat.

CV M Librum nostrum De hortis Germaniæ recens
impressum, nondum tamen absolutum, cuius re-
uoluerem, deprehendi emendanda quedam, partim leuior-
is momenti, quæ hic nõ attingam, quod à quolibet medio-
riter literato Lectore, facillimè emendari queant, ut sunt
accensus, distinctiones, & alia leuisscula: partim paulo gra-
uiora, quæ prætereunda non duxi, siue ea typographorum
culpa, siue mea etiam inter condendum festinationi sint ad-
scribenda. Pauca quedam bis posita occurrunt, quod ita
contigisse puto: dum libri iam pridem missi edito disse-
tur, alia complura obseruari, quæ seorsim conscripta ad
typographum misi, ac suis locis inseri iussi, in quibusdam
non satis memor prius etiam fortè annotata fuisse. Nuper
etiam in peregrinatione per Rheticas alpes, quedam ad-
didici, & alia aliunde animaduerti: quorum pauca huic
libro adijcere uisum est.

237. d. 29. l. calidioribus 31. l. ætiologicis, 52. l. libri sexti
caput. 237. b. 13. l. proprie. 238. a. 2. post, usus, punctum
ad. & l. His etiam conueniunt pergis, & c. 19. l. excel-
lenti. 238. b. l. Zuvinggerus. 239. a. 1. l. Coldenbergius. 22.
Volmarus. 239. b. 17. medicus. 37. indicabimus. 240. b.
11. l. PARS I. Quæ consideranda sint ante sationem. 4. 4.
l. effert. 241. a. 1. l. PARS II. Quenam in ipsa satio-
ne considerari debeant. 241. b. 48. l. PARS III. Post-
quam, & c. 242. a. 35. Cinis lixius, id est, à lixiuo reli-
ctus, 46. post. Winterfreuter ad. Quedam utriusq; ge-
neris reperiuntur, ut in Hordeo, Lino, Cannabi, & c. ha-
bet enim horum unumquodq; species duas: quarum una æ-
stiuæ, altera hyemalis est. 242. b. 18. in fine uersus ad. In apri-
co enim horto odoratissimum hunc fruticem inuenire me-
mini: & iuxta murum, partim etiam ex ipso muro letissi-
mè nascentem. 4. 1. ut Poniculo: & alijs quibusdam licet
non umbelliferis, ut Pabæ in uersæ. 48. sed etiam Iulio. In
fine eiusdem pagine ad. Atqui flos seu Caryophyllus Indi-
cus aut Tunetanus uulgo dictus, tum maior, tum minor,
cum annua herba sit, folia tamen florum multiplicat: sicut
& Calendula. 243. a. 18. l. quæ ouium fimo. Post uersum
24. FINIS, dele. 51. Coldenbergius, & similiter in sequen-
tibus, sicubi citatur, l. 243. b. Lemanum. 21. medicus &
chirurgus. 22. hortum ac in eo. 37. Verba hæc, Vtrumq; aui-
lis aut s. r. p. & facill. comprehendit, abundant. 39. l. non
procul Rotulla, speciem Abrotini inueni, per omnia s. u.
n. mari, sed prociorem, candidiorem. 46. ad finem uersus
ad. Species eius iam d. & c. omnes auulsis aut fractis ramulis
plurimq; multo minus. 244. a. 2. l. meo per al. m. non sat
bene, uirens potius quam crescens, postea interijt. n. proue-
nit. 20. post, hortus. ad. Plantam unam ultra biennium du-
rare non puto. 39. post, uidi. ad. Sed hoc fortè Cotula ge-

nus aliquot fuerit potius. 244. b. 3. l. Accepi & tertiam
speciem a. f. è. C. missam. Lymbaumi appellant: cuius
truncum quinq; cubitorum satis crassum, superne am-
putatum, plantauit facillimè crescit. 38. l. Quidam A-
conitis adnumerant, & c. Erroris causa fuit quod amia-
cus quidam ex Italia Trollium dictum à nostris florem
ad me misit, & à Matthiolo Aconiti speciem ceteris
scripsit. ego postea inspectis quas Matthiolus ponit ico-
nibus, nullam cum eo conuenientem reperi. Aconitum
quidem tertium eius aliquo modo accedit, sed multa
habet diuersa: si modò uerè pictum est. ego tale hacten-
us non inueni. Scribit Matthiolus negasse me inueniri
Aconitum tale, & in eo me decipi. Ego uerò etiam nū-
nego Aconitum esse quod ipse pingit: & si probè pi-
ctum est, omnino Ranunculi speciem esse, non Aconiti,
asserō. Post uersum 48. Inscere hæc: Aconitum aliud,
radicibus duabus, ceu Napis, diuicatis: folijs minis
diuisis & tenuioribus quam reliqua ferè Aconiti ge-
nera. G. E. Lusio monte propè Vuallestadium oppidum
ad Riuardum lacum Helueticorum. 245. a. 1. post, ap-
pellant, a. quoniam prope nives inueniatur, (sicut &
Doronicum,) mox ut nix liquata est, apparens ac flo-
rens. 37. l. nata in b. s. i. b. h. A. 4. 1. Eadem prouenit
4. 4. uidetur quibusdam. 245. b. 16. nostro, flore luteo-
lo, & c. 17. l. flore ferrugineo, uulgo Grauen (Schüpf)
K. Videtur autem eadem superiori: cuius flos quidem
luteus est: folia uerò flori adunata, ferruginea. 21. l. & c.
Nüterwurz. Hæc in altis Helueticorum Rhetici-
ramq; (ubi Fregalienfæ Plantaginem syluestrem uo-
cant) montibus crescit. In Sueuia etiam in planitie re-
pertam mihi puto. In hortulo plantata mihi breui in-
terijt. Vide infra in Calith alpina. 25. oblonga, trans-
uersa, & calcei ferè forma, & c. 28. Dele hunc uersum
totum, et sequentem usq; ad, uocant. Quæ uerò sequi-
tur, refer ad uersum 40. ubi ita l. nascitur apud nos co-
piose. Viuax in hortis, & reliqua. 39. l. Allium sylue-
stre, bifolium, uersum. Ad finem uersus 32. distinguat, &
ad & modicè uisco, ut Cythi, cui cognatum uideri
potest. 51. genus. 247. 1. communicauit K. Angustia-
ra Enneaphylli nomen huic generi adtribuit. 3. Pulsat-
illa. 8. alibiq;. 18. post, montanus, ad. Aut hæc ipse
Narcissus est potius: Anemone uerò limonia Theophras-
tæ quidam pulcherris bulbis, Tulipa quorundam
fortè: uel Hermodactylus aut Dens canis circa Bono-
niam dictus. 39. Anturbini. 247. b. 17. ad finem
uersus ad. Græci uulgo eiusdem plantæ generis herbas,
cultu solum differentem, quam uuper Clauenne in hor-
to suo Franciscus Portus Cretensis, Græcorum omnium
hodie facillè doctissimus, ostendit, & semina communè
cauit. Selinon hodièq; uocitant. 248. a. 3. post, Gede

nier a. Fabaginem uel Siliquastrum, teste Bellonio, recen-
tiores nescio qui. 22. post, loquitur, geminum nota-
ad. mihi certe Aceris apud nos uulgaris speciem de-
scribere uidetur. 28. l. idem nomen Ceratoniae ma-
gis. 30. uerba hæc, Videtur autem C. Th. e. abun-
dant. 31. Arbuscula syluestris, initium noui uersus esse
debet: sicut etiam uersus 35. Arborem uite. 38. l. Lutetie
est Sabine genus. 39. post, olent, ad. quidam uite arbor-
em uocant. 51. Clematis. 249. a. 48. pro atris l. albis
23. post, docet. ad. Aliqui Italorum uulgò Perlaro uoca-
tant. Ad finem uersus 36. ad. Huic eadem aut persimi-
lis uidetur quæ infra describitur Conyze maioris nomi-
ne. 250. a. S. pro, infra l. supra. Ad finem uersus 18. ad.
Vide Cotinus. 2. desiderantes. 35. post G. ad. Anguillara
tamen hanc herbam bodicq; in Græcia multis locis ap-
uocari scribit. 50. l. in Sicilia mentionem eius facit.
250. b. uersus sextus et septimus coniungi debent, et ita
legi: Blitum mac peregrinum, folijs ceu amaranti maio-
ris, C. G. Corchoro c. d. etc. 20. l. albis etiam fl. 46. l. Bul-
monach. Q. Lunaria Ad finem uersus 48. ad. Floribus
albicantibus. G. 251. a. 52. post, alpina l. uocetur. Ad
finem ultimi uersus a. V. supra, Alisma alpinum. 251.
b. 27. l. Carduus benedictus, G. Checus uel Atractylis syl-
uestris. In plurimis apud nos hortis, propter magnum et
multiplicem eius in remedijs usum, ne uulgò quidem in-
cognitus, colitur 29. post, status. ad. Sponte nasci in
Lemni campis scribit Bellonius, et uulgò Gaidera
cantha, id est, Asini spina uocari. 251. a. 8. ad finem
uersus a. l. Anguillara hanc Lappulam catartam Pli-
nii facit. 12. caulepra. 20. seipsam. 29. post, bæcam
ad. (acinum potius) 36. l. Reebbee. 39. In ca-
lidis. 352. b. 6. post, G. ad. At Curia in horto Fabri-
cij nostri satis aprico, ad parietem, ubi Sol reflectitur,
plantatum, nuper Iunio mense pulchre florere uidi:
ubi semen etiam anno superiore protulit. 14. feratur.
post, squalore, ad. ut tradit. Et inferius post Cerasio-
num mentionem sub hæc uerba: Cerasus apud nos ra-
rissime inscribitur. Ex insitione quidem ut Curia et alibi,
in Italia alibiq; multò maiora et solidiora poma fert.
E durauit. 259. a. dele hæc uerba, nos l. p. u. ex Theophr.
nucleo natam octauo uel decimo anno fructificare aiunt:
ex insitione citius. Et mox à noui uersus initio: Cerasus
Trapezantia, uel Lauro cerasus, Pistis in horto Ducis. Re-
peritur et Genue, arbore magna et semper uiuens, Bello-
nio teste. 38. post, conatus sum, ad. Huius species altera,
ni fallor, reperitur arbore censere, fructuq; gemello, in
louis flore. 259. b. 12. Alimi. 13. ad finem uersus ad. Hæc
montibus propè Curiam: et in Burgundia, 40. ad si-
nem uersus ad. quatuor cubitorum: sicut et in monte pro-
ximo supra Vuesum oppidum Heluetiorum ad Riurium
lacum, Tinent eadem uulgò uocant, etc. 51. l. refert flo-
ribus albis. et ad finem uersus 52. ad. Hanc in horto Chri-
stophori Piperini nostri natam audio. mihi quidem diffi-
culter in hortis ali posse uidetur. 253. a. 34. emicat. 51.
b. 29. aliquod. 254. b. ad finem uersus 8. ad. Cæruleo in-
Rheticis albis Baubinus noster inuenit. 27. l. Vide
Carduus benedictus et sequentia dele, usque ad Co. 255.
a. 35. ad finem uersus ad. Vide in Bacchari. 34. post, ser-
rat, adde, albicantibus et lanuginosis, ni fallor, modo-
ra. Et uersu 35. ad. Sexto interiji. Sponte alticubi cre-
scit in ripa lacus nostri, radice admodum capillata candi-
dis et proluxis fibris. 45. post, quam l. iidem aliqui uer-
terum Corchorum nominant. 255. b. ad finem uersus 21.
ad. Anguillare Cotinus est arbuscula, quam Itali uulgò
Scolano uocant, alibi Rosa. Eandem nos Barbam Iouis
Plinij facimus. Vide supra. Ad finem uersus 35. ad. Te-
lij, qui uicus est præclarus Telluræ uallis, in horto ad ma-
ceriam consitum uidi, repit autem suis radicibus per ma-
ceriam quoque: et diu durat. 44. post, alpinus. ad. (idem
nimirum genere syluestri iam dicto.) 256. a. 9. post, est
ad. diuersi generis. 256. b. 4. pro idem l. italicus. 6. post,
futurus. l. Sed breui periit. 12. ad finem uersus ad. inde an-
temenses aliquot mihi missus à Calceolario Veronensi phar-
macopola, etiamnum mihi uiret. Eundem postea ac simi-
les Dauco in Rheticis montibus circa Burnium alibiq;
inueni. 15. ad finem uersus a. Dodoneus Tomo 2. iconum
pag. 156. Apium palustre nominat. Sed non placet cum
Eleosclino ueterum idem significante nomine, homony-
miam fieri. 38. l. Pseudodictamnus. 52. pro ad l. apud. 257.
a. post, floruit ad. Hoc anno uixit quidem, sed non floruit.
22. post, uescitur ad. Et ego nuper ex folijs coliculisq; eius
acelarum parauit, quod ut longè suauissimum mihi fuit,
ita etiam saluberrimum. 29. ad finem uersus ad. Eandem
herbam nuper inter Curiam oppidum Rhetie præci-
puum, et Rhenum fl. satis abunde reperi. 48. ad finem
uersus ad. His scriptis à Fr. Calceolario Veronensi phar-
macopola accepti, hanc herbam etiam florentem reperiiri.
257. b. 14. herba, dele. 17. post, albam a. (ut Anguillara)
20. ad finem uersus ad. Alia est Leucacantha, id est, Alba
spina, de qua inferius. 23. ad finem uersus nota geminum
punctum, et ad. quam Itali Egano et Gigano nuncu-
pant: Anguillara non Laburnum, quod lignum eius non
sit album: sed alteram Ebeni Theophrasti speciem esse uult.
33. post, noster sit, dele quæ sequuntur uerba, usque ad, cum
Diosc. 258. a. 11. maritimum. 44. post, nominat l. uel Si-
liquastrum, arborem inde, de qua supra scripsimus: fictis
scilicet nominibus. 52. ad finem uersus nota geminum pun-
ctum, et ad. alij potius ad Ornithopodium Dodonei refe-
runt. 258. b. ad finem uersus 9. notato gemino: ad. sed non
E durauit. 259. a. dele hæc uerba, nos l. p. u. ex Theophr.
et Germanicum nomen quod mox sequitur: in cuius lo-
cum hæc substituit: Sed cauendū est ne quis plantas quatuor
Theophrasti diuersas, Phlogem uel Phlogion, et Diosphy-
ron (arborem, quam Gazæ Latine Iouis flammam uerit,) et
Lychnidem, et Iouis florem confundat. Vide infra in
louis flore. 259. b. 12. Alimi. 13. ad finem uersus ad. Hæc
Pilofella uulgò dicta sit, querendum. 17. quædam. 29. ad
finem uersus ad. Paulum sub ueruce Braultij montis ala-
tisimi, qui Burmio Vallis Telluræ oppido summo immi-
net, Fragariam paruum luteo flore inueni huius fraga Au-
gusto demum maturescere, et suauissima esse aiunt. 260.
a. 9. post, prouenit ad. (sed non durauit.) 18. dele hæc
uerba, Rhaponticum uulgò d. 260. b. 7. post, produrat hō
et geminum: et ad. radice inodora. 8. post, maiore ad. Hoc
in hortulum translata iam biennū mihi durauit, nec dum
floruit. Radice odorata. Repertur et quartū alpinum, sed
multo rarius, (nam proximè dictum in plerisq; altis mon-
tibus, et quidem frequens est,) longioribus folijs: flore ma-
iore, luteo: quod Io. Fabricius è Galanda mōte iuxta Curia
sicum ad me misit. Deinde dele hæc uerba, proximo an. p.

à m. l. h. t. m. q. u. f. 17. post. perficit, nota geminum: et ad
 duratq; etiamnum. In fine uersus 20. ad. Quod si quid
 Victorialis hæc rotunda à Gladiolo Dioscoridis differt,
 species eius saltem proxima fuerit. 27. post. colitur. l. Po-
 lygalon uel cog. In fine uersus 32. dele G. et ad. Hoc equi-
 dem Polygalon Rheticum dixerim: et aliquoties in hor-
 to plantauit, sed non durauit: siue quod radices non satis
 integræ fuerint, siue quod prata montana requirit, aut a-
 liam ob causam. A Ciria in pratis Vuallestadium usq; in-
 ueniri audio, nec amplius postea. [Reperi et luteo flore
 cognatam ei speciem in montibus.] Hoc pabulum uaccis
 hæc augere uulgò creditur: unde et Polygalon uaccinum
 cognominari potest. Versus 39. deleatur, et in uersu 40.
 etiam hæc uerba hortorum. a. f. p. e. ut et delenda: deinde
 l. Gramen Diosc. etc. 41. Canaria. 42. post. cæmeteria. l.
 Theophrasti uerò Cyn. 45. post. subtrahat. l. Italici uulgò
 Capriola, Sanguinaria alijs, in areis hortorum alibiq; sua
 sponte exilit. 53. l. rabinum cognominat uulgò in Bernen-
 sium aut Vallestorum montibus lactarij. 261. a. 1. post.
 necrus, ad. solidis et mucronatis folijs. 2. post. pluribus, l.
 Hoc anno aut amplius in horto mihi durauit: ædemum sine
 caule et flore perijt. uaccis, eius pab. Versus undecimus
 cum tribus sequentibus, abundant. Ad finem uersus 26.
 ad. Eandem aliqui Ebenum putabant nuper. Eriditiores
 Fabam Grecam Plinij, inter Loti species, interpretantur.
 261. b. ad finem uersus 6. ad. Reperitur etiam in alpinis, ut
 Rheticis alijsq; circa saxa. 19. Hemerocalles. Ad finem
 uersus 47. ad. Anguillara Epipactidem Dioscoridis hanc
 facit. 261. a. 39. Hypococcos. 52. laccæ. 262. b. 31. Seris. Ad fi-
 nem uersus 39. ad. Nos nuper etiam in Rheticis alpinis syl-
 uestrem inuenimus, hortensi odoratiorem. 263. d. 18. fo-
 lijs. 25. uersu et 7. ad. Ad finem uersus 48. ad. Hæc scri-
 pseram cum sine flore perijisset animaduerti. Sponte non mi-
 ni in altissimis montibus crescit. ego in Brantio Rheticæ
 proximè uerticem iugi unius reperi. Persimile est illi Mil-
 lesolium alpinum, tum forma foliorum, et floribus; tum
 altitudine frere parit: fedine discernitur. 263. b. 34. post.
 odorata, ad. liquore quodam resinoso imbuta Flore luteo,
 pappefcente, etc. 264. a. post. uersum 13. inferre, Lawroce-
 rasus. Vide in Cerafo. 36. ad finem uersus ad. Sponte in Cre-
 ta crescit, et hyeme uirct, teste Bellonio. 41. ad finem uer-
 sus ad. Alia est Spina alba, de qua in Echynopode leges.
 264. b. ad finem uersus 8. ad. Sicilie. et duos sequentes uer-
 sus adiunge. 41. ad finem uersus ad. In calidioribus quidè
 locis, etiam Gallie, semina proferre audio. 265. d. 4. sine.
 26. Elegie. Ad finem uersus 4. l. Eius species due sunt, ma-
 gnitudine differentes. minor, in altioribus tantum monti-
 bus nascitur. 44. pro luteis l. purpureis. 265. b. 2. Horten-
 sem. Ad finem uersus 34. ad. Ad Glaucem potius retulerim,
 sicut et Doryenium Monspeliensium. 37. l. iam fortè qua-
 tuor cubitorum. Ad finem uersus 4. ad. Crescentienfis Fra-
 xingolum uocat: Itali Bagolaro circa Venetas: Galli cir-
 ca Monspelum Micaacoulier, alibi Fregolier. Mihi quidè
 omnino hæc lotus propriè dicta, nempè Lotophagorum
 uidetur: quam priore loco describit Theophrastus in Pha-
 ride insula nascentem, partim cum nucleo, partim apyro-
 non, id est, sine nucleo uel offe. Ab hac differt, quā in Con-
 tinente nasci tradit: quæ an sit eadem eum Polybij Loto,
 (Zizipho nimirum, id est, luteba nostra) querendum.

Plinius Theophrasti descriptionem, et Cor. Nepotis (qui
 ex Polybio transulsi) confudit. Ab his differt Paba Gre-
 cæ, cuius Plinius meminit, Romæ Lotus olim dicta pro-
 pter fructus suauitatem, etc. 266. a. 17. dele hæc uerba,
 Semen e. l. a. e. u. Et mox l. In Italia montibus etc. 22. l.
 nascitur in pratis, aliquando etiam saxis m. 27. post. G.
 ad. Sed mihi semen ob hyemem prepropterea, non na-
 turuit. 266. b. 11. dissimilis. 27. Ad finem uersus ad. Trans-
 plantauit aliquando sub hyemem plantam quæ proximè
 æstate ad quatuor cubitos excreuerat, in uas satis magnū:
 sed periit. Aliàs multò humilior mihi nata est. digna
 sint. 40. post. uulgò, ad. pomum. 267. a. 26. Acantib. 28.
 subsecutus. 40. post. uiuit, ad. (decimo iam frere anno,
 una eademq; planta.) 267. b. 35. ad finem uersus nota
 to gemino: ad. una longiore, altera rotundiore folio. 46.
 Castaneæ. et in fine uersus, sumpta. 50. ad finem uersus
 ad. Vide infra in Paliuro Africana. Syluestris quidem A-
 ronice species uidetur, quam Sorbū terminalent dicitur,
 33. post. annis, ad. Mihi plantæ quedam ante decennium
 in arca sic plantatæ adhuc uirent, etsi quotannis frere flo-
 res ac semina protrulerint. 268. a. ad finem uersus 6. ad.
 Rubrum in pratis Ciriaui ut floris odore, ita specie
 differre uidetur. 15. ad finem uersus ad. Folia communis
 leuia sunt. hirsuta, inuentu rarior. 25. Caros uel Daucus
 alp. 27. l. quæ sequente etiam æstate in fine iunij pulchre
 germinabant. 28. l. fed paulò post perierunt. Eius pab.
 uersus 29. subnecte hæc uerba: Flores purpurei sunt. Dau-
 ci Cretici loco poni poterit: quo uel efficacior esse con-
 iicio. 268. b. 15. post. hortensis, l. in altis quibusdam mon-
 tibus reperi. 18. l. In Sabaudia, et iuxta Curiam, circa mu-
 ros, sepes et rud. 23. ad finem uersus ad. Fistulariam aut
 Herbam sanctam Itali quidam uocant, Galli Carpentaria-
 riam. 41. l. syluaticam montanāque. 269. a. 9. l. Aloisio
 Anguillare hæc planta uidetur Hippomanes. Ad finem
 uersus 14. ad. Anguillara quidè Lycopersium esse su-
 spicatur. Pomò d' oro uulgò apud Italos dictum, (Galli
 puto Amoris pomum uocant,) alijs Pomum de Peru. Alij
 (inquit) speciem Melenzæ hanc faciunt. 20. ad finem
 uersus distingue, et ad. à nemine, quod sciam, hæcenus
 memorata. 24. foemina. 31. prorsus est. 35. l. pulcherrima
 mos anno secundo profert, et annis pluribus durat. 41.
 dele hæc uerba, Florent a. d. p. 269. b. 13. in fine uersus
 nota geminum, et ad. sed non apprehenderunt. 19. Hyeme
 31. in fine uersus ad. Spine seu Cardui genus est, cuius hoc
 nomine meminuit Athenæus lib. 2. cap. 33. Hodiç in Sici-
 lia (inquit Anguillara) et Calabria Anafordo uocatur,
 ab Italici Scarzo d' asumo. Folia ei lata sunt, parum diuisa,
 hirsuta et alba. In summo caule, titidem spinoso, echinos
 ædit, cum floret, purpureos. Semen simile Cnico est, ubiq;
 nascitur. Post uersum 40. ad. Ophioscorodum. Vide in
 Pancratio. 46. dele omnia quæ sequuntur post. C. 52. He-
 racleoticum. In fine ultimi uersus ad. Hoc mihi etiam nūc
 Iulio mense floret, floribus candidis, acrius ceteris: anno
 superiore è semine mihi enatum. Floret etiam alterum pe-
 reginum, nigris, flore leuiter purpurascente, similis no-
 stro uulgari: sed paulò acrius, eo, ut candido hebetius pau-
 lò, ni fallor. 270. a. 18. Helxine. 270. b. 2. l. In hortiulo pri-
 mum uirere cepit, sed breui interijt s. l. Paliurus frutex
 sepimentis idoneus. s. l. Paliurus Africana, quæ et uino-
 fa cognom

sa cognominari potest, ad superioris differentiam. Apud nos etc. 9. folio 15. post, Ruellius l. Eadem puto Paluro Africana est Connarus Athenæi. Sed illa quam Ruellius describit, Mespilus Aronia est, ut uir quidam eruditus nos monuit. Palurum uerò Aphricam (inquit) describit Io. Leo in Africæ historia Italice scripta, capite de Zarsa. 37. l. D. uidet. & communicato ab eo semine nunc mihi quoque uret. Semen fert anno secundo. 38. Squilla. 271. a. 31. frequentissima 32. hanc. Et mox: Reperitur huius etiam f. 1. p. o. genus. 35. mereretur. 42. ad finem uersum ad. Li- quiritiam syluestrem aliqui nominant. eam reperi tum in plantis, tum in montanis locis, asperis & lapidosis 51. op- pidi. 271. b. 7. Qui chwaq. 272. a. post. parius. pun- cto notatò. l. Maiores d. q. n. f. i. m. s. pratis, (& infra Se- ptimum Rhetice montem, initio Pregalis uallis, uidi, Li- lij etiam odore: & in radice sapore similiter glutinoso. Minor, ut quibusdam uia. etc. 42. ad finem uersum ad. Sed nuper Io. Bauhinus noster, peregrinationis per alpes Rhe- ticas mihi comes, in itinere non procul Aluinouo fonte sul- tui, sibi inuentum ostendit uiuentem. 44. uret. 47. Mercuriali. 51. l. appellant, abundant ea. 272. b. 3. Ere- quentem. 10. post. constat. l. Anguillara quidem nuper Pimpinellam, Sideritidem secundam Dioscoridis esse scri- pti, & in Chio hodieq; Sideritidem uocari. 24. uidet. ceterum singularem, Ranunculis alijs formâ similem. Herba 25. quæ paulo post omnes perierit. 31. post. sapore ad. (huc

quidem in Pseudamomo nostro non deprehen- do,) 41. Zingiber. 47. l. non produxit, & post aliquot menses perijt. 49. crassior. 273. a. 14. libræ. 32. ad finem uersum disjuncte & ad. semina cuidam amico nico dedit, si bene recorder. Ipse quidem in sententijs suis Italice edi- tis super Styrpium nominibus, Putyusa tanquam ignota sibi meminit. 39. ad finem uersum ad. His scriptis, Aceris fo- lium, ex Anglia Scotica uicina, quod illic pleriq; Platani esse putant, Platani nomine ab amico accepi. 273. b. post f. 1. p. o. inferre hæc uerba: Polygonum Rheticum. Trans- fer huc quæ scripsi in Glaux. 27. post. uasis. ad. Anguilla- ra hoc putat Lycopersium esse. Vide supra in Nuce Me- thel. 50. l. nascitur, nisi. 274. b. 17. l. Pulmonaria Vege- tij, eadem quæ Consiligo est. 30. l. adhaerentem quandam Pulm. 42. notato gemino: ad. & in Rhetico postea copio- sissimum graciles eius nodosq; radiculæ reptant, flores ceu chamæmelij sunt, odorati, Bellidis specie, paulò maio- res, folijs albi, capitulis lutei. 273. a. 24. l. folia, et pluribus incisuris, caulis longior, Saradum etc. 44. per. Tertius qui, l. Idem. Ad finem uersum 53. ad. Tertius, quem copio- sum in summo mōte Braulio Rhetorum inueni, sub finem lunij florentem, tria aut quatuor folia habet, simplicia, oblonga, angusta, striata: & florem in humili caule la- psum in summo mōte Braulio Rhetorum inueni, sub finem lunij florentem, tria aut quatuor folia habet, simplicia, oblonga, angusta, striata: & florem in humili caule la- psum in summo mōte Braulio Rhetorum inueni, sub finem lunij florentem, tria aut quatuor folia habet, simplicia, oblonga, angusta, striata: & florem in humili caule la-

EMENDANDA QVAEDAM IN VAL. CORDI LIBRIS.

NUMERVS prior folium indicat, posterior uersum. Si unicus sit numerus, uersum duntaxat folij prænominati. a. faciem folij priorem, b. posteriorem. l. lege.

89. a. 29. Constantes, principio uiridi, mox in ruffo les. 97. b. 6 pro rotundam. l. teretem. 98. a. Iconi po- pallefcente, 39. nigra, ab una parte (nempe in annexu) sita inscribatur, Thalictrum tenuifolium. Atzoi minimi cand. 51. enascuntur, omnes a. spectantes. 90. a. 36. hi titulo adde, luteo etiam flori colore, astringens. } toti decidunt, imis tantum. 90. b. 38. dele hæc uerba, Si- 50. luteis. 52. inutili. 98. b. Iconis inscriptioni adde: Epi- meon Sethi fortè Max. 91. a. 4. l. syluestri. Et reliquis pactis Anguillare. 99. a. 41. pediculi. 99. b. 9. aliquæ in Titulo adde hæc uerba. Scordonia nomen si- olet, & gustatus. 100. a. 34. pro quo l. uno. 100. b. 10. etum est: & syluestris quidem hæc herba est, sed dupliciaq; 101. a. 31. amplexi. Spicas 39. aut floribus triti- aliâ eiusdem generis urbana non inuenitur, ut ci 40. Squamas. 102. b. fuleantur, proferit 39. onustum. hanc ceu differentiam adijcere non sit opus. 103. b. 36. milio 104. a. 14. copiosissimaq; 41. binum 52. 91. b. 6. specie fruticosa. [Itali quidam, &c. 8. Thameocnenum. 104. b. 46. prodeunt 106. a. 37. ter- dictæ. 92. a. Ellebori nigri alterius icon hic addenda fue- na claud. semina. Semen papaueri æquale est, foris etc. rat ex Trago. 83. pag. 156. Est autem hæc uera Consi- 107. a. 10. papauere 22. surculos, 107. b. 46. exerunt, co- ligo. lore in purpura cæruleo, 110. a. Icon. capitulis 76. Papæ- ueris est, non Panic: cuius iconem dedit Tragus 2. 31.

92. b. 40. coliculatorumq; indiuiduis adnatis, 44. quar- p. 661.
tam 93. a. Icon è regione maris leuæ, inscribatur, Elle- borine tenuifolia. 44. Anthora. 93. b. Iconum altera 37. l. conferentiam, prodeunte è folijs. Increfcente spica inscribatur, Bechium. altera, Anchusa minima 34. aut à duobus inferioribus geniculis culmi undiq; 111. a. Vera 46. Anchusis 53. sed alternatis 94. a. distracta: fortè, s. can- bi hæc in fine pagine: (Hæc non Cordi Chamæ- dida: 94. b. 15. carnosus, capitata, omnibus i. n. radicibus peuce, mihi ignota: sed nostra est) transferri de- 20. toto. 95. a. 19. rubentem 21. tenuiorem, d. c. constan- bent ad iconem proximè sequentem. In titulo etiam ca- tem 22. qui. 96. a. 39. geniculis 40. similia ferentes. Cau- pitus 79. l. Eadem uideri poterat Erica altera

Matthioli, (quam Dodonæus quoque alteram facit arbor, non Citrus, quod nomen Cordus pro
citred inceptor eius pictura est, nisi flosculi cō- Arangio fingit: & à Citro adiectū ū sit citreus,
caui & rubescentes obstant: qui in Chamæ- non citrinus. Inde in sequentibus quædā emen-
peuce Cordi, albi & foliacei sunt. 112. a. 10. stricte dabis. 20. myrteos; 24. citrus 27. similis: gustu 42. fū-
14. detractis, cum exaruerunt, iunctis, consp. p. m. quanti- tienda est. Cortices, ramos uestiunt, 44. Citrus 183. b. 5.
tate: 114. b. 39. Radicem habet p. & fibratam. 115. a. 4. Citrus 31. insident. 46. decidunt, sed etiam, 184. a. 2. de
quod flos hic intus hirsutus 13. pondus habet. 20. ducat. nigrandi 10. 20. rigorem 37. spectantes binis
27. oblonge & grandi Colocynthidi, 35. habent, 43. 52. concipiunt. 184. b. 10. tria discrimina 31. sparteis 34.
grandi & rot. 116. a. (cuius pagine numerus emenda- 35. dicte, 185. a. 41. coherentibus: materia arboris m. son-
dus est.) 46. l. auctum, maturefcit. Magnitudo. 116. b. 2. lida. Gaudet. 185. b. 4. Eius ad nos duo peruen. 5. ex-
corte: 116. b. 41. uerrucis 44. abundant. est ea- pressum. Tertium quoque, Omphacinum, 11. scartice odore
dem etc. 118. a. 51. Alphonsepones, 52. succo qui 118. b. Arangis igni auiore 46. noue inuenit. 186. a. 46. Hic ipse
Colocynthidis icon posita superius cap. 97. uidetur pos- est, aut planè cognatus 52. corticis colore, 186. b. 13. occu-
Ranunculi l. Vide in Nona specie infra. 121. a. 50. Pro Geniste angulose icone ponenda est alia, quam de
DECIMAM. 121. b. uersus undecimus, qui incipit, scribit Tragus 3. 8 p. 96. & uerba hæc lemmati adscri-
Weisse Bignonia, etc. coniungatur uersui tertio. 122. b. enda: Tragus hanc simpliciter Genistam, uel
a. 20. Chelidonio simile est, 124. a. Ad titulum cap. 8. Genistam maiorem uocat: sicut & Dodonæus:
adde hæc uerba: Tolus hoc ipsa Eruca est. Cordus qui etiam uirgas angulosas ei adtribuit. Aliud
uero Eruce (cui folia eius & filiquas confert) Genistæ est, omnium humillimum, quod Cha-
nomine, Sinapi album hic intelligere uidetur, mæspartium Tragus uocat libro 2. cap. 7. co-
ut hæctenus plerique pharmacopolæ. Eruca Ro- liculis mirè & peculiari quodam modo folia-
mana quidem, cuius albicant flores, & quam tis, & nodis quibusdam ceu angulis per longia-
hic describit, nō tam album sinapi folijs refert, tudinis interualla distincti.
quam syluestre à Dodonæo dictum.]

28. niueas 15. Lemmati adde: [Hanc, ni fallor, Spar-
169. a. 17. prætereuntem. 27. inuentu.] 44. pro o- ti nomine Fuchsius pingit, Genistæ Hispanicæ
dorem. l. saporem. 169. b. 38. foliorum quæ præter. 47. Dodonæus.] 46. simili & equali. 190. a. 3. lege
Filice exigua. Numeri foliorum 171. & 172. emen- Spartus Hispanicus, uel Hispanica, Græci enim
duntur. 171. a. 2. l. Ea ut facile cōficio, est Lonchi- sceminio gene. proferunt pro stirpe: pro fune
tis altera quorundam, quam &c. Et ad finem autem neutro, 171. a. 17. Dodonæus exigua foliola sum-
lemmatis adde. Viret autem etiam hyeme, de mis ramis appingit, quibus tamen rami adultiore carent.
quo Cordus dubitauit, Trago teste: qui etiam 191. a. Iconi adscribe: Icon hæc est Fabæ Græcæ Pli-
radicem eius describit. 41. l. acetabula uocant, figu- ni, ut eruditiores hodie iudicant, nam ante an-
ram imitantes: 171. b. 40. spacijs aduersus, secta: 172. a. nos uiginti quidam falsò Ebenum, alij Guai-
Trichomanis icon hic abundat, ut excusatum cum uocitabant. 191. b. 12. intus rem. 26. aque 192.
est superius Cap. 177. 173. a. 45. l. plenum, gustu ad- a. 44. plenam, 45. euanescente fortè legendum. 194.
modum suauem & uinosum. 174. a. 36. foliaceum. 174. a. 11. Scyracis fructus uidetur, fractus. 195. a. 8.
b. 24. tamen, dele. 30. staminibus. E singulis (floribus) bi- Lemmati adde: Meminit eiusdem fructus Anguil-
ne 46. De mascula leg. inf. 175. a. 4. Leucio 7. circun- lara nomine Croni & grani Anelcen apud A-
ferentia. Singulis 52. antilycium fit, 51. aliqua. Paucis acu- uicennam. 18. debilescentes. 21. eximenda atq; abijcienda.
leis Pirastri modo sepiur. Materia est dura. 175. b. 8. l. 196. a. quam, abundat: legi tamen potest tanquam. 197.
Saffegrün/ (i. uiridis color pictoribus in usu. a. 2. sed magnam 3. retinent. Imbecilliores 14. interior 39.
uide Tragus) 23. Flores & fructus fert 176. a. 37. mollis: 41. constans: 49. habentia, 197. b. 7. Chebules
Pyracantha 42. armatur. 177. b. 1. desinunt, ut Cucur- 11. Citrinus, Kebalus, 34. rugosus, 49. scrupulum p.
bite. Longitudine 178. a. 17. duranti 178. b. 18. Rhom- CHEBVLA. 52. CHEBVLA à 198. a. pondus æquan-
bacea, 38. subrotunda sunt. luxta 47. pro qui lege cui 179. te, & intus oblongum. 33. Chebule 43 substantia & colo-
b. 7. Grawphen/ id est, (Subfusca), 43. Grize- re similis: 44. corticem colore 48. commendantem. 198.
liçt (Græci 179. a. 17. dicunt) & o. f. experte, facili b. nucibus, abundat, nisi nucum legas. 199. a. 43. Myxa
in ore dissolubiliç, gustu in dulci 180. a. 36. teneriore & uel Sebastii, quos h. S. a. & ipse Syria translati 53. carne
succo flore constant. Sap. 40. uibicibus colore 180. b. 1. Pa- molli, 199. b. 1. lentore, sapore 34. Schænuantho 39. ten-
ternianis 6. profundiusculè 10. succosa, gustu subacida, 4. uiori. 200. a. 19. Gangitide 200. b. 46. Smyrni 201. a.
In summa Coreitith. ferè æq. e. sim. sunt. Colore inter 28. uersicolor: Aceris 201. b. 1. In Lemmate sic. Cen-
181. b. 12. Augustina, 24. odorisq;. 181. b. 3. uulgo dictos, 22. uirum maius quod hic damus, Inulç ferè
una icone exprimere 11. fuscisq;. 18. exomant, 23. Flores lila habet, Helueticis albis non infrequens.
uirentes gemmarum 29. committitur, 17. Cùm etiam 39. Iuglandis autem folia spectantur in altero gene
similis est forma 52. miniatur, 181. a. 8. Lemmati capituli re Italico: cuius folia separatim appinximus. 34.
13. adscribe hæc uerba. Citrus apud ueteres dicitur uiscofo 52. corrosum, sapore & odore acerrimum & su-
uissimum.

uissimum. 202. a. 1. Thapsia maioris in It. nascentis : et ut 47. distent. 211. b. 17. xonis, 33. refrendae: cum 212. b.
 p. l. i. O. nascentis, 17. hoc, abundat. 40. constante: gustu 1. l. Eleagnus Cordi, ut accipi: et Bellonij. Eade est Rhus
 42. afficiente: odore 45. cepta. Et in fine paginae adde, Sylvestris Plinij Dodonaeo. 213. a. 8. De stirpibus 213. b. 5.
 Icon sequitur. 202. b. in Lemmate, Thapsia 203. Turcico 213. b. 37. mucronem. 214. a. 2. post, alium, adde.
 a. 21. leucom: gustu. 203. b. 23. teretes utroq; lateri: 204. Huius species diu maior, ad quatuor cubitos (ni fallor)
 a. 10. inueterata, 21. capiti 205. a. Ad Mahalebi iconem enascens, fructu distinctus gemino reperitur in montibus
 haec adscribes: Mahalebi icon, expressa ad ramu circa Curiam Rhetorum: Orchocarpium nimirum (cuius in
 lum ficcum, quem ab amico eruditissimo ac Sylua meminit Cordus) peculiare genus, rimoso, fisco ac
 cepi Lugduno: nuper autem prope Vueslam op dependente cortice. Eam nobis primus Curia doctissimus
 pidum, quod diei itinere Tiguro distat, Rhæ 10. Pontifella ostendit: qui etiam an rimosus ille pendu=
 ros uersus, copiosam eandem arbusculam inue lueq; cortex ei conueniat, obseruare poterit. 3. simplicia
 ni: Tihntbeere uocant accolæ. 205. b. 50. splendet: medicamenta 14. post Arbutus, adde, (cuius fructum hæc
 gustu. 206. a. 3. acrius multo, 206. b. exhalante q. t. i. e. proximè refert,) 18. urinam 23. magni 31. Cisthum 32.
 est, fuluum, c. a. t. crassescit. 22. de eo 48. hepatis. 207. a. 19. xonensis 41. post, repries, adde, supra lib. 4. cap. 77.
 acescentem. 207. b. 6. post, Eligito, addendum puto gru pag. 205. 44. dele haec uerba, si bene m. 4. 6. sinistram. Ibi
 mis 24. l. Tertia, ex alpina Populo tantum. Quarta pro dem, dele, ni fallor. 49. dele, Huius, cum sequente uersu
 miscue, 26. Aegirine 30. Semydea 52. habent. Reperitur integro, et reliqua usq; ad punctum. 214. b. 5. Dale=
 208. a. 3. scobe 14. Larigne 24. crassius, Larigna resina li= champius. 215. a. 1. Chamæmepilus. 216. a. 17. post,
 quidiu, col. fuluum et pellucidum, St. o. appellatum: 35. ostendit. adde. Species quidem priores quatuor, omnino
 Masculum, Orobias, 40. pendularum 41. Stagonias 208. inter se cognatæ sunt: quintam uero et sextam, etsi mul=
 b. 1. tritione 11. lego, aut ex (uel, in) candido 13. Larigne tum similitudinis habeant cum illis, generis diuersi esse
 38. Mastiche 40. Mastiches, 46. DE RESINA E= apparet, tum forma, tum uiribus, 20. folijs est. 31. appelle=
 LEMNIA Brauauolus Gummi Helemi uel tur 38. appellauit, 52. pro rotundo, l. terete. 217. a. 17. flu=
 Elemi scribit. 209. a. 31. Cistho 36. trahunt, atq; 51. DE diosa antiquitas t. Gratiarum 33. Lipsiæ. Ibidem,
 GVMMI, quod Arabicum cognominant. 209. b. post, fuissent, distingue, et adde, admissurum. 48. mu
 8. DE TRAGACANTHO CAP. CII. adde. nera. 217. b. 6. Chalcantio. 219. b. 7. Lignum Ostryæ
 ueteres Tragacantham uno nomine fecim. gen. 220. b. 36. liquati utri 41. Onychis 44. miniacis. 221.
 tum fruticem ipsum, tum ex radice eius gum a. 8. incanum 12. pile. 221. b. 9. pro minor, legerem maior.
 mi appellant. Huius capituli numerus omisus erat: qua 222. a. 45. Tragij. 222. b. 6. Rbii. 8. Cisthus 41. Pyracantha.
 re et sequentium numeros emendabis. 210. a. 6. DE 223. a. 16. Thelycrania 46. fisis. 223. b. 8. Presilium 26.
 HAMMONIACO Thymiamate uel Ammo grani 49. splendi dissimè. 224. b. 3. Hercynie. 15. Chau=
 niaca (pleriq; enim non aspirant) gutta. 8. thy corum. 225. a. 43. duabus. 225. b. 20. ut sunt 21. bis omni=
 miam 4. 9. Agayllis nom. et i. Libyæ harenis, atq; circa bus. 226. b. 2. alembicum, 3. desillato 9. Anisi: Fundum
 Hammonis 28. Ligustico 210. b. 20. iudicabit. 38. lucens, 33. modica. 227. a. 22. ruffus. 227. b. 20. retorte. 228. a. 8.
 44. Cissampeli, 211. a. numerus paginae emendatur. Ico= fiat. 32. luto 230. a. numerus paginae omisus addatur. 231.
 nis lemma, sic scribe: Scammonium, quale Mons b. 7. Arceuthidii. 233. b. 30. Recoctauillanos 36. idonajis,
 pessuli demonstratur. 42. diffuens. 211. b. 49. Me 234. b. 35. minimi 37. recoctam. 215. a. 9. Allium 29. Hys=
 limum, 211. post, excedentem, addo, coquitur: 46. tamen sopi. 35. Glübirln arbusctum primo. 235. b. 35. Phyllim=
 tis.

F A M H A I O N MICHAELIS BARTH ANNAEBERGENSIS

AD M. MAVRICIUM STEINMETZ SPONSVAM AMICVM S. S. DE
sponsa eius Virgine honestiss. Catharina filia opt. uiri
Ioan. Rallæ pharmacopolæ & ciuis
Lipsici.

DESIERAM nuper componere inutile carmen,
Decrëamq; animo steriles relinquere Musas,
Hoc tam corrupto commotus tempore, quo nunc
Omnia sunt omnes, quo nec discrimine iusto
Vllus honoratur uates, neq; premia cuiquam
Pro quamuis magno redduntur digna labore.
Sed fraudes tantum & crassa ignorantia regnant,
Ac cytharas pulsant miserrande fortis æfelli:
Aut calamos si quando leues tractare liberet,
Decrëam insanos mores uitamq; pudendam
Inuistorum hominum Satyra uexare decenti,
Aut acri stultas Epigrammate pungere mentes.

Donec sunt promissa tibi connubia primum
MAVRICI nōstros inter memorande sodales,
Hic mihi summam aurem uellit Gryneus Apollo,
Admonuitq; & amicitie officijq; decentis.

Gratulor ergo tibi præstanti corpore sponsam,
Et fama egregia, & præclara mente puellam,
Que tibi connubio & stabili sociatur amore,
Quam tibi, si clari generis mouearis amore,
Et patria, & poterunt sat commendare parentes:
Mater honesta, pater priscos superare Crateus
Qui queat, herbarum radices arte secando,
Et folia, & flores, ac fructus inde legendo,
Miscendo & leuos contra medicamina morbos.
Quid quod ea affines iungit tibi sedere CORDO S?
Cordatos uerè CORDOS, quos pulcer Apollo
Ingenius omnes docuit feliciter artes:

Ecquis enim EVRICIO medica præstabat in arte?
Dulcisono quisnam superabat carmine eundem?
Parciæ Germani, & pariter mihi credite uates,
Hoc melius nemo ex uobis Epigrammata lufit,
Arguto uix hunc æquauit carmine uates.
Bilbilis alta tuus, tuus aut Verona Catullus.

At tu à tam multis non sat laudate VALERI
Tu patris egregij & decus immortale tuorum
Europam implesti iuuenilis laudis honore,
Tu iuuenis senibus stirpes monstrare solebas,
Herbarum tibi erat subiecta potentia soli.
Patria testatur non hoc Germania tantum,
Sed docta Ausonia, & terrarum illa inclita Roma,
In qua CORDE tibi tumultum struxere Camæne,
Et celeres obitus, iundentes pectora pugnis
Assidue plangunt, crebra & suspiria uersant,
Necessant longum luctus extendere in æuam.

Tertius et dignus patre tali et fratre PHILIPPVS
Præter Apollineas herbas, studiumq; paternum
Impiger ingenium miras intendit in artes,
Quarum ope adinuenit uaria organa, carnis ob illud
Principibus multum ipse uiris iam cœperat esse,
Inuadæ sed cœptum, nobis mors semper iniqua,
Interrupit opus, morientem uidimus illum,
Nec dudum exanimum sepeliuit Lipsia corpus.

Prætereo AVGVSTI tacitus præconia CORDI,
Illius doctusq; manus, animumq; sagacem,
Quis nil Parthasio, nil concessurus Apelli,
AVGVSTI pingit dum principis ora, uidetur.
Hos CATHARINA uiros iungit tibi sedere iuncta.

Sed non ista tuam mentem mouere, nec est nunc
Illorum usq; ad eò dulcis tibi mentio fori.
Sed magis eximias dotes, frontemq; pudicam
Respecti, & teneram ætatem, moresq; puellæ:
Que quòd honestatem à primis exercuit annis,
Quodq; etate graues coluit, fouitq; parentes,
Quòd uenerata Deum pietatis semina rectè
Imbibit, hoc fecit tua pectoris a faucibus telum.
Nec tua in hoc ratio neq; mentis feruor aberrat,
Nam neq; diuitie, aut clarorum splendor auorum,
Nec tam forma decens quenuquam effecere beatum,
Quam si casta domi, & sceleris si pura sit uxor,
Æterno deuota Deo obseruansq; marito.
Cetera quæ uulgus stupet atq; ingentia ducit,
Hæc per se pè malis largè concessa uidemus,
Fluxa, caduca, boni pulcro uix nomine digna,
In quibus haud quicquam sapiens fiducia ponit.
Non libet exemplis uti prisce siue nouissæ.
Cernimus assidue ueteri à uirtute parentum
Natos deficere, in lepores transire leones,
Ex aquilis molles fieri imbellesq; columbas.
Obuta sunt etiam & notissima nomina eorum,
Qui è Crasus tri exiguo sunt tempore facti,
Quiq; ob diuitias scelera in peruersa ruentes,
Degenerem egerunt, & agunt hoc tempore uitam,
Nec uerò ullus est plus decantata puellæ
Tyndaridis quam forma decens, uerum illius ergò
Lesa fides thalami, prostratum nobile regnum,
Tota decennali sudauit Grecia bello,
Raptori exitio fuit hæc raptæq; Lacenæ.
Quid quòd tam facile hanc morbus populatur & etas
Vi slos in pratis primo spectabilis ortu,
Mox uisus fugiente die languetq; caduq;
Sic hodie forma quam ceu florere uidemus.

Illam castina lux torret uel tertia febre,
Depascens, pulcratq; genas, floremq; decorum.
Ergo bono fragili stultum ergo est fidere formæ,
Stultum auro, aut sola sibi nobilitate placere.

Inde licet forma tua sit CATHARINA decenti,
Sit diues satis, atq; bonus maioribus orta,
Non tamen hæc animum tibi permouere, puellæ
Sed cantatus honos, et pulcræ gloria famæ.

Ipsa etiam integræ uitæ et præconia laudis
Admirata tuæ, studium admirata medendi, et
Sublime ingenium rebus cœlestibus aptum,
Esse tua et dici uoluit, meruiq; uolendo.

Quos igitur uirtus, non luno pronuba iungit,
Quos Deus omnipotens primæui nobilis auctor
Coniungit, stabili sociari iussit amore,
His bona cuncta omnes, his omnia fausta precemur:

Turturibus ceu perpetua est concordia castis,
Sic sine lite torum teneat concordia uestrum.

Vtq; focer si quando tuus tetrapharmaca miscet,
Resinam atq; picem fundit, tundiq; decenter,
Excipit hinc adipe et cera, atq; ex quatuor istis
Commixtis præstat medicamen nobile et unum:
Sic animæ uestræ binæ, sic corpora bina
Coniugio commixta sacro, iungantur in unum,
Vna caro fiant, mens una, una inde resultet,
Nec secum pugnant nec dispar corde uoluntas.
In qua uiuacis superetis secula cerui,
Felicesq; simul plantetis Adoniidæ hortos,
Oscula libantes toties dulcissima uobis,
Coniungunt Paphiæ quoties sua rostra columbæ,
Deniq; in amplexus sic uertiæ brachia uestra,
Ut uarijs hedere circundant flexibus ulmos,
Nec segnes sterili consumite tempora uena,
Sed date maturos domui solatia foetus,
Qui pedibus mox calcantes uestigia uestra,
Et facie referant nobis et mente parentes.

Hæc rata confirmet nutu Deus ipse benigno
Omnipotens, thalami certissimus auctor honesti,
Immensus qui cuncta gubernat trinus et unus.


F I N I S.




a b A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. a
b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z. Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz.
AA.

ARGENTORATI EXCVDE-
bat Iosias Rihelius.

Anno M. D. LXI.





IN VALERII CORDI ANNO. tationes INDEX.

A. BROTONVM	51. Anchusa	63. Auripigmentum	81.
Abrotoninum unguentū	13. Anchusa altera	63.	
Abinthium	51. Androsæmum	61.	B
Abinthium marinum	52. Androsaces	59.	
Acacalis	18. Anemone	48. Baccharis	58
Acacia	20. Anethum	54. Balaninum oleum	11
Acanthium	51. Anethinum unguentum	13 de Balauſtijs priuatim tractatur	23
Acanthus	51. Anisum	54. Ballote	57.
Acanthus sylueſtris	51. Anthemis	59. Balsamum	5
Acetabulum	69. Anthyllis	59. Batis	45
Acetabulum alterum	69. Anthirinum	72. Batrachium	48.
Acetum	77. Aparine	57. Bdellium	14.
Acetum mulsū	77. Aphace	46. Beta	44.
Achilla	63. Apios	75. Bitumen	16
Acinus	53. Apiastrum	57. Blatta sive	29
Aconitum alterum	67. Apium satium	55. Bitum	44
Aconitum Pardalianches	67. Apium palustre	55. Botrys herba	58.
Acorus	1. Apium montanum	55. Brassica	44.
Adarces	82. Apocynon	68. canina Brassica	76.
Adeps	31. Apollinaris	66. Britannica	61.
Adipes uarii	31. Aqua	77. Bromus	71.
Adiantum	72. Aqua marina	77. Buccina	26.
Adipos minus	68. Aqua mulsā	77. Buglossum	71.
Aegilops	72. Araba	46. Bulbus uomitorius	48.
Acris flos	79. Arabica spina	51. Bulbus id est	48.
Acris squama	79. Araneus	30. Bunium	71.
Aerugo	79. Arbutus	25. Bupthalmum	60
Aethiopsis	70. Arcton	70. Buprestis	30
Aëtites	83. Arenalittoralis	84. Butyrum	31
Agallochum	7. Argemone	48. Butyri fuligo	81
Agaricum	49. Argentirecrementum	80.	
Ageratum	66. Argenti spuma	80.	C
Alcea	60. Argentum uiuum	80.	
Alga	69. Arisarum	48. Cacalia	71.
Alica	42. Aristolochia	50. Cadmia	78.
Alisma	60. Armenius lapis	80. Calamus aromaticus	4.
Allium	46. Artemisia	58. Calx	82.
Aloë	51. Artemisia tenuifolia	58. Cannabis sativa	60.
Alfine	68. Arum	48. Cannabis sylueſtris	60.
Althæa	60. Asarum	2. Cancanum	9
Alumen	81. Asclepias	57. Canchrys	56
Alypum	75. Ascyron	61. Cancri	27
Abyssum	57. Asini ungule	29. Cantharides	30
Amaracinum unguentum	23. Aspalatus	5. Capparis	48.
Ambrosia	58. Asparagus	44. Caprarum ungule	29
Ammi	54. Asphodelus	48. Caprificus	25.
Amomum	3. Asplenium	59. Capnos	20.
Ampeloprasum	46. Aster Atticus	71. Cardamomum	1.
Amurca	20. Astragalus	66. Caries lignorum	18
Amygdala	25. Atramentum sutorium	80. Carum	54.
Amygdalinum oleum	11. Atramentum metallicum	81. Caseus omnis	30.
Amylum	43. Atramentum librarium	84. Cassia seu Cassia	3
Anagallis	48. Atera	42. Castanea	22
Anagyris	60. Atriplex	44. Catanance	72
Arcaon	70. Avena	42. Caulalis	45

Cedrites	78	Cornus	24	Epimedium	61
Cedrus	17	Coronopus	45	Epipactis	70
Centaurium maius	50	Cos naxia	84	Epirotica mala	23
Centaurium minus	50	Coslus	4	Epithymum	75
Centunculus	58	Cratægonum	58	Equisetum	65
Cepa	46	Crematæes	79	Equisetum alterum	65
Cephaea, herba	60	Crematum plumbum	79	Equorum lichenes	29
Cera	41	Crimnus	42	Erica	18
Cerasa	23	Crocinum unguent.	13	Marinus Erinaceus	26
Cerucornu	30	Crocodilium	50	Erinus	61
Cerussa	80	Crocomagma	9	Erucæ, in sup.	45
Chalcitis	80	Crocus	9	Eruum	43
Chamedaphne	73	Cucumer sativus	45	Eryngium	51
Chameleia	75	Cucumer agrestis	71	Eupatorium	64
Chameleon albus	50	Cucurbita	45	Euphorbium	56
Chameleon niger	50	Curmi	42		
Chamepitys	61	Cupressus	16		
Chamepeuce	71	Cyclaminus	48		
Chamefyce	75	Cyclaminus altera	48	Faba, legumen	43
Chelidonium maius	49	Cyminum sativum	54	Faba Aegyptia	43
Chelidonium minus	49	Cyminum sylvestre	54	Fex	81
Chondrilla	45	Cynoglossa	71	Pel omne	31
Chrysanthemum	66	Cynobatus seu Cynorrhodus	19	Ferri recrementum	79
Chrysocolla	80	Cyperus	1	Ferrugo	79
Chrysogonum	65	Cyperus Indicus	1	Ferula	56
Chrysocome	65	Cyphi	9	Fibrorum testiculi	28
Cicade	29	Cytini et Balaustij	12	Ficus Cypria	25
Cicer	43	Cytisus	70	Ficus	25
Cicuta	68			Filix	76
Cirsium	71			Fimus animalium	31
Cimices, naves	28			Foeniculum	55
Cinamomum	3	D		Foenogrecinum unguentum	13
Cinamominum unguent.	13	Daphnoides	73	Foenogrecum	43
Cinnabaris	80	Daucus	56	Fraxinus	17
Cionia	27	Delphinium	56	Fuligo Resina	16
Circea	58	Delphinium alterum	56	Fuligo	84
Cistus	20	Dictamnus	52	Fumaria	70
Clematis	61	Dictamnus Cretenfis	52	Fungi	68
Clematis altera	61	Diphryges	81		
Clinopodium	57	Dorycnium	67		
Clymenium	62	Draco marinus	27		
Cnicinum oleum	11	Dracunculus maior	48		
Cnicus	76	Dracunculus minor	48		
Cnidium oleum	11	Dulcis radix	48	Gagates	85
animalium quorundam Coagula	31			Galbanum	57
Coccus infectorius	65			Galerita auicula	29
Ceruleus	80	E		Galion	69
Colchicum	68	Ebenus		Galla	22
Colocynthis	75	Ebulus		Gallinacei	29
Colus rustica	57	Ebur		Galliopsis	69
Colymbades oliuæ	21	Echium		Garus	28
Conchula Indica	27	Terrestres Erinaceus		Genista	74
Conyza	58	Erucæ		Gentiana	49
Corallium	82	Elaphoboscum		Geodes	84
Coriandrum	54	Elatarium		Geranium	18
Coris	61	Elatine		Gingidium	45
Corium ueterum calceamentorū	29	Empetrum		Gladiolus	72
		Ephemerum		Glandes	21
				Glans unguentaria	74
				Glaucium	57

Melilotus
 Melinum unguentum
 Melomeli
 Memphites
 Mendesium unguentum
 Mentastrium
 Mentha sativa
 Mercurialis
 Mespilus
 de Metallicis medicamentis
 Metopium unguentum
 Milium
 Millesfolium
 Minium
 Misy
 Mitula
 Morus
 Mullus piscis
 Multipedes
 Mulsium
 Muscus marinus
 Mures
 Muria
 Muris auricula
 Mus araneus
 Muscus
 Mustela domestica
 Myagros
 Myrrha
 Myrrha boeotica
 Myrrhis
 Myrtus
 Myrtidanum
 Myrtinum oleum

N

Naptha
 Napus
 Narcissus
 Narcissinum unguentum
 Nardus
 Nardus Celtica
 Nardus montana
 Nardinum unguentum
 Nascapthum
 Nasturtium
 Nepeta
 Nerium
 Nigella
 Nigellinum oleum
 Nutrispuma
 Nitrum
 pontica Nux
 Nymphaea

O

Ochra

53 Ocimastrum
 3 Ocimum unguentum
 78 Ocimum
 83 Oenagra
 13 Oenanthe
 52 Oenanthinum unguentum
 52 Oesypus
 76 Olea sativa & sylvestris
 24 Athiopica Olea lacryma
 78 Oleastri oleum
 13 Oleomel
 42 Oleum acerbum
 70 Oleum album
 80 Oleum commune
 81 Oleum mastichinum
 27 Oleum picinum
 25 Oleum Sicyonium
 28 Oleum sylvestris olea
 29 Olusatrum
 77 Olyra
 69 Omotrichus
 30 Omphacites
 82 Omphacium
 49 Omphacomeles
 30 Onobrychis
 7 Ononis
 28 Onosma
 71 Ophiites
 14 Origanum omne
 14 Orminum sativum
 71 Ornithogalum
 23 Orobanche
 23 Orobus
 12 Oryza
 Ostrifagus avis
 Ostracites
 16 Oxyris
 44 Othonna
 74 Oua
 13 candidum Oui
 2 Oxyacantha
 2 Oxalme
 20
 13
 8
 46 Pronia
 52 Paliurus
 68 Palma
 56 Palmae indae
 11 Palmae Thebaicae
 82 Panaces Herculeum
 82 Panaces Asclepium
 25 Panaces Chironium
 59 Panicum
 Papaver erraticum
 Papaver cornutum
 Papaver sativum
 80 Papaver spumeum

P

63 Pancratium
 13 Paronychia
 45 Parthenium
 71 Paspinaca erratica
 58 Paspinaca marina
 13 Pedicularis, herba
 31 pistaculus
 21 Pepo
 21 Peplus, herba
 21 Persea arbor
 11 Petasites
 10 Petroselinum
 10 Peucedanum
 10 Phalangium
 12 Phalaris
 16 Phafelus
 10 Phegus & Ilex
 10 Phœnix
 55 Phyllam, herba
 42 Phrygius lapis
 28 Phu. 3. siue Nardus Cretica
 77 Phycus marinus
 77 Phyllitis
 78 Picea viridis
 60 Piccarum eruce
 51 Picis fuligo
 59 Pinus, viridis
 83 Piper
 52 recentium Piscium iusculum
 59 Pira
 46 Piraster
 46 Pissaspphaltus
 43 Pistacia
 42 Pityides, viridis
 29 Pityusa
 84 Pix liquida
 72 Pix sicca
 49 Plantago
 29 Platanus
 29 Plumbago
 29 Plumbarius lapis
 77 Plumbi recrementum
 Plumbum clotum
 Polemonia
 Polium
 60 Polycnemum
 19 Polygala
 21 Polygonatum
 21 Polypodium
 21 Pompholyx
 53 Poterium
 54 Populus alba
 54 Populus nigra
 42 Porrum
 66 Portulaca
 66 Potamogeton
 66 Propolis
 66 Prunus

Pseudo

Pseudobonium
Pseudodictamnus
Pforium
Psyllium
Ptarmica
Pulegium
Pulicaris
Pulmo urfinus
Pulmo suillus
Pulmo agninus
Pulmo marinus
Pumex
Purpura
Pycnocomum
Pyrethrum
Pyrites lapis
Pytheum

Q

Quercus
Quinquefolium

R

Radicula
Rane
Rapa sativa
Raphaninum oleum
Raphanus
Resine alie
Rhamnus
Rhaponticum
Rhodia radix
Rhus, ipe
Riciniinum oleum
Ricinus
Rose
Rosaceum unguentum
Rosei pastilli, ipe
Rubia
Rubrica fabrilis
Rubrica Sinopica
Rubus
Rubus Ideus
Rumex
Ruscus
Ruta
Ruta sylvestris

S

Sabina, ipe
Saccharum
Sagapenum
Salis flos
Sal
Salis spuma seu lanugo

71. Salamandra
52. Salix
81. Salvia
67. Sambucus
48. Sampsuchinum unguentum
52. Sampsuchus
67. Sandaracha
29. Sanguinalis femina
29. Sanguinalis mascula
29. Sanguis animalium
29. Sapphirus
81. Sarcocolla
26. Samentorum vitium cinis
75. Sarciphabium
56. Satyrium, herba
83. Satyrium alterum
71. Saxifraga
Scandix
Schœnus, ex oleo
Scilla, ex oleo
31. Sciurus
64. Schistum lac
Schistum
Scolopendra marina
Scolymus
48. Scordium
28. Scorodoprasum
43. Scorpioides
11. Scorpio Marinus
44. Scorpio Terrestris
15. Scammonia
18. Selenites
49. Senecio
64. Senecta anguium
22. Sepia
11. Serpillum
74. Serum lactis
20. Sesamoides maius
12. Sesamoides minus
20. Sesamum
60. Sesele
80. Sedum maius
80. Sedium
63. Sideritis
63. Silique
44. Silurus
73. Silybus
53. Sinapi hortense
53. Sinapinum oleum
Sifer
Sifon
Sifymbrium
17. Sium
36. Suis talus
56. Smaris
82. Smilax
81. Smilax hortensis
82. Smilax lenis

30. Smyrnum
21. Smyris lapis
52. Solanum ipe
75. Solanum furiosum
13. Solanum somnificum
53. Sonchus
81. Sorba
61. Sordes statuarum et Gymnasiorum
61. Sory
31. Sordes palastrarum
83. Sparganium
57. Spina alba
82. Spodium
61. Spondylium
59. Spongie
59. Staete
61. Stachys
45. Stibium
4. Stichas
48. Stæbe
30. Stratiotes aquaticus
30. Stratiotes millefolius
83. Strigementa balnearum
27. Strobili
51. Styrax
58. Succinum
46. Sulphur
76. Sycomorus
27. Symphytum petreum
27. Symphytum alterum
75
83. T
69.
27. Tamarix
27. Taxus, arbor
53. Telephium
30. Telline
73. Terebinthus
73. Terra
42. Terra ampelitis
54. Terra ex fornacibus
68. Teste marine
23. Testiculus
63. Testiculus alter
23. Teucrium
28. Tilia
74. Tithymali
46. Thalassomeli
12. Thalictron
44. Thapsia
54. Thecypieris
45. Thlapi
44. Thunus
30. Thus
28. Thuris cortex
73. Thuris fuligo
46. Thuris manna
73. Thymelea

AA iij

Thymbra	33	Vina concinnata marina aqua	77.	Vinum scillicum	77.
Thymoxalme	77.	Vina pluribus diuersisq; odoramentis	Vinum e sycomor	78	
Thymus	52.	condita	78.	Vinum e syluestri uua	77
Tomentum	58.	Vina pluribus herbis condita	78.	Viola	58.
Tordylum	54	Vina uarijs plantis condita	78.	Vitis nigra	71
Torpedo	27.	Vini facultas	77	Viperæ carnes	27.
Tragacantha	51.	Vinum	77	Viscum	57
Tragium	65	Vinum album	77	Vitex	20
Tragium aliud	65	Vinum absinthite	78	Vitis alba	76
Tragus	42.	Vinum aromatite	78.	Vitis nigra	76
Tragus, herba	65	Vinum e baccis iuniperi	78	Vitis syluestris	76
Tribulus	62	Vinum cedrinum	78.	Vinifera uitis	77
Trichomanes	72.	Vinum ex cotoneis malis confectum	Vinus	18	
Trifolium	58		77.	Vnguent, mysa	11.
Tripolium	72.	Vinum ficatum	78	Vngula caprine	29.
Triticum	41.	Vinum byssopite	78	Vrina	32
Trixago	57.	Vinum ex Labruscæ floribus confectum	Vritica	69	
Tubera	46	ctum	78	Vua	77
Tusilago	58	Vinum loco differens	77	Vua passa alba	77
Typha	58.	Vinum meliutes	77.	Vulpinus pulmo	29
		Vinum ex Myrti baccis confectum	78		
		Vinum myrteum	78	X	
Veratrum album	71.	Vinum palmeum	78	Xanthion	72.
Veratrum nigrum	73.	Vinum picatum	78	Xyris	63
Verbasus	70	Vinum pineis nucleis conditum	78		
Verbena supina	66	Vinum ex puniceis	78	Z	
Verbenaca recta	66	Vinum resinatum	78		
Vermes terre	30.	Vinum rosaceum	78	Zea	43
Vesicaria	67	Vinum sapore differens et mixtione	Zingiber	47	
Vetonica	61		77	Zopis, Zingiber	16

INDEX IN III. LIBROS DE STIR- pibus Val. Cor.

A	Alium satium multifidum	144	Artemisia maior	145.	
ABROTONUM	Alium satium amphicarpon	144.	Arum	102.	
canadum,	Alium simplex utrunq;		144	Asarum	112.
seu scemina	107	Aloë	210.	Asclepias	118.
Abrotonum nigrum mascul.	107	Alibea	101.	Asparagus	101
Absinthium	145	Alfine	159	Asplenium	171.
Absinthium dulce	145.	Amarantus purpureus	168	Aster atticus	140
Absinthium Scripium	205.	Anblatum	89	Astragalus, herba	98.
Acacia indica	197	Ammi	117	Astrantia	124
Acer maior	175.	Amonum	195	Auellana Indica	191.
Acer tenui folia	174.	Amygdale minores	198.		
Achillia	136	Anacardium	194.	B	
Aconitum monococcum	151.	Anagyris	190.	Balanus Myrepisca	194.
Acorus	203	Anchusa minima	93.	Balsamella	88.
Adiantum candidum	171.	Anemone tenuifolia	151	Bellium	205
Adiantum nigrum	172	Anemone tenuifolia altera	151	Bechium	93
Aëxoum minimum	98	Anisum	126.	Benzouant	107
Aëxoum serratum	92	Anonymus	176	Benzouinum oleum	207
Agalochum	191.	Apium satium	168	Bistorta	87
Agrimonia	168	Apium agreste	168.	Botrys	106.
Alchimilla	147.	Arangus	183	Brasica	196.
Alium campestre	143	Argemone	135	Brasica agrestis	147

Brasica

Brassica marina
Brassica sylvestris, virgata
Bresma
Bryonia alba seu ruffa
Bryonia nigra
Buglossa longifolia
Buglossa urbana
Buglossa altera urbana

C

Calcitrippa candida
Caprificus
Cardamomum maius
Cardamomum medicre
Cardamomum minus
Carduus sphaerocephalus
Carpesium
Carpobalsamum
Caryum
Caryophyllus minor aut immaturus
Caryophyllus maior aut maturus
Caryophyllorum festucae
Cassa Aromaticae
Cassia folium
Canthamum
Centauris
Centaurium maius
Cepa onata
Ceruisipina
Chamaecerasus montana
Chamaecyparissus vulgaris
Chamaeclema
Chamaedrys
Chamaemephus
Chamaenerium
Chamaepeuce
Chamaepitys prima
Chelidonium minus
Chelidonium palustre
Chelidonia phragmitis
Chinacaradix
Chondrilla tenera

Cicer arietinum
Cicer nigrum
Cichorium
Cichorium sativum
Cicuta maior
Cicuta minor
Cinamomum ch. aracium
Cinnabari
Citrus arbor
Citrus altera
Citrus arbor
Cnicus sativus
Cnicus supinus

205. *Colchicum nigrum*
 96. *Colchicum subrubens*
 196. *Colchicum album*
 116. *Colocynthis fungosa & levis*
 116. *Colocynthis grandis, candida*
 134. *Colocynthis grandis, oblonga*
 109. *Colocynthis grandis, rotunda*
 109. *Colocynthis oblonga, glabra*
Colocynthis turbinata

Colophonis
Colymbades
 159. *Conyza Helenitis*
 184. *Conyza sylvestris, glabra*
 195. *Conyza sylvestris, hirsuta*
 195. *Conyzodes*
 195. *Coralloides*
 87. *Coriandrum*
 195. *Cornus foemina*
 197. *Coronopus sativa*
 100. *Corruda*
Coslus albus
 196. *Coslus Arabicus*
Coslus flauus
 196. *Coslus Syriacus*
 196. *Cotonea mala*
 192. *Cotonea malus sylvestris*
 199. *Cotoneus*
 206. *Crethamum marinum*
 86. *Crocus*
 201. *Cubebe*
 108. *Cuci*
 175. *Cuculi*
 213. *Curcuma longa*
 249. *Curcuma rotunda*
 161. *Cucumis anguinus*
 125. *Cucumis puniceus*
 214. *Cucurbita cameraria*
 215. *Cucurbita plebeia*
 111. *Cuminum sativum*
 109. *Cyclaminus*
 122. *Cytisus albus, sylvestris*
 112. *Cytisus niger, maior*

D

142. *Damaconium calliphylon*
 99. *Damaconium tenuifolium*
 141. *Dauconides maius*
 142. *Dauconides minus*
 162. *Daucus angulosus*
 162. *Daucus conitophyllus*
 192. *Daucus cyanopus*
 207. *Daucus Selino, des*
 183. *Daucus tenuifolius*
 185. *Dipsacus sativus*
 182. *Dipsacus sylvestris*
 167. *Dolichus*
 166. *Doronicum*

162. *Dorycnium*
 163. *Dracunculus henicophyllus*
 163. *Dracunculus palustris*
 118. *Dracunculus polyphyllus*
 118. *Dracunculus primus*
 114. *Drosium*
 115. *Drosomeli*
 115

E

209
 185. *Elleborus albus*
 160. *Endiua*
 160. *Epimedium*
 160. *Eruca maior*
 216. *Eupatorium*
 154. *Eupatorium alterum*
 126. *Euphorbium*
 188

F

137.
 112
 201. *Faba nigra maior*
 201. *Faba vulgaris*
 202. *Fausel*
 202. *Ficus*
 181. *Filipendula*
 188. *Filix latifolia*
 181. *Filix mascula*
 200. *Foenogracum*
 163. *Folia caryophylli*
 196. *Fragula*
 193. *Fraxinella*
 197

G

203.
 203.
 141
 118. *Galanga maior*
 116. *Galanga minor*
 116. *Galbanum*
 205. *Garosmum*
 131. *Gentiana*
 187. *Genista angulosa*
 188. *Genista uncea*
Geranium supinum maius
Gingidium
Gladiolus palustris
 151. *Glycyrrhiza*
 151. *Gratiola*
 159. *Guaiacum*
 159. *Gummi*

H

155
 155
 155. *Halicacabus*
 144. *Hammoniacum*
 106. *Helenium maius*
 105. *Helianthemum*
 127. *Helleborine maior*
 203. *Helleborine tenuifolia*

Helleborus alter niger
Helleborus niger nostrates
Hemerocallis rubens
Hepatica alba
Heraclea
Hiberis maior
Hippia minor
Hirci barba
Hirundinaria
Hordeum glabrum
Hyacinthus sylvestris
Hyoscyamus peruvianus
Hyssopus sativa

I

Imperatoria
Inula
Inula comagena
Intybum nauscosum
Iris lutea
Iris nostras sativa
Iris sylvestris
Iris tenuifolia
Isophyllum
Iulube
Iulube minores
Ixopus

L

Lactuca agrestis
Ladanon
Larigna Resina
Larix
Lasericium
Lauendula maior
Lauendula minor
Lepidium maius
Ligusticum sativum
Lilago
Limnium
Limnopeuce
Limon arbor
Limonis arboris fructus
Lingula vulnecaria
Lithospermum
Lotus sativus
Lupinus sativus
Lycoctonum sativum pentacarpum

Lycoctonum sativum tricarpum

Lycostaphylon foemina
Lycostaphylus mascula

M

Macholebum

91 *Macis seu Macer*
 102. *Malva*
 139. *Malva palustris*
 153 *Malva sativa laciniosa*
 110 *Malva sylvestris recta*
 124. *Malva sylvestris supina*
 159 *Mandragoras albus seu masculus*
 155. *Mandragoras niger seu foemina*
 110. *Mastiche*
 80 *Matricaria*
 107. *Mellicetta*
Melon
Melon moschatellinus
Melongena

124 *Mentha corymbifera minor*
 142. *Mentha corymbifera maior*
 202 *Mentastrium*
 114. *Mercurialis foemina sylvestris*
 134 *Mercurialis mascula syl.*
 132. *Milium Indicum*
 133. *Millefolium terrestre maius*
 133. *Millefolium terrestre minus*
 108 *Millegrana*
 198. *Morus galline*
 199 *Moschatella*
 104 *Myrobalanus*
Myrobalanus dicta Belliricus
Myrobalanus dicta Chebulus
Myrobalanus citrina

157 *Myrobalanus Emblicus dicta*
 209 *Myrrha*
 209. *Myxæ*

N

104. *Nardus Celtica*
 105 *Nardus Saliunca*
 124. *Nascapthum*
 138. *Nigella*
 150. *Nigella cornuta seu sylvestris*
 86 *Nigella Damascena*
 150 *Nux Indica*
 183 *Nux Indica minor*
 183 *Nux moschata*
 153. *Nux moschata mascula*
 93. *Nux Styracina*
 126 *Nux vomica*
 137 *Nymphaea alba*
Nymphaea citrina

O

145 *Ocimum Charyophyllum*
 174. *Ocimum Nabathicum*
 190 *Ocimum nigrum*
Olea
 204. *Oleaster Germanicus*

193. *Oleum Benzoinum*
 179. *Oleum eiusq; differentia.*
 101. *Oleum Syracinum*
 113. *Olinæ*
 114 *Olsenichium*
 148. *Opium*
Opobalsamum
 204 *Opopanax*
Orchis
 204. *Oxycoccum*
 208. *Oxys*

161
 195.
 117.
 118
 90.
 143. *Paeonia foemina*
 153 *Palma Christi*
 156. *Palma Christi alia*
 111. *Palma montana*
 111. *Panicum*
 142. *Papaier cornutum*
 139 *Pardalanches monococcon*
 139 *Parietaria*
 98 *Parthenium*
 139 *Pastinaca nigra sylvestris*
 172. *Pentaphyllum palustre*
 197. *Peplus*
 198 *Perfoliata*
 197. *Persica minora*
 197. *Petasites*
 198 *Peucedanum*
 206 *Pepo*
 199 *Phalaris*

Phascolus seu phaselus
Phasolus minor
Phasolus sativus
 200 *Phumaius*
 192. *Phyllitis*
 128 *Phyllitis lacustris*
 128 *Piperitis*
 128 *Piper album*
 192. *Piper longum*
 193 *Piper nigrum*
 193. *Piræ urbana*
 191 *Pirus*
 194 *Pistacia*
 194 *Ptyospermum*
 98. *Pneumonanthes*
 99 *Potium maius*
Potium minus
Polyacantha
Polychrestum
 147. *Polygalon*
 147 *Polygonatum*
 114. *Polygonatum angulosum*
 184. *Polygonatum tenuifolium*
 186 *Polypodium*

Portulacæ

207
 186
 208
 184.
 149
 210
 206.
 210
 129
 140.
 173
 135
 130
 130
 150.
 110
 132
 151.
 106
 161
 108
 92
 106
 103
 19.
 123
 135.
 118
 108
 127.
 101
 102
 113
 150
 88
 196.
 196
 196.
 176.
 176.
 198
 148
 162.
 124.
 125
 91.
 155.
 133.
 113
 113.
 113


[illegible]


INDEX IN VALERII CORDI SYL- uam obseruationum.

A	B	C	D	E	F	G	
<i>Achates mineaceis maculis</i>	<i>Achates sanguineis uenis ubi</i>	<i>Achates uulgaris, &c.</i>	<i>Achates alius</i>	<i>Acidula</i>	<i>Acidule aliæ</i>	<i>Acidule sapidissimæ</i>	<i>Aëzoum syluestre</i>
<i>Aë purissimum</i>	<i>Aëtites grandis</i>	<i>Aëtites lapis globosus</i>	<i>Aëtites alius</i>	<i>Agaricus in picea syluestri</i>	<i>Alcea species</i>	<i>Alcea quedam</i>	<i>Alumen scissile</i>
<i>Animalia cuniculis similia</i>	<i>Anthyllis breuior</i>	<i>Anthyllis constans</i>	<i>Anthyllis humi sparsa</i>	<i>Anthyllis folijs latiusculis,</i>	<i>Anthyllis maior</i>	<i>Anthyllis minor</i>	<i>Anthyllis tenuis</i>
<i>Aphronitrum</i>	<i>Armenus lapis</i>	<i>Asparagus quidam fruticosior</i>	<i>Atriplicis syluestris genus,</i>				
<i>Bebchion syluestre</i>	<i>Bitumen nigrum,</i>	<i>Bituminis cineres ubi</i>					
<i>Cæruleum pulchrum</i>	<i>Calaminthe quedam</i>	<i>Calaminthe tenuis folia</i>	<i>Calcarius lapis</i>	<i>Capricorni qualia cornua</i>	<i>Cardamomū quoddam pinguius</i>	<i>Caryophylli indicis minores</i>	<i>Cassia fistula</i>
<i>Cassia solo gustu</i>	<i>Centaurium maius Germanic.</i>	<i>Cepe similes fistulibus</i>	<i>Chalcanti uena, &c.</i>	<i>Chalcedonia gemma</i>	<i>Chlorion auis</i>		
<i>Cicuta syluestris</i>	<i>Cistus quid</i>	<i>Cuslyus syluestris</i>	<i>Cp deleta</i>	<i>Conche Indice grandes</i>	<i>Cornua ceruorum, & caprearum</i>	<i>Cornua Dambocci qualia</i>	<i>Cornuaibicum qualia</i>
<i>Cornus femina</i>	<i>Coronopus syluestris</i>	<i>Cotonea malus syluestris</i>	<i>Coton quid</i>	<i>Cotyledon</i>	<i>Creta figulina</i>	<i>Creta nigra</i>	<i>Creta alia</i>
<i>Creta nigra, optima.</i>	<i>Crethamum marinum</i>	<i>Cucumis recto caule</i>	<i>Cutis piscis cuiusdam marini</i>	<i>Cyclaminus globosa radice</i>	<i>Cyclaminus radice orbiculata</i>	<i>Cyperella herba quedam, &c.</i>	
<i>Dactyli Idæi lapides</i>	<i>Dentata</i>	<i>Draco herba acetaria</i>					
<i>Ebenus uera nigerrima</i>							
<i>Ferrarie Ambergenses</i>	<i>Ferrarie celebres</i>	<i>Ferrarie diuites</i>	<i>Ferrarie aliæ</i>	<i>Figulina creta</i>	<i>Figulinum lutum</i>	<i>Fœniculus longo semine</i>	<i>Folium querno simile</i>
<i>Fons quidam largus</i>	<i>Fructus quidam globosus</i>	<i>Frutex marinus</i>	<i>Frutex spinosus,</i>	<i>Fruticulus exiguus</i>	<i>Fruticulus Siciliæ folijs</i>	<i>Fruticulus tenuibus uirgulis</i>	<i>Fungus grandis</i>
<i>Gammehu, Oxychis species</i>	<i>Gemma uena</i>	<i>Genista iuncels uirgis</i>	<i>Glimmer quid</i>	<i>Goldtsoeren quales</i>	<i>Gründtsoeren cuiusmodi</i>	<i>Gypsum</i>	
<i>Hæmatites fistilis</i>	<i>Hæmatites niger</i>	<i>Helleborus candidus</i>	<i>Herba carquacels folijs</i>	<i>Herba caule bicubitali</i>	<i>Herba Cicute</i>	<i>Herba cicute folijs</i>	<i>Herba hederaceus folijs.</i>
<i>Herba folijs latiusculis.</i>	<i>Herba folijs Narcissi</i>	<i>Herba folijs pyrethri</i>	<i>Herba Lycostoni</i>	<i>Herba radice nucis auellane</i>	<i>Herba trientalis</i>	<i>Herba umbellifera</i>	<i>Herba Irinis folijs</i>
<i>Hippion</i>	<i>Hyacinthus minor, candidus, &c.</i>	<i>Hyacinthus diphyllos, Fuchlij</i>	<i>Hyacinthus minor globosis, &c.</i>				
<i>Iaspidis uiridis fragmentum</i>	<i>Iaspis Spadiceus</i>	<i>Iaspionyx</i>	<i>Iris Illyrica</i>	<i>Iuniperus altera non florens</i>	<i>Iuniperus parua</i>		
<i>Lacerte Indice</i>	<i>Lacus salis ubi</i>	<i>Lapides ex Therms racemosi</i>	<i>Lapides & saxa Therms facium</i>	<i>Lapides oblongi</i>	<i>Lapides porosi</i>	<i>Lapis Aëtites Plinij</i>	<i>Lapis calcarius</i>
<i>Lapides Conchoides</i>	<i>Lapides Dactyli Idæi</i>						

Lapides ferrarij	218		Semen herbæ cuiusdam umbelliferæ		
Lapis ferrugineus	219.	O	222.		
Lapis molochites	220		Semen aliud cuiusdam herbæ umbelli=		
Lapis ostracites	219.	Ochra lapidosa, &c.	219.	feræ	222.
Lapis ruffus, &c.	219.	Ochra rubiginosa	218.	Scripium	223.
Larix arbor	223	Oleastrum peculiare genus	223	Smagelon piscis	224.
Lateres Augusta & Nurenbergæ facti	223	Onyx pulcherrima	220.	Simia porcaria	224.
	223	Onyx simplex	218	Similaces Indicæ	223
Lepidium maius sponte ubi nascitur		Ostracites lapis	219.	Spermatis ceti genus	224.
		Ophioglossus	221.	Spinæ Indicæ materia	223.
Lentiscides	223.	Orchocarpi peculiare genus	223	Stannum purissimum	218
Lignum carbonis	218	Orifella quid	221	Stanni uena	218
Lilium sylvestre	221.	Orphus piscis	224.	Steindolen	224.
Lunaria	221.			Steinraben	224.
Lupinus quidam Indicus	223	P		Styrax arbor	223
Lutum figulinum	218			Subulones	224.
Lutum suffusum	220	Petroselinum Indicum	223.	Sulphur	220.
Lycostictum aconitum purpureo flo=		Piper Africicum	222		
re.	221.	Piper Africicum aliud	222		
Lycostictum floribus cœruleis	221.	Pisciculi in fusco pallidi	224.	T	
Lycostaphylos mascula	223	Piscis planus	224.		
Lycus annus	219	Piscis uolitans	223.	Tæda arbor	223
Lynum ostrie arboris	219.	Phleon	222.	Tamariscus scemina	223
Lysimachia minor	223.	Pseudocrantia arbor	223	Terra salsa ubi	220.
		Pseudocyperus	223	Terra uitiola ubi	220.
		Pulmo marinus	223.	Terra purpurea ubi	220.
		Pumex candidus, &c.	220	Testudines	224.
				Thermæ calidæ & frigidæ quid	219
Magnes fissilis	218			Thermæ Caroli	218.
Magnes lapis	218	R		Thermæ sacitæ	219
Magnes ultramarinus	218	Radices in carbonem crematæ	220.	Thermæ in Suenia Vuirtenberg.	219
Maiele	221.	Radix speciei cardopaciæ maioris	223.	Thermæ Mattiæ	219
Marmoris alia species	219.	Ramulus quidam	221	Thlaffi quoddam minutum	221.
Marmor aliud pulcherrimum	220	Resina quedam uitrea	223.	Thelictaria	223
Marmor calcarium	220	Rhamni nigri fructus qualis	222.	Thymelæa minor	221.
Marmor nienfarum candid.	219.	Rhus frutex	222	Tilia grandis	221
Marmor planum, &c.	218	Ricinus quidam	222.	Tractus inter Culmam acutam, & E=	
Marmor purpureum, &c.	219.	Rubra sylvestris	221	lebogium quid	220.
Marmor Salisburgense	220	Rubrica dura	218.	Tragus sylvestris	222.
Marmorosum saxum	220	Rubrica ruffa	218.	Trifolia arbor	221
Materia peregrinæ arboris	223.	Rubrica lapidis Hematitidis	220	Turchoides	218
Melissophyllum sylvestre	223	Rubrica uersicolor	218.		
Melon citrinus Indicus	222	Rumicis species	223.		
Melon citrinus Indicus alius	222	Ruta quedam sylvestris	221.	V	
Melon Indus	223				
Mentastrium odoratum	221.	S		Vena gemmea	22
Mentastrium vulgari simile	221.	Sal in plateis, &c.	219	Viola equina	221.
Monoclonio Artemisiæ herba non dissimilis	223.	Sandalum rubræ species peculiaris	223.	Viscum in populo nigra	221.
		Saxum durum	218.	Vrphus piscis	224.
		Sarda	218		
		Sardonyx	218	X	
		Saxum eminens & candidum in cinereo.	219	Xyris minor	222
		Saxum ex Thermiss genitum	219		
		Saxum ferrugineum	219	Z	
		Saxum marmorosum	220	Zinsein	218









AD ILLEGENTIA ET LABO
RE N. DE BOVRGES EGIN
CHYBERÉ VI HOVR D'UN
E. DE VOYGES D'UN
NOVÈB. AN. 1570